

一片仁心昭万古，千方妙药救众生

按病索药自己当医生

当中医中药再度崛起

本书参考《中国药典 2015 版》《中华本草 2015 版》等，以药用功能来分类索引

前序

百草回春争鹤寿，千方着意续松年。
宁可药架落满尘，但愿世上无病人。
昔有神农尝百草，妙药广施乐万家。
金丹益气增长寿，国药养神保健康。
丹心医疾疗人苦，妙手除疴去病根。
一片仁心昭万古，千方妙药救众生。

岐黄中医 渊源流长

第一版

作者：张 莽 字茶苜 号岐黄大医

当中医中药再度崛起

序 言

国家医典《中华本草》和《中国药典》以及中国中医药管理局的中医药标准作为国家级的医学标准和医学著作，以介绍各种医药动植物矿物，成药，西药为主，在以疾病来检索医药的读者来看，有些不太方便查找，故决定以《中华本草》和《中国药典》两书为主要蓝本，独立建立一套以病索药的医学书籍以方便患者和中医爱好者。

本书仅参考摘抄《中华本草》和《中华医典》等的药物的条目【药名】，【性味与归经】，【功能与主治】，【用法与用量】，【注意】，【贮藏】的字段，同时参考大量中医药古籍以及以中国中医药管理局的中医药词汇标准来勘误和完善，以精简篇幅来满足普通读者的快速检索的需要。本书共收录中成药共 1400 余种，共分疾病种类 27 大类来快速检索药物，按病索药，自己也能当医生。

中医药数千年来的发展，以德行和疗效代代传承，从未隔断。其诊断和用药理论，也是千差万别，《黄帝内经》《难经》奠定了中医药的基理论基础，而张仲景开创了辨证施治的伟大创举，让中医药更加的科学理性，辨证施治对于中医药来说，无异于是一次伟大的革命。举例说明：为什么我们要按经选药呢？因为术业有专攻，人生如此，人体的结构亦如此，而中医药也如此，因为按经选药，可以使药力更为专一。举例说明，如同泻火药：《医学启源·用药备旨》记载：“黄连泻心火；黄芩泻肺火；白芍药泻肝火；知母泻肾火，木通泻小肠火；黄芩泻大肠火；石膏泻胃火；柴胡泻三焦火，须用黄芩佐之；柴胡泻肝火，须用黄连佐之；胆经亦然；黄柏泻膀胱火。”可见各种泻火药的作用部位并不相同，必须遵从不同的经脉位置和症状来选择不同的药物。医圣的辨证施治理论之伟大由此可见一斑。

本书的特点正是贯彻了中医辩证施治的精髓，通过对相同疾病的不同的产生原因来进行详细的分类，真正让患者通过本书来快速达到“同病异治，异病

同治”的中医绝妙理论，精准定位自己所患的疾病类型，然后对症下药，最终快速去除病痛，还自己健康的身体，这是作者决心编著这本书的出发点；同时，作者对于每一大类的疾病产生的原因、病机和治疗方式都做了比较详细的引述，让读者或者患者可以迅速了解自己疾病的由来以及选择治疗疾患的药物。“同病异治，异病同治”，无论是从医学角度，还是社会学角度，无不体现了中医以人为本，以自然循环为道的先进思想，而这对于西医来讲，这是望尘莫及的高度。作者并非是抹黑西医，相反，作者认为由于科技的发达，西医将来会上升到更深的层次，更加广泛的为人民服务，因为毕竟现在的西医已经发展到了细胞和分子、基因的水平，这是人类文明的新高度，对于深入的了解疾病的机理提供了很好的依据。但是对于中医药，我们并不能像某些人所说的已经日薄西山了，恰恰相反，作者认为随着科技的发展，会更加旁门佐证中医理论的伟大之处。大家都知道，中医的基础理论起源于两千多年前的医学巨著《黄帝内经》，我之所以用巨著来评价《黄帝内经》，因为在两千多年前的人类社会，人类文明在物质如此不发达而且连纸都还没有发明的时代，却能够通过长期的观察和研究从而创造性的撰写出如此高深的理论，而且即使今天的中医药学习者依然把它当作进入中医药领域需要学习的首本著作，足见其博大精深，所以用巨著二字，绝不为过。古人的智慧，远在我们今天之人的想象之外。虽然西医有其先进的地方，但是西医的治疗疾病的理论的确是有其局限性的，如果用一句话来描述中西医的差别，可能用“头痛医头，脚痛医脚”来描述西医比较贴切；而用“头痛医脚，脚痛医五脏”来描述中医比较靠谱。举例说明，中药市场上有一种中成药名字是“银翘双解栓”，这个药是用来治疗口腔咽喉和肺部诸病的，但是它的给药方式却非常的奇特：肛门栓剂给药。口腔咽喉肺部之病却要从肛门来治疗，这对于西医来说，简直就是天方夜谭或者说是巫术，即使是普通人看到这样的治疗方式，也会哑然失笑不会相信的。但是现实意义却是，这个治疗方法的确有效果，而且效果还出奇的好，为何会有这样的结果呢？

因为中医理论认为：“肺通过经脉的相互络属而与大肠构成表里关系”，也就是说呼吸系统和大肠是有密切的关联的，这个神奇的发现伟大吗？绝对是伟大的！这就是中西医在治疗疾病上面的理念的巨大差异，同时窥豹一斑，从这个简单的例子我们也能看出中医药的伟大之处，因为中医在治疗疾病的时候，是从身体的全局来考虑问题的；中医认为人体是一个有机的和谐的整体，各个器官和组织互相联系，相互影响，从而形成一个动态平衡的整体。作者在学习西医《内科学》的时候，就对西医在治疗某些疾病的时候，秉承了一种哪里不行割哪里的错误思想，而不是借鉴中医药的独特之处来进行中西医结合治疗顽疾，这也是西医的局限性的所在，西医注重于点，而中医注重于全局。由于两种医疗体系的出发点的差别，所以造就了两种医疗体系观念的巨大差异。但是我相信，无论是中医还是西医，都有其优点和缺陷，它们一定会在未来继续发展，齐头并进，更好的为人类健康服务。

中医认为，优秀的中医因该在疾病还没有产生之前就应该帮助将来会患病的患者除去疾患（这也就是现代西医所称的亚健康人群，只是这个理念比中医晚了2000多年，当然这个亚健康人群的在定义上也比中医的定义差十万八千里）；中等水平的中医会在患者的疾病开始产生苗头的时候帮助患者除去疾患；普通的中医会在患者疾病已经完全爆发后帮助患者除去疾患。这就是药王孙思邈所说的“上医医未病之病，中医医欲病之病，下医医已病之病”。

中医还有一个领先世界的伟大思想，那就是天人合一，即人与自然的和谐统一。其实我们在看中医治疗疾病的时候，在长期的观察和总结的过程中，惊奇的发现，原来自然和人体是如此的和谐统一。举例说明，当天气变化的时候，患有关节疾病的人就会提前感知。而某种流行疾病的产生，和当时的天气变化也是息息相关，比方说流行感冒。再举例说明，最开始地球上诞生的生物是没有眼睛的，但是在进化的过程中为何会进化出眼睛呢？当我们研究生活在绝对暗黑洞穴里面的生物的时候就明白了，因为没有太阳，这些生物的眼睛又退化

了。也就是说因为有太阳，所以生物进化出了眼睛，因为长期黑暗眼睛又退化了，所以太阳也在左右人类的进化，人类的诞生和发展以及日常生活和太阳密切相关！这又是一个天人合一的绝佳的证例。所以说中医不只是一门医学，同时也是一门伟大的哲学。而中医治疗疾病的思路也在实践中得到了很好的验证，反过来又佐证了中医理论的完整和准确，这也是和现代的实践是检验真理的唯一标准不谋而合的。所以说中医是一门永不过时的伟大哲学。

多年前，笔者因为慢性鼻窦炎苦恼不已，在长达十几年的治疗过程中遭受了不少的痛苦，花费过万，然而疗效全无，后来到了流脓血的危险时期，求医无门，自己不得不在网上搜索信息。偶然看到一位武汉的老中医曾经用鱼腥草和青霉素做消炎的疗效对比的信息，受到启发，于是买来鱼腥草口服液直接喷鼻孔，奇迹发生了，长达十几年不愈的鼻窦炎居然一周后痊愈了，后来感冒后复发过两次，又用鱼腥草治愈了；后来在新闻里看到凤凰卫视的主持人刘海若在英国因为意外脑死亡后，西医建议放弃治疗，但是她的父母坚持用专机把她运回中国用中医治疗，在每天喂饲一颗安宫牛黄丸和运用针灸，九十天后，她居然苏醒过来重获新生！从此对伟大的中医药膜拜不已！然而作者学习中医药时间短暂，不足之处难免，还望各位读者批评指正书中的纰漏和错误。作者也会继续不断的努力学习并完善本书，以更加准确完善的资料来以飨读者，共同为伟大的民族瑰宝中医药的再次崛起添砖加瓦。

本书中药品的全部信息均来自国家权威书籍《中国药典》，处方为生产时的用药量，仅作为药方里药材用量比，不可以实际使用！本书作者系中医爱好者，并非执业药师。故本书药方资料仅供参考，使用前请依照合法医师的药方为准，本书不承担任何法律责任！

不为良相，则为良医！……范仲淹

张莽 2020.09.09 -- 2020.12.26 于深圳

中医对诸病之见解

为什么我们会生病？损害我们健康的疾病由何而来？其实疾病的产生是由外在和内在两大原因造成的，中医认为外在由风、寒、暑、湿、燥、火六淫外因所造成的，而内因有喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七情型，外因六淫侵袭我们的身体，导致身体平衡失调而致病。那么为什么七情也会导致我们生病呢？这是由于人体对于外在的各种刺激所引起的不同心理状态，从而心理状态影响了我们的身体的整体运行；而运行不畅则会导致我们气血运行受阻，无法及时输送营养和排泄废物，导致身体平衡失调，从而导致身体不适而生病。

比方说当我们过度喜或者惊的时候，我们的心脏就会受到影响，从而出现心神不安，甚至心悸失眠，睡眠不好则会影响我们食欲、精力等等，从而导致身体平衡失调而致病。而当我们大怒的时候，则会损伤肝脏，因为人在大怒的时候气血会急速上升，导致肝火亢盛，从而出现急躁易怒，肝脏受损。而肝脏主血，肝脏受损则会影响血液运行，从而身体平衡被打破而致病。而当我们忧思过度则会伤害脾脏，因为思虑过度可导致气机郁结，脾失健运，会出现食少便溏，消瘦乏力，身体营养不足导致身体无法抵御外在的六淫，从而身体生病。同样，当人悲忧过度时，肺也会受到损伤，因为悲哀和忧伤可使肺气耗损，长期的忧愁，可导致肺气郁滞不舒，气机闭塞，精神不振，最终气血运输不畅，身体平衡被打破，从而生病。当我们惊恐的时候，则会伤害肾脏。因为恐惧之时，气血趋于下，出现面色苍白(这就是我们平常所说的吓得脸都白了的原因)，头昏欲倒，甚至二便失禁，从而致病。总而言之，七情损伤五脏而致病，是由于气机逆乱反转，导致气血运行失常，阴阳失调，从而身体的健康平衡运行状态被打破而导致生病。

我们应该如何避免生病呢？简单来讲就是饮食有节；起居有常；不妄作劳，勿以耗散其真；勿以欲竭其精；不以物喜勿以己悲；淡泊明志，宁静致远。方能健康长寿，远离疾病，享受健康人生！

一片仁心昭万古，千方妙药救众生

当中医中药再度崛起

目 录

中医对于大脑的研究和诊断	10
头部诸病	12
风痰瘀阻型神昏头痛晕眩癫痫.....	12
痰火热盛动风型神昏眩晕烦躁咽痛惊风.....	13
血瘀肝风型头痛偏头痛眩晕麻木瘀斑癫痫.....	14
外感风寒瘀血阻络型头痛头胀偏头痛.....	16
高脂血高血压型眩晕失眠头痛烦热心悸失眠耳鸣耳聋.....	18
肝阳上亢型眩晕头痛失眠项强迟缓痴呆.....	21
血虚肝旺型头痛眩晕易怒失眠.....	22
肝肾不足型眩晕失眠记忆力减退头痛耳鸣.....	23
肝阳挟痰瘀上扰型眩晕脑动脉硬化.....	24
气虚血瘀型头晕头痛心悸气喘乏力.....	24
瘀血阻滞风邪上扰型偏头痛头晕目眩恶风神经性头痛.....	25
中风后遗症头晕耳鸣视减听衰失眠气短脑功能减退.....	26
惊风癫痫子痫手足抽搐痰涎壅盛神昏谵语.....	26
颅内血肿.....	30
中医对于脾胃的研究和诊断	31
胃消化系统诸病	35
饮食积滞型脘腹胀闷便秘消化不良嗝气吞酸.....	35
气郁食滞型胸胀胃脘疼痛嗝气呕恶.....	40
湿热内停型胃肠积滞脘胀便秘腹泻痢疾.....	41
脾胃湿热型胃脘胀痛胃酸过多慢性胃炎胃溃疡.....	42
脾胃虚寒型胀满腹痛喜温胃炎十二指肠溃疡.....	42
脾胃虚弱型腹闷饮食不化腹痛泄泻嗝气吞酸.....	47
脾胃虚弱中气下陷型泄泻脱肛阴挺子宫脱垂.....	51
脾胃不和型胃脘胀痛恶心嗝气泄泻消化不良.....	53
脾虚气滞型胃炎胃痛胃胀嗝气食欲不振.....	55
气血瘀滞型胃炎胃痛胃胀反酸十二指肠溃疡.....	57
脾胃气滞型胃炎胃胀痛吐酸十二指肠溃疡.....	61
肝胃郁热气滞型胃痛胀满口苦胃炎溃疡.....	61
肝胃不和型胃炎灼痛吐酸十二指肠溃疡胃窦炎.....	64
胃阴不足阴虚型胃胀痛口干胃炎溃疡.....	70
胃火炽盛型口燥舌干头痛目眩大便燥结.....	71
胃阳不足湿阻气滞型胃痛脘闷呕吐酸水.....	71
肾阳衰弱型脾胃虚寒腹痛呕吐泄泻肢冷.....	72

感冒属风寒夹湿内伤食滞型恶寒发热头痛反酸腹痛泄泻.....	73
胃痞瘤木布病剑突痰病消化不良胃胀胃烧泛酸.....	73
平滑肌痉挛型胃及十二指肠溃疡胃肠道肾胆绞痛.....	74
小儿饮食积滞疳症虫积腹痛呕吐二便不畅消化不良.....	74
小儿腹泻腹胀腹痛食少呕吐口干倦怠乏力.....	77
小儿脾胃虚弱厌食面黄体弱大便不调.....	78
中医对于肠道系统的研究和诊断.....	79
肠道消化系统诸病.....	81
胃肠积滞型便秘湿热下痢小便赤黄.....	81
胃肠积热型便秘大便不通脘腹胀满口苦尿黄.....	82
湿热毒蕴型肠炎痢疾便血腹痛腹胀泄泻.....	83
湿热瘀阻血热毒盛型痔疮肛裂肿胀便血肛周湿疹.....	88
热毒蕴结型痢疾便血肠炎结肠炎.....	91
肾阳不足型五更溏泻肠鸣腹胀食少不化久泻肢冷.....	92
脾肾阳虚型血便腹泻肠炎结肠炎腹痛绵绵.....	93
脾肾不足肠腑气滞型晕眩酸软排便乏力便秘肛周疾病.....	95
肝气犯脾型腹痛腹泻腹部不适肠易激综合征.....	95
暑湿感冒型头痛腹痛腹泻恶心呕吐晕车晕船.....	96
久痢伤阴型久泄久痢赤痢蛔厥厥阴头痛.....	96
泄泻痢疾痧气(中暑).....	97
小儿腹泻腹痛泄泻下利赤白中寒.....	97
阴虚型口干咽燥烦热习惯性功能性便秘.....	98
肠热津亏型大便不通脘腹胀满习惯性便秘.....	99
中医对热毒火邪理论的研究和诊断.....	99
热毒上火诸病.....	100
火毒血热型牙痛吐血便秘口舌生疮高热火眼.....	100
火热内盛型口舌生疮咽痛烦热便赤便秘呼吸道感染.....	105
三焦热盛型目赤口鼻疮肿发热头痛尿赤口渴.....	107
肺胃热盛型口疮牙痛肿毒便秘眩晕目赤.....	107
湿热蕴毒型痢疾黄疸尿黄如茶目赤牙肿便血.....	111
脏腑蕴热型血热痒疹疔肿目赤口鼻生疮痢疾.....	111
阴虚火旺型潮热盗汗咯血遗精口干咽痛便赤.....	112
热入心包肝风内动型咽痛高热惊厥抽搐惊风.....	113
肝胆火旺型心烦晕眩耳鸣耳聋胁痛腹胀便秘.....	114
外寒内热型恶寒壮热头痛咽干便赤便秘瘰疬风疹湿疮.....	115
中医对于口腔咽喉的研究和诊断.....	116
口腔咽喉诸病.....	118

热毒蕴结型牙肿溃疡喉痹乳蛾咽炎扁桃体炎.....	118
风热袭肺型咽干咽痛灼热嘶哑扁桃体炎咽炎.....	123
风热外束痰热内盛型嘶哑肿痛喉炎声带小结息肉.....	126
阴虚内热肺热津亏型口鼻干燥咽炎失音扁桃体炎.....	127
阴虚燥热火毒内蕴型咽痛乳蛾白喉扁桃体炎咽峡炎.....	129
外感风热型牙痛咽痛咽炎扁桃体支气管炎.....	130
外感风热肺胃热盛型咽痛发热扁桃体炎咽炎上呼吸道感染.....	133
肺胃热盛型口舌生疮咽痛嘶哑扁桃体炎腮腺炎.....	135
痰湿内阻肝郁气滞型咽喉嘶哑异物感声带肥厚.....	138
心脾湿热型口疮复发性溃疡口干口臭.....	138
牙病.....	138
小儿肺卫热盛型口腔咽喉诸病.....	139
中医对于肝脏胆囊的研究和诊断.....	140
肝脏胆囊系统诸病.....	145
肝肾脾虚阴虚肝郁型急慢性肝炎.....	145
热毒血瘀型赤巴病急慢性黄疸型肝炎胆囊炎.....	146
慢性肝炎早期肝硬化.....	148
肝胆湿热型急慢性黄疸性乙型肝炎胆囊炎.....	148
肝郁气滞脾虚型急慢性肝炎肝痛肝硬化胆囊炎.....	154
肝胆湿热型胆胀尿黄胆囊炎胆结石.....	156
肝胆湿热型口苦热淋湿热带下黄疸耳鸣耳聋头晕.....	158
肝气不舒型胸胁痞闷疼痛食滞不清呕吐酸水.....	160
中医对于心脏系统的研究和诊断.....	161
心脏系统诸病.....	164
瘀血痰瘀闭阻型胸痛心悸眩晕冠心病心绞痛.....	164
瘀血阻络型冠心病高血压高血脂动脉硬化.....	165
气滞血瘀型胸痛心悸眩晕心慌气短心绞痛.....	170
气滞血瘀型冠心病心绞痛胸闷刺痛.....	172
气滞血瘀型冠心病高血压高血脂心绞痛脑梗.....	176
心血瘀阻型胸痛胸闷冠心病心绞痛.....	178
肝肾不足瘀血内停型胸痹胸闷冠心病.....	180
气虚血瘀型胸痹心痛头痛眩晕.....	180
气虚血瘀型冠心病心绞痛胸痛胸闷气短.....	181
气虚血瘀型怔忡心悸房性早搏室性早搏.....	184
痰热瘀阻型冠心病心绞痛.....	185
阳虚血瘀型胸闷心悸气短五心烦热冠心病心绞痛.....	186
气阴两虚型高血压冠心病胸闷心绞痛病毒性心肌炎.....	187

气阴两虚心脉瘀阻型心悸气短胸痛室性早搏房性早搏.....	191
气阴不足心脉瘀阻型心悸气短胸闷自汗乏力脉微.....	192
心气不足心阳不振型冠心病心绞痛胸闷畏寒.....	192
肝阳上亢型高血压头痛眩晕口苦耳鸣高脂血症.....	193
寒凝气滞心脉不通型胸闷心痛冠心病心绞痛.....	195
心力衰竭型心悸气短胸闷喘促面肢浮肿.....	197
心气虚损型胸痹心痛气短心悸乏力头晕.....	197
中医对于呼吸系统的研究和诊断.....	198
呼吸系统诸病.....	213
燥热痰热蕴肺型痰黄黏燥咳少痰干咳支气管炎.....	213
肺肾阴虚型燥咳少痰痰中带血虚劳久咳哮喘气短.....	215
肺脾气虚肾不纳气型咳嗽气管炎肺气肿支气管哮喘.....	217
肺虚型咳嗽气喘痰多肺气肿气管炎支气管炎.....	218
肺热型咳嗽痰多作喘支气管炎.....	219
肺心病气虚血瘀型咳喘气促乏力酸软口唇紫绀.....	221
阴虚肺燥肺热型燥咳痰喘少痰胸闷气短口燥咽干.....	221
虚劳久咳型痰喘支气管哮喘肺气肿肺心病.....	223
胸满气逆型咳喘胸塞喘急气短气管炎.....	226
阳虚痰阻型咳嗽痰多白痰喘促畏寒冬季加重.....	227
痰湿痰浊阻肺型痰多咳嗽支气管炎百日咳.....	228
痰涎水饮停于胸膈型咳喘隐痛顽痰瘰疬痰核.....	231
寒痰犯肺型咳嗽咳痰色白急慢性支气管炎.....	232
痰热阻肺型咳嗽痰多胸满气短痰黄黏支气管炎百日咳.....	233
肝火犯肺型头晕耳鸣咳嗽吐衄痰多黄稠口渴心烦.....	240
外感风寒型咳嗽痰多清稀头痛鼻塞支气管炎哮喘.....	240
外感风热型咳嗽发热恶寒咽痛急慢性支气管炎.....	245
支气管哮喘急性发作期热哮痰瘀伏肺证痰鸣如吼.....	246
小儿咳嗽百日咳支气管炎感冒咳嗽高热惊风.....	246
小儿肺炎咳嗽高热烦躁.....	251
鼻炎鼻塞流涕鼻窦炎过敏性鼻炎.....	252
中医对于身体平衡的研究和诊断.....	258
身体亏虚诸病.....	263
肝肾亏虚型须发早白遗精早泄晕眩耳鸣.....	263
肝肾不足型腰膝酸软遗精早泄头眩耳鸣须发早白.....	264
肝郁脾虚型郁闷胸胀头晕目眩食少经乱.....	265
肾精肾阴亏虚型阳痿遗精早泄头晕耳鸣无力.....	267
肾虚精亏气血两虚型心悸气短酸软乏力.....	271

肾阳不足亏虚型疲乏精冷畏冷酸软眩晕阳痿早泄.....	271
脾气虚型体弱乏力气短心悸虚脱自汗浮肿.....	275
脾肾亏虚阳虚型酸软畏寒尿频乏力腰膝酸痛.....	277
气血两虚型体弱乏力气短心悸经多面色苍白萎黄.....	278
气血不足脾胃虚弱型心悸气短乏力面色萎黄盗汗失眠.....	282
气阴两亏肾不纳气型心悸气短脉微自汗遗精盗汗.....	284
表虚气虚不固型多汗倦怠乏力恶风面色发白.....	285
阳虚欲脱冷汗自出四肢厥逆下利清谷脉微欲绝.....	287
心脾两虚型失眠乏力多梦头昏晕食欲不振崩漏便血.....	287
心肾亏虚型记忆减退晕眩失眠酸软认知障碍.....	288
肺肾两虚阴亏型气喘咳血浮肿眩晕耳鸣腰膝酸软.....	289
中医对于血液循环系统的研究和诊断.....	290
血液系统诸病.....	294
吐血咳血便血胃及十二指肠出血支气管出血崩漏.....	294
原发性及继发性血小板减少性紫癜齿衄.....	295
胃肠消化道出血十二指肠溃疡出血.....	296
血热型咯血衄血尿血便血崩漏血小板减少紫癜.....	297
血瘀气滞型胸闷刺痛瘀斑高脂血症.....	299
痰浊阻滞型头昏胸闷便秘高脂血症.....	300
气滞血瘀型高脂血症.....	302
脾肾两虚痰浊血瘀型高脂血症.....	302
脾肾不足型慢性白细胞减少症.....	302
瘀浊内阻气血不足型动脉硬化高脂血症.....	303
瘀血阻滞型脉管炎硬皮病动脉硬化.....	303
肝肾不足型头昏须发早白头晕目眩高脂血症.....	304
肝肾阴虚挟瘀型头晕耳鸣胸闷便秘高脂血症.....	304
缺铁性贫血再生障碍性贫血.....	305
中医对于泌尿系统的研究和诊断.....	309
泌尿系统诸病.....	314
湿热下注型热淋短赤浮肿肾盂肾炎膀胱炎尿路感染.....	314
气滞血瘀湿热下注型肾结石尿结石肾盂肾炎.....	317
水湿内停型小便胀满水肿腹胀渴不思饮.....	319
急慢性肾炎四肢浮肿头晕耳鸣蛋白尿血尿.....	320
肾不化气清浊不分型白浊小便频数.....	322
肾虚型小便频数夜间遗尿.....	323
脾胃气虚浊瘀内阻升降失调型慢性肾功能不全.....	323
中医对于糖尿病的研究和诊断.....	324

糖尿病诸病	327
气阴两虚口渴喜饮型糖尿病.....	327
气虚内热口渴喜饮易饥型糖尿病.....	331
气阴不足口渴多饮善饥型糖尿病.....	332
心神不宁诸病	333
气血瘀阻型失眠健忘胸痛心悸.....	333
热病攻心虚火内扰型神昏心悸失眠高热惊厥.....	334
肝肾阴血不足型头昏耳鸣心悸健忘失眠.....	335
阴血不足型心悸健忘失眠多梦烦热盗汗.....	336
心脾两虚型心悸健忘失眠体虚食少气短自汗.....	336
心气虚寒型心悸健忘失眠多梦.....	337
心神失养型精神忧郁易惊不寐烦躁.....	338
心阴不足型心悸健忘失眠眩晕耳鸣腰膝酸软.....	338
中医对于中风瘫痪的研究和诊断	339
中风瘫痪昏迷诸病	346
风痰瘀血痹阻脉络型中风口眼歪斜半身不遂昏迷.....	346
风邪中络型口眼歪斜肌肉麻木筋骨疼痛.....	351
痰浊阻窍型气闭昏厥牙关紧闭不省人事.....	351
瘀血阻络兼肾虚型半身不遂口舌歪斜语蹇麻木酸软.....	352
瘀血阻络型中风偏瘫麻木口眼歪斜黑白脉病.....	352
瘀血阻络型脑动脉硬化缺血性中风脑出血偏瘫口眼歪斜眩晕.....	354
气虚血瘀型中风脑血栓口舌歪斜麻木眩晕乏力.....	357
气虚血瘀肝肾不足型中风不遂口舌歪斜麻木.....	359
心脑血管栓塞型中风不遂口舌歪斜偏身麻木.....	361
热入心包型高热惊厥神昏谵语中风昏迷脑炎脑膜炎.....	362
肝阳上亢肝风内动型眩晕项强痰涎言语不清麻木口眼歪斜.....	363
中医对于女性诸病的研究和诊断	364
女性诸病	367
瘀血内阻型痛经血瘀血块恶露腹痛子宫肌瘤难产.....	367
寒凝血瘀型痛经产后腹痛冷痛血块喜热拒按.....	372
气虚血瘀型经闭经乱痛经血块恶露盆腔炎.....	373
气滞血瘀型经少经乱痛经恶露血块乳腺增生.....	376
气血两虚型经乱痛经淋漓不净肢体乏力.....	378
气血两亏型月经失调崩漏早产宫冷不孕.....	380
血虚气滞型经乱经痛赤白带下.....	382
阴虚血热型经多色黑赤白带下.....	383
肝郁血虚型月经失调血块经期烦躁食欲不振.....	384

肝郁脾肾虚弱型经乱痛经闭经崩漏晕眩腰膝酸软.....	385
肝肾不足肾虚气血虚弱型流产早产保胎胎漏胎动.....	387
肝气郁结型乳癖乳房结节胀痛乳腺增生.....	388
脾肾阳虚瘀血阻滞型月经不调冷痛血块久不受孕.....	391
脾虚湿盛型带下量多色白质稀纳少腹胀便溏.....	391
湿热下注型带下病阴道盆腔炎症瘙痒宫颈糜烂.....	392
湿热瘀阻型带下腹痛盆腔子宫炎宫颈炎附件炎带下病月经不调.....	394
湿热瘀阻下焦型热淋尿频尿急尿痛尿赤浑浊.....	399
痰瘀互结气滞型痛经经乱包块不孕子宫内膜异位症.....	399
痰热互结型的乳癖乳痛增生乳腺增生乳腺炎.....	400
产后气血亏损型乳少无乳乳汁不通.....	401
妇科炎症菌痢肠炎呼吸道及泌尿道感染外科感染眼结膜炎.....	401
更年期综合症神经官能症绝经前后诸证.....	402
中医对于男性诸病的研究和诊断.....	405
男性诸病.....	410
前列腺炎尿频尿急湿热淋症尿不尽腰膝痠软.....	410
寒凝气滞型寒疝睾丸坠胀疼痛.....	413
中医对于感冒瘟疫中暑的研究和诊断.....	414
感冒中暑瘟疫诸病.....	420
外感病邪犯少阳证型少阳感冒寒热往来口苦咽干心烦喜呕.....	420
流行性感冒型发热恶寒酸痛鼻塞流涕咳嗽头痛咽痛.....	422
风寒挟湿型风寒感冒发热无汗头重酸痛.....	426
外感风寒型风寒感冒恶寒发热鼻塞无汗咳嗽.....	427
外感风寒表虚型风寒感冒头痛项强有汗咳嗽痰白.....	433
外感风寒内伤食积型风寒感冒头痛腹胀呕吐泄泻.....	433
外感风热型感冒发热咳嗽头痛咽痛上呼吸道感染.....	434
外感风热痰浊阻肺型感冒发热头痛咽痛咳嗽痰白.....	444
外感风热内郁化火型风热感冒发热上呼吸道感染支气管炎.....	445
外感风寒内伤湿滞或夏伤暑湿型胃肠型感冒呕吐泄泻.....	449
小儿感冒胃肠炎呼吸道感染.....	451
中暑瘟疫痧气.....	458
跌打损伤诸病.....	463
跌扑损伤血瘀出血肿痛闪腰岔气.....	463
跌扑损伤骨折脱臼筋伤岔气.....	472
破伤风.....	475
运动劳损肌肉酸痛.....	475
中医对于风湿的研究和诊断.....	477

关节系统诸病	482
风寒湿邪型关节炎麻木疼痛屈伸不利筋脉拘挛.....	482
风寒阻络型关节冷痛麻木关节炎腰椎病坐骨神经痛.....	490
风寒阻络气血瘀滞型痹病腰腿肩颈疼痛筋脉拘挛.....	493
肝肾不足风湿瘀阻型关节疼痛麻木拘挛类风湿性关节炎.....	495
肝肾不足瘀血阻络型骨质增生骨性关节炎风湿关节炎.....	498
肝肾阴虚气滞血瘀型头痛颈项僵直疼痛麻木颈椎病.....	501
气血不足风湿瘀阻型关节肿大僵硬萎缩风湿性关节炎.....	502
阳虚寒湿型颈椎膝关节增生性关节炎畏寒肢冷.....	502
湿热下注阻络型足膝肿痛肢沉关节炎痛风滑膜炎.....	503
热毒血瘀型骨髓炎骨疽红肿疼痛流脓.....	507
神经根型颈椎病肩痛麻木僵硬窜痛.....	507
血瘀阻络型颈椎脊椎肩周病骨性关节炎骨折后遗症.....	508
血瘀气滞脉络闭阻型腰痛腰椎间盘突出.....	509
风湿瘀阻型颈椎病头晕颈项僵硬肩背酸痛.....	509
类风湿型关节炎红斑狼疮.....	510
肾虚气血不足型中老年骨质疏松腰脊酸痛胫膝酸软.....	510
中医对于皮肤病的研究和诊断	512
皮肤科诸病	518
热毒瘀结型溃疡脓疮红肿湿疮疔疮黄水疮.....	518
气滞血瘀热毒壅滞型红斑狼疮.....	521
湿毒蕴结型湿疹皮疹瘙痒粉刺痤疮荨麻疹足癣银屑病.....	521
血热瘀阻型粉刺痤疮丘疹红斑湿疹.....	523
血虚风燥型瘙痒皮肤干燥脱屑.....	523
血虚风盛肾精不足型秃头脱发油腻毛发干燥斑秃产后脱发.....	524
风热瘀阻型黄褐斑粉刺红鼻酒齄.....	524
真菌型脚癣手癣体癣股癣皮肤癣症.....	524
风湿虫毒型鹅掌风脚湿气丘疹水疱脱屑瘙痒.....	525
经络阻隔气血不畅型秃头脱发油风斑秃.....	525
肝肾不足血虚风盛型油风斑秃全秃普秃.....	526
肝肾不足气血瘀阻型白癜风.....	527
银屑病(牛皮癣)玫瑰糠疹白疔.....	528
水火烫伤疮疡肿痛溃烂.....	530
小儿发育成长诸病	532
中医对于眼睛诸病的研究和诊断	534
眼科诸病	541
风邪热毒型目赤肿痛流泪视物不清结膜炎角结膜炎.....	541

肝胆火盛型火眼红肿痛痒羞明多泪多眵结膜炎角结膜炎.....	543
肝阴不足肝气偏盛型眼痛视疲劳近视轻度青光眼.....	544
肝肾阴虚型畏光视物模糊迎风流泪青光眼白内障.....	544
肝肾两亏虚火上炎型翳障瞳孔散大视力减退昏花迎风流泪.....	547
肝肾不足型干涩复视酸软视力下降老年性白内障.....	548
气滞血瘀型老年白内障角膜翳.....	548
脾肾不足型眼目昏花视物不清.....	549
气滞血瘀型视物不清视网膜中央静脉阻塞.....	549
血瘀筋脉阻滞型视力下降不能久视假性近视.....	550
神经系统诸病.....	550
神经性疼痛三叉神经痛坐骨神经痛白脉病面神经麻痹.....	550
神经衰弱型头痛头晕健忘失眠耳鸣心烦乏力.....	551
中医对于听力系统的研究和诊断.....	555
听力系统诸病.....	558
中医对于瘰疬结节结核肿块的研究和诊断.....	559
瘰疬结节结核肿块诸病.....	564
瘰疬瘰瘤乳岩乳癖癌肿关节红肿.....	564
火热内蕴型甲状腺肿大淋巴结核乳腺增生.....	567
中毒解毒诸病.....	568
各种毒症.....	568
蛇虫毒症.....	569
中医对于癌症的研究和诊断.....	570
癌症肿瘤诸病.....	573
各种癌症肿瘤.....	573
胃癌食管癌.....	575
肝癌.....	576
肺癌.....	577
鼻咽癌.....	578
其他疼痛类诸病.....	579
附录一：中医舌诊.....	580
参考书目.....	586
后 记.....	587

中医对于大脑的研究和诊断

脑居于颅内与脊髓相通，由髓汇集而成，故《素问·五藏生成》说：“诸髓者皆属于脑。”《灵枢·海论》也说：“脑为髓之海。”从这里可以看出，在两千多年前的古代中医就已经研究出，脑髓控制着身体的骨髓神经系统而成为身体的中枢系统。

脑的主要功能

脑具有主宰生命活动、主管精神思维和主持感觉运动的功能。

主宰生命活动：脑系生命活动的中枢，统领着人体的一切的生命活动，诸如心搏、呼吸、吞咽食物、排泄二便等等的生理活动，均由脑所主宰和调节。《素问·禁刺论》说道：“刺头，中脑户，入脑，立死。”就足以说明中医学已经发现了脑在人体生命活动中的重要地位。脑能主宰全身，则脏腑组织得其所主，各司其职，协调配合，身体平衡。具体表现为生命力旺盛，健康无忧。若大脑有病，则脏腑组织失其所主，功能紊乱，生命活动发生障碍从而诸病蜂起，甚则严重的时候导致生命活动终止。

主管精神思维：《素问·脉要精微论》说：“头者，精明之府。”头就指颅脑。明·李时珍《本草纲目》也提出“脑为元神之府”，而清·王清任在《医林改错》中更明确的指出来：“灵机记性不在心而在脑。”说明中医学已认识到脑具有主管人体精神思维活动的功能。精髓充盛，脑海充盈，则精神饱满、意识清楚、思维敏捷、记忆力强、情志调和、寐寤正常。若精髓亏虚，脑海不足，可见精神萎靡、意识模糊、思维迟钝、健忘呆滞、情志异常、失眠多梦等病症；若痰火上扰于脑，可见精神错乱、意识昏愤或狂躁、骂詈等症。

主持感觉运动：自《内经》问世后，中医学即将视觉、听觉等感觉功能归属于脑，如《灵枢·海论》说：“髓海不足，则脑转耳鸣，胫痠眩冒，目无所见，懈怠安卧。”清·王清任《医林改错·脑髓说》中记载更为清楚：“两耳通脑，所听之声归于脑。”；“两目系如线长于脑，所见之物归于脑。”；“鼻通于脑，所闻香臭归于脑”；又说小儿“至周岁，脑渐生……舌能言一二字”。王清任在这里明确地指出了大脑与人体言、听、视、嗅、动的关系。脑主管感觉和肢体运动的功能正常，则表现为视物明晰、听觉聪灵、嗅觉灵敏、感觉敏锐、语言流畅、肢体运动自如等。脑主管感觉及肢体运动的功能失常，则有视物不明、听觉失聪、嗅觉不灵、感觉呆滞、步履维艰、语言蹇涩、运动障碍等病症。

脑与五脏的关系

人体精神情志和意识思维活动属于大脑的功能。由于受古代五行学说的影响，重视五脏在人体生命活动中的重要作用，而且五脏精气又为精神活动的物质基础，因此将人体精神情志活动分别归属于五脏，形成了独特的脏腑精神活动系统。

脏腑学说又将人的精神活动总的概括为两类：一是精神活动，包括神、魂、魄、意、志，分别由五脏所主，“心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。”《素问·宣明五

气》。这里的神，是指意识思维活动；魂，是指梦寐变幻；魄，是指动作、感觉；意，是指意念、想法；志，是指志向、记忆等。二是情感活动，包括喜、怒、忧、思、悲、恐、惊，多为表现于外的情感反应，也分属于五脏。即心在志为喜、肝在志为怒、脾在志为思、肺在志为悲、肾在志为恐。如《素问·阴阳应象大论》说：“人有五脏化五气，以生喜、怒、悲、忧、恐。”总之，脑的生理、病理总统一于心而分属于五脏，其中与心、肝、肾三脏关系尤为密切，因此大脑的病变多从五脏论治。

髓

髓是分布于骨骼腔内的精微物质。由于髓在人体的分布部位不同，名称亦异。藏于骨骼内者为骨髓，藏于脊柱内者为脊髓，藏于颅内者为脑髓。髓为肾所藏的先天之精所化生，并由后天之精不断地充养，故《灵枢·经脉》说：“人始生，先成精，精成而脑髓生。”当先天禀赋不足或后天调养失当时，均可影响髓的生成。髓的主要功能为：充养脑髓、滋养骨骼、化生血液。

充养脑髓：脑为髓之海，髓充脑健，则精力充沛、耳聪目明、智力发达。如果肾精不足，精不生髓，脑髓不足，在小儿可见发育迟缓、智力低下；在成人可见神疲倦怠、眩晕耳鸣、智力减退等症。故《灵枢·海论》说：“髓海不足，则脑转耳鸣，胫痠眩冒，目无所见，懈怠安卧。”

滋养骨骼：骨髓位于骨腔之中。精能生髓，髓能养骨。肾精充足，骨髓充盈，骨骼得养，则生长发育正常，骨骼坚强有力，不易折损。若肾精亏虚，骨髓不充，骨骼失养，在小儿则骨骼生长发育迟缓，可见卤门迟闭、骨质痿软、牙齿稀疏等病症；在成人则可见腰膝痿软、行走无力，甚或骨质疏松易折。

化生血液：精与血可以互生，精可生髓，髓可化血。这一理论对中医临床有一定指导意义，在临床治疗某些血虚证时，中医就已经发现，如果只是单用补血养血疗效会有不佳的时候，则加入一些填补肾精的药物以提高疗效，其结果往往都是正面的。

头部诸病

风痰瘀阻型神昏头痛晕眩癫痫

【药名】	牛黄清心丸(局方)
【处方】	牛黄 25.7g 川芎 39g 山药 210g 炒苦杏仁 37.5g 大枣 90g 茯苓 48g 防风 45g 阿胶 51g 白芍 75g 六神曲(炒)75g 麦冬 44g 蒲黄(炒)7.5g 冰片 16.1g 羚羊角 28.4g 雄黄 24g 当归 45g 甘草 150g 黄芩 45g 大豆黄卷 57g 炒白术 75g 桔梗 39g 柴胡 39g 干姜 25g 人参 75g 肉桂 54g 白芷 22.5g 麝香或人工麝香 6.4g 水牛角浓缩粉 28.5g 朱砂 69.7g。
【性状】	本品为红褐色的大蜜丸或水丸；气芳香，味微甜。
【功能与主治】	清心化痰，镇惊祛风。用于风痰阻窍所致的头晕目眩、痰涎壅盛、神志混乱、言语不清及惊风抽搐、癫痫。
【用法与用量】	口服。大蜜丸一次 1 丸，水丸一次 1.6g，一日 1 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1) 水丸每 20 粒重 1.6g；(2) 大蜜丸每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	半夏天麻丸
【处方】	法半夏 360g 炙黄芪 360g 苍术(米泔炙)36g 茯苓 126g 泽泻 36g 炒麦芽 39g 天麻 180g 人参 30g 炒白术 80g 陈皮 360g 六神曲(麸炒)69g 黄柏 54g。
【性状】	本品为浅黄色至棕黄色的水丸；味苦、微甘。
【功能与主治】	健脾祛湿，化痰息风。用于脾虚湿盛、痰浊内阻所致的眩晕、头痛、如蒙如裹、胸脘满闷。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2~3 次。
【注意】	忌食生冷油腻。
【规格】	每 100 丸重 6g。
【贮藏】	密封。

痰火热盛动风型神昏眩晕烦躁咽痛惊风

【药名】	牛黄净脑片
【处方】	人工牛黄 0.21g 连翘 30g 黄连 5g 蒲公英 73g 朱砂 2.1g 煅磁石 21g 猪胆膏 2.1g 雄黄 56g 天花粉 52g 地黄 37g 玄参 52g 大黄 37g 甘草 51g 金银花 21g 黄芩 52g 石膏 51g 珍珠 2.1g 煅石决明 11g 赭石 51g 冰片 5.3g 麦冬 52g 葛根 30g 板蓝根 50g 栀子 30g 郁金 41g。
【性状】	本品为棕褐色片或糖衣片，糖衣片除去包衣后显棕褐色；气清凉，味苦。
【功能与主治】	清热解毒，镇惊安神。用于热盛所致的神昏狂躁，头目眩晕，咽喉肿痛等症。亦用于小儿内热，惊风抽搐等。
【用法与用量】	口服。一次 2~4 片，一日 3 次；小儿酌减，或遵医嘱。
【注意】	体弱或低血压慎用，孕妇忌服。
【规格】	素片每片重 0.34g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	牛黄清宫丸
【处方】	人工牛黄 1.7g 黄芩 170g 天花粉 170g 大黄 170g 地黄 100g 郁金 100g 雄黄 185g 朱砂 135g 金银花 335g 麦冬 170g 莲子心 170g 甘草 170g 栀子 170g 连翘 100g 玄参 70g 水牛角浓缩粉 340g 冰片 35g 人工麝香 1.7g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的大蜜丸；味微苦、辛，凉。
【功能与主治】	清热解毒，镇惊安神，止渴除烦。用于热入心包、热盛动风证，症见身热烦躁、昏迷、舌赤唇干、谵语狂躁、头痛眩晕、惊悸不安及小儿急热惊风。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇禁用；不宜久服。
【规格】	每丸重 2.2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	速效牛黄丸
【处方】	人工牛黄，水牛角浓缩粉，黄连，冰片，栀子，黄芩，朱砂，珍珠母，郁金，雄黄，石菖蒲。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的大蜜丸；气香，味微苦。
【功能与主治】	清热解毒，开窍镇惊。用于痰火内盛所致烦躁不安、神志昏迷及高血压引起的头目眩晕。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2 次，小儿酌减。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清眩丸
【处方】	川芎 200g 薄荷 100g 白芷 200g 荆芥穗 100g 石膏 100g。
【性状】	本品为黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味微甜而后辛、凉。

【功能与主治】	散风清热。用于风热头晕目眩，偏正头痛，鼻塞牙痛。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 6~12g(30~60 丸)，大蜜丸一次 1~2 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)小蜜丸每 100 丸重 20g；(2)大蜜丸每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清眩片
【处方】	川芎 400g 薄荷 200g 白芷 400g 荆芥穗 200g 石膏 200g。
【性状】	本品为浅棕色至棕褐色的片，气芳香，味苦、辛。
【功能与主治】	散风清热。用于风热头晕目眩，偏正头痛，鼻塞牙痛。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每片重 0.55g。
【贮藏】	密封。

血瘀肝风型头痛偏头痛眩晕麻木瘀斑癫痫

【药名】	大川芎口服液
【处方】	川芎天麻
【性状】	本品为棕红色的澄清液体；气香，味苦。
【功能与主治】	活血化瘀、平肝熄风。用于瘀血阻络，肝阳化风所致的头痛、头胀、眩晕、颈项紧张不舒、上下肢或偏身麻木、舌部瘀斑。
【用法与用量】	口服，一次 10ml，一日 3 次，15 天为一个疗程，或遵医嘱，
【注意】	外感头痛、孕妇、出血性脑血管病急性期患者忌用；重症患者请遵医嘱服用。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	天菊脑安胶囊
【处方】	川芎，天麻，菊花，蔓荆子，藁本，白芍，丹参，墨旱莲，女贞子，牛膝。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的粉末；气芳香，味微甜酸、略苦。
【功能与主治】	平肝熄风，活血化痰。用于肝风夹痰证的偏头痛，症见头部胀痛、刺痛、跳痛、痛有定处、反复发作、或伴有头晕目眩、或烦躁易怒、或恶心呕吐，舌暗红或有瘀斑，脉弦。
【用法与用量】	口服。一次5粒，一日3次。
【注意】	妊娠及哺乳期妇女禁用。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	正天胶囊
【处方】	钩藤 336g 川芎 303g 麻黄 168g 细辛 168g 黑顺片 168g 白芍 201g 羌活 168g 独活 102g 防风 168g 地黄 168g 当归 168g 鸡血藤 507g 桃仁 102g 红花 102g 白芷 168g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为褐色的颗粒；气微香，味微苦。
【功能与主治】	疏风活血，养血平肝，通络止痛。用于外感风寒、瘀血阻络、血虚失养、肝阳上亢引起的多种头痛，神经性头痛，颈椎病型头痛，经前头痛。
【用法与用量】	口服。一次2粒，一日3次。
【注意】	(1) 用药期间注意血压监测；(2) 孕妇慎用；(3) 宜饭后服用；(4) 有心脏病史者，用药期间注意监测心律情况。
【规格】	每粒装0.45g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	复方羊角片
【处方】	山羊角 1050g 川芎 350g 白芷 350g 制川乌 250g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄褐色至棕褐色；味微涩。
【功能与主治】	平肝熄风，通络止痛。用于肝风上扰，瘀血阻络所致偏头痛，紧张性头痛。
【用法与用量】	口服。一次5片，一日3次。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重0.32g；(2) 糖衣片(片心重0.31g)；(3) 糖衣片(片心重0.35g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	全天麻胶囊
【处方】	天麻 500g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄白色至黄棕色的细粉或颗粒；气微，味甘。
【功能与主治】	平肝，息风，止痉。用于肝风上扰所致的眩晕、头痛、肢体麻木、癫痫抽搐。
【用法与用量】	口服。一次2~6粒，一日3次。
【注意】	无。

【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

外感风寒瘀血阻络型头痛头胀偏头痛

【药名】	天麻头痛片
【处方】	天麻，白芷，川芎，荆芥，当归，乳香(醋制)。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅棕色至棕色；气微香，味微辛、苦。
【功能与主治】	养血祛风，散寒止痛。用于外感风寒、瘀血阻滞或血虚失养所致的偏正头痛、恶寒、鼻塞。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 片〔规格(2)〕，一次 4~6 片〔规格(1)、规格(3)〕，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.31g；(2) 薄膜衣片每片重 0.62g；(3) 糖衣片片心重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	都梁丸
【处方】	白芷(酒炖) 500g 川芎 125g。
【性状】	本品为浅黄色至棕黄色的大蜜丸；气香，味甜、微辛、苦。
【功能与主治】	祛风散寒，活血通络，用于风寒瘀血阻滞脉络所致的头痛，症见头胀痛或刺痛、痛有定处、反复发作、遇风寒诱发或加重。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 3 次。
【注意】	忌食辛辣食物。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	都梁软胶囊
【处方】	白芷 1128g 川芎 282g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为棕褐色的油状混悬物；气香，味苦。
【功能与主治】	祛风散寒，活血通络，用于风寒瘀血阻滞脉络所致的头痛，症见头胀痛或刺痛、痛有定处、反复发作、遇风寒诱发或加重。
【用法与用量】	口服，一次 3 粒，一日 3 次。
【注意】	忌食辛辣食物。
【规格】	每粒装 0.54g。
【贮藏】	密闭，置阴凉干燥处保存。

【药名】	都梁滴丸
【处方】	白芷 90g 川芎 22.5g。
【性状】	本品为棕黄色滴丸，或为薄膜衣滴丸，除去包衣后显棕黄色；有特异香气，味苦、有麻舌感。
【功能与主治】	祛风散寒，活血通络，用于风寒瘀血阻滞脉络所致的头痛，症见头胀痛或刺痛、痛有定处、反复发作、遇风寒诱发或加重。
【用法与用量】	口服或舌下含服。一次 6 丸，一日 4 次。
【注意】	忌食辛辣食物。
【规格】	(1) 每丸重 30mg；(2) 薄膜衣滴丸每丸重 31mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	正天丸
【处方】	钩藤，白芍，川芎，当归，地黄，白芷，防风，羌活，桃仁，红花，细辛，独活，麻黄，黑顺片，鸡血藤。
【性状】	本品为黑色的水丸；气微香，味微苦。
【功能与主治】	疏风活血，养血平肝，通络止痛。用于外感风邪、瘀血阻络、血虚失养、肝阳上亢引起的偏头痛、紧张性头痛、神经性头痛、颈椎病型头痛、经前头痛。
【用法与用量】	饭后服用。一次 6g，一日 2~3 次。15 天为一个疗程。
【注意】	(1) 用药期间注意血压监测。(2) 孕妇慎用。(3) 宜饭后服用。(4) 有心脏病史，用药期间注意监测心律情况。
【规格】	(1) 每瓶装 60g；(2) 每袋装 6g。
【贮藏】	密封。

高脂血高血压型眩晕失眠头痛烦热心悸失眠耳鸣耳聋

【药名】	山菊降压片
【处方】	山楂 500g 菊花 83.3g 盐泽泻 62.5g 夏枯草 62.5g 小蓟 83.3g 炒决明子 83.3g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味酸、微涩。
【功能与主治】	平肝潜阳。用于阴虚阳亢所致的头痛眩晕、耳鸣健忘、腰膝痠软、五心烦热、心悸失眠；高血压病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5 片〔规格(1)〕，一次 3 片〔规格(2)〕，一日 2 次；或遵医嘱。
【注意】	偶见胃脘部不适，一般可自行缓解。
【规格】	(1) 每片重 0.3g；(2) 每片重 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	山绿茶降压片
【处方】	山绿茶
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显深褐色；味苦。
【功能与主治】	清热泻火，平肝潜阳。用于眩晕耳鸣，头痛头胀，心烦易怒，少寐多梦；高血压、高脂血症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2~4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.2g；(2) 糖衣片片心重 0.2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	天麻钩藤颗粒
【处方】	天麻，钩藤，石决明，栀子，黄芩，牛膝，盐杜仲，益母草，桑寄生，首乌藤，茯苓。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味微苦、微甜；或味苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	平肝熄风，清热安神。用于肝阳上亢所引起的头痛、眩晕、耳鸣、眼花、震颤、失眠；高血压见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 5g(无蔗糖)；(2) 每袋装 10g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	天舒片
【处方】	川芎 784g 天麻 196g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕黄至棕褐色；有特殊的香气，味微苦涩。
【功能与主治】	活血平肝，通络止痛。用于瘀血阻络或肝阳上亢所致的头痛日久、痛有定处，或头晕胁痛、失眠烦躁、舌质暗或有瘀斑；血管神经性头痛，紧张性

<p>【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>头痛，高血压头痛见上述证候者。 饭后口服。一次4片，一日3次，或遵医嘱。 孕妇及月经量多的妇女禁用；偶见胃部不适、头胀和妇女月经过多。 每片重0.34g。 密封。</p>
---	--

<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>天舒胶囊 川芎，天麻。 本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；具特殊香气，味微苦涩。 活血平肝，通络止痛。用于瘀血阻络或肝阳上亢所致的头痛日久、痛有定处，或头晕胁痛、失眠烦躁、舌质暗或有瘀斑；血管神经性头痛，紧张性头痛，高血压头痛见上述证候者。 饭后口服。一次4粒，一日3次；或遵医嘱。 孕妇及月经量过多的妇女禁用；偶见胃部不适、头胀和妇女月经量过多。 每粒装0.34g。 密封。</p>
--	--

<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>牛黄降压丸 羚羊角，水牛角浓缩粉，冰片，党参，决明子，黄芩提取物，薄荷，珍珠，人工牛黄，黄芪，川芎，甘松，郁金，白芍。 本品为深棕色的水蜜丸，或为浅棕绿色至深棕色的大蜜丸；气微香，味微甜、苦，有清凉感。 清心化痰，平肝安神。用于心肝火旺、痰热壅盛所致的头晕目眩、头痛失眠、烦躁不安；高血压病见上述证候者。 口服。水蜜丸一次20~40丸，大蜜丸一次1~2丸，一日1次。 腹泻者忌服。 (1)水蜜丸每20丸重1.3g；(2)大蜜丸每丸重1.6g。 密封。</p>
---	---

<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>牛黄降压片 羚羊角，珍珠，水牛角浓缩粉，人工牛黄，冰片，白芍，党参，黄芪，决明子，川芎，黄芩提取物，甘松，薄荷，郁金。 本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕色；气微香，味微苦、有清凉感。 清心化痰，平肝安神。用于心肝火旺、痰热壅盛所致的头晕目眩、头痛失眠、烦躁不安；高血压病见上述证候者。 口服。一次2片，一日2次。 腹泻者忌服。 每片重0.27g。 密封。</p>
---	--

【药名】	牛黄降压胶囊
【处方】	羚羊角，珍珠，水牛角浓缩粉，人工牛黄，冰片，白芍，党参，黄芪，决明子，川芎，黄芩提取物，甘松，薄荷，郁金。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为暗黄色的粉末，气微香，味微甜、苦，凉。
【功能与主治】	清心化痰，平肝安神。用于心肝火旺、痰热壅盛所致的头晕目眩、头痛失眠、烦躁不安；高血压病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒，一日1次。
【注意】	腹泻者忌服。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	心脑静片
【处方】	莲子心11g 珍珠母46g 槐米64g 黄柏64g 木香7g 黄芩286g 夏枯草214g 钩藤214g 龙胆71g 铁丝威灵仙179g 甘草14g 朱砂7.1g 淡竹叶36g 制天南星57g 人工牛黄7.1g 冰片19.3g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；气香，味微苦、凉。
【功能与主治】	平肝潜阳，清心安神。用于肝阳上亢所致的眩晕及中风，症见头晕目眩、烦躁不宁、言语不清、手足不遂。也可用于高血压肝阳上亢证。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日1~3次。
【注意】	孕妇忌服；本品不宜久服；肝肾功能不全者慎用。
【规格】	(1)薄膜衣片，每片重0.4g；(2)糖衣片，片心重0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	心脑健片
【处方】	茶叶提取物100g。
【性状】	本品为淡黄褐色至棕褐色的片；气微，味涩。
【功能与主治】	清利头目，醒神健脑，化浊降脂。用于头晕目眩，胸闷气短，倦怠乏力，精神不振，记忆力减退。亦可用于心血管病伴高纤维蛋白原症及动脉粥样硬化，肿瘤放疗、化疗所致的白细胞减少症。
【用法与用量】	口服。一次2片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每片含茶叶提取物0.1g。
【贮藏】	遮光，密封。

【药名】	心脑健胶囊
【处方】	茶叶提取物100g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为淡棕色至黄棕色的粉末或颗粒和粉末；气微，味涩。
【功能与主治】	清利头目，醒神健脑，化浊降脂。用于头晕目眩，胸闷气短，倦怠乏力，精神不振，记忆力减退。亦可用于心血管病伴高纤维蛋白原症及动脉粥样

【用法与用量】	硬化，肿瘤放疗、化疗所致的白细胞减少症。
【注意】	口服。一次2粒，一日3次。
【规格】	无。
【贮藏】	每片含茶叶提取物0.1g。
	遮光，密封。

【药名】	愈风宁心片
【处方】	葛根 1000g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味微苦、甜。
【功能与主治】	解痉止痛，增强脑及冠脉血流量。用于高血压头晕，头痛，颈项疼痛，冠心病，心绞痛，神经性头痛，早期突发性耳聋。
【用法与用量】	口服。一次5片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	愈风宁心片
【处方】	葛根 1250g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄褐色至棕褐色的粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	解痉止痛，增强脑及冠脉血流量。用于高血压头晕，头痛，颈项疼痛，冠心病，心绞痛，神经性头痛，早期突发性耳聋。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

肝阳上亢型眩晕头痛失眠项强迟缓痴呆

【药名】	天智颗粒
【处方】	天麻 533g 石决明 533g 桑寄生 533g 首乌藤 533g 栀子 267g 川牛膝 400g 钩藤 533g 杜仲 533g 茯神 267g 槐花 267g 黄芩 267g 益母草 533g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微，味甜、微苦涩。
【功能与主治】	平肝潜阳，补益肝肾，益智安神。用于肝阳上亢的中风引起的头晕目眩，头痛失眠、烦躁易怒、口苦咽干、腰膝痠软、智能减退、思维迟缓、定向性差；轻中度血管性痴呆属上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	(1) 低血压患者忌服。(2) 个别患者可出现腹泻、腹痛、恶心、心慌等症状。(3) 孕妇忌服。
【规格】	每袋装5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清脑降压片
【处方】	黄芩 100g 夏枯草 60g 槐米 60g 煅磁石 60g 牛膝 60g 当归 100g 地黄 40g 丹参 40g 水蛭 20g 钩藤 60g 决明子 100g 地龙 20g 珍珠母 40g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黑棕色；味微苦。
【功能与主治】	平肝潜阳。用于肝阳上亢所致的眩晕，症见头晕、头痛、项强、血压偏高。
【用法与用量】	口服。一次4~6片，一日3次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.33g；(2)糖衣片(片心重0.30g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	清脑降压胶囊
【处方】	黄芩 132g 夏枯草 79g 槐米 79g 煅磁石 79g 牛膝 79g 当归 132g 地黄 53g 丹参 53g 水蛭 26g 钩藤 79g 决明子 132g 地龙 26g 珍珠母 53g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至黑棕色的粉末；味微苦。
【功能与主治】	平肝潜阳。用于肝阳上亢所致的眩晕，症见头晕、头痛、项强、血压偏高。
【用法与用量】	口服。一次3~5粒，一日3次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装0.55g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清脑降压颗粒
【处方】	黄芩 200g 槐米 120g 牛膝 120g 地黄 80g 水蛭 40g 决明子 200g 珍珠母 80g 夏枯草 120g 煅磁石 120g 当归 200g 丹参 80g 钩藤 120g 地龙 40g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的混悬颗粒；味甘、微苦。
【功能与主治】	平肝潜阳。用于肝阳上亢所致的眩晕，症见头晕、头痛、项强、血压偏高。
【用法与用量】	口服。一次2~3g，一日3次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每袋装2g。
【贮藏】	密封。

血虚肝旺型头痛眩晕易怒失眠

【药名】	养血清脑丸
-------------	--------------

【处方】	当归 405.6g 川芎 405.6g 白芍 324.3g 熟地黄 324.3g 钩藤 810.8g 鸡血藤 810.8g 夏枯草 810.8g 决明子 810.8g 珍珠母 810.8g 延胡索 405.6g 细辛 80.8g。
【性状】	本品为包薄膜衣的浓缩丸，除去包衣后显深棕色至棕黑色；气微，味特异。
【功能与主治】	养血平肝，活血通络。用于血虚肝旺所致的头痛眩晕、心烦易怒、失眠多梦。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	本品有平缓的降压作用，低血压者慎用；孕妇忌服。
【规格】	每袋装 2.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	养血清脑颗粒
【处方】	当归 253.5g 川芎 253.5g 白芍 202.7g 熟地黄 202.7g 钩藤 506.8g 鸡血藤 506.8g 夏枯草 506.8g 决明子 506.8g 珍珠母 506.8g 延胡索 253.5g 细辛 50.5g。
【性状】	本品为淡棕黄色至棕色的颗粒；味微甜。
【功能与主治】	养血平肝，活血通络。用于血虚肝旺所致的头痛眩晕、心烦易怒、失眠多梦。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	本品有轻度降压作用，低血压者慎用；孕妇忌服。
【规格】	每袋装 4g。
【贮藏】	密封。

肝肾不足型眩晕失眠记忆力减退头痛耳鸣

【药名】	参乌健脑胶囊
【处方】	人参，制何首乌，党参，黄芪，熟地黄，山药，丹参，枸杞子，白芍，远志，茯神，石菖蒲，黄芩，葛根，粉葛，酸枣仁，麦冬，龙骨(粉)，香附，菊花，卵磷脂，维生素 E。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的颗粒和粉末；味微苦。
【功能与主治】	补肾填精，益气养血，强身健脑。用于肾精不足，肝气血亏所引致的精神疲惫、失眠多梦、头晕目眩、体乏无力、记忆力减退。
【用法与用量】	口服。一次 5~6 粒，一日 3 次；儿童酌减或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	天麻醒脑胶囊
【处方】	天麻 300g 地龙 200g 石菖蒲 300g 远志 200g 熟地黄 100g 肉苁蓉 100g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为淡黄色至棕黄色的颗粒和粉末；气腥，味辛、咸。
【功能与主治】	滋补肝肾，平肝息风，通络止痛。用于肝肾不足，肝风上扰所致头痛，晕，

【用法与用量】	记忆力减退，失眠，反应迟钝，耳鸣，腰酸。
【注意】	口服。一次2粒，一日3次。
【规格】	无
【贮藏】	每粒装0.4g。
	密封。

【药名】	天麻首乌片
【处方】	天麻，白芷，何首乌，熟地黄，丹参，川芎，当归，炒蒺藜，桑叶，墨旱莲，女贞子，白芍，黄精，甘草。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；气香，味微苦。
【功能与主治】	滋阴补肾，养血息风。用于肝肾阴虚所致的头晕目眩、头痛耳鸣、口苦咽干、腰膝痠软、脱发、白发；脑动脉硬化、早期高血压、血管神经性头痛、脂溢性脱发见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次6片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

肝阳挟痰瘀上扰型眩晕脑动脉硬化

【药名】	消眩止晕片
【处方】	火炭母400g 鸡矢藤100g 姜半夏50g 白术50g 天麻50g 丹参100g 当归25g 白芍40g 茯苓50g 木瓜40g 枳实25g 砂仁5g 石菖蒲50g 白芷15g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显浅褐色；气香，味微苦。
【功能与主治】	豁痰，化痰，平肝。用于因肝阳挟痰瘀上扰所致眩晕；脑动脉硬化见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5片，一日3次，4周为一个疗程。
【注意】	无。
【规格】	片心重0.35g(相当于饮片1g)。
【贮藏】	密封。

气虚血瘀型头晕头痛心悸气喘乏力

【药名】	心脑欣丸
【处方】	红景天2000g 枸杞子1000g 沙棘鲜浆286g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的浓缩水丸，气微，味淡〔规格(1)、规格(2)〕；

【功能与主治】	或为黑色至黑褐色的浓缩水丸；气微，味淡〔规格(3)〕。 益气活血。用于气虚血瘀所致的头晕，头痛，心悸，气喘，乏力；缺氧引起的红细胞增多症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋〔规格(1)〕、〔规格(2)〕，一次5丸〔规格(3)〕，一日2次；饭后服。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装1.0g(约1250丸)；(2)每袋装1.0g(约30~40丸)；(3)每丸重0.2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	心脑欣胶囊
【处方】	红景天1000g 枸杞子500g 沙棘鲜浆143g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅褐色的粉末；气微，味淡。
【功能与主治】	益气活血。用于气虚血瘀所致的头晕，头痛，心悸，气喘，乏力；缺氧引起的红细胞增多症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2粒，一日2次；饭后服。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

瘀血阻滞风邪上扰型偏头痛头晕目眩恶风神经性头痛

【药名】	通天口服液
【处方】	川芎，赤芍，天麻，羌活，白芷，细辛，菊花，薄荷，防风，茶叶，甘草。
【性状】	本品为棕色的液体；气香，味辛、微苦涩。
【功能与主治】	活血化瘀，祛风止痛。用于瘀血阻滞、风邪上扰所致的偏头痛，症见头部胀痛或刺痛、痛有定处、反复发作、头晕目眩、或恶心呕吐、恶风。
【用法与用量】	口服。第一日：即刻、服药1小时后、2小时后、4小时后各服10ml，以后每6小时服10ml。第二三日：一次10ml，一日3次。3天为一疗程，或遵医嘱。
【注意】	出血性脑血管病、阴虚阳亢患者和孕妇禁服。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	镇脑宁胶囊
【处方】	猪脑粉，细辛，丹参，水牛角浓缩粉，川芎，天麻，葛根，藁本，白芷。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕黄色的粉末；有特异香气，味微苦。
【功能与主治】	熄风通络。用于风邪上扰所致的头痛头昏、恶心呕吐、视物不清、肢体麻木、耳鸣；血管神经性头痛、高血压、动脉硬化见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4~5粒，一日3次。

【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

中风后遗症头晕耳鸣视减听衰失眠气短脑功能减退

【药名】	甜梦口服液(甜梦合剂)
【处方】	刺五加 53g 蚕蛾 13g 党参 40g 砂仁 5g 山楂 160g 炙淫羊藿 27g 茯苓 27g 法半夏 27g 山药 27g 黄精 67g 桑椹 33g 黄芪 40g 枸杞子 40g 熟地黄 27g 陈皮 27g 制马钱子 1.3g 泽泻 40g。
【性状】	本品为棕红色的液体；味酸甜、微苦。
【功能与主治】	益气补肾，健脾和胃，养心安神。用于头晕耳鸣，视减听衰，失眠健忘，食欲不振，腰膝酸软，心慌气短，中风后遗症；对脑功能减退，冠状血管疾患，脑血管栓塞及脱发也有一定作用。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每支装 (1)10ml；(2)20ml；(3)100ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	甜梦胶囊
【处方】	刺五加 178g 蚕蛾 44g 党参 133g 砂仁 18g 山楂 533g 炙淫羊藿 89g 茯苓 89g 法半夏 89g 山药 89g 黄精 222g 桑椹 111g 黄芪 133g 枸杞子 133g 熟地黄 89g 陈皮 89g 制马钱子 4.4g 泽泻 133g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的颗粒和粉末；味微甜、酸。
【功能与主治】	益气补肾，健脾和胃，养心安神。用于头晕耳鸣，视减听衰，失眠健忘，食欲不振，腰膝酸软，心慌气短，中风后遗症；对脑功能减退，冠状血管疾患，脑血管栓塞及脱发也有一定作用。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 4g。
【贮藏】	密封。

惊风癫痫子痫手足抽搐痰涎壅盛神昏谵语

【药名】	小儿抗癫痫胶囊
【处方】	胆南星，天麻，太子参，茯苓，水半夏(制)，橘红，九节菖蒲，青果，琥珀，沉香，六神曲(麸炒)，麸炒枳壳，川芎，羌活。

【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至黄棕色的粉末；味微苦。
【功能与主治】	豁痰熄风，健脾理气。用于原发性全身性强直阵挛发作型儿童癫痫风痰闭阻证，发作时症见四肢抽搐、口吐涎沫、二目上窜、甚至昏仆。
【用法与用量】	口服。三至六岁一次5粒，七至十三岁一次8粒，一日3次。本品胶囊较大，患儿不习惯或吞服有困难者，可从胶囊中取出药粉冲服。
【注意】	忌食牛羊肉、无鳞鱼及辛辣刺激食物；少数患儿服药后出现食欲不振、恶心呕吐、腹痛腹泻等消化道症状，饭后服用或继续服药1~3周一般可自行消失；停药、减量需在医生指导下进行。
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿惊风散
【处方】	全蝎130g 炒僵蚕224g 雄黄40g 朱砂60g 甘草60g。
【性状】	本品为橘黄色或棕黄色的粉末；气特异，味甜、咸。
【功能与主治】	镇惊熄风。用于小儿惊风，抽搐神昏。
【用法与用量】	口服。周岁小儿一次1.5g，一日2次；周岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每袋装1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	七珍丸
【处方】	炒僵蚕160g 全蝎160g 人工麝香16g 朱砂80g 雄黄80g 胆南星80g 天竺黄80g 巴豆32g 寒食曲160g。
【性状】	本品为朱红色的水丸；气芳香浓郁，味辣、微苦。
【功能与主治】	定惊豁痰，消积通便。用于小儿急惊风，身热，昏睡，气粗，烦躁，痰涎壅盛，停乳停食，大便秘结。
【用法与用量】	口服。小儿三至四个月，一次3丸；五至六个月，一次4~5丸；周岁一次6~7丸，一日1~2次；周岁以上及体实者酌加用量，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每200丸重3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄千金散
【处方】	全蝎120g 牛黄24g 冰片20g 胆南星80g 甘草80g 僵蚕(制)120g 朱砂160g 黄连160g 天麻160g。
【性状】	本品为棕红色的粉末；气芳香，味辛凉而苦。
【功能与主治】	清热解毒，镇痉定惊。用于小儿惊风高热，手足抽搐，痰涎壅盛，神昏谵语。
【用法与用量】	口服。次0.6~0.9g，一日2~3次。三岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄抱龙丸
【处方】	牛黄 8g 胆南星 200g 天竺黄 70g 茯苓 100g 琥珀 50g 人工麝香 4g 全蝎 30g 炒僵蚕 60g 雄黄 50g 朱砂 30g。
【性状】	本品为黄棕色至红棕色的大蜜丸；气微香，味略苦。
【功能与主治】	清热镇惊，祛风化痰。用于小儿风痰壅盛所致的惊风，症见高热神昏、惊风抽搐。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 1~2 次；周岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄镇惊丸
【处方】	牛黄 80g 炒僵蚕 100g 人工麝香 40g 雄黄 100g 钩藤 100g 制白附子 100g 天竺黄 100g 全蝎 300g 珍珠 100g 朱砂 100g 天麻 200g 防风 200g 琥珀 60g 制白附子 100g 薄荷 100g 胆南星 100g 半夏(制)100g 冰片 40g 甘草 400g。
【性状】	本品为黄棕色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气微香，味甜、凉略苦。
【功能与主治】	镇惊安神，祛风豁痰。用于小儿惊风，高热抽搐，牙关紧闭，烦躁不安。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 1g，小蜜丸一次 1.5g，大蜜丸一次 1 丸，一日 1~3 次；三岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	羚羊角胶囊
【处方】	羚羊角 150g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为白色或类白色的粉末，气微腥，味淡。
【功能与主治】	平肝息风，清肝明目，散血解毒。用于肝风内动，肝火上扰，血热毒盛所致的高热惊痫，神昏痉厥，子痫抽搐，癫痫发狂，头痛眩晕，目赤，翳障，温毒发斑。
【用法与用量】	口服。一次 0.3~0.6g，一日 1 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装(1)0.15g；(2)0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	琥珀抱龙丸
【处方】	山药(炒)256g 甘草 48g 天竺黄 24g 枳壳(炒)16g 胆南星 16g 红参 24g 朱砂 80g 琥珀 24g 檀香 24g 茯苓 24g 枳实(炒)16g。
【性状】	本品为棕红色的小蜜丸或大蜜丸；味甘、微苦、辛。
【功能与主治】	清热化痰，镇静安神。用于饮食内伤所致的痰食型急惊风，症见发热抽搐、烦躁不安、痰喘气急、惊痫不安。

【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 1.8g(9 丸)，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次；婴儿小蜜丸每次 0.6g(3 丸)，大蜜丸每次 1/3 丸，化服。
【注意】	慢惊及久病、气虚者忌服。
【规格】	(1)小蜜丸每 100 丸 20g；(2)大蜜丸每丸重 8g。
【贮藏】	密封。

【药名】	熊胆胶囊
【处方】	熊胆粉 50g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄棕色粉末，味苦、微腥。
【功能与主治】	清热，平肝，明目。用于惊风抽搐，咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服。一次 1 粒〔规格(1)〕或一次 2~3 粒〔规格(2)〕，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每粒装 0.2g(含熊胆粉 0.2g)；(2)每粒装 0.25g(含熊胆粉 50mg)。
【贮藏】	密封。

【药名】	癫痫平片
【处方】	石菖蒲 214g 僵蚕 54g 全蝎 54g 蜈蚣 36g 石膏 714g 白芍 214g 煅磁石 300g 煅牡蛎 107g 猪牙皂 107g 柴胡 214g 硼砂 70g。
【性状】	本品为棕褐色的片，或为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色，气香，味微咸。
【功能与主治】	豁痰开窍，平肝清热，熄风定痫。用于风痰闭阻所致癫痫。
【用法与用量】	口服。一次 5~7 片，一日 2 次，小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每片重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	癫痫康胶囊
【处方】	天麻，石菖蒲，僵蚕，胆南星，川贝母，丹参，远志，全蝎，麦冬，淡竹叶，生姜，琥珀，人参，冰片，人工牛黄。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色的粉末；气清香，味苦。
【功能与主治】	镇惊熄风，化痰开窍。用于癫痫风痰闭阻，痰火扰心，神昏抽搐，口吐涎沫者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	医痫丸
【处方】	生白附子 40g 半夏(制)80g 僵蚕(炒)80g 蜈蚣 2g 白矾 120g 朱砂 16g 天南星(制)80g 猪牙皂 400g 乌梢蛇(制)80g 全蝎 16g 雄黄 12g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的水丸；味咸、涩、辛。
【功能与主治】	祛风化痰，定痫止搐。用于痰阻脑络所致的癫痫，症见抽搐昏迷、双目上

【用法与用量】	吊、口吐涎沫。
【注意】	口服。一次 3g，一日 2~3 次；小儿酌减。
【规格】	本品含毒性药，不宜多服；孕妇禁用。
【贮藏】	无。
	密封。

【药名】	桂芍镇痫片
【处方】	桂枝 296g 白芍 444g 党参 222g 半夏(制) 296g 柴胡 296g 黄芩 222g 甘草 148g 生姜 148g 大枣 296g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显褐色；味甘、苦，
【功能与主治】	调和营卫，清肝胆，用于治疗各种发作类型的癫痫。
【用法与用量】	口服，一次 6 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重 0.32g。
【贮藏】	密封。

颅内血肿

【药名】	消瘀康片
【处方】	当归 125g 苏木 125g 木香 100g 赤芍 125g 泽兰 125g 乳香 37.5g 地黄 125g 泽泻 125g 没药 37.5g 川芎 125g 川木通 125g 川牛膝 187.5g 桃仁 125g 续断 125g 甘草 62.5g 红花 125g 香附 100g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕褐色至褐色；味苦、甘。

【功能与主治】	活血化瘀，消肿止痛。用于治疗颅内血肿吸收期。
【用法与用量】	口服，一次3~4片，一日3次，或遵医嘱。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每片重0.62g。
【贮藏】	密封。

【药名】	消瘀康胶囊
【处方】	当归 125g 苏木 125g 木香 100g 赤芍 125g 泽兰 125g 乳香 37.5g 地黄 125g 泽泻 125g 没药 37.5g 川芎 125g 川木通 125g 川牛膝 187.5g 桃仁 125g 续断 125g 甘草 62.5g 红花 125g 香附 100g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色至褐色的颗粒和粉末；味甘、苦。
【功能与主治】	活血化瘀，消肿止痛。用于治疗颅内血肿吸收期。
【用法与用量】	口服，一次3~4粒，一日3次，或遵医嘱。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

中医对于脾胃的研究和诊断

脾位居于膈下中焦。《灵枢·本藏》记载有脾的形态大小、位置高下偏正、质地坚脆等详细内容。明·李梴《医学入门》形容脾“扁似马蹄”。明·赵献可《医贯》又谓：“其色如马肝紫赤，其形如刀镰。”脾的主要功能一是主运化，二是统摄血液。这两个方面的功能是气、血、阴、阳共同作用的结果，但是其中又以脾气、脾阳所发挥的作用为主，脾阴次之，脾血只是对脾的一般营养作用而已，故不提及脾血。脾的系统联系是在体合肉、主四肢，其华在唇，开窍于口，在液为涎，在志为思。脾在五行中属土，为阴中之至阴，

通于长夏。脾通过其经脉的相互络属与胃构成表里关系。脾和胃以膜相连，故常脾胃并称。由于人体出生后所需要的营养物质，均赖脾化生的水谷精微供养，故又称脾为“后天之本”。脾化生的水谷精微是生成气血的主要物质，故又称脾为“气血生化之源”。

脾的生理特性是喜燥恶湿，此与胃的喜润恶燥相对而言。脾气的运动特点以上升为主，即脾气主升，脾主运化的生理功能主要凭借脾主升清得以体现。

脾的主要生理

主运化：运，即转运、输送功能；化，即消化、吸收功能。所谓脾主运化是指脾具有消化饮食物，吸收水谷精微并将其转输至全身的功能。饮食物的消化吸收是一个十分复杂的生理过程，肝、胆、胃、肠均参与其中，但脾起着主导作用。水谷精微包括水谷精气(又称“谷精”)和津液(又称“水精”)。故脾主运化体现在运化水谷和运化水液两个方面。

运化水谷：所谓运化水谷，是指脾对饮食物的消化吸收和转输精微物质的作用。饮食物在受纳于胃，进行初步消化，通过幽门下输小肠，作进一步精细的消化吸收，但必须依赖于脾，才能将饮食物化为精微(营养物质)。所化生的精微物质，必须依赖脾的运化才能输送至全身。脾吸收精微物质后，一方面上输于心肺，于血脉之中经心阳温煦化赤为血，在肺中生成宗气。所生成的气血以营养全身；另一方面是通过脾的直接散精，将精微物质布散至脏腑组织而发挥其营养作用。脾主运化的功能强健，称为“脾气健运”，则运化水谷的功能旺盛，精、气、血、津液的生化有源，常表现为精力充沛、肢体强壮有力、面色红润等生机旺盛状态。如果脾主运化的功能减退，常称为“脾失健运”，一方面导致机体消化功能不良，常可表现为食少、腹胀、便溏之症。另一方面导致吸收不良，精微物质不足，精、气、血、津液生化乏源，可见精神萎靡、头昏眼花、形体消瘦、面色萎黄、体倦乏力、气短声低等虚弱之症。

运化水液：所谓运化水液，是指脾在消化饮食物的基础上，对其中水液的吸收和输布的作用。脾一方面吸收水谷精微中的水液，气化为津液，输布至全身，以滋润脏腑组织和器官；另一方面又将胃肠输送来的水分上输至肺，再通过肺的宣降和肾的气化作用，分别气化为汗和尿排出体外。因此脾气健运，既能使体内各脏腑组织得到水液的充分滋润，又能防止多余水液在体内停滞，从而维持体内水液代谢的平衡。如若脾失健运，则会导致运化水液的作用减退，水液的吸收、输布障碍，必然导致水液停滞。若留滞的水液弥漫体内则生湿邪，水液凝聚体内则为痰饮，水液下注肠道则为泄泻，水液泛滥肌肤则为水肿。这就是脾虚生湿、脾虚生痰、脾虚泄泻、脾虚水肿的机理所在，故有“脾为生痰之源”、“诸湿肿满，皆属于脾”之说，因此谓脾有“喜燥恶湿”的生理特性。健脾燥湿则是临床上治疗水、湿、痰、饮病证最常用的方法之一。

主升：脾主升的生理作用包括升清和升举两个方面。“清”，指水谷精微等营养物质。“升清”是指脾气将消化吸收的水谷精微从中焦上输于心肺及头面五官，通过心肺的作用化生为气血，营养全身。所谓“升举”是指脾气升托内脏，使之维持相对恒定位置而不游

移或下垂。脾主升清是与胃主降浊相对而言，故常以脾升胃降来概括整个消化系统的生理活动。脾主管吸收、升散水谷精微，称为脾主升清；胃将初步消化的食糜向下传送，称为胃主降浊。脾升胃降正常，协调平衡，则营养物质的吸收、升散与食物中的糟粕下行、排出，就能各行其道，从而保障了脾胃纳运活动井然有序，故清·叶桂《临证指南医案·脾胃》说：“脾宜升则健，胃宜降则和。”若脾气虚弱，上升无力，一则清气不升，气血生化无源，头目清窍失于滋养，可见头目眩晕，神疲乏力；清阳不升，而下行大肠，可见腹胀泄泻，甚则久泻不止等，故《素问·阴阳应象大论》说：“清气在下，则生飧泄。”二则升举无力，反而下陷，称之脾气下陷，或称中气下陷，即见腹部坠胀、便意频繁、内脏下垂，如胃、肝、肾下垂、子宫脱垂和脱肛等，临证可用补益脾气，升提托举的方法治疗。

主统血：所谓脾主统血，是指脾气具有控制血液在血脉内流行而不逸出脉外的功能，又称“脾统血”，如《类证治裁》说：“诸血皆统于脾”，强调了脾对血的约束作用。脾统血的机制，主要是脾气的固摄作用。如沈目南《金匱要略注》中说：“五脏六腑之血，全赖脾气统摄。”其次与脾主运化，为气血生化之源相关。因气血充足是血行正常的重要条件之一。此外与脾阳有关，如清·唐宗海《血证论·脏腑病机论》说：“经云脾统血，血之运行上下，全赖乎脾。脾阳虚，则不能统血。”因此脾气健运，水谷精微充足，气血生化有源，则气血充盈，阳气旺盛而统摄血液有力，能够控制血液在脉内的正常循行。脾气或脾阳亏虚则统摄血液失职，血液循行失控而逸出脉外，可见多种出血病症，常称为脾不统血，表现为长期慢性的皮下出血、便血、尿血、月经过多、崩漏等症，常用补脾摄血的方法治疗。

脾的系统联系

在体合肉、主四肢：肉，包括肌肉，脂肪和皮下组织。肌肉居于皮下，附着于骨骼。有保护内脏、抗御外邪和进行运动的功能。肌肉的纹理称为肌腠。肌肉的纹理和皮肤的纹理合称为腠理。四肢又称“四末”，具有主管运动和支撑身体的功能。所谓脾在体合肉、主四肢是指脾具有运化水谷精微，充养肌肉和四肢的功能，这是由脾主运化水谷精微的功能决定的，所以《素问·病论》说：“脾主身之肌肉”；明·彭用光《体仁汇编》说：“四肢为脾之外候也。”脾气健运，水谷精微充盈，四肢肌肉得养，则表现为肌肉丰满壮实，四肢活动轻劲有力；如果脾失健运，水谷精微亏乏，四肢肌肉失养，则表现为肌肉消瘦、四肢软弱无力，甚至痿废不用。对于肌肉的病变，如重症肌无力、周期性麻痹、进行性肌营养不良、多发性肌炎等，常从脾胃治疗而获效。此外四肢肌肉的适度运动，可促进脾的运化，增进食欲。

脾开窍于口，其华在唇：口腔是消化道的最上端，饮食摄入的门户。口腔有进饮食、辨五味、泌涎液、助消化、研磨食物和助发音等功能。所谓脾开窍于口，是指食欲口味等与脾的运化功能密切相关。所以《素问·阴阳应象大论》说：“脾主口……在窍为口。”脾气健运，则食欲旺盛，口味良好，故《灵枢·脉度》说：“脾气通于口，脾和则口能知五谷矣。”若脾失健运，则食欲不振、口淡无味；若湿热困脾，则纳呆不饥、口甜黏腻等。此外口与其他脏腑也有一定的联系，如心火亢盛或肝胆湿热，均可见到口苦之症。

口唇为口腔的起始部分，有上、下唇之分，由肌肉组成，靠脾运化水谷精微而化生气血以养之。所谓脾其华在唇，是指脾的功能正常与否通过口唇的色泽形态的变化反映出来，所以《素问·五藏生成》说：“脾之合肉也，其荣唇也。”脾气健运，化生的气血充盈，则口唇红润光泽；脾失健运，精微不足，气血不充，则口唇淡白无泽。

脾在液为涎：涎为五液之一，与唾同为口津，俗称“口水”，是唾液中质地较清稀者。脾的经脉连舌本散舌下，涎为脾精上溢于口而化生，故脾在液为涎。涎具有保护和清洁口腔，湿润和溶解食物，使之易于吞咽和消化的作用。所谓脾在液为涎是指人体涎液主要由脾气所主管，所以《素问·宣明五气》说：“脾为涎。”脾气健旺，运化水液功能正常，则涎液上行润口，但不溢出口外；若脾胃不和，可导致涎液的增加或减少，影响食欲和消化；如脾气虚弱，气不摄津，涎液可自口角流出；脾阳亏虚，涎液减少，则见口干症状。

脾在志为思：思，即思考、思虑，是人类特有的精神情志活动。所谓脾在志为思，是指脾具有思考、思虑的功能。脾主思与脾主运化的功能密切相关，脾主运化能为思虑活动提供充足的水谷精微作为其活动的物质基础。脾气健运，水谷精微充足，气血旺盛，则遇事能够周密思考，从而协助心神正确处理事物。正常的思考是人认识事物、处理问题的必然过程，又是人类特有的本能，且对机体的生理活动并无不良影响，但过度思虑或所思不遂，就能影响气的正常运行，导致脾气壅塞结滞，影响运化功能，出现不思饮食、脘腹胀满等症，故曰“思则气结”。

胰

胰位居上腹，在胃之后，与脾毗邻。胰的主要生理功能为主消化水谷。胰又称“脾”，《难经》则称“散膏”。正如清末名医张锡纯《医学衷中参西录》所说：“古人不名脾而名为散膏，散膏即脾也。为脾之质为胶子，形如膏……故曰散膏；为脾之副脏……散膏与脾为一脏，即脾与脾为一脏也。”对于胰主消化水谷的生理功能，藏象学说多将其归属于脾主运化之中，因此其病亦多从脾论治。

胃

胃居胸下，上接食管，下通小肠，与脾以膜相连，同在中焦，胃与腔通过经脉的相互络属而构成表里关系。胃为燥土属阳，脾为湿土属阴。胃又称胃脘，脘，即管腔，可容纳饮食食物。胃脘分上、中、下三部。胃上口的贲门部为上脘，下口幽门部为下脘，上下脘之间的胃体部为中脘，故合称胃脘。古代文献对胃的形态已有描述，正如《灵枢·平人绝谷》说：“胃大一尺五寸，径五寸，长二尺六寸，横屈受水谷三斗五升。其中之谷常留二斗，水一斗五升而满，”《内经》对胃形态的具体描述基本符合实际解剖。

胃的主要功能

胃有接受、容纳和消化饮食的功能，前人称其为主受纳腐熟水谷，是指胃具有容纳食物，并对其初步消化形成食糜的功能。由于饮食入口，经食管，过贲门，容纳于胃，故称

胃为“太仓”、“水谷之海”。机体气血津液的化生，都需要以食物中的营养物质为基础，故又称胃为“水谷气血之海”。水谷（饮食和水分）进入胃后，依赖胃的腐熟作用，将水谷消磨变成食糜，在脾的运化功能主持下，化为精微，以生气血津液，供养全身。脾胃对食物消化吸收功能产生的物质基础常称为胃气。中医学特别重视人体“胃气”的作用，认为“人以胃气为本”，“有胃气则生，无胃气则死”。所以临床治病时，强调要时刻注意保护胃气，用药不可妄攻妄补，以免损伤胃气。若胃的受纳腐熟功能减退，则可表现为纳呆、厌食、胃脘胀满等症；胃的受纳腐熟功能亢进，则可表现为多食善饥等症。

胃的生理特点

胃有主通降，以降为顺的生理特征，《临证指南医案》说：“胃宜降则和。”只有胃腑通降，才能不断受纳饮食物。饮食物经过胃的腐熟，下行小肠，其食物残渣下移大肠，变成粪便排出体外。整个过程都是由胃气下行完成的。所以胃的通降还包括协助小肠将食物残渣下输大肠和帮助大肠传导糟粕的功能。胃失通降，一则饮食物停滞于胃，可见胃脘胀痛、纳呆厌食或噎腐吞酸等症；二则胃气上逆，则可出现恶心、嗝气、呕吐、呃逆、口臭等症。临床上常以降胃、和胃的药物以治疗胃病。

胃主受纳腐熟和通降，其功能的正常进行，必须以胃津濡润为前提条件。反之胃津枯竭，饮食物势必无以消化腐熟形成食糜，也难以通降下行。因此胃有“喜润而恶燥”的重要生理特性。

胃消化系统诸病

饮食积滞型脘腹胀闷便秘消化不良嗝气吞酸

【药名】

大山楂丸

【处方】	山楂 1000g 六神曲(麸炒)150g 炒麦芽 150g。
【性状】	本品为棕红色或褐色的大蜜丸，味酸、甜。
【功能与主治】	开胃消食。用于食积内停所致的食欲不振、消化不良、脘腹胀闷。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 丸，一日 1~3 次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	山楂化滞丸
【处方】	山楂 500g 麦芽 100g 六神曲 100g 槟榔 50g 莱菔子 50g 牵牛子 50g。
【性状】	本品为棕色的大蜜丸；味酸、甜。
【功能与主治】	消食导滞。用于饮食不节所致的食积，症见脘腹胀满、纳少饱胀、大便秘结。
【用法与用量】	口服。一次 2 丸，一日 1~2 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	开胃山楂丸
【处方】	山楂 600g 槟榔 50g 炒白扁豆 50g 麸炒枳壳 50g 砂仁 25g 六神曲(炒)100g 山药 50g 炒鸡内金 50g 炒麦芽 50g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；气微，味酸、微甜。
【功能与主治】	行气健脾，消食导滞。用于饮食积滞所致的脘腹胀满、食后疼痛；消化不良见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	六味安消胶囊
【处方】	藏木香 23.81g 大黄 95.24g 山柰 47.62g 北寒水石(煨)119.05g 诃子 71.43g 碱花 142.86g。
【性状】	本品为胶囊剂，内容物为灰黄色至黄棕色的粉末；气香，味苦涩，微咸。
【功能与主治】	和胃健脾，消积导滞，活血止痛。用于胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。
【用法与用量】	口服。一次 3~6 粒，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃立康片
【处方】	广藿香 75g 茯苓 75g 苍术 60g 白术 60g 泽泻 45g 陈皮 45g 豆蔻 30g 人参

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>30g 炒麦芽 75g 六神曲(麸炒)75g 姜厚朴 60g 木香 45g 猪苓 45g 清半夏 45g 甘草 30g 制吴茱萸 30g。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色；气微香，味微苦。</p> <p>健胃和中，顺气化滞。用于消化不良，倒饱嘈杂，呕吐胀满，肠鸣泻下。</p> <p>口服。一次4片，一日2次。</p> <p>无。</p> <p>(1)糖衣片(片心重0.3g)；(2)薄膜衣片每片重0.31g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>香苏调胃片</p> <p>广藿香 60g 香薷 96g 木香 15g 姜厚朴 60g 麸炒枳壳 15g 茯苓 15g 炒麦芽 15g 葛根 15g 六神曲(麸炒)15g 紫苏叶 120g 砂仁 15g 陈皮 30g 炒山楂 15g 白扁豆(去皮)48g 甘草 8g 生姜 30g。</p> <p>本品为糖衣片，除去糖衣后显深棕色；气微香，味甘、微辛。</p> <p>解表和中，健胃化滞。用于胃肠积滞、外感时邪所致的身热体倦、饮食少进、呕吐乳食、腹胀便泻、小便不利。</p> <p>口服。周岁以内一次1~2片，一至三岁一次2~3片，三岁以上一次3~5片，一日2次，温开水送下。</p> <p>无。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>保和丸</p> <p>焦山楂 300g 半夏(制)100g 陈皮 50g 炒莱菔子 50g 六神曲(炒)100g 茯苓 100g 连翘 50g 炒麦芽 50g。</p> <p>本品为棕色至褐色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味微酸、涩、甜。</p> <p>消食，导滞，和胃。用于食积停滞，脘腹胀满，噯腐吞酸，不欲饮食。</p> <p>口服。小蜜丸一次9~18g，大蜜丸一次1~2丸，一日2次；小儿酌减。</p> <p>无。</p> <p>(1)小蜜丸每100丸重20g；(2)大蜜丸每丸重9g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>保和丸(水丸)</p> <p>焦山楂 300g 六神曲(炒)100g 半夏(制)100g 茯苓 100g 陈皮 50g 连翘 50g 炒莱菔子 50g 炒麦芽 50g。</p> <p>本品为灰棕色至褐色的大蜜丸；气微香，味微酸、涩、甜。</p> <p>消食，导滞，和胃。用于食积停滞，脘腹胀满，噯腐吞酸，不欲饮食。</p> <p>口服。一次6~9g，一日2次；小儿酌减。</p> <p>无。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---	--

【药名】	保和片
【处方】	焦山楂 500g 姜半夏 166.7g 陈皮 83.3g 炒麦芽 83.3g 六神曲(炒)166.7g 茯苓 166.7g 连翘 83.3g 炒莱菔子 83.3g。
【性状】	本品为深棕色的片；或为薄膜衣片，除去包衣后显深棕色；味酸、微苦。
【功能与主治】	消食，导滞，和胃。用于食积停滞，脘腹胀满，噯腐吞酸，不欲饮食。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	保和颗粒
【处方】	焦山楂 333g 姜半夏 111g 陈皮 56g 炒麦芽 56g 六神曲(炒)111g 茯苓 111g 连翘 56g 炒莱菔子 56g。
【性状】	本品为黄棕色至黄褐色的颗粒；气微香，味微酸、甜。
【功能与主治】	消食，导滞，和胃。用于食积停滞，脘腹胀满，噯腐吞酸，不欲饮食。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每袋装4.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	洁白丸
【处方】	本品为藏族验方：诃子(煨)370g 翼首草 85g 土木香 26g 木瓜 26g 丁香 20g 红花 6g 草豆蔻 13g 南寒水石 210g 五灵脂膏 178g 石榴子 26g 沉香 19g 石灰华 13g 肉豆蔻 13g 草果仁 13g。
【性状】	本品为暗褐色的水蜜丸，或为薄膜衣丸，除去包衣后显暗褐色；气香，味涩、苦、辛。
【功能与主治】	健脾和胃，止痛止吐，分清泌浊。用于胸腹胀满，胃脘疼痛，消化不良，呕逆泄泻，小便不利。
【用法与用量】	嚼碎吞服。一次1丸，一日2~3次；薄膜衣丸：一次0.8g，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每丸重0.8g；(2)薄膜衣丸每4丸重0.8g。
【贮藏】	密封。

【药名】	疳积散
【处方】	石燕(煨)100g 煅石决明 100g 使君子仁 100g 炒鸡内金 50g 谷精草 50g 威灵仙 50g 茯苓 100g。
【性状】	本品为灰黄色的粉末；味微涩。
【功能与主治】	消积化滞。用于食滞脾胃所致的疳证，症见不思乳食、面黄肌瘦、腹部膨胀、消化不良。
【用法与用量】	用热米汤加少量糖调服，一次9g，一日2次；三岁以内小儿酌减。

【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	越鞠二陈丸
【处方】	醋香附 100g 川芎 100g 炒麦芽 100g 茯苓 100g 陈皮 100g 麸炒苍术 100g 清半夏 100g 六神曲(炒)100g 炒栀子 100g 甘草 50g。
【性状】	本品为棕色的水丸；气香，味微苦。
【功能与主治】	理气解郁，化痰和中。用于胸腹闷胀，噯气不断，吞酸呕吐，消化不良，咳嗽痰多。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每 10 粒重 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	越鞠丸
【处方】	醋香附 200g 川芎 200g 炒栀子 200g 苍术(炒)200g 六神曲(炒)200g。
【性状】	本品为深棕色至棕褐色的水丸；气香，味微涩、苦。
【功能与主治】	理气解郁，宽中除满。用于胸脘痞闷，腹中胀满，饮食停滞，噯气吞酸。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	越鞠保和丸
【处方】	栀子(姜制)120g 六神曲(麸炒)120g 醋香附 120g 川芎 120g 苍术 120g 木香 60g 槟榔 60g。
【性状】	本品为棕黄色至黄棕色的水丸；气微香，味微苦。
【功能与主治】	舒肝解郁，开胃消食。用于气食郁滞所致的胃痛，症见脘腹胀痛、倒饱嘈杂、纳呆食少、大便不调；消化不良见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 1~2 次。
【注意】	孕妇慎用；忌生冷、硬黏难消化食物。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	槟榔四消丸(大蜜丸)
【处方】	槟榔 200g 酒大黄 400g 炒牵牛子 400g 猪牙皂(炒) 50g 醋香附 200g 五灵脂(醋炙) 200g。
【性状】	本品为黄褐色的大蜜丸，气微香，味甜、苦、微辛。
【功能与主治】	消食导滞，行气泻水。用于食积痰饮，消化不良，脘腹胀满，噯气吞酸，大便秘结。

【用法与用量】	口服。一次1丸，一日2次
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	檳榔四消丸(水丸)
【处方】	檳榔 200g 酒大黄 400g 炒牽牛子 400g 猪牙皂(炒) 50g 醋香附 200g 五灵脂(醋炙) 200g。
【性状】	本品为浅褐色至褐色的水丸；气微香，味苦、辛。
【功能与主治】	消食导滞，行气泻水。用于食积痰饮，消化不良，脘腹胀满，噎气吞酸，大便秘结。
【用法与用量】	口服。一次6g，一日2次
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

气郁食滞型胸胀胃脘疼痛噎气呕恶

【药名】	开胸顺气丸
【处方】	檳榔 300g 炒牽牛子 400g 陈皮 100g 木香 75g 姜厚朴 100g 醋三棱 100g 醋莪术 100g 猪牙皂 50g。
【性状】	本品为浅棕色至棕色的水丸；味微苦、辛。
【功能与主治】	消积化滞，行气止痛。用于气郁食滞所致的胸胁胀满、胃脘疼痛、噎气呕恶、食少纳呆。
【用法与用量】	口服。一次3~9g，一日1~2次。
【注意】	孕妇禁用；年老体弱者慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	开胸顺气胶囊
【处方】	檳榔 360g 炒牽牛子 480g 陈皮 120g 木香 90g 姜厚朴 120g 醋三棱 120g 醋莪术 120g 猪牙皂 60g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的颗粒；气香，味微苦、涩。
【功能与主治】	消积化滞，行气止痛。用于气郁食滞所致的胸胁胀满、胃脘疼痛、噎气呕恶、食少纳呆。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日2次。

【注意】	孕妇禁用；年老体弱者及儿童慎用。
【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

湿热内停型胃肠积滞脘胀便秘腹泻痢疾

【药名】	本香槟榔丸
【处方】	木香 50g 枳壳(炒) 50g 青皮(醋炒) 50g 醋三棱 50g 黄连 50g 大黄 150g 芒硝 100g 槟榔 50g 陈皮 50g 香附(醋制) 150g 莪术(醋炙) 50g 黄柏(酒炒) 150g 炒牵牛子 200g。
【性状】	本品为灰棕色的水丸；味苦、微咸。
【功能与主治】	行气导滞，泻热通便。用于湿热内停，赤白痢疾，里急后重，胃肠积滞，脘腹胀痛，大便不通。
【用法与用量】	口服。一次 3~6g，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	枳实导滞丸
【处方】	枳实(炒) 100g 大黄 200g 黄连(姜汁炙) 60g 黄芩 60g 六神曲(炒) 100g 白术(炒) 100g 茯苓 60g 泽泻 40g。
【性状】	本品为浅褐色至深褐色的水丸；气微香，味苦。
【功能与主治】	消积导滞，清利湿热。用于饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结、痢疾里急后重。
【用法与用量】	口服，一次 6~9g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃肠安丸
【处方】	木香，沉香，枳壳(麸炒)，檀香，大黄，厚朴(姜炙)，人工麝香，巴豆霜，大枣(去核)，川芎。
【性状】	本品为薄膜包衣水丸，除去包衣后显黄色至棕黄色；气芳香，味甘、辛、苦。
【功能与主治】	芳香化浊，理气止痛，健胃导滞。用于湿浊中阻、食滞不化所致的腹泻、纳差、恶心、呕吐、腹胀、腹痛；消化不良、肠炎、痢疾见上述证候者。
【用法与用量】	口服。小丸：一次 20 丸，一日 3 次；小儿周岁内一次 4~6 丸，一日 2~3 次；一至三岁一次 6~12 丸，一日 3 次；三岁以上酌加。大丸：成人一次 4 丸，一日 3 次；小儿周岁内一次 1 丸，一日 2~3 次，一至三岁一次 1~2 丸，一日 3 次；三岁以上酌加。

【注意】	脾胃虚弱者慎用。
【规格】	(1)小丸每20丸重0.08g；(2)大丸每4丸重0.08g。
【贮藏】	密封。

【药名】	香砂胃苓丸
【处方】	木香 50g 砂仁 50g 麸炒苍术 150g 姜厚朴 150g 麸炒白术 150g 陈皮 150g 茯苓 150g 泽泻 100g 猪苓 100g 肉桂 50g 甘草 60g。
【性状】	本品为黄褐色或棕褐色的水丸；气微香，味微苦、辛。
【功能与主治】	祛湿运脾，行气和胃。用于水湿内停之呕吐，泻泄，浮肿，眩晕，小便不利等症。
【用法与用量】	口服。一次6g，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每15粒重1g。
【贮藏】	密闭，防潮。

脾胃湿热型胃脘胀痛胃酸过多慢性胃炎胃溃疡

【药名】	溃疡散胶囊
【处方】	甘草 313g 白及 47g 延胡索 94g 泽泻 31g 海螵蛸 47g 薏苡仁 47g 黄芩 94g 天仙子 1.25g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色的颗粒；气香，味甜。
【功能与主治】	理气和胃，制酸止痛。用于脾胃湿热，胃脘胀痛，胃酸过多；溃疡病，慢性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

脾胃虚寒型胀满腹痛喜温胃炎十二指肠溃疡

【药名】	十香止痛丸
【处方】	香附(醋炙)160g 乌药 80g 檀香 40g 延胡索(醋炙)80g 香橼 80g 蒲黄 40g 沉香 10g 厚朴(姜汁炙)80g 零陵香 80g 降香 40g 丁香 10g 五灵脂(醋炙) 80g

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>木香 40g 香排草 10g 砂仁 10g 乳香(醋炙)40g 高良姜 6g 熟大黄 80g。</p> <p>本品为深棕褐色的大蜜丸；气香，味微苦。</p> <p>疏气解郁，散寒止痛。用于气滞胃寒，两胁胀满，胃脘刺痛，腹部隐痛。</p> <p>口服。一次 1 丸，一日 2 次。</p> <p>孕妇慎服。</p> <p>每丸重 6g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>九香止痛丸(七香止痛丸)</p> <p>川木香 160g 木香 20g 沉香 20g 降香 80g 小茴香(盐水炙)80g 八角茴香 80g 丁香 80g 乳香(炒)80g 广藿香 80g。</p> <p>本品为棕褐色的水丸；气香，味辛、苦。</p> <p>温中散寒，行气止痛。用于寒凝气滞，脘腹疼痛。</p> <p>口服。一次 3~6g，一日 2 次，小儿酌减。</p> <p>无。</p> <p>每 20 丸重 1g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>小建中片</p> <p>桂枝 1110g 白芍 2220g 炙甘草 740g 生姜 1110g 大枣 1110g。</p> <p>本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色至黑褐色；气微香，味甜、微辛。</p> <p>温中补虚，缓急止痛。用于脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，嘈杂吞酸，食少；胃及十二指肠溃疡上述证候者。</p> <p>口服。一次 2~3 片，一日 3 次。</p> <p>无。</p> <p>薄膜衣片每片重 0.6g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>小建中合剂</p> <p>桂枝 111g 白芍 222g 炙甘草 74g 生姜 111g 大枣 111g。</p> <p>本品为棕黄色的液体；气微香，味甜、微辛。</p> <p>温中补虚，缓急止痛。用于脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，嘈杂吞酸，食少；胃及十二指肠溃疡见上述证候者。</p> <p>口服。一次 20~30ml，一日 3 次。用时摇匀。</p> <p>无。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p>	<p>小建中颗粒</p> <p>白芍 400g 大枣 200g 桂枝 200g 炙甘草 133g 生姜 200g。</p> <p>本品为浅棕色至棕黄色的颗粒；气香，味甜。</p>
--	--

【功能与主治】	温中补虚，缓急止痛。用于脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，嘈杂吞酸，食少心悸及腹泻与便秘交替症状的慢性结肠炎，胃及十二指肠溃疡。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	外感风热表证未清患者及脾胃湿热或明显胃肠道出血症状者，不宜服用。
【规格】	每袋装15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	五味清浊散
【处方】	本品系蒙古族验方：石榴400g 红花200g 豆蔻50g 肉桂50g 荜茇50g。
【性状】	本品为黄棕色的粉末；气香，味酸、辛、微涩。
【功能与主治】	开郁消食，暖胃。用于食欲不振，消化不良，胃脘冷痛，满闷噎气，腹胀泄泻。
【用法与用量】	口服。一次2~3g，一日1~2次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装15g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	丹桂香颗粒
【处方】	炙黄芪，桂枝，吴茱萸，肉桂，细辛、桃仁，红花，当归，川芎，赤芍，丹参，牡丹皮，延胡索，片姜黄，三棱，莪术，水蛭，木香，枳壳，乌药，黄连，地黄，炙甘草。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味微苦或味苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	益气温胃，散寒行气，活血止痛。用于脾胃虚寒、气滞血瘀所致的胃脘痞满疼痛、食少纳差、嘈杂噎气、腹胀；慢性萎缩性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。1次1袋，一日3次，饭前半小时服用；8周为一个疗程，或遵医嘱。
【注意】	妊娠、月经过多者禁用；有自发出血倾向及有中医热证或阴虚火旺证者慎用；偶见轻度胃脘不适，一般可自行缓解。
【规格】	(1)每袋装8g；(2)每袋装6g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	石榴健胃散
【处方】	石榴子750g 肉桂120g 荜茇75g 红花375g 豆蔻60g。
【性状】	本品为浅红棕色的粉末；气微香，味酸、辣。
【功能与主治】	温胃益火，化滞除温，温通脉道，用于消化不良、食欲不振、寒性腹泻等。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装1.2g。
【贮藏】	密闭，置阴凉干燥处。

【药名】	安中片
-------------	------------

【处方】	桂枝 180g 煨牡蛎 180g 砂仁 120g 甘草 120g 醋延胡索 180g 小茴香 120g 高良姜 60g。
【性状】	本品为浅褐色的片或薄膜衣片，薄膜衣片除去包衣后为浅褐色；气香，味微甘、苦、涩。
【功能与主治】	温中散寒，理气止痛，和胃止呕。用于阳虚胃寒所致的胃痛，症见胃痛绵绵、畏寒喜暖、泛吐清水、神疲肢冷；慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片，儿童一次 2~3 片。〔规格(1)〕或一次 2~3 片，儿童一次 1~1.5 片〔规格(2)〕；一日 3 次，或遵医嘱。
【注意】	急性胃炎、出血性溃疡禁用。
【规格】	(1) 每片重 0.2g；(2) 薄膜衣片每片重 0.52g。
【贮藏】	密封。

【药名】	良附丸
【处方】	高良姜 500g 醋香附 500g。
【性状】	本品为棕黄色至黄褐色的水丸；气微香，味辣。
【功能与主治】	温胃理气。用于寒凝气滞，脘痛吐酸，胸腹胀满。
【用法与用量】	口服。一次 3~6g，一日 2 次
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	附子理中丸
【处方】	附子(制) 100g 党参 200g 炒白术 150g 干姜 100g 甘草 100g。
【性状】	本品为棕褐色至棕黑色的水蜜丸，或为棕褐色至黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；气微，味微甜而辛辣。
【功能与主治】	温中健脾。用于脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，手足不温。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 小蜜丸每 100 丸重 20g；(2) 大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	附子理中片
【处方】	附子(制) 67g 党参 133g 炒白术 100g 干姜 67g 甘草 67g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微，味微甜而辛辣。
【功能与主治】	温中健脾。用于脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，手足不温。
【用法与用量】	口服。一次 6~8 片，一日 1~3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	片心重 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	理中丸
【处方】	党参 75g 炙甘草 75g 土白术 75g 炮姜 50g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的大蜜丸；味甜而辣。
【功能与主治】	温中散寒，健胃。用于脾胃虚寒，呕吐泄泻，胸满腹痛，消化不良。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2 次。小儿酌减。
【注意】	忌食生冷油腻，不宜消化的食物。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃溃疡灵颗粒
【处方】	黄芪 416.7g 炙甘草 333.3g 白芍 250g 大枣 166.7g 桂枝 133.3g 生姜 133.3g。
【性状】	本品为黄色至棕黄色的颗粒；气香，味甜、微辛。
【功能与主治】	温中益气，缓急止痛。用于脾胃虚寒、中气不足所致的胃痛，症见脘腹胀痛、喜温喜按、食少乏力、舌淡脉弱；胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	胃部灼热，口苦反酸者忌用。
【规格】	每袋装 20g。
【贮藏】	密封。

【药名】	黄芪健胃膏
【处方】	黄芪 407g 桂枝 122g 甘草 122g 白芍 244g 生姜 122g 大枣 122g。
【性状】	本品为深棕色的稠厚的半流体；气香，味甜，微辛。
【功能与主治】	补气温中，缓急止痛。用于脾胃虚寒所致的胃痛，症见胃痛拘急、畏寒肢冷、喜温喜按、心悸自汗；胃、十二指肠溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次 15~20g，一日 2 次。
【注意】	消化道出血时慎服。
【规格】	每瓶装 100g。
【贮藏】	密封。

【药名】	虚寒胃痛颗粒
【处方】	炙黄芪，桂枝，白芍，大枣，炙甘草，党参，高良姜，干姜。
【性状】	本品为淡棕黄色至棕黄色的颗粒；味辛、甘。
【功能与主治】	益气健脾，温胃止痛。用于脾虚胃弱所致的胃痛，症见胃脘隐痛、喜温喜按、遇冷或空腹加重；十二指肠球部溃疡、慢性萎缩性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 5g；(2) 每袋装 3g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	温胃舒胶囊
【处方】	党参 183g 炙黄芪 183g 山药 183g 白术（清炒）183g 乌梅 225g 陈皮 150g 附片（黑顺片）150g 肉桂 90g 肉苁蓉（酒蒸）183g 南山楂（炒）225g 砂仁 60g 补骨脂 183g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的细粉和颗粒；味微酸、苦。
【功能与主治】	温中养胃，行气止痛。用于中焦虚寒所致的胃痛，症见胃脘冷痛、腹胀嗳气、纳差食少、畏寒无力；慢性萎缩性胃炎、浅表性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日2次。
【注意】	胃大出血时禁用；忌食生冷，油腻及不宜消化的食物。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	姜酊
【处方】	姜流浸膏 200ml。
【性状】	本品为淡黄色的液体；有姜的香气，味辣。
【功能与主治】	健胃驱风。
【用法与用量】	口服。一次2~4ml，一日6~12ml。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	暖脐膏
【处方】	当归 80g 白芷 80g 乌药 80g 小茴香 80g 八角茴香 80g 木香 40g 香附 80g 乳香 20g 母丁香 20g 没药 20g 肉桂 20g 沉香 20g 人工麝香 3g。
【性状】	本品为摊于布或纸上的黑膏药。
【功能与主治】	温里散寒，行气止痛。用于寒凝气滞，少腹冷痛，脘腹痞满，大便溏泻。
【用法与用量】	外用，加温软化，贴于脐上。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每张净重(1)3g；(2)15g；(3)30g。
【贮藏】	密闭，置阴凉干处。

脾胃虚弱型腹闷饮食不化腹痛泄泻暖气吞酸

【药名】	人参健脾丸
【处方】	人参 25g 白术（麸炒）150g 茯苓 50g 山药 100g 陈皮 50g 木香 12.5g 砂仁 25g 炙黄芪 100g 当归 50g 酸枣仁（炒）50g 远志（制）25g。
【性状】	本品为棕褐色至棕黑色的水蜜丸或大蜜丸；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	健脾益气，和胃止泻。用于脾胃虚弱所致的饮食不化、脘闷嘈杂、恶心呕

【用法与用量】	吐、腹痛便溏、不思饮食、体弱倦怠。
【注意】	口服。水蜜丸一次 8g，大蜜丸一次 2 丸，一日 2 次。
【规格】	无。
【贮藏】	大蜜丸每丸重 6g。
	密封。

【药名】	开胃健脾丸
【处方】	白术 200g 党参 120g 茯苓 160g 木香 60g 黄连 60g 六神曲(炒)80g 陈皮 80g 砂仁 80g 炒麦芽 80g 山楂 80g 山药 80g 煨肉豆蔻 80g 炙甘草 60g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸；味甘、微苦。
【功能与主治】	健脾和胃。用于脾胃虚弱、中气不和所致的泄泻、痞满，症见食欲不振、噎气吞酸、腹胀泄泻；消化不良见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每 10 丸重 1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	六君子丸
【处方】	党参 200g 麸炒白术 200g 茯苓 200g 姜半夏 200g 陈皮 100g 炙甘草 100g。
【性状】	本品为浅黄色至棕褐色的水丸，味微苦。
【功能与主治】	补脾益气，燥湿化痰。用于脾胃虚弱，食量不多，气虚痰多，腹胀便溏。
【用法与用量】	口服。一次 9g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋重 9g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	仲景胃灵丸
【处方】	肉桂，牡蛎，砂仁，白芍，延胡索，小茴香，高良姜，炙甘草。
【性状】	本品为黑褐色的浓缩水丸；气芳香，味辛、甘。
【功能与主治】	温中散寒，健胃止痛。用于脾胃虚弱，食欲不振，寒凝胃痛，脘腹胀满，呕吐酸水或清水。
【用法与用量】	口服。一次 1.2g。一日 3 次；儿童酌减。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 1.2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	启脾口服液
【处方】	人参 20g 茯苓 20g 陈皮 10g 炒莲子 20g 炒六神曲 16g 泽泻 10g 麸炒白术 20g 甘草 10g 山药 20g 炒山楂 10g 炒麦芽 10g。
【性状】	本品为黄棕色至棕色的液体；气香，味甜。
【功能与主治】	健脾和胃。用于脾胃虚弱，消化不良，腹胀便溏。

【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 2~3 次，三岁以内儿童酌减。
【注意】	服药期间，忌食生冷、油腻之品。
【规格】	(1) 每瓶装 10ml；(2) 每瓶装 100ml；(3) 每瓶装 120ml。
【贮藏】	置阴凉干燥处。

【药名】	启脾丸
【处方】	人参 100g 茯苓 100g 麸炒白术 100g 甘草 50g 陈皮 50g 莲子(炒) 100g 六神曲(炒) 80g 泽泻 50g 山药 100g 炒山楂 50g 炒麦芽 50g。
【性状】	本品为棕色的小蜜丸或大蜜丸；味甜。
【功能与主治】	健脾和胃。用于脾胃虚弱，消化不良，腹胀便溏。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 3g(15 丸)，大蜜丸一次 1 丸，一日 2~3 次；三岁以内小儿酌减。
【注意】	服药期间忌食生冷、油腻之品。
【规格】	(1) 小蜜丸每 100 丸重 20g；(2) 大蜜丸每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	参苓白术丸
【处方】	人参 100g 茯苓 100g 麸炒白术 100g 山药 100g 炒白扁豆 75g 莲子 50g 麸炒薏苡仁 50g 砂仁 50g 桔梗 50g 甘草 100g。
【性状】	本品为黄色至黄棕色的水丸；气香，味甜。
【功能与主治】	补脾胃，益肺气。用于脾胃虚弱，食少便溏，气短咳嗽，肢倦乏力。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每 100 粒重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	参苓白术散
【处方】	人参 100g 茯苓 100g 白术(炒) 100g 山药 100g 白扁豆(炒) 75g 莲子 50g 薏苡仁(炒) 50g 砂仁 50g 桔梗 50g 甘草 100g。
【性状】	本品为黄色至灰黄色的粉末；气香，味甜。
【功能与主治】	补脾胃，益肺气。用于脾胃虚弱，食少便溏，气短咳嗽，肢倦乏力。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	枳术颗粒
【处方】	麸炒枳实 333g 麸炒白术 666g 荷叶 100g。
【性状】	本品为浅黄棕色至棕褐色颗粒；气微香，味微苦。
【功能与主治】	健脾消食，行气化湿。用于脾胃虚弱，食少不化，脘腹痞满。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次；或遵医嘱。1 周为一疗程。

【注意】	无。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃肠复元膏
【处方】	麸炒枳壳 100g 太子参 100g 大黄 150g 蒲公英 300g 炒莱菔子 200g 木香 100g 赤芍 150g 紫苏梗 100g 黄芪 150g 桃仁 150g。
【性状】	本品为棕褐色稠厚的半流体；味甘、苦。
【功能与主治】	益气活血，理气通下。用于胃肠术后腹胀、胃肠活动减弱，症见体乏气短、脘腹胀满、大便不下；亦可用于老年性便秘及虚性便秘。
【用法与用量】	口服，腹部手术前 1~3 天，一次 15~30g，一日 2 次或遵医嘱；术中胃肠吻合完成前，经导管注入远端肠管 40~60g (用水稀释 2~3 倍) 或遵医嘱；术后 6~8 小时，口服，一次 20~30g，一日 2 次或遵医嘱；老年性便秘：一次 10~20g，一日 2 次或遵医嘱。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每瓶装 100g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	香砂平胃丸
【处方】	苍术 200g 陈皮 200g 姜厚朴 200g 木香 100g 砂仁 100g 甘草 75g。
【性状】	本品为棕褐色的水丸；气芳香，味辛、苦。
【功能与主治】	健胃，舒气，止痛。用于胃肠衰弱，消化不良，胸膈满闷，胃痛呕吐。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 (1) 6g；(2) 60g。
【贮藏】	密封。

【药名】	健胃消食片
【处方】	太子参 228.6g 陈皮 22.9g 山药 171.4g 炒麦芽 171.4g 山楂 114.3g。
【性状】	本品为浅棕黄色的片或薄膜衣片，也可为异形片，薄膜衣片除去包衣后显浅棕黄色；气微香，味微甜、酸。
【功能与主治】	健胃消食。用于脾胃虚弱所致的食积，症见不思饮食、嗳腐酸臭、脘腹胀满；消化不良见上述证候者。
【用法与用量】	口服或咀嚼；〔规格(2)〕：成人一次 4~6 片，儿童二至四岁一次 2 片，五至八岁一次 3 片，九至十四岁一次 4 片，一日 3 次。〔规格(1)〕：一次 3 片，一日 3 次，小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每片重 0.8g；(2) 每片重 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	健脾丸
-------------	------------

【处方】	党参 200g 炒白术 300g 陈皮 200g 枳实(炒)200g 炒山楂 150g 炒麦芽 200g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味微甜、微苦。
【功能与主治】	健脾开胃。用于脾胃虚弱，脘腹胀满，食少便溏。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	健脾糖浆
【处方】	党参 51.3g 炒白术 76.9g 陈皮 51.3g 枳实(炒)51.3g 炒山楂 38.5g 炒麦芽 51.3g。
【性状】	本品为棕褐色的黏稠液体；气香，味甜、微苦、涩。
【功能与主治】	健脾开胃。用于脾胃虚弱，脘腹胀满，食少便溏。
【用法与用量】	口服，一次 10~15ml，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 120ml。
【贮藏】	密封。

脾胃虚弱中气下陷型泄泻脱肛阴挺子宫脱垂

【药名】	补中益气丸
【处方】	炙黄芪 200g 炙甘草 100g 当归 60g 柴胡 60g 党参 60g 炒白术 60g 升麻 60g 陈皮 60g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味微甜、苦、辛。
【功能与主治】	补中益气，升阳举陷。用于脾胃虚弱、中气下陷所致的泄泻、脱肛、阴挺，症见体倦乏力、食少腹胀、便溏久泻、肛门下坠或脱肛、子宫脱垂。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。

【贮藏】	密封。
-------------	-----

【药名】	补中益气丸(水丸)
【处方】	炙黄芪 200g 炙甘草 100g 当归 60g 柴胡 60g 党参 60g 炒白术 60g 升麻 60g 陈皮 60g。
【性状】	本品为黄棕色至棕色的水丸；味微甜、微苦、辛。
【功能与主治】	补中益气，升阳举陷。用于脾胃虚弱、中气下陷所致的泄泻、脱肛、阴挺，症见体倦乏力、食少腹胀、便溏久泻、肛门下坠或脱肛、子宫脱垂。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2~3 次
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	补中益气合剂
【处方】	炙黄芪 280g 炙甘草 140g 当归 84g 柴胡 84g 党参 84g 炒白术 84g 升麻 84g 陈皮 84g。
【性状】	本品为棕褐色的液体；气香，味甜、苦。
【功能与主治】	补中益气，升阳举陷。用于脾胃虚弱、中气下陷所致的泄泻、脱肛、阴挺，症见体倦乏力、食少腹胀、便溏久泻、肛门下坠或脱肛、子宫脱垂。
【用法与用量】	口服。一次 10~15ml，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	补中益气颗粒
【处方】	炙黄芪 557g 党参 166.5g 炙甘草 277g 当归 166.5g 炒白术 166.5g 升麻 166.5g 柴胡 166.5g 陈皮 166.5g 生姜 57g 大枣 110g。
【性状】	本品为棕色的颗粒；味甜、微苦、辛。
【功能与主治】	补中益气，升阳举陷。用于脾胃虚弱、中气下陷所致的泄泻、脱肛、阴挺，症见体倦乏力、食少腹胀、便溏久泻、肛门下坠或脱肛、子宫脱垂。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 3g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

脾胃不和型胃脘胀痛恶心嗳气泄泻消化不良

【药名】	和中理脾丸
【处方】	党参 24g 苍术(米泔炙) 48g 甘草 12g 法半夏 24g 砂仁 24g 姜厚朴 48g 醋香附 48g 南山楂 48g 炒麦芽 48g 麸炒白术 72g 茯苓 48g 陈皮 96g 木香 12g 麸炒枳壳 48g 豆蔻 12g 广藿香 48g 六神曲(麸炒) 48g 炒莱菔子 48g。
【性状】	本品为黄褐色的大蜜丸；气微香，味甜。
【功能与主治】	健脾和胃，理气化湿。用于脾胃不和所致的痞满、泄泻，症见胸膈痞满、脘腹胀闷、恶心呕吐、不思饮食、大便不调。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	木香分气丸
【处方】	木香 192g 丁香 48g 醋香附 384g 陈皮 192g 枳实 192g 醋莪术 384 砂仁 48g 檀香 48g 白术(麸炒) 192g 槟榔 96g 广藿香 48g 姜厚朴 384g 豆蔻 48g 炒山楂 192g 甘松 192g 甘草 192g。
【性状】	本品为黄褐色的水丸；气香，味微辛。
【功能与主治】	宽胸消胀，理气止呕。用于肝郁气滞、脾胃不和所致的胸膈痞闷、两肋胀满、胃脘疼痛、倒饱嘈杂、恶心呕吐、嗳气吞酸。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每 100 丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	抱龙丸
【处方】	茯苓 50g 广藿香 38g 陈皮 25g 薄荷 31g 僵蚕(姜炙) 31g 天竺黄 38g 白芷 25g 防风 31g 白附子 31g 白芍 25g 荜茇 25g 川芎(酒蒸) 31g 朱砂 47g 香附(四制) 25g 赤石脂 25g 法半夏 31g 厚朴 25g 紫苏叶 31g 山药 25g 檀香 25g 砂仁 25g 荆芥 38g 独活 31g 诃子(去核) 25g 炒白术 38g 木香 25g 天麻 25g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味甘、辛、辣。
【功能与主治】	祛风化痰，健脾和胃。用于脾胃不和、风热痰内蕴所致的腹泻，症见食乳不化、恶心呕吐、大便稀、有不消化食物。
【用法与用量】	口服。周岁以内一次 1 丸，一至二岁一次 2 丸，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 1.56g。
【贮藏】	密封。

【药名】	木香顺气丸
【处方】	木香 100g 醋香附 100g 甘草 50g 厚朴 100g 苍术(炒) 100g 砂仁 100g 槟榔 100g 陈皮 100g 枳壳(炒) 100g 青皮(炒) 100g 生姜 200g。
【性状】	本品为棕褐色的水丸；气香，味苦。
【功能与主治】	行气化湿，健脾和胃。用于湿浊中阻、脾胃不和所致的胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐恶心、嗳气纳呆。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每 100 丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	一捻金
【处方】	大黄 100g 炒牵牛子 200g 槟榔 100g 人参 100g 朱砂 30g。
【性状】	本品为黄棕色至黄褐色的粉末；气微，味微苦、涩。
【功能与主治】	消食导滞，祛痰通便。用于脾胃不和、痰食阻滞所致的积滞，症见停食停乳、腹胀便秘、痰盛喘咳。
【用法与用量】	口服。周岁以内一次 0.3g，一至三岁一次 0.6g，四至六岁一次 1g，一日 1~2 次；或遵医嘱。
【注意】	不宜久服。
【规格】	每袋装 1.2g。
【贮藏】	置干燥处。

【药名】	一捻金胶囊
【处方】	大黄 56.6g 炒牵牛子 113.2g 槟榔 56.6g 人参 56.6g 朱砂 17g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至黄褐色的粉末；气微，味微苦、涩。
【功能与主治】	消食导滞，祛痰通便。用于脾胃不和、痰食阻滞所致的积滞，症见停食停乳、腹胀便秘、痰盛喘咳。
【用法与用量】	口服，或倾出内容物，温水冲服。周岁以内一次 1 粒，一至三岁一次 2 粒，四至六岁一次 3 粒，一日 1~2 次，六岁以上请遵医嘱。
【注意】	不宜久用。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	六味安消散
【处方】	本品系蒙古族、藏族验方：藏木香 50g 大黄 200g 山柰 100g 北寒水石(煨) 250g 诃子 150g 碱花 300g。
【性状】	本品为灰黄色或黄棕色的粉末；气香，味苦涩、微咸。
【功能与主治】	和胃健脾，消积导滞，活血止痛。用于脾胃不和、积滞内停所致的胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。
【用法与用量】	口服。一次 1.5~3g，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇忌服。

【规格】	(1) 每袋装 1.5g；(2) 每袋装 3g；(3) 每袋装 18g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	香砂和中丸
【处方】	陈皮 60g 姜厚朴 60g 苍术(土炒) 60g 麸炒枳壳 60g 醋青皮 90g 焦山楂 90g 砂仁 15g 炙甘草 12g 广藿香 60g 清半夏 90g 白术(土炒) 90g 茯苓 90g 六神曲(炒) 60g。
【性状】	本品为淡黄棕色至棕褐色的水丸；气香，味苦。
【功能与主治】	健脾燥湿，和中消食。用于脾胃不和，不思饮食，胸满腹胀，恶心呕吐，暖气吞酸。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	脾胃舒丸
【处方】	鳖甲(制) 50g 炙黄芪 50g 陈皮 50g 枳实 50g 白芍 50g 麸炒白术 50g 醋香附 50g 草果 50g 乌梅(炒) 50g 川芎 50g 焦槟榔 50g 厚朴 50g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味苦、辛。
【功能与主治】	疏肝理气，健脾和胃，消积化食。用于消化不良，不思饮食，胃脘嘈杂，腹胀肠鸣，恶心呕吐，大便溏泻，胁肋胀痛，急躁易怒，头晕乏力，失眠多梦等症。对慢性胃炎，慢性肝炎，早期肝硬化出现上述证候者有效。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

脾虚气滞型胃炎胃痛胃胀暖气食欲不振

【药名】	养胃颗粒
【处方】	炙黄芪 500g 党参 333g 白芍 500g 甘草 281g 陈皮 250g 香附 500g 乌梅 167g 山药 500g。
【性状】	本品为棕黄色至棕色的颗粒；气香，味甜、微苦；或味微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	养胃健脾，理气和胃。用于脾虚气滞所致的胃痛，症见胃脘不舒、胀满疼痛、暖气食少；慢性萎缩性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	忌生冷、油腻、不易消化及刺激性食物，戒烟酒。
【规格】	(1) 每袋装 15g；(2) 每袋装 5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方消食茶(复方消食冲剂)
【处方】	苍术 1500g 白术 1300g 神曲茶 1000g 广山楂 1000g 薏苡仁 700g 小槐花 1500g。
【性状】	本品为淡棕色至棕色的块状物；味甜。
【功能与主治】	健脾利湿，开胃导滞。用于脾虚食滞，食欲不振，便溏消瘦。
【用法与用量】	水冲服。一次 14g，一日 3 次；周岁以内小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每块重 7g。
【贮藏】	密封。

【药名】	香砂枳术丸
【处方】	木香 150g 麸炒枳实 150g 砂仁 150g 白术(麸炒)150g。
【性状】	本品为黄棕色的水丸；气微香，味苦、微辛。
【功能与主治】	健脾开胃，行气消痞。用于脾虚气滞，脘腹痞闷，食欲不振，大便溏软。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 2 次。
【注意】	忌食生冷食物。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	香砂六君丸
【处方】	木香 70g 砂仁 80g 党参 100g 炒白术 200g 茯苓 200g 炙甘草 70g 陈皮 80g 姜半夏 100g。
【性状】	本品为黄棕色的水丸；气微香，味微甜、辛。
【功能与主治】	益气健脾，和胃。用于脾虚气滞，消化不良，噯气食少，脘腹胀满，大便溏泄。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	四君子丸
【处方】	党参 200g 炒白术 200g 茯苓 200g 炙甘草 100g。
【性状】	本品为棕色的水丸，味微甜。
【功能与主治】	益气健脾。用于脾胃气虚，胃纳不佳，食少便溏。
【用法与用量】	口服，一次 3~6g，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	四君子颗粒
【处方】	党参 200g 麸炒白术 200g 茯苓 200g 炙甘草 100g。

【性状】	本品为黄棕色的颗粒；味甜，微苦。
【功能与主治】	益气健脾。用于脾胃气虚，胃纳不佳，食少便溏。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装15g。
【贮藏】	密封。

气血瘀滞型胃炎胃痛胃胀反酸十二指肠溃疡

【药名】	三九胃泰胶囊
【处方】	三叉苦，九里香，两面针，木香，黄芩，茯苓，地黄，白芍。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至深棕色的颗粒和粉末；味苦。
【功能与主治】	清热燥湿，行气活血，柔肝止痛。用于湿热内蕴、气滞血瘀所致的胃痛，症见脘腹隐痛、饱胀反酸、恶心呕吐、嘈杂纳减；浅表性胃炎、糜烂性胃炎、萎缩性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒，一日2次。
【注意】	胃寒患者慎用；忌油腻、生冷、难消化食物。 <u>注：九里香为芸香科植物千里香的干燥叶和带叶嫩枝。</u>
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	三九胃泰颗粒
【处方】	三叉苦，九里香，两面针，木香，黄芩，茯苓，地黄，白芍。
【性状】	本品为棕色至深棕色的颗粒，味甜、微苦；或为灰棕色至棕褐色的颗粒，味苦〔规格(3)〕。
【功能与主治】	清热燥湿，行气活血，柔肝止痛。用于湿热内蕴、气滞血瘀所致的胃痛，症见脘腹隐痛、饱胀反酸、恶心呕吐、嘈杂纳减；浅表性胃炎、糜烂性胃炎、萎缩性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	胃寒患者慎用；忌油腻、生冷、难消化食物。
【规格】	(1)每袋装20g；(2)每袋装10g；(3)每袋装2.5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	元胡止痛口服液
【处方】	醋延胡索 267g 白芷 134g。
【性状】	本品为棕黄色至棕红色的液体；气微，味微苦、甜、酸。
【功能与主治】	理气，活血，止痛。用于气滞血瘀的胃痛胁痛，头痛及痛经。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	元胡止痛片
【处方】	醋延胡索 445g 白芷 223g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显棕黄色至棕褐色；气香，味苦。
【功能与主治】	理气，活血，止痛。用于气滞血瘀的胃痛，胁痛，头痛及痛经。
【用法与用量】	口服。一次4~6片，一日3次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片，每片重0.26g；(2)薄膜衣片，每片重0.31g；(3)糖衣片，片心重0.25g；(4)糖衣片，片心重0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	元胡止痛软胶囊
【处方】	醋延胡索 1333g 白芷 667g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的油膏状物；气微，味苦。
【功能与主治】	理气，活血，止痛。用于气滞血瘀的胃痛，胁痛，头痛及痛经。
【用法与用量】	口服。一次2粒，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	元胡止痛胶囊
-------------	---------------

【处方】	醋延胡索 445g 白芷 223g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕黄色至棕褐色的粉末；气香，味苦。
【功能与主治】	理气，活血，止痛。用于气滞血瘀的胃痛，胁痛，头痛及痛经。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 粒〔规格(1)〕，一次 2~3 粒〔规格(2)〕，一日 3 次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每粒装 0.25g；(2) 每粒装 0.45g。
【贮藏】	密封。

【药名】	元胡止痛颗粒
【处方】	醋延胡索 445g，白芷 223g。
【性状】	本品为黄色至棕黄色的颗粒；味甜，微苦。
【功能与主治】	理气，活血，止痛。用于气滞血瘀的胃痛，胁痛，头痛及痛经。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	元胡止痛滴丸
【处方】	醋延胡索 86.6g，白芷 43.4g。
【性状】	本品为棕褐色的滴丸；气香，味微苦。
【功能与主治】	理气，活血，止痛。用于气滞血瘀的胃痛，胁痛，头痛及痛经。
【用法与用量】	口服。一次 20~30 丸，一日 3 次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每 10 丸重 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	安胃片
【处方】	醋延胡索 63g 枯矾 250g 海螵蛸(去壳)187g。
【性状】	本品为类白色至浅黄棕色的片；或为薄膜衣片，除去包衣后显浅黄棕色；气微，味涩、苦。
【功能与主治】	行气活血，制酸止痛。用于气滞血瘀所致的胃脘刺痛、吞酸嗳气、脘闷不舒；胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5~7 片，一日 3~4 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 素片每片重 0.6g；(2) 薄膜衣片每片重 0.7g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金佛止痛丸
【处方】	白芍，三七，佛手，甘草，醋延胡索，郁金，姜黄。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的包衣浓缩水丸；味苦、甘。

【功能与主治】	行气止痛，舒肝和胃，祛瘀生新。用于气血瘀滞所致的胃脘疼痛，痛经及消化性溃疡、慢性胃炎引起的疼痛。
【用法与用量】	口服。一次5~10g，一日2~3次，或痛时服；寒证腹痛须用姜汤送服。
【注意】	孕妇禁服；月经过多者慎服。
【规格】	每袋装5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	荜铃胃痛颗粒
【处方】	荜澄茄，川楝子，醋延胡索，酒大黄，黄连，吴茱萸，醋香附，香椽，佛手，海螵蛸，煅瓦楞子。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味苦。
【功能与主治】	行气活血，和胃止痛。用于气滞血瘀所致的胃脘痛；慢性胃炎见有上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每袋装5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃乃安胶囊
【处方】	黄芪，三七，红参，珍珠层粉，人工牛黄。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色的粉末；气香，味微苦。
【功能与主治】	补气健脾，活血止痛。用于脾胃气虚，瘀血阻滞所致的胃痛，症见胃脘隐痛或刺痛、纳呆食少；慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次。
【注意】	孕妇慎用；忌生冷、油腻、不易消化食物，戒烟酒。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃康胶囊
【处方】	白及64g 海螵蛸63g 香附64g 黄芪63g 白芍64g 三七64g 鸡内金38g 鸡蛋壳(炒焦)1g 乳香32g 没药15g 百草霜13g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黑色颗粒和粉末；味苦。
【功能与主治】	行气健胃，化瘀止血，制酸止痛。用于气滞血瘀所致的胃脘疼痛、痛处固定、吞酸嘈杂，或见吐血、黑便；胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、上消化道出血见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒，一日3次。
【注意】	孕妇及脾胃虚弱者慎用；忌食辛辣、油腻、生冷之品，戒烟酒。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

脾胃气滞型胃炎胃胀痛吐酸十二指肠溃疡

【药名】	珍珠胃安丸
【处方】	珍珠层粉 450g 甘草 350g 豆豉姜 50g 陈皮 100g 徐长卿 50g。
【性状】	本品为黑色包衣水丸，除去包衣后显浅灰黄色至黄棕色；味甘。
【功能与主治】	行气止痛，宽中和胃。用于气滞所致的胃痛，症见胃脘疼痛胀满、泛吐酸水、嘈杂似饥；胃及十二指肠溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 4 次。饭后及睡前服。
【注意】	忌辛辣、酸甜和难消化食物。
【规格】	每袋装 1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃脘舒颗粒
【处方】	党参，白芍，山楂(炭)，陈皮，甘草，醋延胡索。
【性状】	本品为黄色至黄棕色的颗粒；气香，味甜。
【功能与主治】	益气阴，健脾胃，消痞满。用于脾虚气滞所致的胃脘痞满、噯气纳差、时有隐痛；萎缩性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 2 次，或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每袋装 7g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

肝胃郁热气滞型胃痛胀满口苦胃炎溃疡

【药名】	气痛丸
【处方】	木香 165g 煅赤石脂 662g 朱砂粉 35g 甘草 165g 枳实(炒)110g。
【性状】	本品为朱红色的包衣水丸，除去包衣后显暗棕红色至红褐色；气香，味甘苦，微辛辣。
【功能与主治】	行气止痛，健胃消滞。用于气机阻滞，脘腹胀痛。
【用法与用量】	口服。一次 3.4g，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶(袋)装 3.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	气滞胃痛片
【处方】	柴胡，醋延胡索，枳壳，醋香附，炙甘草，白芍。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味微苦。

【功能与主治】	舒肝理气，和胃止痛。用于肝郁气滞，胸痞胀满，胃脘疼痛。
【用法与用量】	口服。一次3片〔规格(1)〕或6片〔规格(2)〕，一日3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.5g；(2)糖衣片片心重0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	气滞胃痛颗粒
【处方】	柴胡，醋延胡索，枳壳，醋香附，炙甘草，白芍。
【性状】	本品为淡棕色至棕黄色颗粒，具特异香气，味甜、苦辛。
【功能与主治】	舒肝理气，和胃止痛。用于肝郁气滞，胸痞胀满，胃脘疼痛。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每袋装5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	六味木香散
【处方】	本品系蒙古族验方：木香200g 栀子150g 石榴100g 闹羊花100g 豆蔻70g 荜茇70g。
【性状】	本品为浅黄色至黄色的粉末；气香，味辛、苦。
【功能与主治】	开郁行气止痛。用于寒热错杂、气滞中焦所致的胃脘痞满疼痛、吞酸嘈杂、噎气腹胀、腹痛、大便不爽。
【用法与用量】	口服。一次2~3g，一日1~2次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装15g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	龙胆胶囊
【处方】	龙胆总苷80g(以龙胆苦昔计)。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄色至棕色的颗粒；味苦、微涩。
【功能与主治】	清肝泄热。用于功能性消化不良属肝胃郁热证者，症见胃脘饱胀、脘部烧灼、口干口苦。
【用法与用量】	口服。一次2粒，一日3次。4周为一疗程。
【注意】	(1)偶见恶心、呕吐、食欲不振、腹痛及轻度腹泻。(2)脾胃虚寒者忌服。
【规格】	每粒含龙胆苦昔80mg。
【贮藏】	密闭，置阴凉干燥处。

【药名】	左金丸
【处方】	黄连600g 吴茱萸100g。
【性状】	本品为黄褐色的水丸；气特异，味苦、辛。
【功能与主治】	泻火，疏肝，和胃，止痛。用于肝火犯胃，脘胁疼痛，口苦嘈杂，呕吐酸水，不喜热饮。

【用法与用量】	口服。一次 3~6g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	左金胶囊
【处方】	黄连 1284g 吴茱萸 214g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为红棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气特异，味苦。
【功能与主治】	泻火，疏肝，和胃，止痛。用于肝火犯胃，脘胁疼痛，口苦嘈杂，呕吐酸水，不喜热饮。
【用法与用量】	饭后服用。一次 2~4 粒，一日 2 次。15 日为一个疗程。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	达立通颗粒
【处方】	柴胡 154g 木香 154g 清半夏 154g 焦山楂 154g 鸡矢藤 154g 延胡索 92g 枳实 154g 陈皮 154g 蒲公英 231g 焦槟榔 92g 党参 92g 六神曲(炒) 154g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味微甜、微苦。
【功能与主治】	清热解郁，和胃降逆，通利消滞。用于肝胃郁热所致痞满证，症见胃脘胀满、嗳气、纳差、胃中灼热、嘈杂泛酸、脘腹疼痛、口干口苦；动力障碍型功能性消化不良见上述症状者。
【用法与用量】	温开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。饭前服用。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	利膈片
【处方】	炒莱菔子 100g 酒大黄 100g 山楂 50g 砂仁 25g 醋青皮 50g 麸炒麦芽 50g 陈皮 50g 广藿香 50g 甘草 50g 槟榔 100g 姜厚朴 50g 六神曲(炒) 50g 桔梗 50g 麸炒枳壳 50g 木香 50g 麸炒苍术 50g 草果仁 50g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的大蜜丸；气微香，味苦、辛。
【功能与主治】	宽胸利膈，消积止痛。用于气滞不舒，胸膈胀满，脘腹疼痛，停饮。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	沉香化气丸
【处方】	沉香 25g 广藿香 100g 砂仁 50g 醋莪术 100g 炒麦芽 100g 木香 50g 醋香附 50g 陈皮 50g 六神曲(炒) 100g 甘草 50g。

【性状】	本品为灰棕色至黄棕色的水丸；气香，味微甜、苦。
【功能与主治】	理气疏肝，消积和胃。用于肝胃气滞，脘腹胀痛，胸膈痞满，不思饮食，噯气泛酸。
【用法与用量】	口服。一次3~6g，一日2次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃苏颗粒
【处方】	紫苏梗 166.7g 香附 166.7g 陈皮 100g 香橼 166.7g 佛手 100g 枳壳 166.7g 槟榔 100g 炒鸡内金 100g。
【性状】	规格(1)：本品为淡棕色的颗粒，味微苦。 规格(2)：本品为淡棕色至棕褐色的颗粒，味苦。
【功能与主治】	理气消胀，和胃止痛。主治气滞型胃脘痛，症见胃脘胀痛，窜及两胁，得噯气或矢气则舒，情绪郁怒则加重，胸闷食少，排便不畅，舌苔薄白，脉弦；慢性胃炎及消化性溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。15天为一个疗程，可服1~3个疗程或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装15g。(2)每袋装5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

肝胃不和型胃炎灼痛吐酸十二指肠溃疡胃窦炎

【药名】	乌贝散
【处方】	海螵蛸(去壳)850g 浙贝母 150g。
【性状】	本品为黄白色的粉末；气微香，味咸、微苦。
【功能与主治】	制酸止痛，收敛止血。用于肝胃不和所致的胃脘疼痛、泛吐酸水、嘈杂似饥；胃及十二指肠溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	饭前口服。一次3g，一日3次；十二指肠溃疡者可加倍服用。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装45g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乌贝颗粒
【处方】	海螵蛸(去壳)638g 浙贝母 112g。

【性状】	本品为黄白色的包衣颗粒；气微香，味微苦。
【功能与主治】	制酸止痛，收敛止血。用于肝胃不和所致的胃脘疼痛、泛吐酸水、嘈杂似饥；胃及十二指肠溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	饭前口服，服用时将颗粒倒入口中，用温开水送服。一次一袋，一日3次；十二指肠溃疡者可加倍服用。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	戊己丸
【处方】	黄连30g 吴茱萸(制)50g 白芍(炒)300g。
【性状】	本品为棕黄色的水丸；味苦，稍有麻辣感。
【功能与主治】	泻肝和胃，降逆止呕。用于肝火犯胃、肝胃不和所致的胃脘灼热疼痛、呕吐吞酸、口苦嘈杂、腹痛泄泻。
【用法与用量】	口服。一次3~6g，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	四方胃片
【处方】	海螵蛸156g 浙贝母78g 苦杏仁39g 吴茱萸(盐水制)20g 延胡索(醋制)39g 黄连39g 炒川楝子78g 柿霜39g 沉香12g。
【性状】	本品为灰黄色至棕黄色的片或薄膜衣片，薄膜衣片除去包衣后显灰黄色至棕黄色；气微香，味微苦。
【功能与主治】	调肝和胃，制酸止痛。用于肝胃不和所致的胃脘疼痛、呕吐吞酸、食少便溏；消化不良、胃及十二指肠溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3片，一日2~3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)素片，每片重0.64g。(2)薄膜衣片，每片重0.65g。
【贮藏】	密封。

【药名】	快胃片
【处方】	海螵蛸，枯矾，醋延胡索，白及，甘草。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显淡黄色至灰棕色；气微，味涩、微苦。
【功能与主治】	制酸和胃，收敛止痛。用于肝胃不和所致的胃脘疼痛、呕吐反酸、纳食减少；浅表性胃炎、胃及十二指肠溃疡、胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次6片，十一至十五岁一次4片〔规格(1)、(3)〕或一次3片，十一至十五岁一次2片〔规格(2)〕，一日3次，饭前1~2小时服。
【注意】	低酸性胃病、胃阴不足者慎用。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.35g。(2)薄膜衣片每片重0.87g。(3)糖衣片(片心重0.35g)。

【贮藏】	密封。
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>健胃片</p> <p>炒山楂 16g 炒麦芽 16g 醋鸡内金 16g 草豆蔻 47g 生姜 16g 白芍 79g 醋延胡索 32g 六神曲(炒) 16g 焦槟榔 32g 苍术(制) 79g 陈皮 47g 柴胡 47g 川楝子 47g 甘草浸膏 9g。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显浅黄棕色至棕色；气香，味微苦、辛。</p> <p>舒肝和胃，消食导滞，理气止痛。用于肝胃不和，饮食停滞所致的胃痛，痞满，症见胃脘胀痛，嘈杂食少，嗳气口臭，大便不调。</p> <p>口服。一次 6 片，一日 3 次。</p> <p>孕妇慎服；不宜久服，肝功能不良者慎服。</p> <p>(1) 薄膜衣片每片重 0.32g；(2) 糖衣片(片心重 0.3g)。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>健胃愈疡片</p> <p>柴胡，党参，白芍，延胡索，白及，珍珠层粉，青黛，甘草。</p> <p>本品为灰褐黑色的素片，或为薄膜衣片，除去包衣后显灰褐黑色，气微，味苦。</p> <p>疏肝健脾，生肌止痛。用于肝郁脾虚、肝胃不和所致的胃痛，症见脘腹胀痛、嗳气吞酸、烦躁不适、腹胀便溏；消化性溃疡见上述证候者。</p> <p>口服，一次 4~5 片，一日 4 次。</p> <p>忌酒及辛辣、油腻、酸性食物。</p> <p>薄膜衣片每片重 0.3g。</p> <p>遮光，密封，置干燥处。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>健胃愈疡颗粒</p> <p>柴胡，党参，白芍，延胡索，白及，珍珠层粉，青黛，甘草。</p> <p>本品为褐黑色的颗粒；气微，味苦。</p> <p>疏肝健脾，生肌止痛。用于肝郁脾虚、肝胃不和所致的胃痛，症见脘腹胀痛、嗳气吞酸、烦躁不适、腹胀便溏；消化性溃疡见上述证候者。</p> <p>温开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。</p> <p>忌酒及辛辣、油腻、酸性食物。</p> <p>每袋装 3g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p>	<p>胃舒宁颗粒</p> <p>甘草 595g 海螵蛸 595g 白芍 464g 白术 310g 延胡索 310g 党参 119g。</p> <p>本品为棕黄色的颗粒；气芳香，味甜。</p> <p>补气健脾，制酸止痛。用于脾胃气虚、肝胃不和所致的胃脘疼痛、喜温喜按、泛吐酸水；胃及十二指肠溃疡见上述证候者。</p>

【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装(1)5g；(2)3g；(3)3g(含乳糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	舒肝平胃丸
【处方】	姜厚朴 30g 麸炒枳壳 30g 苍术 60g 焦槟榔 15g 陈皮 30g 法半夏 30g 炙甘草 30g。
【性状】	本品为赭红色的水丸，除去包衣后显黄褐色；味辛、微甜。
【功能与主治】	舒肝和胃，化湿导滞。用于肝胃不和、湿浊中阻所致的胸胁胀满、胃脘痞塞疼痛、嘈杂噯气、呕吐酸水、大便不调。
【用法与用量】	口服。一次4.5g，一日2次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每10粒重0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	舒肝和胃丸
【处方】	醋香附 45g 佛手 150g 郁金 45g 陈皮 75g 广藿香 30g 莱菔子 45g 乌药 45g 白芍 45g 木香 45g 炒白术 60g 柴胡 15g 炙甘草 15g 焦槟榔 45g。
【性状】	本品为棕褐色的水丸或为棕褐色至棕黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气特异，味甜。
【功能与主治】	舒肝解郁，和胃止痛。用于肝胃不和，两胁胀满，胃脘疼痛，食欲不振，呃逆呕吐，大便失调。
【用法与用量】	口服。水丸一次6g，水蜜丸一次9g，小蜜丸一次12g(60丸)，大蜜丸一次2丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)水蜜丸每100丸重20g；(2)小蜜丸每100丸重20g；(3)大蜜丸每丸重6g；(4)水丸每袋装6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	草香胃康胶囊
【处方】	鸡内金，决明子，海螵蛸，牡蛎，木香，阿魏。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为褐色至红褐色的粉末；气特异，味淡。
【功能与主治】	泄肝和胃，行气止痛。用于肝气犯胃所致的胃痛，症见胃脘疼痛、饥后尤甚、泛吐酸水、食欲不佳、心烦易怒；胃及十二指肠球部溃疡、慢性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃药胶囊
【处方】	醋延胡索 120g 海螵蛸(漂)60g 土木香 60g 枯矾 90g 鸡蛋壳(炒)120g 煅珍珠母 120g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅灰黄色至棕黄色颗粒和粉末；气微香，味苦。
【功能与主治】	制酸止痛。用于肝胃不和所致的胃脘疼痛、胃酸过多、嘈杂反酸；胃及十二指肠溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 粒，一日 3 次。
【注意】	忌烟酒及辛辣等刺激性食物。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃康灵片
【处方】	白芍 317.5g 三七 9.9g 茯苓 238.1g 海螵蛸 31.7g 白及 238.1g 甘草 317.5g 延胡索 158.7g 颠茄浸膏 2.1g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显褐色，味甘。
【功能与主治】	柔肝和胃，散瘀止血，缓急止痛，去腐生新。用于肝胃不和、瘀血阻络所致的胃脘疼痛、连及两胁、噯气、泛酸；急、慢性胃炎，胃、十二指肠溃疡，胃出血见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次。饭后服用。
【注意】	青光眼患者忌服。
【规格】	每片重 0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃康灵胶囊
【处方】	白芍 317.5g 白及 238.1g 三七 9.9g 甘草 317.5g 茯苓 238.1g 延胡索 158.7g 海螵蛸 31.7g 颠茄浸膏 2.1g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为淡黄色至棕褐色的粉末；味甘。
【功能与主治】	柔肝和胃，散瘀止血，缓急止痛，去腐生新。用于肝胃不和、瘀血阻络所致的胃脘疼痛、连及两胁、噯气、泛酸；急、慢性胃炎，胃、十二指肠溃疡，胃出血见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。饭后服用。
【注意】	青光眼患者忌服。
【规格】	每粒装 0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	朴沉化郁丸
【处方】	醋香附 150g 麸炒枳壳 50g 木香 35g 柴胡 35g 丁香 35g 高良姜 25g 陈皮 100g 豆蔻 35g 砂仁 35g 醋延胡索 35g 檀香 35g 片姜黄 15g 姜厚朴 75g 沉香 35g 醋青皮 35g 甘草 35g 醋莪术 25g 肉桂 15g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的大蜜丸，味甜、微苦。
【功能与主治】	疏肝解郁，开胃消食。用于肝气郁滞、肝胃不和所致的胃脘刺痛、胸腹胀

【用法与用量】	满、恶心呕吐、停食停水、气滞闷郁。 口服。一次1丸，一日2次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	猴头健胃灵片
【处方】	猴头菌丝体160g 海螵蛸80g 醋延胡索40g 酒白芍40g 醋香附40g 甘草40g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕黄色；气芳香，味甜、微苦。
【功能与主治】	舒肝和胃，理气止痛。用于肝胃不和，胃脘胁肋胀痛，呕吐吞酸，慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每片重0.38g。
【贮藏】	密封。

【药名】	猴头健胃灵胶囊
【处方】	猴头菌丝体160g 海螵蛸80g 醋延胡索40g 酒白芍40g 醋香附40g 甘草40g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气芳香，味甜、微苦。
【功能与主治】	舒肝和胃，理气止痛。用于肝胃不和，胃脘胁肋胀痛，呕吐吞酸，慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.34g。
【贮藏】	密封。

【药名】	加味左金丸
【处方】	姜黄连36g 制吴茱萸36g 黄芩18g 柴胡36g 木香18g 醋香附72g 郁金36g 白芍54g 醋青皮54g 麸炒枳壳54g 陈皮54g 醋延胡索54g 当归54g 甘草18g。
【性状】	本品为黄棕色的水丸；气香，味苦、辛。
【功能与主治】	平肝降逆，疏郁止痛。用于肝郁化火、肝胃不和引起的胸脘痞闷、急躁易怒、噯气吞酸、胃痛少食。
【用法与用量】	口服。一次6g，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每100丸重6g。
【贮藏】	密封。

胃阴不足阴虚型胃胀痛口干胃炎溃疡

【药名】	阴虚胃痛颗粒
【处方】	北沙参，石斛，玉竹，炙甘草，麦冬，川楝子，白芍。
【性状】	本品为淡黄棕色至黄棕色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	养阴益胃，缓急止痛。用于胃阴不足所致的胃脘隐隐灼痛、口干舌燥、纳呆干呕，慢性胃炎、消化性溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃安胶囊
【处方】	石斛50g 黄柏50g 南沙参100g 山楂100g 枳壳(炒)100g 黄精100g 甘草50g 白芍50g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒或粉末，有时可见少量细小黄色纤维；味苦。
【功能与主治】	养阴益胃，柔肝止痛。用于肝胃阴虚、胃气不和所致的胃痛、痞满，症见胃脘隐痛、纳少嘈杂、咽干口渴、舌红少津、脉细数；萎缩性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	饭后2小时服用。一次8粒〔规格(1)〕，或一次4粒〔规格(2)〕，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每粒装0.25g；(2)每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胃祥宁颗粒
【处方】	女贞子5000g。
【性状】	本品为灰褐色颗粒；味苦、微甜。
【功能与主治】	养阴柔肝止痛，润燥通便。用于阴虚胃燥，胃脘胀痛，腹胀，嗝气，口渴，便秘；消化性溃疡，慢性胃炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装3g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

胃火炽盛型口燥舌干头痛目眩大便燥结

【药名】	大黄清胃丸
【处方】	大黄 504g 木通 63g 槟榔 63g 黄芩 96g 胆南星 42g 羌活 42g 滑石粉 168g 白芷 42g 炒牵牛子 42g 芒硝 63g。
【性状】	本品为黑褐色的大蜜丸；味苦、辛。
【功能与主治】	清热通便。用于胃火炽盛所致的口燥舌干、头痛目眩、大便燥结。
【用法与用量】	口服，一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

胃阳不足湿阻气滞型胃痛脘闷呕吐酸水

【药名】	香砂养胃丸
【处方】	木香 210g 白术 300g 茯苓 300g 醋香附 210g 豆蔻(去壳)210g 广藿香 210g 生姜 90g 砂仁 210g 陈皮 300g 半夏(制)300g 枳实(炒)210g 姜厚朴 210g 甘草 90g 大枣 150g。
【性状】	本品为黑色的水丸，除去包衣后显棕褐色；气微，味辛、微苦。
【功能与主治】	温中和胃。用于胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满，症见胃痛隐隐、脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠。
【用法与用量】	口服。一次 9g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	香砂养胃丸(浓缩丸)
------	-------------------

【处方】	木香 210g 砂仁 210g 白术 300g 陈皮 300g 茯苓 300g 半夏(制) 300g 醋香附 210g 枳实(炒) 210g 豆蔻(去壳) 210g 姜厚朴 210g 广藿香 210g 甘草 90g 生姜 90g 大枣 150g。
【性状】	本品为棕色或棕褐色的浓缩水丸；气微，味辛、微苦。
【功能与主治】	温中和胃。用于胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满，症见胃痛隐隐、脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠。
【用法与用量】	口服。一次 8 丸，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每 8 丸相当于饮片 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	香砂养胃颗粒
【处方】	木香 152.2g 白术 217.4g 茯苓 217.4g 醋香附 152.2g 豆蔻(去壳) 152.2g 砂仁 152.2g 陈皮 217.4g 姜半夏 217.4g 枳实(炒) 152.2g 姜厚朴 152.2g 广藿香 152.2g 甘草 65.2g。
【性状】	本品为黄棕色至棕色的颗粒；气芳香，味微甜、略苦。
【功能与主治】	温中和胃。用于胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满，症见胃痛隐隐、脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 5g。
【贮藏】	密封。

肾阳衰弱型脾胃虚寒腹痛呕吐泄泻肢冷

【药名】	桂附理中丸
【处方】	肉桂 30g 附片 30g 党参 90g 炒白术 90g 炮姜 90g 炙甘草 90g。
【性状】	本品为棕褐色至棕黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸，气微，味甜而辛辣。
【功能与主治】	补肾助阳，温中健脾。用于肾阳衰弱，脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，四肢厥冷。
【用法与用量】	用姜汤或温开水送服，水蜜丸一次 5g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1) 水蜜丸每 10 丸重 0.24g。(2) 大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

感冒属风寒夹湿内伤食滞型恶寒发热头痛反酸腹痛泄泻

【药名】	调胃消滞丸
【处方】	姜厚朴 60g 羌活 60g 广东神曲 60g 枳壳 30g 香附(四制) 6g 姜半夏 60g 防风 60g 前胡 60g 川芎(白酒蒸) 6g 白芷 60g 薄荷 60g 砂仁 60g 草果 30g 木香 6g 豆蔻 60g 茯苓 60g 苍术(泡) 60g 广藿香 6g 乌药(醋蒸) 60g 甘草 30g 紫苏叶 60g 陈皮(蒸) 60g。
【性状】	本品为包衣水丸，除去包衣后，显灰黄色；气香，味微苦、辛。
【功能与主治】	疏风解表，散寒化湿，健胃消食。用于感冒属风寒夹湿、内伤食滞证，症见恶寒发热、头痛身困、食少纳呆、噎腐吞酸、腹痛泄泻。
【用法与用量】	口服。一次 2.2g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶或每袋装 2.2g。
【贮藏】	密封。

胃痞瘤木布病剑突痰病消化不良胃胀胃烧泛酸

【药名】	帕朱丸
【处方】	本品系藏族验方：寒水石(酒制) 200g 石榴子 130g 干姜 70g 诃子(去) 150g 荜茇 40g 木香 80g 肉桂 80g 胡椒 40g 红花 100g 豆蔻 40g 光明盐 30g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的水丸，气微，味辛、酸。
【功能与主治】	健胃散寒，除痰，破痞瘤，养荣强壮。用于剑突痰病，胃痞瘤木布病引起的消化不良、胃胀、胃烧泛酸、胃肝不适。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 丸，一日 1 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 0.5g。
【贮藏】	密闭，置阴凉干燥处。

平滑肌痉挛型胃及十二指肠溃疡胃肠道肾胆绞痛

【药名】	颠茄酊
【处方】	颠煎草 1000g。
【性状】	本品为棕红色或棕绿色的液体；气微臭。
【功能与主治】	抗胆碱药，解除平滑肌痉挛，抑制腺体分泌。用于胃及十二指肠溃疡，胃肠道、肾、胆绞痛等。
【用法与用量】	口服。常用量：一次 0.3~1ml，一日 1~3ml；极量：一次 1.5ml，一日 4.5ml。
【注意】	青光眼患者忌服。
【规格】	无。
【贮藏】	遮光，密封，置阴凉处。

【药名】	颠茄片
【处方】	颠茄浸膏 10g。
【性状】	本品为浅棕色或棕色的片。
【功能与主治】	抗胆碱药，解除平滑肌痉挛，抑制腺体分泌。用于胃及十二指肠溃疡，胃肠道、肾、胆绞痛等。
【用法与用量】	口服。一次 10~30mg，一日 30~90mg；极量，一次 50mg，一日 150mg。
【注意】	青光眼患者忌服。
【规格】	每片含颠茄浸膏 10mg。
【贮藏】	密封。

小儿饮食积滞疳症虫积腹痛呕吐二便不畅消化不良

【药名】	儿童清热导滞丸
【处方】	醋鸡内金 120g 醋莪术 90g 姜厚朴 90g 枳实 90g 焦山楂 60g 醋青皮 90g 法半夏 60g 六神曲(焦) 60g 焦麦芽 60g 焦槟榔 120g 榧子 90g 使君子仁 120g 胡黄连 60g 苦楝皮 90g 知母 120g 青蒿 60g 酒黄芩 120g 薄荷 60g 钩藤 90g 盐车前子 120g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；味甜、微苦。
【功能与主治】	健胃导滞，消积化虫。用于食滞肠胃所致的疳症，症见不思饮食、消化不良、面黄肌瘦、烦躁口渴、胸膈满闷、积聚痞块，亦用于虫积腹痛。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 3 次，周岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿七星茶口服液
【处方】	薏苡仁 417g 稻芽 417g 山楂 208g 淡竹叶 313g 钩藤 156g 蝉蜕 52g 甘草 52g。
【性状】	本品为棕红色的澄清液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	开胃消滞，清热定惊。用于小儿积滞化热，消化不良，不思饮食，烦躁易惊，夜寐不安，大便不畅，小便短赤。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 2 次，婴儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿七星茶颗粒
【处方】	薏苡仁 893g 稻芽 893g 山楂 446g 淡竹叶 670g 钩藤 335g 蝉蜕 112g 甘草 112g。
【性状】	本品为浅黄棕色至红棕色的颗粒；气微，味甜、微苦。
【功能与主治】	开胃消滞，清热定惊。用于小儿积滞化热，消化不良，不思饮食，烦躁易惊，夜寐不安，大便不畅，小便短赤。
【用法与用量】	开水冲服。一次 3.5~7g，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 3.5g；(2) 每袋装 7g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿化食口服液
【处方】	六神曲(炒焦) 10g 焦山楂 10g 焦麦芽 10g 焦槟榔 10g 醋莪术 5g 三棱(麸炒) 5g 大黄 10g 炒牵牛子 20g。
【性状】	本品为棕色的液体；气微，味甜。
【功能与主治】	消食化滞，泻火通便。用于食滞化热所致的积滞，症见厌食、烦躁、恶心呕吐、口渴、脘腹胀满、大便干燥。
【用法与用量】	口服。三岁以上每次 10ml，一日 2 次。
【注意】	忌食辛辣油腻。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿化食丸
【处方】	六神曲(炒焦) 100g 焦山楂 100g 焦麦芽 100g 焦槟榔 100g 醋莪术 50g，三棱(制) 50g 牵牛子(炒焦) 200g 大黄 100g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；味微苦。
【功能与主治】	消食化滞，泻火通便。用于食滞化热所致的积滞，症见厌食、烦躁、恶心呕吐、口渴、脘腹胀满、大便干燥。
【用法与用量】	口服。周岁以内一次 1 丸，周岁以上一次 2 丸，一日 2 次。
【注意】	忌食辛辣油腻。
【规格】	每丸重 1.5g。

【贮藏】	密封。
【药名】	小儿香橘丸
【处方】	木香 9g 陈皮 54g 苍术(米泔炒) 54g 炒白术 54g 茯苓 54g 甘草 18g 白扁豆(去皮) 36g 麸炒山药 36g 莲子 36g 麸炒薏苡仁 36g 炒山楂 36g 炒麦芽 36g 六神曲(麸炒) 36g 姜厚朴 36g 麸炒枳实 36g 醋香附 54g 砂仁 18g 法半夏 36g 泽泻 18g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味苦。
【功能与主治】	健脾和胃，消食止泻。用于脾虚食滞所致的呕吐便泻、脾胃不和、身热腹胀、面黄肌瘦、不思饮食。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 3 次；周岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 3g。
【贮藏】	密封。
【药名】	小儿消食片
【处方】	炒鸡内金 4.7g 山楂 93.3g 六神曲(炒) 85.5g 炒麦芽 85.5g 槟榔 23.3g 陈皮 7.8g。
【性状】	本品为浅棕色的片；或为异型薄膜衣片，除去包衣后显浅棕色；气微，味甘、微酸。
【功能与主治】	消食化滞，健脾和胃。用于食滞肠胃所致积滞，症见食少、便秘、脘腹胀满、面黄肌瘦。
【用法与用量】	口服或咀嚼。一至三岁一次 2~4 片，三至七岁一次 4~6 片，成人一次 6~8 片〔规格(1)〕或一至三岁一次 2~3 片，三至七岁一次 3~5 片，成人一次 5~6 片〔规格(2)〕；一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每片重 0.3g；(2) 薄膜衣片每片重 0.4g。
【贮藏】	密封。
【药名】	小儿消积止咳口服液
【处方】	炒山楂，枳实，瓜蒌，炒葶苈子，连翘，槟榔，蜜枇杷叶，炒莱菔子，桔梗，蝉蜕。
【性状】	本品为棕红色的液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热肃肺，消积止咳。用于小儿饮食积滞、痰热蕴肺所致的咳嗽、夜间加重、喉间痰鸣、腹胀、口臭。
【用法与用量】	口服。周岁以内一次 5ml，一至二岁一次 10ml，三至四岁一次 15ml，五岁以上一次 20ml，一日 3 次；5 天为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	保赤散
【处方】	六神曲(炒)250g 巴豆霜 150g 天南星(制)400g 朱砂 250g。
【性状】	本品为粉红色至橙红色的粉末；味淡、微辛。
【功能与主治】	消食导滞，化痰镇惊。用于小儿冷积，停乳停食，大便秘结，腹部胀满，痰多。
【用法与用量】	口服。小儿六个月至一岁一次 0.09g，二至四岁一次 0.18g。
【注意】	泄泻者忌服。
【规格】	每瓶装 0.09g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	清胃保安丸
【处方】	麸炒白术 90g 陈皮 90g 砂仁 90g 姜厚朴 90g 甘草 90g 麸炒枳壳 90g 白酒曲 180g 六神曲(麸炒)90g 茯苓 90g 青皮 90g 炒麦芽 90g 槟榔 90g 枳实 90g 炒山楂 360g。
【性状】	本品为黄色至棕褐色的大蜜丸或小蜜丸；气香，味甜、酸。
【功能与主治】	消食化滞，和胃止呕。用于食滞胃肠所致积滞，症见小儿停食、停乳、脘腹胀满、呕吐、心烦、口渴。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 3g，大蜜丸一次 1 丸〔规格(2)〕，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)小蜜丸每袋装 3g。(2)大蜜丸每丸重 3g。
【贮藏】	密闭，防潮。

小儿腹泻腹胀腹痛食少呕吐口干倦怠乏力

【药名】	小儿腹泻宁糖浆
【处方】	党参 150g 白术 200g 茯苓 200g 葛根 250g 甘草 50g 广藿香 50g 木香 50g。
【性状】	本品为深棕色的黏稠液体；气香，味甜、涩。
【功能与主治】	健脾和胃，生津止泻，用于脾胃气虚所致的泄泻，症见大便泄泻、腹胀腹痛、纳减、呕吐、口干、倦怠乏力、舌淡苔白。
【用法与用量】	口服。十岁以上儿童一次 10ml，一日 2 次；十岁以下儿童酌减。
【注意】	呕吐腹泻后舌红口渴，小便短赤者慎用。
【规格】	每瓶装 10ml。
【贮藏】	密封。

小儿脾胃虚弱厌食面黄体弱大便不调

【药名】	儿宝颗粒
【处方】	太子参 120g 北沙参 120g 茯苓 120g 山药 120g 炒山楂 45g 炒麦芽 45g 陈皮 45g 炒白芍 45g 炒白扁豆 120g 麦冬 45g 葛根(煨) 45g。
【性状】	本品为淡黄色至棕黄色的颗粒；味甜、微酸。
【功能与主治】	健脾益气，生津开胃。用于脾气虚弱、胃阴不足所致的纳呆厌食、口干燥渴、大便久泻、面黄体弱、精神不振、盗汗。
【用法与用量】	开水冲服，一至三岁一次 5g 或 4.5g(低蔗糖型)，四至六岁一次 1.5g 或 6.8g(低蔗糖型)，六岁以上一次 10g 或 9g(低蔗糖型)，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 4.5g(低蔗糖型)；(2) 每袋装 5g；(3) 每袋装 9g(低蔗糖型)；(4) 每袋装 10g；(5) 每袋装 15g。
【贮藏】	密封。
【药名】	儿康宁糖浆
【处方】	党参，黄芪，白术，茯苓，山药，薏苡仁，麦冬，制何首乌，大枣，焦山楂，麦芽(炒)。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的黏稠液体；气芳香，味甜。
【功能与主治】	益气健脾，消食开胃。用于脾胃气虚所致的厌食，症见食欲不振、消化不良、面黄身瘦、大便稀溏。
【用法与用量】	口服，一次 10ml，一日 3 次，20~30 天为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每支装 10ml；(2) 每瓶装 150ml。
【贮藏】	密封。
【药名】	健儿乐颗粒
【处方】	山楂 250g 钩藤 50g 竹心 150g 白芍 250g 甜叶菊 150g 鸡内金 5g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒，味甜、微苦。
【功能与主治】	健脾消食，清心安神。用于脾失健运、心肝热盛所致厌食、夜啼，症见纳呆食少、消化不良、夜惊夜啼、夜眠不宁。
【用法与用量】	口服。三岁以下小儿一次 5g，三至六岁一次 10g，一日 2 次；七至十二岁一次 10g，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密封。
【药名】	健儿消食口服液
【处方】	黄芪 66.7g 陈皮 33.4g 黄芩 33.4g 炒莱菔子 33.4g 炒白术 33.4g 麦冬 66.7g

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>炒山楂 33.4。</p> <p>本品为棕黄色至棕褐色的液体，久置有少量沉淀；味甜、微苦。</p> <p>健脾益胃，理气消食。用于小儿饮食不节损伤脾胃引起的纳呆食少，脘腹胀满，手足心热，自汗乏力，大便不调，以至厌食、恶食。</p> <p>口服。三岁以内一次 5~10ml，三岁以上一次 10~20ml，一日 2 次，用时摇匀。</p> <p>无。</p> <p>每支装 10ml。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>化积口服液</p> <p>茯苓(去皮)，炒鸡内金，醋莪术，槟榔，鹤虱，海螵蛸，醋三棱，红花，雷丸，使君子仁。</p> <p>本品为黄棕色的澄清液体；气清香，味甜、苦。</p> <p>健脾导滞，化积除疳。用于脾胃虚弱所致的疳积，症见面黄肌瘦、腹胀腹痛、厌食或食欲不振、大便失调。</p> <p>口服。周岁以内一次 5ml，一日 2 次；二至五岁，一次 10ml，一日 2 次；五岁以上，一次 10ml，一日 3 次；或遵医嘱。</p> <p>无。</p> <p>每支装 10ml。</p> <p>密封，置阴凉处。</p>
---	---

中医对于肠道系统的研究和诊断

小肠

小肠位于腹中，是一个相当长的管道器官，包括十二指肠、空肠和回肠，上头连接幽门，与胃相通；下连阑门，与大肠连接。饮食物的消化吸收主要是在小肠内进行的。小肠通过经脉的相互络属而与心构成表里关系。小肠属火，为阳。其主要务能是消化食糜、吸收精微和传输糟粕，前人将其归纳为受盛化物和泌别清浊。

受盛化物：所谓受盛化物是指小肠具有接受胃下降的食糜，并将食糜进一步消化，吸收精微的功能。故《素问·灵兰秘典论》说：“小肠者，受盛之官，化物出焉。”受盛和化物为两个阶段，小肠一方面接受由胃腑下传来的食糜，起到容器的作用。另一方面使食糜在小肠内有相当长的停留时间，进行精细的消化，使之化为精微。前为“受盛”，后者为“化物”。若小肠的受盛和化物功能失常，消化吸收障碍，可见腹胀、腹痛、泄泻等症。

泌别清浊：所谓泌别清浊是指小肠具有将胃下降的食糜在进一步消化的同时，分化为水谷精微和食物残渣两个部分。一方面将水谷精微(清)易收，经脾的升清散精作用输送到全身。另一方面将剩余的食物残渣(浊)经阑门传人大肠。此外小肠的吸收功能与尿量有着一定的关系，因为吸收的精微物质中包括大量的水液，故有“小肠主液”之说。张介宾指

出：“小肠居胃之下，受盛胃中水谷而分清浊，水液由此渗于前，糟粕由此而归于后，脾气化而上升，小肠化而下降，故曰化物出焉。”小肠功能失常，清浊不分，水谷精微和食物残渣俱下于大肠，可见肠鸣泄泻；水液吸收障碍，尿的来源减少，则可见小便短少等病症。小肠泌别清浊的功能失常，既影响大便，也影响小便，故治疗泄泻常用“利小便即所以实大便”的分利方法。

应当指出，小肠的受盛化物和泌别清浊，乃人体整个消化吸收过程的重要阶段，但在中医藏象学说中，往往又将之归属于脾胃的纳运功能，所以临床上对于小肠的消化吸收不良之症也多从脾胃论治。

大肠

大肠位居腹中，是一个管道样的器官，其上口在阑门处与小肠相接，其下端为肛门。大肠与肺通过经脉的相互络属构成表里关系。大肠的五行属性为金，阴阳属性为阳。大肠的主要功能是吸收饮食残渣中的水分和排泄糟粕。故《素问·灵兰秘典论》说：“大肠者，传道之官，变化出焉。”道，通“导”。这是对大肠生理功能的高度概括。由于大肠具有吸收食物残渣中部分水分的功能，故有“大肠主津”之说。大肠传化糟粕功能失常，主要表现为排便的异常，若大肠虚寒，无力吸收多余水分，则水粪俱下，可见肠鸣、泄泻等病症；大肠实热则消灼水津而肠道失润，可见腹痛、便秘等病症；大肠湿热则阻滞肠道而传导失司，可见下痢脓血、里急后重，或暴注下泻、肛门灼热等病症。

应该指出，大肠排泄糟粕还与肺气肃降、胃气降浊、脾主运化、肾中阴阳的滋润与温煦和肾气的封藏等功能有关，这些脏腑发生病变也可以引起大肠传导功能的失常。所以临床上常通过调理他脏以治大肠之病。

中医认为，肛门直肠疾病中常见的发病因素有**风、湿、热、燥、气虚、血虚**等。下面是各种因素的致病特点及引起疾病的机理分述如下：

风：《证治要诀·卷八·肠风脏毒》说：“血清而色鲜者，为肠风。”《见闻录》说：“纯下清血者，风也。”说明风邪可引起下血。而风多挟热，热伤肠络，血不循经而下溢，风又善行而数变，故由风邪引起的便血，其色泽较鲜红，下血暴急呈喷射状。

湿：湿分内湿、外湿。外湿多因坐卧湿地，久居雾露潮湿之处而发；内湿多因饮食不节，恣食生冷、肥甘，损伤脾胃而生。湿性重着，常先伤于下，故肛门病中因湿而发病的较多。湿与热结，致肛门部气血纵横、经络交错而发内痔。湿性秽浊，热伤络脉，则下血如烟尘，正如《见闻录》说：“色如烟尘者，湿也。”湿热蕴阻肛门，经络阻隔，气血凝滞，则易形成肛门直肠周围脓肿；湿热下注大肠，肠途气机不利，经络阻滞，瘀血凝聚，发为直肠息肉。

热：《丹溪心法·卷二·痔疮》中说：“痔者，皆因脏腑本虚，外伤风湿，风蓄热毒。”热积肠道，最易耗伤津液，而致热结肠燥，大便秘结不通，久之可导致气血不畅，瘀血不散，结而为痔；热盛灼伤肠络或迫血妄行，血不循经，下溢而为便血。热与湿结，蕴阻肛

门而发生肛门周围脓肿。

燥：《医宗金鉴·外科心法要诀·痔疮》中说：“肛门围绕，折纹破裂，便结者，火燥也。”燥有内外之分，而引起肛门直肠疾病者，多为内燥。常因饮食不节，恣饮醇酒，过食辛辣等物，以致爆热内生，耗伤津液，无以下漏大肠，使大便干结；或素体阴虚，肠道失于濡润，大便干燥，排便怒挣，常使肛门裂伤或擦伤痔核而致使便血等。

气虚：《疮疡经验全书·卷三·痔漏图说》：“又有妇人孕育过多，力尽血枯，气虚下陷，及小儿久痢，皆能使肛门突出。”这说明了肛门直肠疾病的发生，气虚也是其因素之一。一是脾胃本虚，功能失调，致中气不足而为痔；也有因妇人生育过多，小儿久泻久痢，老年气血衰退，以及某些慢性疾病等，皆能导致中气不足，气虚下陷，无以摄纳而引起直肠脱垂不收，内痔脱出不纳，气虚，统摄失司则下血。

血虚：失血过多；或脾胃虚弱，生血乏源；或忧思抑郁，皆可导致血虚。在肛肠疾病中常见痔疮出血等。血虚生燥，无以濡润肠道，则大便燥结。同时因为气血同源，气血相依，所以气虚或血虚都可导致气血两虚，使五脏六腑，四肢百骸失于温煦濡养，抗病能力低，每易发生肛门痈疽，其初起症状不明显，蕴脓慢，溃后脓水稀薄，久不敛口。

上述各种因素，有的可单独发病，有的则多种因素同时存在，在病变过程中，有的为实证，有的为虚证，有的则虚中挟实。

肠道消化系统诸病

胃肠积滞型便秘湿热下痢小便赤黄

【药名】	九制大黄丸
【处方】	大黄 500g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的水丸；味微苦。
【功能与主治】	泻下导滞，用于胃肠积滞所致的便秘、湿热下痢、口渴不休、停食停水、胸热心烦、小便赤黄。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 1 次。
【注意】	孕妇禁服；久病体弱者慎服；不宜久服。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密封。

胃肠积热型便秘大便不通脘腹胀满口苦尿黄

【药名】	通幽润燥丸
【处方】	麸炒枳壳 80g 姜厚朴 80g 红花 20g 炒苦杏仁 20g 郁李仁 20g 地黄 20g 槟榔 20g 大黄 40g 木香 10g 桃仁(去皮)20g 当归 20g 火麻仁 20g 熟地黄 20g 黄芩 80g 熟大黄 80g 甘草 10g。
【性状】	本品为黑色至黑褐色的大蜜丸；气微，味苦。
【功能与主治】	清热导滞，润肠通便。用于胃肠积热所致的便秘，症见大便不通、脘腹胀满、口苦尿黄。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇禁用；年老体弱者慎用。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。
【药名】	麻仁润肠丸
【处方】	火麻仁 120g 炒苦杏仁 60g 大黄 120g 木香 60g 陈皮 120g 白芍 60g。
【性状】	本品为黄褐色的大蜜丸；气微香，味苦、微甘。
【功能与主治】	润肠通便。用于肠胃积热，胸腹胀满，大便秘结。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。
【药名】	麻仁滋脾丸
【处方】	大黄(制)160g 当归 80g 炒苦杏仁 40g 郁李仁 40g 火麻仁 80g 姜厚朴 40g 麸炒枳实 40g 白芍 30g。
【性状】	本品为深棕色至黑褐色的大蜜丸或黑褐色的小蜜丸，气微香，味苦。
【功能与主治】	润肠通便，消食导滞。用于胃肠积热、肠燥津伤所致的大便秘结、胸腹胀满、饮食无味、烦躁不宁、舌红少津。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 9g(45 丸)，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)小蜜丸每 100 丸重 20g；(2)大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。
【药名】	清泻丸
【处方】	大黄 826g 枳实 83g 朱砂粉 14g 黄芩 165g 甘草 17g。
【性状】	本品为赭红色的包衣水丸，除去包衣后显褐黄色；味苦、涩。
【功能与主治】	清热，通便，消滞。用于实热积滞所致的大便秘结。

【用法与用量】	口服。一次 5.4g。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每袋装 5.4g。
【贮藏】	密封。

湿热毒蕴型肠炎痢疾便血腹痛腹胀泄泻

【药名】	白蒲黄片
【处方】	白头翁 830g 蒲公英 830g 黄芩 83g 黄柏 83g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄褐色；味微苦。
【功能与主治】	清热燥湿，解毒凉血。用于大肠湿热、热毒壅盛所致的痢疾、泄泻，症见里急后重、便下脓血；肠炎、痢疾见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3~6 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.35g；(2) 薄膜衣片每片重 0.4g；(3) 糖衣片(片心重 0.3g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	加味香连丸
【处方】	木香 120 黄芩 120g 白芍 120g 姜厚朴 120g 槟榔 60g 制吴茱萸 60g 姜黄连 180g 黄柏(酒炙) 60g 当归 60g 麸炒枳壳 120g 醋延胡索 60g 炙甘草 30g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的水丸；气微香，味苦。
【功能与主治】	清热祛湿，化滞止痛。用于大肠湿热所致的痢疾，症见大便脓血、腹痛下坠、里急后重
【用法与用量】	口服，一次 6g，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每 100 丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	地榆槐角丸
【处方】	地榆炭 72g 蜜槐角 108g 炒槐花 72g 大黄 36g 黄芩 72g 地黄 72g 当归 36g 赤芍 36g 红花 9g 防风 36g 荆芥穗 36g 麸炒枳壳 36g。
【性状】	本品为黑色的大蜜丸或水蜜丸；气微，味苦、涩。

【功能与主治】	疏风凉血，泻热润燥。用于脏腑实热、大肠火盛所致的肠风便血、痔疮肛痿、湿热便秘，肛门肿痛。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 5g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	忌食辛辣。孕妇忌服。
【规格】	(1) 水蜜丸每 100 丸重 10g；(2) 大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	连蒲双清片
【处方】	盐酸小檗碱 10g 蒲公英浸膏 188g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至绿褐色；气微，味苦。
【功能与主治】	清热解毒，燥湿止痢。用于湿热蕴结所致的肠炎、痢疾；亦用于乳腺炎、疖肿、外伤发炎、胆囊炎。
【用法与用量】	口服。一次 4 片〔规格(1)(3)〕或一次 2 片〔规格(2)(4)〕，一日 3 次；儿童酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.126g(含盐酸小檗碱 5mg)；(2) 薄膜衣片每片重 0.255g(含盐酸小檗碱 10mg)；(3) 糖衣片(片心重 0.125g)(含盐酸小檗碱 5mg)；(4) 糖衣片(片心重 0.25g)(含盐酸小檗碱 10mg)。
【贮藏】	密封。

【药名】	肠炎宁片
【处方】	地锦草，金毛耳草，樟树根，香薷，枳香树叶。
【性状】	本品为薄膜衣片或糖衣片，除去包衣后显棕褐色；气芳香，味酸、微苦。
【功能与主治】	清热利湿，行气。用于大肠湿热所致的泄泻、痢疾，症见大便泄泻、或大便脓血、里急后重、腹痛腹胀；急慢性胃肠炎、腹泻、细菌性痢疾、小儿消化不良见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片〔规格(1)〕或一次 3~4 片〔规格(2)〕或一次 2~3 片〔规格(3)〕，一日 3~4 次小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1) 糖衣片(片心重 0.28g)；(2) 薄膜衣片每片重 0.42g；(3) 薄膜衣片每片重 0.58g。
【贮藏】	密封。

【药名】	肠炎宁糖浆
【处方】	地锦草 660g 樟树根 660g 枳香树叶 330g 金毛耳草 900g 香薷 330g。
【性状】	本品为棕褐色的黏稠液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热利湿，行气。用于大肠湿热所致的泄泻、痢疾，症见大便泄泻、或大便脓血、里急后重、腹痛腹胀；急慢性胃肠炎、腹泻、细菌性痢疾、小儿消化不良见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 3~4 次，小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装(1) 10ml；(2) 100ml。

【贮藏】	密封，置阴凉处。
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>肠胃适胶囊</p> <p>功劳木 1000g 鸡骨香 250g 黄连须 375g 葛根 200g 救必应 250g 凤尾草 375g 两面针 250g 防己 25g。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为淡棕黄色至黄棕色粉末，味苦、甘。</p> <p>清热解毒、利湿止泻。用于大肠湿热所致的泄泻、痢疾，症见腹痛、腹泻，或里急后重、便下脓血；急性胃肠炎、痢疾见上述证候者。</p> <p>口服。一次 4~6 粒，一日 4 次，空腹服。</p> <p>慢性虚寒性泻痢者慎用。</p> <p>每粒装 0.25g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>肠康片</p> <p>盐酸小檗碱 50g 制吴茱萸 125g 木香 313g。</p> <p>本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色，气香，味苦。</p> <p>清热燥湿，理气止痛。用于大肠湿热所致的泄泻、痢疾，症见腹痛泄泻，或里急后重、大便脓血。</p> <p>口服。一次 2~4 片，一日 2 次。</p> <p>无。</p> <p>每片含盐酸小檗碱 50mg。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>苦参片</p> <p>苦参 1000g。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色；味苦。</p> <p>清热燥湿，杀虫。用于湿热蕴蓄下焦所致之痢疾，肠炎，热淋及阴肿阴痒，湿疹，湿疮等。</p> <p>口服。一次 4~6 片，一日 3 次。</p> <p>无。</p> <p>薄膜衣片每片重(1)0.25g；(2)0.35g；(3)0.4g；糖衣片片心重(1)0.25g；(2)0.30g；(3)0.32g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p>	<p>泻痢消胶囊</p> <p>酒黄连 404g 酒白芍 404g 吴茱萸(盐炙) 202g 槟榔 202g 陈皮 202g 茯苓 303g 苍术(炒) 404g 木香 202g 姜厚朴 303g 枳壳(炒) 303g 泽泻 202g 甘草 202g。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味苦。</p> <p>清热燥湿，行气止痛。用于大肠湿热所致的腹痛泄泻、大便不爽、下痢脓血、肛门灼热、里急后重、心烦口渴、小便黄赤、舌质红、苔薄黄或黄腻、脉濡数；急性肠炎、结肠炎、痢疾见上述证候者。</p>

【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每粒装0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	香连丸
【处方】	萹黄连 800g 木香 200g。
【性状】	本品为淡黄色至黄褐色的水丸；气微，味苦。
【功能与主治】	清热化湿，行气止痛。用于大肠湿热所致的痢疾，症见大便脓血、里急后重、发热腹痛；肠炎、细菌性痢疾见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3~6g，一日2~3次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	香连丸(浓缩丸)
【处方】	萹黄连 400g 木香 100g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的浓缩丸；气微，味苦。
【功能与主治】	清热化湿，行气止痛。用于大肠湿热所致的痢疾，症见大便脓血、里急后重、发热腹痛；肠炎、细菌性痢疾见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次6~12丸，一日2~3次。小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1)每10丸重1.7g；(2)每10丸重2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	香连片
【处方】	萹黄连 800g 木香 200g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄褐色；气微，味苦。
【功能与主治】	清热化湿，行气止痛。用于大肠湿热所致的痢疾，症见大便脓血、里急后重、发热腹痛；肠炎、细菌性痢疾见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5片〔规格(2)(4)〕，一日3次；小儿一次2~3片〔规格(1)(3)〕，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣小片每片重0.1g(相当于饮片0.35g)；(2)薄膜衣大片每片重0.3g(相当于饮片1g)；(3)糖衣小片(片心重0.1g；相当于饮片0.35g)；(4)糖衣大片(片心重0.3g；相当于饮片1g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	香连化滞丸
【处方】	黄连 60g 黄芩 75g 陈皮 75g 姜厚朴 75g 滑石 60g 当归 150g 木香 60g 麸炒枳实 75g 醋青皮 75g 炒槟榔 60g 炒白芍 150g 甘草 60g。

【性状】	本品为黄褐色至棕褐色的水丸或棕褐色的水蜜丸或大蜜丸；气微香，味微苦。
【功能与主治】	清热利湿，行血化滞。用于大肠湿热所致的痢疾，症见大便脓血、里急后重、发热腹痛。
【用法与用量】	口服。水丸一次 5g，水蜜丸一次 8g，大蜜丸一次 2 丸，一日 2 次；或遵医嘱。
【注意】	忌食生冷油腻；孕妇忌服。
【规格】	(1) 水丸每 10 丸重 0.3g；(2) 水蜜丸每 100 粒重 10g；(3) 大蜜丸每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方仙鹤草肠炎胶囊
【处方】	仙鹤草 1250g 黄连 375g 木香 375g 蝉蜕 375g 石菖蒲 375g 桔梗 250g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至褐棕色的颗粒和粉末；味苦、涩。
【功能与主治】	清热燥湿，健脾止泻。用于脾虚湿热内蕴所致的泄泻急迫、泻而不爽，或大便溏泻、食少倦怠、腹胀腹痛；急、慢性肠炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次；饭后服用。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方苦参肠炎康片
【处方】	苦参，黄连，黄芩，白芍，车前子，金银花，甘草，颠茄流。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	清热燥湿止泻。用于湿热泄泻，症见泄泻急迫或泻而不爽、肛门灼热、腹痛、小便短赤；急性胃肠炎见上述症候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次；3 天为一疗程，或遵医嘱。
【注意】	青光眼患者慎用。
【规格】	(1) 薄膜衣每片重 0.42g；(2) 糖衣片(片心重 0.4g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方黄连素片
【处方】	盐酸小檗碱 30g 木香 116g 吴茱萸 40g 白芍 162g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色至棕褐色；味苦、微辛。
【功能与主治】	清热燥湿，行气止痛，止痢止泻。用于大肠湿热，赤白下痢，里急后重或暴注下泻，肛门灼热；肠炎、痢疾见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每片含盐酸小檗碱 30mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	葛根苓连片
【处方】	葛根 1000g 黄连 375g 黄芩 375g 炙甘草 250g。
【性状】	本品为黄棕色至棕色的片；或为糖衣片、薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕色；气微，味苦。
【功能与主治】	解肌清热，止泻止痢。用于湿热蕴结所致的泄泻、痢疾，症见身热烦渴、下痢臭秽、腹痛不适。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)素片每片重 0.3g；(2)素片每片重 0.5g；(3)糖衣片(片心重 0.3g)；(4)薄膜衣片每片重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	痢必灵片
【处方】	苦参 277.8g 白芍 138.9g 木香 83.3g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色；气微，味苦。
【功能与主治】	清热，去湿，止痢。用于大肠湿热所致的痢疾、泄泻，症见发热腹痛、大便脓血、里急后重。
【用法与用量】	口服。糖衣片：一次 8 片；薄膜衣片：小片一次 4 片或大片一次 3 片，一日 3 次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重 0.44g(小片)；(2)薄膜衣片每片重 0.7g(大片)。
【贮藏】	密封。

湿热瘀阻血热毒盛型痔疮肛裂肿胀便血肛周湿疹

【药名】	马应龙麝香痔疮膏
【处方】	人工麝香，人工牛黄，珍珠，煅炉甘石粉，硼砂，冰片，琥珀。
【性状】	本品为浅灰黄色或粉红色的软膏；气香，有清凉感。
【功能与主治】	清热燥湿，活血消肿，去腐生肌。用于湿热瘀阻所致的各类痔疮、肛裂，症见大便出血，或疼痛、有下坠感；亦用于肛周湿疹。
【用法与用量】	外用，涂擦患处。
【注意】	孕妇慎用或遵医嘱。
【规格】	无。
【贮藏】	遮光，密闭。

【药名】	化痔栓
【处方】	次没食子酸铋 200g 苦参 370g 黄柏 92.5g 洋金花 55.5g 冰片 30g。
【性状】	本品为暗黄褐色的栓剂。
【功能与主治】	清热燥湿，收涩止血。用于大肠湿热所致的内外痔、混合痔疮。
【用法与用量】	患者取侧卧位，置入肛门 2~2.5cm 深处，一次 1 粒，一日 1~2 次。

【注意】	无。
【规格】	每粒重 1.7g。
【贮藏】	密封。

【药名】	肛泰软膏
【处方】	地榆炭 72g 五倍子 7g 冰片 7g 盐酸小檗碱 36g 盐酸罂粟碱 7g。
【性状】	本品为黄褐色至深褐色的软膏，气香。
【功能与主治】	凉血止血，清热解毒，燥湿敛疮，消肿止痛。用于湿热瘀阻所引起的内痔、外痔、混合痔所出现的便血、肿胀、疼痛。
【用法与用量】	肛门给药。一次 1g，一日 1~2 次，或遵医嘱，睡前或便后外用。使用时先将患部用温水洗净，擦干，然后将药管上的盖拧下，揭掉封口膜，用药前取出给药管，套在药管上拧紧，插入肛门内适量给药或外涂于患部。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每支装 10g。
【贮藏】	遮光，密闭。

【药名】	消痔软膏
【处方】	熊胆粉，地榆，冰片。
【性状】	本品为棕褐色的软膏。
【功能与主治】	凉血止血，消肿止痛。用于炎性、血栓性外痔及 I、II 期内痔属风热瘀阻或湿热壅滞证。
【用法与用量】	外用。用药前用温水清洗局部，治疗内痔：将注入头轻轻插入肛内，把药膏推入肛内；治疗外痔：将药膏均匀涂敷患处，外用清洁纱布覆盖。一次 2~3g，一日 2 次。
【注意】	忌食辛辣、厚味食物。
【规格】	每支装 (1) 2.5g；(2) 5g。
【贮藏】	密闭，置干燥处。

【药名】	痔宁片
【处方】	地榆炭，地黄，酒白芍，当归，枳壳，乌梅，侧柏叶炭，槐米，荆芥炭，黄芩，刺猬皮(制)，甘草。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显黑褐色，味苦微酸。
【功能与主治】	清热凉血，润燥疏风。用于实热内结或湿热瘀滞所致的痔疮出血、肿痛。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用；忌食辛辣食物。
【规格】	每片重 0.48g。
【贮藏】	密封。

【药名】	痔疮消颗粒
【处方】	火麻仁 150g 槐花 75g 地榆 75g 三七 5g 茵陈 75g 紫珠叶 150g 山银花 75g 白芍 60g 白茅根 150g 枳壳 50g。

【性状】	本品为棕色至棕褐色或棕褐色至深棕褐色(无蔗糖)的颗粒;味苦、甜或微甜(无蔗糖),微涩。
【功能与主治】	清热解毒,润肠通便,止血,止痛,消肿。用于血热毒盛所致的痔疮肿痛、肛裂疼痛及痔疮手术后大便困难、便血及老年人便秘。
【用法与用量】	口服。一次1~2袋,一日3次。
【注意】	孕妇慎用;忌食辛辣食物。
【规格】	(1)每袋装10g;(2)每袋装3g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	痔疮片
【处方】	大黄 323g 蒺藜 323g 功劳木 645g 白芷 323g 冰片 16g 猪胆粉 4g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片,除去包衣后显棕色至棕褐色;气芳香,味苦、凉。
【功能与主治】	清热解毒,凉血止痛,祛风消肿。用于各种痔疮,肛裂,大便秘结。
【用法与用量】	口服。一次4~5片,一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.3g;(2)糖衣片(片心重0.3g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	痔康片
【处方】	豨莶草,金银花,槐花,地榆炭,黄芩,大黄。
【性状】	本品为薄膜衣片,除去包衣后显棕色至棕褐色;味苦、涩。
【功能与主治】	清热凉血,泻热通便。用于热毒风盛或湿热下注所致的便血、肛门肿痛、有下坠感;一、二期内痔见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3片,一日3次。7天为一疗程,或遵医嘱。
【注意】	(1)孕妇禁用。(2)部分患者服药后可有轻度腹泻,减少服药量后可缓解。(3)本品不宜用于门静脉高压症,习惯性便秘导致的内痔需配合原发病治疗。
【规格】	每片重0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	熊胆痔灵栓
【处方】	熊胆粉 1.05g 冰片 40g 煅炉甘石 202g 珍珠母 202g 胆糖膏 202g 蛋黄油 202g。
【性状】	本品为棕黄色至棕色的栓剂。
【功能与主治】	清热解毒,消肿止痛,敛疮生肌,止血。用于痔疮肿痛出血,痔漏,肠风下血,肛窦炎及内痔手术出血。
【用法与用量】	直肠给药。一次1粒,一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每粒重2g。
【贮藏】	密封,置阴凉处。

【药名】	熊胆痔灵膏
【处方】	熊胆粉 1.05g 冰片 40g 煅炉甘石 202g 珍珠母 202g 胆糖膏 202g 蛋黄油 202g。
【性状】	本品为棕黄色的软膏；具清香气。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛，敛疮生肌，止血。用于痔疮肿痛出血，痔漏，肠风下血，肛窦炎及内痔手术出血。
【用法与用量】	外用，洗净肛门，涂布于肛门内外，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每管装 10g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	麝香痔疮栓
【处方】	人工麝香，珍珠，冰片，炉甘石粉，三七，五倍子，人工牛黄，颠茄流浸膏。
【性状】	本品为灰黄色至棕褐色弹头形或鱼雷形的栓剂；气清香。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛，止血生肌。用于大肠热盛所致的大便出血、血色鲜红、肛门灼热疼痛；各类痔疮和肛裂见上述证候者。
【用法与用量】	早晚或大便后塞于肛门内，一次1粒，一日2次，或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每粒重 1.5g。
【贮藏】	30℃以下密闭贮存。

热毒蕴结型痢疾便血肠炎结肠炎

【药名】	千喜片
【处方】	穿心莲 2000g 千里光 2000g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显绿褐色至黑褐色；味苦。
【功能与主治】	清热解毒，消炎止痛，止泻止痢。用于热毒蕴结所致肠炎、结肠炎、细菌性痢疾和鼻窦炎。
【用法与用量】	口服。一次2~3片，一日3~4次，重症患者首次可服4~6片。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.31g。(2)糖衣片片心重0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	千喜胶囊
【处方】	穿心莲 2000g 千里光 2000g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为绿褐色至黑褐色的颗粒和粉末；味苦。
【功能与主治】	清热解毒，消炎止痛，止泻止痢。用于热毒蕴结所致肠炎、结肠炎、细菌性痢疾和鼻窦炎。
【用法与用量】	口服。一次2~3粒，一日3~4次，重症患者首次可服4~6粒。

【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	脏连丸
【处方】	黄连 25g 黄芩 150g 地黄 75g 赤芍 50g 当归 50g 槐角 100g 槐花 75g 荆芥穗 50g 地榆炭 75g 阿胶 50g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味苦。
【功能与主治】	清肠止血，用于肠热便血，肛门灼热，痔疮肿痛。
【用法与用量】	口服，水蜜丸一次 6~9g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

肾阳不足型五更溏泻肠鸣腹胀食少不化久泻肢冷

【药名】	四神丸
【处方】	肉豆蔻(煨) 200g 补骨脂(盐炒) 400g 五味子(醋制) 200g 吴茱萸(制) 100g 大枣(去核) 200g。
【性状】	本品为浅褐色至褐色的水丸；气微香，味苦、咸而带酸、辛。
【功能与主治】	温肾散寒，涩肠止泻。用于肾阳不足所致的泄泻，症见肠鸣腹胀、五更溏泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。
【用法与用量】	口服。一次 9g，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	四神片
【处方】	肉豆蔻(煨) 189g 盐补骨脂 377g 醋五味子 189g 制吴茱萸 94g 大枣(去核) 189g 干姜 94g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的片；或为薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至深褐

【功能与主治】	色；味酸、辛。 温肾散寒，涩肠止泻。用于肾阳不足所致的泄泻，症见肠鸣腹胀、五更溏泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)素片，每片重0.6g；(2)薄膜衣片，每片重0.3g。
【贮藏】	密封。

脾肾阳虚型血便腹泻肠炎结肠炎腹痛绵绵

【药名】	肠胃宁片
【处方】	党参96g 黄芪96g 姜炭38g 砂仁38g 葛根96g 白术64g 赤石脂190g 木香38g 补骨脂96g 防风38g 白芍64g 延胡索64g 当归64g 儿茶32g 罂粟壳38g 炙甘草64g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显黑褐色；气香，味苦。
【功能与主治】	健脾益肾，温中止痛，涩肠止泻。用于脾肾阳虚所致的泄泻，症见大便不调、五更泄泻、时带黏液，伴腹胀腹痛、胃脘不舒、小腹坠胀；慢性结肠炎、溃疡性结肠炎、肠功能紊乱见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4~5片，一日3次。
【注意】	禁食酸、冷、刺激性的食物；儿童慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	补脾益肠丸
-------------	--------------

【处方】	外层： 黄芪，党参(米炒)，砂仁，白芍，当归(土炒)，白术(土炒)，肉桂； 内层： 醋延胡索，荔枝核，炮姜，炙甘草，防风，木香，盐补骨脂，煅赤石脂。
【性状】	本品为黑色的包衣水蜜丸；断面可见两层，外层为棕褐色至黑褐色，内层为黄棕色至红棕色；气香，味甘辛、微苦。
【功能与主治】	益气养血，温阳行气，涩肠止泻。用于脾虚气滞所致的泄泻，症见腹胀疼痛、肠鸣泄泻、黏液血便；慢性结肠炎、溃疡性结肠炎、过敏性结肠炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次6g，一日3次；儿童酌减；重症加量或遵医嘱。30天为一疗程，一般连服2~3个疗程。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)每瓶装72g；(2)每瓶装90g；(3)每瓶装130g。
【贮藏】	密封。

【药名】	固本益肠片
【处方】	党参，炒白术，补骨脂，麸炒山药，黄芪，炮姜酒，当归，炒白芍，醋延胡索，煨木香，地榆炭，煅赤石脂，儿茶，炙甘草。
【性状】	本品为棕色片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色；气微香，味微苦。
【功能与主治】	健脾温肾、涩肠止泻。用于脾肾阳虚所致的泄泻，症见腹痛绵绵、大便清稀或有黏液及黏液血便、食少腹胀、腰痠乏力、形寒肢冷、舌淡苔白、脉虚；慢性肠炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次小片8片，大片4片，一日3次。
【注意】	服药期间忌食生冷、辛辣、油腻食物。湿热下痢亦非本方所宜。
【规格】	(1)素片每片重0.32g(小片)；(2)素片每片重0.60g(大片)；(3)薄膜衣片每片重0.62g(大片)。
【贮藏】	密封。

脾肾不足肠腑气滞型晕眩酸软排便乏力便秘肛周疾病

【药名】	便通片
【处方】	麸炒白术 296g 肉苁蓉 210g 当归 170g 桑椹 127g 枳实 127g 芦荟 65g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；味辛、苦、涩。
【功能与主治】	健脾益肾，润肠通便。用于脾肾不足，肠腑气滞所致的便秘。症见：大便秘结或排便乏力，神疲气短，头晕目眩，腰膝酸软；习惯性便秘，肛周疾病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3片，一日2次，或遵医嘱。
【注意】	(1) 孕妇禁服。(2) 偶见轻度腹痛、腹泻及皮疹。
【规格】	每片重 0.46g。
【贮藏】	密封。

【药名】	便通胶囊
【处方】	麸炒白术 296g 肉苁蓉 210g 当归 170g 桑椹 127g 枳实 127g 芦荟 65g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒；味辛、苦、涩。
【功能与主治】	健脾益肾，润肠通便。用于脾肾不足，肠腑气滞所致的便秘。症见：大便秘结或排便乏力，神疲气短，头晕目眩，腰膝酸软；习惯性便秘，肛周疾病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日2次。
【注意】	(1) 孕妇禁服。(2) 偶见轻度腹痛、腹泻及皮疹。
【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封。

肝气犯脾型腹痛腹泻腹部不适肠易激综合征

【药名】	痛泻宁颗粒
【处方】	白芍 800g 青皮 800g 薤白 500g 白术 500g。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	柔肝缓急，疏肝行气，理脾运湿。用于肝气犯脾所致的腹痛、腹泻、腹胀、腹部不适等症，肠易激综合征(腹泻型)等见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1~2袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 5g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

暑湿感冒型头痛腹痛腹泻恶心呕吐晕车晕船

【药名】	保济口服液
【处方】	钩藤 3.4g 菊花 6.8g 蒺藜 3.4g 厚朴 13.6g 木香 13.6g 苍术 13.6g 天花粉 10.2g 广藿香 13.6g 葛根 13.6g 化橘红 6.8g 白芷 13.6g 薏苡仁 17.1g 稻芽 10.2g 薄荷 6.8g 茯苓 27.3g 广东神曲 13.6g。
【性状】	本品为黄棕色至深棕色的澄清液体；味甘、微辛、苦。
【功能与主治】	解表，祛湿，和中。用于暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适；亦可用于晕车晕船。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 3 次；儿童酌减。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	保济丸
【处方】	钩藤，菊花，蒺藜，厚朴，木香，苍术，天花粉，广藿香，葛根，化橘红，白芷，薏苡仁，稻芽，薄荷，茯苓，广东神曲。
【性状】	本品为朱红色的水丸；气芳香，味微苦、辛。
【功能与主治】	解表，祛湿，和中。用于暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适；亦可用于晕车晕船。
【用法与用量】	口服。一次 1.85~3.7g，一日 3 次。
【注意】	外感燥热者不宜服用。
【规格】	每瓶装 (1) 1.85g；(2) 3.7g。
【贮藏】	密封。

久痢伤阴型久泄久痢赤痢蛔厥厥阴头痛

【药名】	乌梅丸
【处方】	乌梅肉 120g 花椒 12g 细辛 18g 黄连 48g 黄柏 18g 干姜 30g 附子(制) 18g 桂枝 18g 人参 18g 当归 12g。
【性状】	本品为黄褐色的水丸或棕黑色至黑色的大蜜丸；味苦、酸(水丸)；味微甜、苦、酸(大蜜丸)。
【功能与主治】	缓肝调中，清上温下。用于蛔厥，久痢，厥阴头痛，症见腹痛下痢、巅顶头痛、时发时止、躁烦呕吐、手足厥冷。
【用法与用量】	口服。水丸一次 3g，大蜜丸一次 2 丸，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇禁服。
【规格】	(1) 水丸每袋(瓶)装 3g；(2) 大蜜丸每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	驻车丸
------	------------

【处方】	黄连 360g 炮姜 120g 当归 180g 阿胶 180g。
【性状】	本品为黄褐色的水丸；气微香，味苦、微辛。
【功能与主治】	滋阴，止痢。用于久痢伤阴，赤痢腹痛，里急后重，休息痢。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 3 次。
【注意】	湿热积滞、痢疾初起者忌服。
【规格】	每 50 丸重 3g。
【贮藏】	密封。

泄泻痢疾痧气(中暑)

【药名】	克痢痧胶囊
【处方】	白芷，苍术，石菖蒲，细辛，葶苈，鹅不食草，猪牙皂，雄黄，丁香，硝石，枯矾。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为淡黄色至棕色的粉末；气香，味辛、涩。
【功能与主治】	解毒辟秽，理气止泻。用于泄泻，痢疾和痧气(中暑)。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3~4 次，儿童酌减。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每粒装 0.28g。
【贮藏】	密封。

小儿腹泻腹痛泄泻下利赤白中寒

【药名】	小儿泻速停颗粒
【处方】	地锦草，儿茶，乌梅，焦山楂，茯苓，白芍，甘草。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒；味甜、微涩。
【功能与主治】	清热利湿，健脾止泻，缓急止痛，用于小儿湿热壅遏大肠所致的泄泻，症见大便稀薄如水样、腹痛、纳差；小儿秋季腹泻及迁延性、慢性腹泻见上述证候者。
【用法与用量】	口服。六个月以下，一次 1.5~3g，六个月至一岁以内，一次 3~6g，一至三岁，一次 6~9g，三至七岁，一次 10~15g，七至十二岁，一次 15~20g，一日 3~4 次；或遵医嘱。
【注意】	忌食生冷油腻；腹泻严重，有较明显脱水表现者应及时就医。
【规格】	每袋装(1)3g；(2)5g；(3)10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿泻痢片
【处方】	葛根 37.5g 黄芩 62.5g 黄连 31.3g 厚朴 62.5g 白芍 62.5g 茯苓 62.5g 焦山楂 62.5g 乌梅 31.3g 甘草 12.5g 滑石粉 75g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；气微，味苦。
【功能与主治】	清热利湿，止泻。用于小儿湿热下注所致的痢疾、泄泻，症见大便次数增多或里急后重、下利赤白。
【用法与用量】	口服。一岁以下一次 1 片，二至三岁一次 2~3 片，四岁以上一次 4~6 片，一日 4 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.18g；(2) 糖衣片片心重 0.17g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿敷脐止泻散
【处方】	黑胡椒 300g。
【性状】	本品为暗灰色的粉末；气芳香。
【功能与主治】	温中散寒，止泻。用于小儿中寒、腹泻、腹痛。
【用法与用量】	外用，贴敷肚脐。一次 1 袋，一日 1 次。
【注意】	脐部皮肤破损及有炎症者，大便有脓血者忌用；敷药期间忌食生冷油腻。
【规格】	每袋装 0.3g。
【贮藏】	密封。

阴虚型口干咽燥烦热习惯性功能性便秘

【药名】	通乐颗粒
【处方】	何首乌，地黄，当归，麦冬，玄参，麸炒枳壳。
【性状】	本品为浅棕色至棕褐色的颗粒；味微甜、苦。
【功能与主治】	滋阴补肾，润肠通便。用于阴虚便秘，症见大便秘结、口干、咽燥、烦热，以及习惯性、功能性便秘见于上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 2 袋，一日 2 次。2 周为一疗程，或遵医嘱。
【注意】	偶见上腹部不适或大便难以控制，一般不影响继续治疗。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密封。

肠热津亏型大便不通脘腹胀满习惯性便秘

【药名】	麻仁丸
【处方】	火麻仁 200g 大黄 200g 姜厚朴 100g 苦杏仁 100g 枳实(炒)200g 炒白芍 200g。
【性状】	本品为黄褐色至棕褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味苦。
【功能与主治】	润肠通便。用于肠热津亏所致的便秘，症见大便干结难下、腹部胀满不舒；习惯性便秘见上述证候者。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

中医对热毒火邪理论的研究和诊断

热邪，又称温邪、温热之邪。热之极则为火。温、热、火邪三者仅程度不同，没有本质的区别。热邪多属外感，如风热、暑热、湿热等；火则常自内生，多由脏腑阴阳气血失调所致，如心火上炎、肝火炽盛等。但温、热、火邪常相提并论或相互包涵，故不予严格区分，例如温热之邪、火热之邪等。温病学中所说的温邪，泛指一切温热邪气。

热(火)邪的性质：热(火)邪具有燔灼、炎上、急迫的基本特性。热(火)邪之性炎热燔灼，蒸腾向上，来势急骤，变化迅速猛烈，故称热(火)邪为阳邪。

热(火)邪的致病特点：

表现阳热之象：热(火)为阳邪，其性燔灼，故火热之邪侵犯人体表现为一派阳热之象，可见壮热、面赤、烦躁、舌红、脉洪数等症状。

易于伤津耗气：热(火)邪侵犯人体，因其燔灼蒸腾而消灼煎熬阴津，又逼迫汗液外泄，从而耗伤人体的津液，故热(火)邪致病的临床表现除热象显著外，常伴有大汗出、口渴喜饮、咽干舌燥、尿少色黄、大便秘结等津液不足的症状。火热阳邪过盛，机能亢奋，还易于消蚀人体正气，故《素问·阴阳应象大论》有“壮火食气”之说；同时火热之邪迫津外泄，也会导致气随津泄而耗气，因此临床上还可见倦怠乏力、少气懒言等气虚的症状。

主要侵犯人体上部：热(火)邪具有上炎的特点，其致病主要在人体上部。例如风热上扰可见头痛、耳鸣、咽喉红肿疼痛；阳明火盛可见牙痛、齿龈红肿等症状。

易致生风动血：火热之邪侵犯人体，易于引起肝风内动和血液妄行的病证。火热之邪燔灼肝经，劫耗阴液，使筋脉失养，运动失常，可致肝风内动，称为“热极生风”。临床表现为高热、四肢抽搐、两目上视、角弓反张等。血得寒则凝，得温则行。火热之邪侵犯血脉，可扩张血脉，加速血行，甚则灼伤脉络，迫血妄行，引起各种出血的病证。如吐血、衄血、便血、尿血、皮肤发斑、妇女月经过多、崩漏等。

易扰心神：心在五行中属火，火热之性躁动，与心相应，故火热之邪入于营血，尤易影响心神，轻者心神不宁而心烦失眠，重者可扰乱心神，出现狂躁不安、神昏谵语等症。

易致阳性疮疡：火热之邪入于血分，可聚于局部，腐蚀血肉，形成阳性疮疡痈肿，故《医宗金鉴·痈疽总论歌》曰：“痈疽原是火毒生”。可见火热之邪是引起阳性疮疡的主要病因，其临床表现以疮疡局部红、肿、热、痛为主要特征。

热毒上火诸病

火毒血热型牙痛吐血便秘口舌生疮高热火眼

【药名】	一清胶囊
【处方】	黄连 660g 大黄 2000g 黄芩 1000g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄色至黄棕色的粉末；气微，味苦。
【功能与主治】	清热泻火解毒，化瘀凉血止血。用于火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、咽喉牙龈肿痛、大便秘结、吐血、咯血、衄血、痔血；咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次。
【注意】	出现腹泻时，可酌情减量。
【规格】	每粒装 0.5g。

【贮藏】	密封。
-------------	-----

【药名】	一清颗粒
【处方】	黄连 165g 大黄 500g 黄芩 250g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄色至黄棕色的粉末；气微，味苦。
【功能与主治】	清热泻火解毒，化瘀凉血止血。用于火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、咽喉牙龈肿痛、大便秘结、吐血、咯血、衄血、痔血；咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3~4 次。
【注意】	出现腹泻时，可酌情减量。
【规格】	每粒装 7.5g。
【贮藏】	密闭。

【药名】	二丁颗粒
【处方】	紫花地丁 250g 半边莲 250g 蒲公英 250g 板蓝根 250g。
【性状】	本品为棕褐色的颗粒；味甜、苦；或味微甜、微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	清热解毒。用于火热毒盛所致的热疔病毒、咽喉肿痛、风热火眼，
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	糖尿病患者慎用(含蔗糖颗粒)。
【规格】	每袋装(1)20g；(2)4g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	万应胶囊
【处方】	胡黄连 54g 黄连 54g 儿茶 54g 冰片 3.3g 香墨 108g 熊胆粉 10.8g 人工麝香 2.7g 牛黄 2.7g 牛胆汁 87g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为墨绿色或黑色的颗粒和粉末；气芳香，味苦、有清凉感。
【功能与主治】	清热，解毒，镇惊。用于邪毒内蕴所致的口舌生疮、牙龈咽喉肿痛、小儿高热、烦躁易惊。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 粒〔规格(1)〕或 2~4 粒〔规格(2)〕，一日 2 次；三岁以下以内小儿酌减。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1) 每粒装 0.3g；(2) 每粒装 0.15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	万应锭
【处方】	胡黄连 100g 黄连 100g 儿茶 100g 冰片 6g 香墨 200g 熊胆粉 20g 人工麝香 5g 牛黄 5g 牛胆汁 160g。
【性状】	本品为黑色光亮的球形小锭；气芳香，味苦，有清凉感。
【功能与主治】	清热，解毒，镇惊。用于邪毒内蕴所致的口舌生疮、牙龈咽喉肿痛、小儿高热、烦躁易惊。

【用法与用量】	口服。一次2~4锭，一日2次；三岁以内小儿酌减。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每10锭重1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	比拜克胶囊
【处方】	熊胆粉1g 酒大黄222.2g 儿茶111.1g 冰片22.2g 胡黄连166.7g 香墨33.4g 玄明粉22.2g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰褐色至棕褐色的颗粒；气香、微腥，味苦。
【功能与主治】	清热、解毒、通便。用于外感病气分热盛，发热烦躁，头痛目赤，牙龈肿痛、大便秘结。
【用法与用量】	口服。一次2~3粒，小儿一次1~2粒，三岁以内酌减，一日3次。
【注意】	孕妇禁服。
【规格】	每粒装0.36g。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄上清丸
【处方】	人工牛黄2g 菊花40g 白芷16g 栀子50g 黄柏10g 大黄80g 赤芍16g 薄荷30g 荆芥穗16g 川芎16g 黄连16g 黄芩50g 连翘50g 当归50g 地黄64g 甘草10g 冰片10g 桔梗16g 石膏80g。
【性状】	本品为棕黄色至深棕色的水丸或红褐色至黑褐色的小蜜丸、大蜜丸；气芳香，味苦。
【功能与主治】	清热泻火，散风止痛。用于热毒内盛、风火上攻所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛、大便燥结。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次6g，水蜜丸一次4g，水丸一次3g，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	孕妇、哺乳期妇女慎用，脾胃虚寒者慎用。
【规格】	(1)大蜜丸每丸重6g；(2)小蜜丸每100丸重20g，或每袋装6g；(3)水丸每16粒重3g；(4)水蜜丸每100丸重10g，或每袋装4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄上清片
【处方】	人工牛黄2g 菊花40g 白芷16g 栀子50g 黄柏10g 大黄80g 赤芍16g 地黄64g 甘草10g 冰片10g 薄荷30g 荆芥穗16g 川芎16g 黄连16g 黄芩50g 连翘50g 当归50g 桔梗16g 石膏80g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色至黑褐色微香，味凉、苦。
【功能与主治】	清热泻火，散风止痛。用于热毒内盛、风火上攻所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛、大便燥结。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日2次。
【注意】	孕妇、哺乳期妇女慎用，脾胃虚寒者慎用。
【规格】	薄膜衣片每片重0.265g。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄上清软胶囊
【处方】	人工牛黄 2g 菊花 40g 白芷 16g 栀子 50g 黄柏 10g 大黄 80g 赤芍 16g 地黄 64g 甘草 10g 冰片 10g 薄荷 30g 荆芥穗 16g 川芎 16g 黄连 16g 黄芩 50g 连翘 50g 当归 50g 桔梗 16g 石膏 80g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为棕褐色的油膏状物；气香，味苦。
【功能与主治】	清热泻火，散风止痛。用于热毒内盛、风火上攻所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛、大便燥结。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 2 次。
【注意】	孕妇、哺乳期妇女慎用，脾胃虚寒者慎用。
【规格】	每粒装 0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄上清胶囊
【处方】	人工牛黄 2g 菊花 58.8g 白芷 23.5g 栀子 73.5g 黄柏 14.7g 大黄 117.7g 赤芍 23.5g 地黄 94.1g 薄荷 41.1g 荆芥穗 23.5g 川芎 23.5g 黄连 23.5g 黄芩 73.5g 连翘 73.5g 当归 73.5g 桔梗 23.5g 甘草 14.7g 石膏 117.7g 冰片 14.7g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至深棕色的粉末；气香，味苦。
【功能与主治】	清热泻火，散风止痛。用于热毒内盛、风火上攻所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛、大便燥结。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 2 次。
【注意】	孕妇、哺乳期妇女慎用，脾胃虚寒者慎用。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄解毒丸
【处方】	人工牛黄 5g 雄黄 50g 石膏 200g 大黄 200g 黄芩 150g 桔梗 100g 冰片 25g 甘草 50g。
【性状】	本品为棕黄色的大蜜丸或水蜜丸；有冰片香气，味微甜而后苦、辛。
【功能与主治】	清热解毒。用于火热内盛，咽喉肿痛，牙龈肿痛，口舌生疮，目赤肿痛。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 2g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	水蜜丸每 100 丸重 5g；大蜜丸每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄解毒片
【处方】	人工牛黄 5g 雄黄 50g 石膏 200g 大黄 200g 黄芩 150g 桔梗 100g 冰片 25g 甘草 50g。
【性状】	本品为素片、糖衣片或薄膜衣片，素片或包衣片除去包衣后显棕黄色；有冰片香气，味微苦、辛。

【功能与主治】	清热解毒。用于火热内盛，咽喉肿痛，牙龈肿痛，口舌生疮，目赤肿痛。
【用法与用量】	口服。小片一次3片，大片一次2片，一日2~3次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄解毒软胶囊
【处方】	人工牛黄 2.5g 雄黄 25g 石膏 100g 大黄 100g 黄芩 75g 桔梗 50g 冰片 12.5g 甘草 25g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为棕黄色黏稠状液体；有冰片香气，味微苦、辛。
【功能与主治】	清热解毒。用于火热内盛，咽喉肿痛，牙龈肿痛，口舌生疮，目赤肿痛。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日2~3次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿化毒散
【处方】	人工牛黄 8g 珍珠 16g 雄黄 40g 大黄 80g 黄连 40g 甘草 30g 天花粉 80g 川贝母 40g 赤芍 80g 乳香(制) 40g 没药(制) 40g 冰片 10g。
【性状】	本品为杏黄色至棕黄色的粉末；味苦，有清凉感。
【功能与主治】	清热解毒，活血消肿。用于热毒内蕴、毒邪未尽所致的口疮肿痛、疮疡溃烂、烦躁口渴、大便秘结。
【用法与用量】	口服。一次0.6g，一日1~2次；三岁以内小儿酌减。外用，敷于患处。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	五福化毒丸
【处方】	水牛角浓缩粉 20g 青黛 20g 炒牛蒡子 50g 地黄 50g 芒硝 5g 甘草 60g 连翘 60g 黄连 5g 玄参 60g 桔梗 50g 赤芍 50g。
【性状】	本品为黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味甜、微苦、咸。
【功能与主治】	清热解毒，凉血消肿。用于血热毒盛，小儿疮疖，痱毒，咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈出血，疔腮。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次2g，小蜜丸一次3g(15丸)，大蜜丸一次1丸，一日1~3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)水蜜丸每100粒重10g；(2)小蜜丸每100丸重20g；(3)大蜜丸每丸重3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清宁丸
-------------	------------

【处方】	大黄 600g 车前草 25g 黑豆 25g 醋香附 25g 桃枝 5g 姜厚朴 25g 陈皮 25g 绿豆 25g 炒白术 25g 半夏(制) 25g 桑叶 25g 牛乳 50g 麦芽 25g 侧柏叶 25g。
【性状】	本品为黑色的大蜜丸或黑褐色的水蜜丸；味苦。
【功能与主治】	清热泻火，消肿通便。用于火毒内蕴所致的咽喉肿痛、口舌生疮、头晕耳鸣、目赤牙痛、腹中胀满、大便秘结。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 1~2 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	(1) 水蜜丸每袋装 6g；(2) 大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	新瘡片
【处方】	肿节风，三七，人工牛黄，猪胆粉，肖梵天花，珍珠层粉，水牛角浓缩粉，红曲，吡啶美辛。
【性状】	本品为淡棕灰色至棕色的片；气香、微腥，味苦。
【功能与主治】	清热解毒，活血化瘀，消肿止痛。用于热毒瘀血所致的咽喉肿痛、牙痛、痹痛、胁痛、黄疸、无名肿毒。
【用法与用量】	口服。一次 2~4 片，一日 3 次，小儿酌减。外用，用冷开水调化，敷患处。
【注意】	活动性溃疡病、消化道出血及病史者、溃疡性结肠炎及病史者、癫痫，帕金森病及精神病患者，支气管哮喘者，血管神经性水肿者，肝肾功能不全者，对本品、阿司匹林或其他非甾体抗炎药过敏者禁用；孕妇、哺乳期妇女禁用。
【规格】	每片重 0.32g。
【贮藏】	密封。

火热内盛型口舌生疮咽痛烦热便赤便秘呼吸道感染

【药名】	导赤丸
【处方】	连翘 120g 栀子(姜炒) 120g 玄参 120g 赤芍 60g 黄芩 120g 黄连 60g 木通 60g 天花粉 120g 大黄 60g 滑石 120g。
【性状】	本品为黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；味甘、苦。
【功能与主治】	清热泻火，利尿通便。用于火热内盛所致的口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 2g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次；周岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1) 水蜜丸每 10 粒重 1g；(2) 大蜜丸每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	新清宁片
-------------	-------------

【处方】	熟大黄 300g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黑色；味微苦、涩。
【功能与主治】	清热解毒，泻火通便。用于内结实热所致的喉肿、牙痛、目赤、便秘、下痢、发热；感染性炎症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3~5 片，一日 3 次；必要时可适当增量，学龄前儿童酌减或遵医嘱；用于便秘，临睡前服 5 片。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重 0.31g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方牛黄消炎胶囊
【处方】	人工牛黄 35.7g 栀子 62.3g 珍珠母 28.6g 雄黄 50g 石膏 71.4g 盐酸小檗碱 4.3g 黄芩 190.6g 朱砂 50g 郁金 66g 冰片 20g 水牛角浓缩粉 95.4g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色的粉末；气香，味苦、辛。
【功能与主治】	清热解毒，镇静安神。用于气分热盛，高热烦躁；上呼吸道感染、肺炎、气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 粒，一日 2 次。
【注意】	不宜久服，孕妇禁服。
【规格】	每粒装 0.4g(含盐酸小檗碱 4.3mg)。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄解毒胶囊
【处方】	人工牛黄 5g 雄黄 50g 石膏 200g 大黄 200g 黄芩 150g 桔梗 100g 冰片 25g 甘草 50g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色的颗粒和粉末或粉末；有冰片香气、味微苦、辛。
【功能与主治】	清热解毒。用于火热内盛，咽喉肿痛，牙龈肿痛，口舌生疮，目赤肿痛。
【用法与用量】	口服。次 2 粒〔规格(1)〕，或一次 3 粒规格(2)〕，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	(1) 每粒相当于饮片 0.78g，每粒装 0.3g，每粒装 0.4g，每粒装 0.5。(2) 每粒相当于饮片 0.52g，每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

三焦热盛型目赤口鼻疮肿发热头痛尿赤口渴

【药名】	三黄片
【处方】	大黄 300g 盐酸小檗碱 5g 黄芩浸膏 21g。
【性状】	本品为糖衣或薄膜衣片，除去包衣后显棕色，味苦、微涩。
【功能与主治】	清热解毒，泻火通便，用于三焦热盛所致的目赤肿痛、口鼻生疮、咽喉肿痛、牙龈肿痛、心烦口渴、尿黄、便秘；亦用于急性胃肠炎，痢疾。
【用法与用量】	口服。小片一次 4 片，大片一次 2 片，一日 2 次；小儿酌减。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1) 薄膜衣小片每片重 0.26g。(2) 薄膜衣大片每片重 0.52g
【贮藏】	密封。

【药名】	梔芩清热合剂
【处方】	梔子 400g 黄芩 400g 连翘 400g 淡竹叶 400g 甘草 200g 薄荷油 1ml。
【性状】	本品为棕褐色的液体；气芳香，味苦。
【功能与主治】	疏风散热，清热解毒。用于三焦热毒炽盛，发热头痛，口渴，尿赤等。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 (1) 10ml；(2) 100ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

肺胃热盛型口疮牙痛肿毒便秘眩晕目赤

【药名】	牛黄至宝丸
【处方】	连翘 120g 大黄 60g 梔子 120g 芒硝 60g 石膏 60g 陈皮 60g 青蒿 60g 木香 45g 广藿香 75g 人工牛黄 5g 冰片 10g 雄黄 15g。
【性状】	本品为浅棕黄色的大蜜丸；气微香，味苦、辛。
【功能与主治】	清热解毒，泻火通便。用于胃肠积热所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、口燥咽干、大便燥结。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	抗炎退热片
------	--------------

【处方】	蒲公英 1064g 黄芩 1064g。
【性状】	本品为糖衣片，除去包衣后显深棕色；气微，味苦。
【功能与主治】	清热解毒，消肿散结。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛，疮痍疔疖，红肿热痛诸症。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片，每 4 小时 1 次；儿童酌减。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	栀子金花丸
【处方】	栀子 116g 黄连 4.8g 黄芩 192g 黄柏 60g 大黄 116g 金银花 40g 知母 40g 天花粉 60g。
【性状】	本品为黄色至黄褐色的水丸；味苦。
【功能与主治】	清热泻火，凉血解毒。用于肺胃热盛，口舌生疮，牙龈肿痛，目赤眩晕，咽喉肿痛，吐血衄血，大便秘结。
【用法与用量】	口服。一次 9g，一日 1 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每袋装 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方牛黄清胃丸
【处方】	大黄 240g 炒牵牛子 200g 栀子(姜炙) 80g 石膏 120g 芒硝 80g 黄芩 80g 黄连 20g 连翘 80g 炒山楂 160g 陈皮 160g 姜厚朴 80g 枳实 80g 香附 40g 猪牙皂 120g 荆芥穗 40g 薄荷 40g 防风 40g 菊花 40g 白芷 120g 桔梗 80g 玄参 120g 甘草 40g 人工牛黄 13g 冰片 51.5g。
【性状】	本品为黄褐色的大蜜丸；气香，味苦，微凉。
【功能与主治】	清热泻火，解毒通便。用于胃肠实热所致的口舌生疮、牙龈肿痛、咽膈不利、大便秘结、小便短赤。
【用法与用量】	口服。一次 2 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇禁用；老人、儿童及脾胃虚弱者慎用；忌食辛辣油腻之品。
【规格】	每丸重 4.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	黄连上清丸
【处方】	黄连 10g 连翘 80g 防风 40g 白芷 80g 菊花 160g 酒大黄 320g 桔梗 80g 石膏 40g 甘草 40g 栀子(姜制) 80g 炒蔓荆子 80g 荆芥穗 80g 黄芩 80g 薄荷 40g 黄柏(酒炒) 40g 川芎 40g 旋覆花 20g。
【性状】	本品为暗黄色至黄褐色的水丸、黄棕色至棕褐色的水蜜丸或黑褐色的大蜜丸或小蜜丸；气芳香，味苦。
【功能与主治】	散风清热，泻火止痛。用于风热上攻、肺胃热盛所致的头晕目眩、暴发火眼、牙齿疼痛、口舌生疮、咽喉肿痛、耳痛耳鸣、大便秘结、小便短赤。
【用法与用量】	口服。水丸或水蜜丸一次 3~6g，小蜜丸一次 6~12g(30~60 丸)，大蜜丸

【注意】	一次1~2丸，一日2次。
【规格】	忌食辛辣食物；孕妇慎用；脾胃虚寒者禁用。
【贮藏】	水丸每袋装6g；水蜜丸每40丸重3g；小蜜丸每100丸重20g；大蜜丸每丸重6g。
	密封。

【药名】	黄连上清片
【处方】	黄连5g 连翘40g 防风20g 白芷40g 菊花80g 大黄160g 桔梗40g 石膏20g 甘草20g 栀子40g 炒蔓荆子40g 荆芥穗40g 黄芩40g 薄荷20g 黄柏20g 川芎20g 旋覆花10g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；气香，味苦。
【功能与主治】	散风清热，泻火止痛。用于风热上攻、肺胃热盛所致的头晕目眩、暴发火眼、牙齿疼痛、口舌生疮、咽喉肿痛、耳痛耳鸣、大便秘结、小便短赤。
【用法与用量】	口服。一次6片，一日2次。
【注意】	忌食辛辣食物；孕妇慎用；脾胃虚寒者禁用。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.31g；(2)糖衣片(片心重0.3g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	黄连上清胶囊
【处方】	黄连8.78g 连翘70.23g 防风35.11g 白芷70.23g 菊花140.46g 酒大黄280.92g 桔梗70.23g 石膏35.11g 甘草35.11g 栀子(姜制)70.23g 炒蔓荆子70.23g 荆芥穗70.23g 黄芩70.23g 薄荷35.11g 黄柏(酒炙)35.11g 川芎35.11g 旋覆花17.57g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味苦。
【功能与主治】	散风清热，泻火止痛。用于风热上攻、肺胃热盛所致的头晕目眩、暴发火眼、牙齿疼痛、口舌生疮、咽喉肿痛、耳痛耳鸣、大便秘结、小便短赤。
【用法与用量】	口服。一次2粒，一日2次。
【注意】	忌食辛辣食物；孕妇慎用；脾胃虚寒者禁用。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	黄连上清胶囊
【处方】	黄连24g 连翘192g 防风96g 白芷192g 菊花384g 酒大黄768g 桔梗192g 石膏96g 甘草96g 栀子(姜制)192g 炒蔓荆子192g 荆芥穗192g 黄芩192g 薄荷96g 黄柏(酒炙)96g 川芎96g 旋覆花48g。
【性状】	本品为棕褐色的颗粒；味微苦。
【功能与主治】	散风清热，泻火止痛。用于风热上攻、肺胃热盛所致的头晕目眩、暴发火眼、牙齿疼痛、口舌生疮、咽喉肿痛、耳痛耳鸣、大便秘结、小便短赤。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日2次。
【注意】	忌食辛辣食物；孕妇慎用；脾胃虚寒者禁用。
【规格】	每袋装2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清火栀麦丸
【处方】	穿心莲 2000g 麦冬 250g 栀子 250g。
【性状】	本品为黑褐色的浓缩水丸；味极苦。
【功能与主治】	清热解毒，凉血消肿。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、发热、牙痛、目赤。
【用法与用量】	口服。一次 2 片，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重(1)0.27g；(2)0.31g；(3)0.34g；(4)0.4g；(5)0.42g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清火栀麦胶囊
【处方】	穿心莲 800g 麦冬 100g 栀子 100g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为褐绿色或黄褐色至棕褐色的颗粒和粉末；味极苦。
【功能与主治】	清热解毒，凉血消肿。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、发热、牙痛、目赤。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	咽喉清口服液
【处方】	土牛膝，车前草，马兰草，天名精。
【性状】	本品为棕褐色的液体，味甜、微苦，具清凉感。
【功能与主治】	清热解毒，利咽止痛。用于肺胃实热所致的咽部红肿、咽痛、发热、口渴、便秘；急性扁桃体炎、急性咽炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 3 次，酌减或遵医嘱。
【注意】	忌食辛辣、油腻、厚味食物。
【规格】	每支 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

湿热蕴毒型痢疾黄疸尿黄如茶目赤牙肿便血

【药名】	黄连胶囊
【处方】	黄连。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄褐色粉末；气微，味极苦。
【功能与主治】	清热燥湿，泻火解毒。用于湿热蕴毒所致的痢疾、黄疸，症见发热、黄疸、吐泻、纳呆、尿黄如茶、目赤吞酸、牙龈肿痛或大便脓血。
【用法与用量】	口服。一次2~6粒，一日3次。
【注意】	脾胃虚寒者慎用；忌辛辣、油腻、黏滑及不宜消化食品。
【规格】	每粒装0.25g。
【贮藏】	密封。

脏腑蕴热型血热疹痒疔肿目赤口鼻生疮痢疾

【药名】	三子散
【处方】	本品系蒙古族验方：诃子200g 川楝子200g 栀子200g。
【性状】	本品为姜黄色至棕黄色的粉末；气微，味苦、涩、微酸。
【功能与主治】	清热凉血，解毒。用于温热，血热，新久热。
【用法与用量】	水煎服，一次3~4.5g，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	芩连片
【处方】	黄芩213g 连翘213g 黄连85g 黄柏340g 赤芍213g 甘草85g。
【性状】	本品为黄色至棕黄色的片，气微香，味苦。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛。用于脏腑蕴热，头痛目赤，口鼻生疮，热痢腹痛，湿热带下，疮疖肿痛。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日2~3次。

【注意】	无。
【规格】	每片重 0.55g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金银花露
【处方】	金银花。
【性状】	本品为无色至淡黄色的透明液体；气芳香，味微甜或甜。
【功能与主治】	清热解毒。用于暑热内犯肺胃所致的中暑、麻疹、疖肿，症见发热口渴、咽喉肿痛、麻疹鲜红、头部疖肿。
【用法与用量】	口服。一次 60~120ml，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 60ml、100ml、150ml、340ml (无蔗糖)；(2) 每瓶装 60ml、100ml、150ml、340ml (含蔗糖)；(3) 每瓶装 100ml、300ml (含蔗糖)。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

阴虚火旺型潮热盗汗咯血遗精口干咽痛便赤

【药名】	大补阴丸
【处方】	熟地黄 120g 盐知母 80g 盐黄柏 80g 醋龟甲 120g 猪脊髓 160g。
【性状】	本品为深棕黑色的水蜜丸；或为黑褐色的大蜜丸；味苦、微甜带涩。
【功能与主治】	滋阴降火。用于阴虚火旺，潮热盗汗，咳嗽咯血，耳鸣遗精。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，一日 2~3 次；大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	知柏地黄丸
【处方】	知母 40g 黄柏 40g 熟地黄 160g 山茱萸(制) 80g 牡丹皮 60g 山药 80g 茯苓 60g 泽泻 60g。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜而带酸苦。
【功能与主治】	滋阴降火。用于阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	知柏地黄丸(浓缩丸)
【处方】	知母 25.9g 熟地黄 103.4g 牡丹皮 38.8g 茯苓 38.8g 黄柏 25.9g 山茱萸(制) 51.7g 山药 51.7g 泽泻 38.8g。
【性状】	本品为黑棕色的浓缩丸；气微，味苦、酸。
【功能与主治】	滋阴降火。用于阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。
【用法与用量】	口服。一次 8 丸，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每 10 丸重 1.7g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清热凉血丸
【处方】	黄芩 500g 地黄 500g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的水丸；味甘、苦。
【功能与主治】	滋阴，清热，凉血。用于孕妇上焦火盛，头晕目眩，口舌生疮，耳鸣，牙痛，子烦。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 1~2 次。
【注意】	痰湿气郁之子烦者忌服。
【规格】	每瓶装 6g。
【贮藏】	密闭，防潮。

热入心包肝风内动型咽痛高热惊厥抽搐惊风

【药名】	瓜霜退热灵胶囊
【处方】	西瓜霜，北寒水石，石膏，滑石，磁石，玄参，水牛角浓缩粉，羚羊角，甘草，升麻，丁香，沉香，人工麝香，冰片，朱砂。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰色的粉末；气芳香，味咸凉。
【功能与主治】	清热解毒，开窍镇惊。用于热病热入心包、肝风内动证，症见高热、惊厥、抽搐、咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服。周岁以内一次 0.15~0.3g，一至三岁一次 0.3~0.6g，三至六岁一次 0.6~0.75g，六至九岁一次 0.75~0.9g，九岁以上一次 0.9~1.2g，成人一次 1.2~1.8g，一日 3~4 次。
【注意】	不宜久服，孕妇禁服。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	局方至宝散
-------------	--------------

【处方】	水牛角浓缩粉 200g 牛黄 50g 玳瑁 100g 人工麝香 10g 朱砂 100g 雄黄 100g 琥珀 100g 安息香 150g 冰片 10g。
【性状】	本品为橘黄色至浅褐色的粉末；气芳香浓郁，味微苦。
【功能与主治】	清热解毒，开窍镇惊。用于热病属热入心包、热盛动风证，症见高热惊厥、烦躁不安、神昏谵语及小儿急热惊风。
【用法与用量】	口服。一次 2g，一日 1 次；小儿三岁以内一次 0.5g，四至六岁一次 1g；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 2g；(2) 每袋装 2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	紫雪散
【处方】	石膏 144g 滑石 144g 玄参 48g 沉香 15g 甘草 24g 芒硝(制) 480g 水牛角浓缩粉 9g 人工麝香 3.6g 北寒水石 144g 磁石 144g 木香 15g 升麻 48g 丁香 3g 硝石(精制) 96g 羚羊角 4.5g 朱砂 9g。
【性状】	本品为棕红色至灰棕色的粉末；气芳香，味咸、微苦。
【功能与主治】	清热开窍，止痉安神。用于热入心包、热动肝风证，症见高热烦躁、神昏谵语、惊风抽搐、斑疹吐衄、尿赤便秘。
【用法与用量】	口服。一次 1.5~3g，一日 2 次；周岁小儿一次 0.3g，五岁以内小儿每增一岁递增 0.3g，一日 1 次；五岁以上小儿酌情服用。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	(1) 每瓶装 1.5g；(2) 每袋装 1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	礞石滚痰丸
【处方】	金礞石(煅) 40g 沉香 20g 黄芩 320g 熟大黄 320g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的水丸；味苦。
【功能与主治】	逐痰降火。用于痰火扰心所致的癫狂惊悸，或喘咳痰稠、大便秘结。
【用法与用量】	口服。一次 6~12g，一日 1 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每袋(瓶)装 6g。
【贮藏】	密闭，防潮。

肝胆火旺型心烦晕眩耳鸣耳聋胁痛腹胀便秘

【药名】	当归龙荟丸
【处方】	酒当归 100g 芦荟 50g 栀子 100g 酒黄芩 100g 酒大黄 50g 人工麝香 5g 龙胆

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>(酒炙)100g 青黛 50g 酒黄连 100g 盐黄柏 100g 木香 25g。</p> <p>本品为黄绿色至深褐色的水丸；气微，味苦。</p> <p>泻火通便。用于肝胆火旺，心烦不宁，头晕目眩，耳鸣耳聋，胁肋疼痛，脘腹胀痛，大便秘结。</p> <p>口服。一次 6g，一日 2 次。</p> <p>孕妇禁用。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---	---

外寒内热型恶寒壮热头痛咽干便赤便秘瘰疬风疹湿疮

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>防风通圣丸</p> <p>防风 50g 薄荷 50g 大黄 50g 栀子 25g 桔梗 100g 川芎 50g 白芍 50g 连翘 50g 白术(炒)25g 荆芥穗 25g 麻黄 50g 芒硝 50g 滑石 30g 石膏 10g 当归 50g 黄芩 100g 甘草 200g。</p> <p>本品为包衣或不包衣的水丸，丸芯颜色为浅棕色至黑褐色；味甘、咸、微苦。</p> <p>解表通里，清热解毒。用于外寒内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，瘰疬初起，风疹湿疮。</p> <p>口服，一次 6g，一日 2 次。</p> <p>孕妇慎用。</p> <p>每 20 丸重 1g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>防风通圣颗粒</p> <p>防风 75.5g 薄荷 75.5g 大黄 75.5g 栀子 37.8g 桔梗 151g 川芎 75.5g 荆芥穗 37.8g 麻黄 75.5g 芒硝 75.5g 滑石 453g 石膏 151g 白芍 75.5g 连翘 75.5g 白术(炒)37.8g 当归 75.5g 黄芩 151g 甘草 302g。</p> <p>本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气香，味甘、咸、微苦。</p> <p>解表通里，清热解毒。用于外寒内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，瘰疬初起，风疹湿疮。</p> <p>口服。一次 1 袋，一日 2 次。</p> <p>孕妇慎用。</p> <p>每袋装 3g。</p> <p>密封。</p>
---	---

中医对于口腔咽喉的研究和诊断

中医认为，口腔疾病，包括口、齿、舌、唇、咽喉、面颊、腮及软腭等部位的病变。口腔的生理和病理，变化都与全身脏腑经络有着密切关系。

口腔与脏腑经络关系

《内经》云：“诸经皆循经于口”。足太阴脾经、足阳明胃经、手阳明大肠经及冲、任两脉等都交会于口，其中以脾经为主。五味入口，藏于脾胃，乃运化津液、而后润养喉咙、口腔及五脏，故口腔得此而华，脾胃得此而和，水谷得此而化。《灵枢·脉度篇》言：“脾气通于口，脾和则口能知五谷矣；心气通于舌，心和则舌能知五味矣。”所以，心脾和则口舌俱和，而五谷、五味入口即辨矣。脾健运则水谷之精微得化，以营养各脏腑及其各开窍的器官。古人认为：肝热口酸而苦，胆虚口苦，脾热口甘或臭，肺热口辛，肾热口咸，胃热口淡或甘，虚火郁胃则口臭，口无味则胃虚。因五脏偏盛皆验于口，若五味过偏，则五脏亦偏，而诸病生焉。

牙齿：中医认为肾主骨，齿者骨之余，髓之所养。故有肾衰则齿落，精固则齿坚之说。若肾为之病，则齿脆不坚，或者易浮，或者牙稀疏。而在经络方面，上齿归属足阳明胃经，止而不动，喜寒饮而恶热饮；下齿属手阳明大肠经，动而不休，喜热饮而恶寒饮。由此以来，从肾、胃、大肠所属可验齿病。牙齿黄垢，乃胃浊熏蒸；牙齿干燥不泽，是阴液耗伤；齿如枯骨，乃肾阴枯润之兆；齿衄肿痛者，多属胃火；牙齿腐洞为“龋齿”。牙龈色红肿者，多是胃火盛，若见出血则为胃火伤络；龈肿不红者，是虚火上炎，若出血而不红肿者，是虚火灼络或气不摄血。牙龈腐烂，牙齿脱落为“牙疳”。

舌：《内经》言：舌为心之苗，心开窍于舌。《灵枢·经别篇》曰：“足少阴之正，……直者系舌本。”舌本即舌根也，李东垣曰：“舌者心也，复能知味，是舌中有脾也。”五味都从舌上感觉而得，若心脾不和，诸证生焉。从部位而言，中医认为五脏皆有所属：舌根属肾，舌中属脾，舌尖属心肺，其右边属胆，其左边属肝。以证言之，五脏同样皆有所至：若思虑过度、口舌生疮，则为心脾有热；若咽痛舌疮口干、手足发热者，多为肾经虚火……。以色辨之，舌色应该红而润，凡见舌尖红，则心火上炎；舌糜烂、舌质红，为心阳虚；舌质紫暗有瘀者，则为心血瘀滞；而苔白薄滋润者，为脾胃之气得以升发；若苔白而黄，由黄而黑，甚至舌焦干，或者生刺，皆为邪热内传之证，故舌在中医辨证中有很大诊断价值。

唇：脾者，仓廩之本，营之居，其华在唇，唇本色淡红而泽。《灵枢》曰：“脾病者唇黄，脾绝者唇白面肿。”若气血虚而受冷者则为唇青；如果复受寒气，则加之为额黑唇青；胃热者唇发黑；上下唇赤者则属心热；上唇赤而下唇白者，为肾虚而心火不降也；环口黑色者，是肾气将绝或者水气内停；小儿环口发青为惊风先兆；唇色淡白，主血虚；唇色深红；主实热证；唇红绛而干，是热伤津液或热入营血；唇色淡红，为虚为寒；唇色鲜红者，为阴虚火旺；唇色青紫，为气滞血瘀。钱乙曰：“肺主唇，色白而泽者吉，白如枯骨者死。”唇白者当补脾肺，色深红者，应散肺之虚热，或滋养肾阴，故唇为脾胃所主，可以验脏腑之寒热也。

喉：喉为肺之门户，咽内通于胃，肾之经脉循咽喉，故望咽喉则可知晓肺胃与肾之病变。所以中医是通过观察咽喉部色泽、形态及分泌物，以诊察疾病的。而望咽喉应注意与问诊相结合。咽喉红肿疼痛，多为外感风热或肺胃有热；咽红干而痛，则是热伤肺津；若红肿溃烂，则为热毒深极；咽部嫩红，肿痛不甚，则是水亏火灼；咽喉一侧或两侧突起肿块，状如乳突，称“乳蛾”，则是邪壅气血；若红赤溃烂，多为热毒蕴结；若溃烂出现黄色脓样膜状物或脓点，刮之易去，属“烂乳蛾”或“烂喉痧”，是热毒壅盛从而导致热灼肉腐，最终搏结成脓所致；咽部有灰白色膜点，擦之不去，重擦则出血，随即复生者，则是“白喉”，为疫疠毒邪蕴积肺胃，而上蒸咽喉所致，极易传染，须隔离治疗。

病因病机

口腔与咽喉、肺、胃相通，是经脉循行交会之处。不论外感六淫，内伤七情，饮食劳

倦，都可在口腔中引起病变。《内经》曰：“诸痛痒疮疡皆属于心。”故以火热为主，主要病因病机有：

风热侵袭：风邪从口鼻而入，依循足阳明胃经，贯络于齿、上龈；或者循手阳明大肠经，贯络于齿、下龈；或者循足太阴脾经，系于舌旁。正邪相搏，以致口舌唇齿病变。临床可见牙龈红肿、口舌溃疡、红肿作痛等症。

火热熏蒸：感受外邪或者内伤七情，肠胃不化津液，郁而化热，循经上蒸于口，多见口舌生疮。

心火上炎：舌为心之苗，心火上炎，热伤津液，口腔失于滋养，则出现口舌生疮、生刺、舌肿、复发性口腔炎等。

水不制火：疲劳过度或者房事不节，阴液亏损；或过于攻伐，或素体阴虚，导致水不制火，虚火上炎，临床可见虚火牙痛、牙龈口疮等病变。

对于中医非常重要的“舌诊”的更多详细资料，请参考附录一：中医舌诊。

口腔咽喉诸病

热毒蕴结型牙肿溃疡喉痹乳蛾咽炎扁桃体炎

【药名】	口咽清丸(阮氏上清丸)
【处方】	儿茶 60g 马槟榔 61g 薄荷 121g 乌梅肉 30g 硼砂 61g 诃子 30g 山豆根 30g 冰片 30.3g 甘草 30g。
【性状】	本品为黑色的水丸，除去包衣后显棕色至棕褐色；味苦凉、涩、甜。
【功能与主治】	清热降火，生津止渴。用于火热伤津所致的咽部肿痛、口舌生疮、牙龈红肿、口干舌燥。
【用法与用量】	吞服或含服。一次 0.5g，一日 2~4 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 8g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	口腔溃疡散
【处方】	青黛 240g 枯矾 240g 冰片 24g。
【性状】	本品为淡蓝色的粉末：气芳香，味涩。
【功能与主治】	清热，消肿，止痛。用于火热内蕴所致的口舌生疮、黏膜破溃、红肿灼痛；复发性口疮、急性口炎见上述证候者。
【用法与用量】	用消毒棉球蘸药擦患处。一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	山香圆片
【处方】	山香圆叶 3000g。
【性状】	本品为糖衣片或异形薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味苦、涩。
【功能与主治】	清热解毒，利咽消肿。用于喉痹，乳蛾，咽喉肿痛等症。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 片，一日 3~4 次；小儿酌减。
【注意】	忌食辛辣、油腻、厚味食物。
【规格】	薄膜衣片每片重 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	五味麝香丸
【处方】	本品系藏族验方：麝香 10g 诃子(去核)300g 黑草乌 300g 木香 100g 藏菖蒲 60g。
【性状】	本品为棕褐色的水丸；具麝香特异的香气，味微苦、涩、麻。
【功能与主治】	消炎，止痛，祛风。用于扁桃体炎，咽峡炎，流行性感冒，炭疽病，风湿性关节炎，神经痛，胃痛，牙痛。
【用法与用量】	睡前服或含化。一次 2~3 丸，一日 1 次；极量 5 丸。
【注意】	本品有毒，慎用；孕妇忌服。
【规格】	每 10 丸重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄消炎片
【处方】	人工牛黄 4.8g 蟾酥 2.9g 天花粉 9.6g 珍珠母 9.6g 青黛 3.8g 大黄 9.6g 雄黄 9.6g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣 4 片，除去包衣后显黄棕色，味苦，有麻辣感。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛。用于热毒蕴结所致的咽喉肿痛、疔、疖、疮疖。
【用法与用量】	口服。一次 1 片，一日 3 次，小儿酌减；外用研末调敷患处。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	西瓜霜润喉片
【处方】	西瓜霜，薄荷素油，冰片，薄荷脑。
【性状】	本品为浅红色或浅橙红色(无蔗糖)的片，气芳香，味甜而辛凉。
【功能与主治】	清音利咽，消肿止痛。用于防治咽喉肿痛，声音嘶哑，喉痹，喉痛，喉蛾，口糜，口舌生疮，牙痛；急、慢性咽喉炎，急性扁桃体炎，口腔溃疡，口腔炎，牙龈肿痛。
【用法与用量】	含服。每小时含化 2~4 片〔规格(1)、(2)〕或每小时含化 1~2 片〔规格(3)〕。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每片重 0.6g；(2) 每片重 0.6g(无蔗糖)；(3) 每片重 1.2g。
【贮藏】	密封，避光。

【药名】	冰硼散
【处方】	冰片 50g 朱砂 60g 硼砂(煨) 500g 玄明粉 500g。
【性状】	本品为粉红色的粉末；气芳香，味辛凉。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛。用于热毒蕴结所致的咽喉疼痛、牙龈肿痛、口舌生疮。
【用法与用量】	吹敷患处，每次少量，一日数次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	珠黄吹喉散
【处方】	珍珠 50g 人工牛黄 30g 硼砂(煨) 250g 西瓜霜 80g 雄黄 40g 儿茶 100g 黄连 100g 黄柏 150g 冰片 50g。
【性状】	本品为淡黄色的粉末；气香，味苦，有清凉感。
【功能与主治】	解毒化腐生肌。用于热毒内蕴所致的咽喉口舌肿痛、糜烂。
【用法与用量】	外用，吹于患处。一日 3~5 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	珠黄散
【处方】	人工牛黄 500g 珍珠 500g。
【性状】	本品为淡黄色的粉末；气腥。
【功能与主治】	清热解毒，祛腐生肌。用于热毒内蕴所致的咽痛、咽部红肿、糜烂、口腔溃疡久不收斂。
【用法与用量】	取药少许吹患处，一日 2~3 次。
【注意】	忌食辛辣、油腻、厚味食物。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	健民咽喉片
【处方】	玄参，麦冬，蝉蜕，诃子，桔梗，板蓝根，胖大海，地黄，西青果，甘草，薄荷素油薄荷脑。
【性状】	本品为黄褐色的片或糖衣片、薄膜衣片，除去包衣后显黄褐色；气香，味甜或酸甜，具清凉感。
【功能与主治】	清利咽喉，养阴生津，解毒泻火。用于热盛津伤、热毒内盛所致的咽喉肿痛、失音及上呼吸道感染。
【用法与用量】	含服。一次2~4片〔规格(1)〕或2片〔规格(2)〕，每隔1小时1次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每片相当于饮片0.195g；(2)每片相当于饮片0.292g。
【贮藏】	密封。

【药名】	梅花点舌丸
【处方】	牛黄60g 人工麝香60g 熊胆粉30g 朱砂60g 葶苈子30g 珍珠90g 蟾酥(制)60g 雄黄30g 硼砂30g 乳香(制)30g 没药(制)30g 沉香30g 血竭30g 冰片30g。
【性状】	本品为朱红色的包衣水丸，除去包衣后显棕黄色至棕色；气香，味苦、麻舌。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛。用于火毒内盛所致的疔疮痈肿初起、咽喉牙龈肿痛、口舌生疮。
【用法与用量】	口服。一次3丸，一日1~2次；外用，用醋化开，敷于患处。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每10丸重1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清膈丸
【处方】	金银花60g 连翘60g 玄参60g 射干60g 山豆根60g 黄连30g 熟大黄30g 龙胆60g 石膏30g 玄明粉60g 桔梗60g 麦冬60g 薄荷30g 地黄45g 硼砂30g 甘草15g 人工牛黄2.4g 冰片6g 水牛角浓缩粉6g。
【性状】	本品为黑棕色的大蜜丸；气微香，味苦、甘。
【功能与主治】	清热利咽，消肿止痛。用于内蕴毒热引起的口渴咽干，咽喉肿痛、水浆难下、声哑失音、面赤腮肿、大便燥结。
【用法与用量】	口服。一次1丸，一日2次。
【注意】	孕妇及儿童慎用；忌食辛辣、油腻、厚味食物。
【规格】	每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	喉疾灵胶囊
【处方】	人工牛黄9.1g 诃子肉125g 猪牙皂25g 天花粉250g 广东土牛膝150g 山豆根250g 板蓝根150g 桔梗150g 连翘125g 珍珠层粉11g 冰片9.1g 了哥王

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>250g。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的粉末；气芳香，味苦。</p> <p>清热解毒，散肿止痛。用于热毒内蕴所致的两腮肿痛、咽部红肿、咽痛；腮腺炎、扁桃体炎、急性咽炎、慢性咽炎急性发作及一般喉痛见上述证候者。</p> <p>口服。一次3~4粒，一日3次。</p> <p>孕妇慎服。</p> <p>每粒装0.25g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>猴耳环消炎片</p> <p>猴耳环浸膏200g。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色至黑褐色；味涩，微苦。</p> <p>清热解毒，凉血消肿，止泻。用于上呼吸道感染，急性咽喉炎，急性扁桃体炎，急性肠胃炎，亦可用于细菌性痢疾。</p> <p>口服。一次3~4片，一日3次。</p> <p>无。</p> <p>(1)薄膜衣片每片重0.24g(相当于猴耳环浸膏0.2g)；(2)糖衣片(片心重0.23g，相当于猴耳环浸膏0.2g)。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>猴耳环消炎胶囊</p> <p>猴耳环浸膏400g。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为棕褐色至黑褐色的颗粒；味涩，微苦。</p> <p>清热解毒，凉血消肿，止泻。用于上呼吸道感染，急性咽喉炎，急性扁桃体炎，急性肠胃炎，亦可用于细菌性痢疾。</p> <p>口服。一次4粒〔规格(1)〕或一次2粒〔规格(2)〕，一日3次。</p> <p>无。</p> <p>(1)每粒装0.23g(含猴耳环浸膏0.2g)；(2)每粒装0.45g(含猴耳环浸膏0.4g)。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>蒲地蓝消炎口服液</p> <p>蒲公英500g 板蓝根188g 苦地丁125g 黄芩188g。</p> <p>本品为棕红色至深棕色的液体；气微香，味甜、微苦。</p> <p>清热解毒，消肿利咽。用于疖肿、腮腺炎、咽炎、扁桃体炎。</p> <p>口服。一次10ml，一日3次，小儿酌减。如有沉淀，摇匀后服用。</p> <p>无。</p> <p>每支装10ml。</p> <p>密封。</p>
---	--

风热袭肺型咽干咽痛灼热嘶哑扁桃体炎咽炎

【药名】	金果含片
【处方】	地黄，玄参，西青果，蝉蜕，胖大海，麦冬，南沙参，太子参，陈皮。
【性状】	本品为素片或薄膜衣片，素片或薄膜衣片除去包衣后显淡红棕色至棕色；味甜，有清凉感。
【功能与主治】	养阴生津，清热利咽。用于肺热阴伤所致的咽部红肿、咽痛、口干咽燥；急、慢性咽炎见上述证候者。
【用法与用量】	含服。一小时2~4片，一日10~20片。
【注意】	少数患者用药后偶有恶心、上腹不适感。
【规格】	(1)素片每片重0.55g；(2)薄膜衣片每片重0.57g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金果饮
【处方】	地黄73g 西青果18g 麦冬55g 南沙参55g 陈皮36g 玄参55g 蝉蜕27g 胖大海18g 太子参55g 薄荷素油0.5ml。
【性状】	本品为棕褐色的液体；味微甜，具清凉感。
【功能与主治】	养阴生津，清热利咽。用于肺热阴伤所致的咽部红肿、咽痛、口干咽燥；急、慢性咽炎见上述证候者。亦可用于放疗引起的咽干不适。
【用法与用量】	口服。一次15ml，一日3次或遵医嘱。
【注意】	忌食辛辣、油腻、厚味食物。
【规格】	(1)每支装15ml；(2)每瓶装90ml；(3)每瓶装165ml。(4)每支装15ml(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	金果饮咽喉片
【处方】	地黄137g 西青果34g 麦冬102g 南沙参102g 陈皮68g 玄参102g 蝉蜕52g 胖大海34g 太子参102g 薄荷素油2ml。
【性状】	本品为浅棕色或棕色的片；或为薄膜衣片，除去包衣后显浅棕色或棕色；

【功能与主治】	味甜，具清凉感。 养阴生津，清热利咽。用于肺热阴伤所致的咽部红肿、咽痛、口干咽燥；急、慢性咽炎见上述证候者。亦可用于放疗引起的咽干不适。
【用法与用量】	含服。每小时4片〔规格(1)〕，每小时2片〔规格(2)〕。
【注意】	忌食辛辣、油腻、厚味食物。
【规格】	每片重(1)0.5g；(2)1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金莲花口服液
【处方】	金莲花 450g。
【性状】	本品为棕红色澄清液体；味苦、微甜。
【功能与主治】	清热解毒。用于风热邪毒袭肺，热毒内盛引起的上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日3次；用时摇匀。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	金莲花片
【处方】	金莲花 1500g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后呈棕色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	清热解毒。用于风热邪毒袭肺，热毒内盛引起的上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎。
【用法与用量】	口服。一次3~4片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片(1)每片重0.31g；(2)每片重0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金莲花胶囊
【处方】	金莲花 1000g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰棕色至棕褐色的粉末；味苦。
【功能与主治】	清热解毒。用于风热邪毒袭肺，热毒内盛引起的上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日2~3次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金莲花颗粒
【处方】	金莲花 1000g。
【性状】	本品为浅棕黄色的颗粒；味甜、微苦〔规格(1)〕。本品为棕黄色的颗粒；

【功能与主治】	味甜、微苦〔规格(2)〕(无蔗糖)。 清热解毒。用于风热邪毒袭肺，热毒内盛引起的上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2~3次，小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装8g；(2)每袋装3g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	金莲花润喉片
【处方】	金莲花，薄荷素油。
【性状】	本品为浅棕色的片；味酸甜、微苦、清凉。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛，利咽。用于热毒内盛所致的咽部红肿疼痛、牙龈肿胀、口舌生疮；急性咽炎、急性扁桃体炎、上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	含服。一次1~2片，一日4~5次。
【注意】	忌食辛辣、油腻、厚味食物。
【规格】	每片重0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方瓜子金颗粒
【处方】	瓜子金150g 大青叶350g 野菊花200g 海金沙250g 白花蛇舌草250g 紫花地丁200g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甜、苦或味微甜、苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	清热利咽，散结止痛，祛痰止咳。用于风热袭肺或痰热壅肺所致的咽部红肿、咽痛、发热、咳嗽；急性咽炎、慢性咽炎急性发作及上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次20g〔规格(1)、(2)〕，一次14g〔规格(3)〕或一次5g〔规格(4)〕，一日3次；儿童酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装10g(相当于饮片14g)；(2)每袋装20g(相当于饮片28g)；(3)每袋装7g(相当于饮片14g)；(4)每袋装5g(无蔗糖相当于饮片28g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	功劳去火片
【处方】	功劳木604g 黄柏302g 黄芩302g 栀子302g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显棕黄色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	清热开音。用于风热犯肺引起的失音声哑；风热犯肺引起的急性咽炎出现的咽痛、咽干灼热、咽黏膜充血等。
【用法与用量】	口服。糖衣片一次5片，薄膜衣片一次3片，一日3次。
【注意】	本品仅适用于实热火毒、三焦热盛之证，虚寒者慎用，虚寒重症者禁用。
【规格】	薄膜衣片每片重0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	甘桔冰梅片
【处方】	桔梗 100g 薄荷 100g 射干 100g 蝉蜕 50g 乌梅(去核)50g 冰片 5g 甘草 100g 青果 100g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣显褐色；气香，味辛、微苦。
【功能与主治】	清热开音。用于风热犯肺引起的失音声哑；风热犯肺引起的急性咽炎出现的咽痛、咽干灼热、咽黏膜充血等。
【用法与用量】	口服。一次 2 片，一日 3~4 次。
【注意】	无。
【规格】	糖衣片，片心重 0.2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金嗓清音丸
【处方】	玄参 100g 地黄 100g 麦冬 60g 黄芩 40g 牡丹皮 60g 赤芍 60g 川贝母 60g 泽泻 60g 薏苡仁(炒)60g 石斛 60g 僵蚕(麸炒)40g 薄荷 20g 胖大海 40g 蝉蜕 40g 木蝴蝶 40g 甘草 20g。
【性状】	本品为黑褐色的水蜜丸；气微，味甜。
【功能与主治】	养阴清肺，化痰利咽。用于肺热阴虚所致的慢喉痞、慢喉痹，症见声音嘶哑、咽喉肿痛、咽干；慢性喉炎、慢性咽炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 60~120 丸，一日 2 次。
【注意】	忌烟酒及辛辣食物。
【规格】	每 10 丸重 1g。
【贮藏】	密封。

风热外束痰热内盛型嘶哑肿痛喉炎声带小结息肉

【药名】	黄氏响声丸
【处方】	薄荷，连翘，胖大海，川芎，桔梗，甘草，浙贝母，蝉蜕，酒大黄，儿茶，诃子肉，薄荷脑。
【性状】	本品为糖衣或糖衣浓缩水丸，除去包衣后显褐色或棕褐色；味苦、清凉。
【功能与主治】	疏风清热，化痰散结，利咽开音。用于风热外束、痰热内盛所致的急、慢性喉痞，症见声音嘶哑、咽喉肿痛、咽干灼热、咽中有痰、或寒热头痛、或便秘尿赤；急慢性喉炎及声带小结、声带息肉初起见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 8 丸[规格(1)]或一次 6 丸[规格(2)]或一次 20 丸[规格(3)]，一日 3 次，饭后服用；儿童减半。
【注意】	胃寒便溏者慎用。
【规格】	(1)糖衣丸每丸重 0.1g；(2)糖衣丸每丸重 0.133g；(3)糖衣丸每瓶装 400 丸。
【贮藏】	密封。

【药名】	金嗓散结丸
-------------	--------------

【处方】	马勃 25g 金银花 125g 玄参 125g 红花 50g 板蓝根 125g 浙贝母 75g 炒鸡内金 50g 木蝴蝶 75g 醋莪术 50g 燂桃仁 50g 醋三棱 50g 丹参 75g 麦冬 100g 泽泻 75g 蝉蜕 75g 蒲公英 125g。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸或大蜜丸；气微，味甘、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，活血化瘀，利湿化痰。用于热毒蕴结、气滞血瘀所致的声音嘶哑、声带充血、肿胀；慢性喉炎、声带小结、声带息肉见上述证候者。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 60~120 粒，大蜜丸一次 1~2 丸。一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	水蜜丸每 10 丸重 1g；大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

阴虚内热肺热津亏型口鼻干燥咽炎失音扁桃体炎

【药名】	西青果茶
【处方】	西青果 5000g。
【性状】	本品为浅棕黄色长方形块状；味甜，微酸涩。
【功能与主治】	清热，利咽，生津。用于阴虚内热、伤津所致咽干、咽痛、咽部充血；慢性咽炎、慢性扁桃体炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 块，一日 3 次。
【注意】	忌食辛辣、油腻、厚味食物。
【规格】	每块重 15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	西青果颗粒
【处方】	西青果 333.3g。
【性状】	本品为浅棕黄色至棕褐色颗粒；味甜，微酸涩。
【功能与主治】	清热，利咽，生津。用于阴虚内热、伤津所致咽干、咽痛、咽部充血；慢性咽炎、慢性扁桃体炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	忌食辛辣、油腻、厚味食物。
【规格】	每袋装 15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	玄麦甘桔胶囊
【处方】	玄参 400g 麦冬 400g 甘草 400g 桔梗 400g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅灰褐色至褐色粉末，味甜。
【功能与主治】	清热滋阴，祛痰利咽。用于阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.35g。

【贮藏】	密封。
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>玄麦甘桔颗粒</p> <p>玄参 80g 甘草 80g 麦冬 80g 桔梗 80g。</p> <p>本品为浅棕色至棕褐色的颗粒，味甜(含蔗糖、低蔗糖)；或味微甜(无蔗糖)。</p> <p>清热滋阴，祛痰利咽。用于阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛。</p> <p>开水冲服。一次 1 袋，一日 3~4 次。</p> <p>无。</p> <p>每袋装(1) 10g；(2) 6g(低蔗糖)；(3) 5g(无蔗糖)。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>玄麦甘桔含片</p> <p>玄参 275g 麦冬 275g 甘草 275g 桔梗 275g。</p> <p>本品为浅棕色至棕色的片或薄膜衣片，薄膜衣片除去包衣后显浅棕色至棕色；味甜，有清凉感。</p> <p>清热滋阴，祛痰利咽。用于阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛。</p> <p>含服。一次 1~2 片，一日 12 片，随时服用。</p> <p>无。</p> <p>(1) 每片重 1.0g；(2) 薄膜衣片每片重 1.0g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>口炎清颗粒</p> <p>天冬，麦冬，玄参，山银花，甘草。</p> <p>本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦；或味甘、苦(无蔗糖)。</p> <p>滋阴清热，解毒消肿。用于阴虚火旺所致的口腔炎症。</p> <p>口服。一次 2 袋，一日 1~2 次。</p> <p>无。</p> <p>(1) 每袋装 10g；(2) 每袋装 3g(无蔗糖)。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>铁笛口服液</p> <p>麦冬 25g 玄参 25g 瓜蒌皮 25g 诃子肉 25g 青果 10g 凤凰衣 2.5g 桔梗 50g 浙贝母 50g 茯苓 25g 甘草 50g。</p> <p>本品为棕褐色液体；气香，味甜、苦酸。</p> <p>润肺利咽，生津止渴。用于阴虚肺热津亏引起的咽干声哑、咽喉疼痛、口渴烦躁。</p> <p>口服，一次 10ml，一日 2 次，小儿酌减。</p> <p>忌烟、酒及辛辣食物。</p> <p>每支 10ml。</p> <p>密封。</p>

【药名】	铁笛丸
【处方】	麦冬 150g 瓜蒌皮 150g 青果 60g 桔梗 300g 茯苓 150g 玄参 150g 诃子肉 150g 凤凰衣 15g 浙贝母 300g 甘草 300g。
【性状】	本品为褐色的大蜜丸；味甘、苦、酸。
【功能与主治】	润肺利咽，生津止渴。用于阴虚肺热津亏引起的咽干声哑、咽喉疼痛、口渴烦躁。
【用法与用量】	口服或含化。一次 2 丸，一日 2 次。
【注意】	忌烟、酒及辛辣食物。
【规格】	每丸重 3g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	清音丸
【处方】	诃子肉，百药煎，葛根，甘草，川贝母，乌梅肉，茯苓，天花粉。
【性状】	本品为褐色的水蜜丸或大蜜丸；味甘、微酸涩。
【功能与主治】	清热利咽，生津润燥。用于肺热津亏，咽喉不利，口舌干燥，声哑失音。
【用法与用量】	口服，温开水送服或噙化。水蜜丸一次 2g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	忌食辛辣食物。
【规格】	水蜜丸每 100 粒重 10g；大蜜丸每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

阴虚燥热火毒内蕴型咽痛乳蛾白喉扁桃体炎咽峡炎

【药名】	清喉咽合剂
【处方】	地黄 180g 麦冬 160g 连翘 315g 玄参 260g 黄芩 315g。
【性状】	本品为棕褐色的澄清液体；味苦。
【功能与主治】	养阴清肺，利咽解毒。用于阴虚燥热、火毒内蕴所致的咽部肿痛、咽干少津、咽部白腐有苔膜、喉核肿大；局限性的咽白喉、轻度中毒型白喉、急性扁桃体炎、咽峡炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。第一次 20ml，以后每次 10~15ml，一日 4 次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 100ml；(2) 每瓶装 150ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	冬凌草片
【处方】	冬凌草 3000g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显绿棕色至绿褐色或棕色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	清热解毒，消肿散结，利咽止痛。用于热毒壅盛所致咽喉肿痛、声音嘶哑；扁桃体炎、咽炎、口腔炎见上述证候者及癌症的辅助治疗。
【用法与用量】	口服。一次 2~5 片，一日 3 次。

【注意】	无。
【规格】	1) 薄膜衣片，每片重 0.26g；(2) 糖衣片，片心重 0.25g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	六应丸
【处方】	丁香，雄黄，珍珠，蟾酥，牛黄，冰片。
【性状】	本品为黑色有光泽的水丸，除去包衣显深黄色；味苦、辛，有麻舌感。
【功能与主治】	清热，解毒，消肿，止痛。用于火毒内盛所致的喉痹、乳蛾，症见咽喉肿痛、口苦咽干、喉核红肿；咽喉炎、扁桃体炎见上述证候者。亦用于疔疮疮疡及虫咬肿痛。
【用法与用量】	饭后服。一次 10 丸，儿童一次 5 丸，婴儿一次 2 丸，一日 3 次；外用。以冷开水或醋调敷患处。
【注意】	无。
【规格】	每 5 丸重 19mg。
【贮藏】	密封。

外感风热型牙痛咽痛咽炎扁桃体支气管炎

【药名】	万通炎康片
【处方】	苦玄参，肿节风
【性状】	本品为薄膜衣片或糖衣片，除去包衣后显黄棕色至棕色；味苦。
【功能与主治】	疏风清热，解毒消肿。用于外感风热所致的咽部红肿、牙龈红肿、疮疡肿痛；急慢性咽炎、扁桃体炎、牙龈炎、疮疖见上述证候者。
【用法与用量】	口服。薄膜衣片：小片一次 3 片，重症一次 4 片，一日 3 次；大片一次 2 片，重症一次 3 片，一日 3 次。糖衣片：一次 6 片，重症一次 9 片，一日 3 次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.35g(大片)；(2) 薄膜衣片每片重 0.24g(小片)。
【贮藏】	密封。

【药名】	北豆根片
【处方】	北豆根提取物 120g(相当于总生物碱 30g)。
【性状】	本品为糖衣或薄膜衣片，除去包衣后显灰棕色至黑棕色；味苦。
【功能与主治】	清热解毒，止咳，祛痰。用于咽喉肿痛，扁桃体炎，慢性支气管炎。
【用法与用量】	口服。一次 60mg，一日 3 次。

【注意】	无。
【规格】	(1) 每片含总生物碱 15mg；(2) 每片含总生物碱 30mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	北豆根胶囊
【处方】	北豆根提取物 120g(相当于总生物碱 30g)。
【性状】	本品为硬胶囊，内容为灰棕色至黑棕色的颗粒及粉末；味苦。
【功能与主治】	清热解毒，止咳，祛痰，用于咽喉肿痛，扁桃体炎，慢性支气管炎。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒含总生物碱 30mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	灵丹草颗粒
【处方】	臭灵丹草 1667g。
【性状】	本品为棕色至褐色的颗粒；气微香，味甜而苦涩。
【功能与主治】	清热疏风，解毒利咽，止咳祛痰。用于风热邪毒，咽喉肿痛及肺热咳嗽；急性咽炎、扁桃体炎、上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1~2 袋，一日 3~4 次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 3g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	炎宁糖浆
【处方】	鹿茸草 1562.5g 白花蛇舌草 781.25g 鸭跖草 781.25g。
【性状】	本品为红棕色至深棕色的黏稠液体；气香，味微甜、苦。
【功能与主治】	清热解毒，消炎止痛。用于上呼吸道感染，扁桃体炎，尿路感染，急性菌痢，肠炎。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 3~4 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 100ml。
【贮藏】	遮光，密封。

【药名】	金嗓开音丸
【处方】	金银花，连翘，玄参，板蓝根，赤芍，黄芩，桑叶，菊花，前胡，焯苦杏仁，牛蒡子，泽泻，胖大海，僵蚕(麸炒)，蝉蜕，木蝴蝶。
【性状】	本品为黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；气微，味甘。
【功能与主治】	清热解毒，疏风利咽。用于风热邪毒所致的咽喉肿痛，声音嘶哑；急性咽炎、亚急性咽炎、喉炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 60~120 丸，大蜜丸一次 1~2 丸，一日 2 次。
【注意】	忌烟、酒及辛辣食物。

【规格】	水蜜丸每10丸重1g；大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方草珊瑚片
【处方】	肿节风浸膏，薄荷脑，薄荷素油。
【性状】	本品为粉红色至棕色的片，或为薄膜衣片，除去包衣后显浅棕色至棕色； 气香，味甜、清凉。
【功能与主治】	疏风清热，消肿止痛，清利咽喉。用于外感风热所致的喉痹，症见咽喉肿痛、声哑失音；急性咽喉炎见上述证候者。
【用法与用量】	含服。一次2片〔规格(1)〕或一次1片〔规格(2)〕，每隔2小时1次， 一日6次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每片重0.44g；(2)每片重1.0g。
【贮藏】	密封。

【药名】	穿心莲内酯滴丸
【处方】	穿心莲内酯150g。
【性状】	本品为黄色的包衣滴丸，除去包衣后显类白色；味苦。
【功能与主治】	清热解毒，抗菌消炎。用于上呼吸道感染，细菌性痢疾。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	脾胃虚寒者慎用。
【规格】	每袋含穿心莲内酯0.15g。
【贮藏】	遮光，密闭保存。

【药名】	银蒲解毒片
【处方】	山银花，野菊花，夏枯草，蒲公英，紫花地丁。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色至棕褐色；味苦涩。
【功能与主治】	清热解毒。用于风热型急性咽炎，症见咽痛、充血，咽干或具灼热感，舌 苔薄黄；湿热型肾盂肾炎，症见尿频短急，灼热疼痛，头身疼痛，小腹坠 胀，肾区叩击痛。
【用法与用量】	口服，一次4~5片，一日3~4次，小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	糖衣片(片心重0.35g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	清咽利膈丸
【处方】	射干100g 栀子100g 熟大黄25g 薄荷100g 玄参100g 防风100g 甘草150g 连翘100g 黄芩100g 炒牛蒡子100g 天花粉100g 荆芥穗100g 桔梗200g。
【性状】	本品为浅棕色至棕色的水丸；味微苦。
【功能与主治】	清热利咽，消肿止痛。用于外感风邪、脏腑积热所致的咽部红肿、咽痛、 面红腮肿、痰涎壅盛、胸膈不利、口苦舌干、大便秘结、小便黄赤。

【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2 次。
【注意】	忌食辛辣、油腻、厚味食物。
【规格】	每 100 粒重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清喉利咽颗粒
【处方】	黄芩，西青果，桔梗，竹茹，胖大海，橘红，枳壳，桑叶，醋香附，紫苏子，紫苏梗，沉香，薄荷脑。
【性状】	本品为黄棕色的颗粒；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	清热利咽，宽胸润喉。用于外感风热所致的咽喉发干、声音嘶哑；急慢性咽炎、扁桃体炎见上述证候者，常用有保护声带作用。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 10g；(2) 每袋装 5g(含乳糖)。
【贮藏】	密封。

外感风热肺胃热盛型咽痛发热扁桃体炎咽炎上呼吸道感染

【药名】	银黄口服液
【处方】	金银花提取物(以绿原酸计)2.4g 黄芩提取物(以黄芩苷计)24g。
【性状】	本品为红棕色的澄清液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热疏风，利咽解毒。用于外感风热、肺胃热盛所致的咽干、咽痛、喉核肿大、口渴、发热；急慢性扁桃体炎、急慢性咽炎、上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 3 次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	银黄片
【处方】	金银花提取物 100g 黄芩提取物 40g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄色至棕黄色；味微苦。
【功能与主治】	清热疏风，利咽解毒。用于外感风热、肺胃热盛所致的咽干、咽痛、喉核肿大、口渴、发热；急慢性扁桃体炎、急慢性咽炎、上呼吸道感染见上述

<p>【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>证候者。 口服。一次2~4片，一日4次。 无。 (1)糖衣片(片心重0.25g)；(2)薄膜衣片每片重0.27g。 密封。</p>
<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>银黄颗粒 金银花提取物100g 黄芩提取物40g。 本品为淡黄色至棕黄色的颗粒；味甜、微苦。 清热疏风，利咽解毒。用于外感风热、肺胃热盛所致的咽干、咽痛、喉核肿大、口渴、发热；急慢性扁桃体炎、急慢性咽炎、上呼吸道感染见上述证候者。 开水冲服。一次1~2袋〔规格(1)、(3)、(4)、(5)〕或一次0.5~1袋〔规格(2)、(6)〕，一日2次。 无。 (1)每袋装4g；(2)每袋装8g；(3)每袋装4g(无蔗糖)；(4)每袋装3g(无蔗糖)；(5)每袋装2g(无蔗糖)；(6)每袋装4g(无蔗糖)。 密封，防潮。</p>
<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>银翘双解栓 连翘1860.46g 金银花930.23g 黄芩1023.26g 丁香叶465.12g。 本品为黄棕色子弹形栓剂。 疏散风热，清肺泻火。用于外感风热，肺热内盛所致的发热、恶风寒、咽喉肿痛、咳嗽、痰白或黄、口干微渴、舌红苔白或黄、脉浮数或滑数；上呼吸道感染、扁桃体炎、急性支气管炎见上述证候者。 肛门给药。一次1粒，一日3次；儿童用量酌减。 应在排便后纳入肛门，以利药物迅速吸收。 (1)每粒重1g；(2)每粒重1.5g。 30℃以下密闭贮存。</p>
<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>清咽润喉丸 射干30g 山豆根30g 桔梗30g 炒僵蚕15g 栀子(姜炙)15g 牡丹皮30g 青果30g 金果榄15g 麦冬45g 玄参45g 知母30g 地黄45g 白芍60g 浙贝母30g 甘草60g 冰片6g 水牛角浓缩粉3g。 本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸或黑褐色的大蜜丸；味甘、苦而辛凉。 清热利咽，消肿止痛。用于风热外袭、肺胃热盛所致的胸膈不利、口渴心烦、咳嗽痰多、咽部红肿、咽痛、失音声哑。 温开水送服或含化。水蜜丸一次4.5g，大蜜丸一次2丸，一日2次。 孕妇及儿童慎用；忌食辛辣、油腻、厚味食物。 水蜜丸每100粒重10g；大蜜丸每丸重3g。 密封。</p>

肺胃热盛型口舌生疮咽痛嘶哑扁桃体炎腮腺炎

【药名】	板蓝根茶
【处方】	板蓝根 1400g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的块状物；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，凉血利咽。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥、腮部肿胀；急性扁桃体炎、腮腺炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 块，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每块重 10g；(2) 每块重 15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	板蓝根颗粒
【处方】	板蓝根 1400g。
【性状】	本品为浅棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦，或味微苦〔规格(3)、(4)〕。
【功能与主治】	清热解毒，凉血利咽。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥、腮部肿胀；急性扁桃体炎、腮腺炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 5~10g〔规格(1)、(2)〕，或一次 1~2 袋〔规格(3)、(4)〕，一日 3~4 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 5g(相当于饮片 7g)；(2) 每袋装 10g(相当于饮片 14g)；(3) 每袋装 3g(无蔗糖，相当于饮片 7g)；(4) 每袋装 1g(无蔗糖，相当于饮片 7g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	青果丸
【处方】	青果 100g 金银花 100g 黄芩 100g 北豆根 100g 麦冬 100g 玄参 100g 白芍 100g 桔梗 100g。
【性状】	本品为棕褐色的水蜜丸或黑棕色的大蜜丸；味微苦。
【功能与主治】	清热利咽，消肿止痛。用于肺胃蕴热所致的咽部红肿、咽痛、失音声哑、口干舌燥、干咳少痰。

【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 8g，大蜜丸一次 2 丸，一日 2 次。
【注意】	忌食辛辣食物。
【规格】	(1) 水蜜丸每 10 丸重 1g；(2) 大蜜丸每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	珍珠黄胶囊
【处方】	珍珠 11g 人工牛黄 45g 三七 90g 黄芩浸膏粉 56g 冰片 2.8g 猪胆粉 8g 薄荷素油 5.6g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄色至深黄色粉末；气香，味辛凉而苦。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、疮疡热疖。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次。外用，取药粉用米醋或冷开水调成糊状，敷患处。
【注意】	孕妇慎用；忌食辛辣、油腻、厚味食物。
【规格】	每粒装 0.2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	桂林西瓜霜
【处方】	西瓜霜，煨硼砂，黄柏，黄连，山豆根，射干，浙贝母，青黛，冰片，无患子果(炭)，大黄，黄芩，甘草，薄荷脑。
【性状】	本品为灰黄绿色的粉末；气香，味咸、甜、微苦而辛凉。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛。用于风热上攻、肺胃热盛所致的乳蛾、喉痹、口糜，症见咽喉肿痛、喉核肿大、口舌生疮、牙龈肿痛或出血；急、慢性咽炎，扁桃体炎，口腔炎，口腔溃疡，牙龈炎见上述证候者及轻度烫伤(表皮未破)者。
【用法与用量】	外用，喷、吹或敷于患处，一次适量，一日数次；重症者兼服，一次 1~2g，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装(1)1g；(2)2g；(3)2.5g；(4)3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清胃黄连丸(大蜜丸)
【处方】	黄连 80g 桔梗 80g 知母 80g 地黄 80g 天花粉 80g 栀子 200g 黄芩 200g 石膏 80g 甘草 40g 玄参 80g 牡丹皮 80g 连翘 80g 黄柏 200g 赤芍 80g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；味微甜后苦。
【功能与主治】	清胃泻火，解毒消肿。用于肺胃火盛所致的口舌生疮，齿龈、咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服，一次 1~2 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清胃黄连丸(水丸)
-------------	------------------

【处方】	黄连 80g 桔梗 80g 知母 80g 地黄 80g 天花粉 80g 栀子 200g 黄芩 200g 石膏 80g 甘草 40g 玄参 80g 牡丹皮 80g 连翘 80g 黄柏 200g 赤芍 80g。
【性状】	本品为黄色至深黄色的水丸；味微苦。
【功能与主治】	清胃泻火，解毒消肿。用于肺胃火盛所致的口舌生疮，齿龈、咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服，一次 9g，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每袋装 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清胃黄连片
【处方】	黄连 62g 桔梗 62g 知母 62g 地黄 62g 天花粉 62g 栀子 156g 黄芩 156g 石膏 62g 甘草 31g 玄参 62g 牡丹皮 62g 连翘 62g 黄柏 156g 赤芍 62g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	清胃泻火，解毒消肿。用于肺胃火盛所致的口舌生疮，齿龈、咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服，一次 8 片〔规格(1)、(2)〕或一次 4 片〔规格(3)〕，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)糖衣片(片心重 0.32g)；(2)薄膜衣片每片重 0.33g；(3)薄膜衣片每片重 0.33g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清咽丸
【处方】	桔梗 100g 北寒水石 100g 薄荷 100g 甘草 100g 青黛 20g 冰片 20g 诃子肉 100g 乌梅肉 100g 硼砂(煨) 20g。
【性状】	本品为黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；气清凉，味甜、酸、微苦。
【功能与主治】	清热利咽，生津止渴。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、声音嘶哑、口舌干燥、咽下不利。
【用法与用量】	口服或含化。小蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	忌食烟、酒、辛辣之物。
【规格】	小蜜丸每 30 丸重 6g；大蜜丸每丸重 6g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

痰湿内阻肝郁气滞型咽喉嘶哑异物感声带肥厚

【药名】	金嗓利咽丸
【处方】	茯苓 50g 法半夏 50g 枳实(炒) 50g 青皮(炒) 50g 胆南星 50g 橘红 50g 砂仁 50g 豆蔻 25g 槟榔 50g 合欢皮 50g 六神曲(炒) 50g 紫苏梗 50g 生姜 7.5g 蝉蜕 50g 木蝴蝶 50g 厚朴(制) 50g。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸或大蜜丸；气微，味甘、微苦。
【功能与主治】	疏肝理气，化痰利咽。用于痰湿内阻、肝郁气滞所致的咽部异物感、咽部不适、声音嘶哑；声带肥厚见上述证候者。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 60~120 丸，大蜜丸一次 1~2 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	水蜜丸每 10 丸 1g；大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

心脾湿热型口疮复发性溃疡口干口臭

【药名】	复方珍珠口疮颗粒
【处方】	珍珠 15g 五倍子 300g 苍术 450g 甘草 150g。
【性状】	本品为棕色的颗粒；味微苦、涩而后甘。
【功能与主治】	燥湿，生肌止痛。用于心脾湿热证口疮，症见口疮，周围红肿，中间凹陷，表面黄白，灼热疼痛，口干，口臭，舌红；复发性口腔溃疡见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，开水 100ml 溶解，分次含于口中，每口含 1~2 分钟后缓缓咽下；10 分钟内服完。一日 2 次。饭后半小时服用。5 天为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密闭，防潮。

牙病

【药名】	牙痛一粒丸
------	--------------

【处方】	蟾酥 240g 朱砂 50g 雄黄 60g 甘草 240g。
【性状】	本品为黄褐色的水丸；气微，味辛、有麻舌感。
【功能与主治】	解毒消肿，杀虫止痛，用于火毒内盛所致的牙龈肿痛、龋齿疼痛。
【用法与用量】	每次取 1~2 丸，填入龋齿洞内或肿痛的齿缝处，外塞一块消毒棉花，防止药丸滑脱。
【注意】	将含药后渗出的唾液吐出，不可咽下。
【规格】	每 125 丸重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	齿痛消炎灵颗粒
【处方】	石膏 200g 荆芥 80g 防风 80g 青皮 100g 牡丹皮 100g 地黄 150g 青黛 100g 细辛 60g 白芷 50g 甘草 60g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦或味微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	疏风清热，凉血止痛。用于脾胃积热、风热上攻所致的头痛身热、口干口臭、便秘燥结、牙龈肿痛；急性齿根尖周炎、智齿冠周炎、急性牙龈(周)炎、急性牙髓炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次，首次加倍。
【注意】	服药期间忌食酒和辛辣之物。
【规格】	每袋装 (1) 20g；(2) 10g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

小儿肺卫热盛型口腔咽喉诸病

【药名】	小儿咽扁颗粒
【处方】	金银花 109.4g 射干 62.5g 金果榄 78.1g 桔梗 78.1g 玄参 78.1g 麦冬 78.1g 人工牛黄 0.31g 冰片 0.16g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦，或味微甜、微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	清热利咽，解毒止痛。用于小儿肺卫热盛所致的喉痹、乳蛾，症见咽喉肿痛、咳嗽痰盛、口舌糜烂；急性咽炎、急性扁桃腺炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一至二岁一次 4g 或 2g(无蔗糖)，一日 2 次；三至五岁一次 4g 或 2g(无蔗糖)，一日 3 次；六至十四岁一次 8g 或 4g(无蔗糖)，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 8g；(2) 每袋装 4g(无蔗糖)
【贮藏】	密封。

中医对于肝脏胆囊的研究和诊断

胆囊

胆存在于肝之短叶间，其位居右肋。胆与肝通过其经脉的络属而构成表里关系。在五行之中肝为脏属阴木，而胆为腑属阳木。胆是一囊状脏器，有管道与小肠相通，胆内盛有胆汁，正如《难经·四十二难》说：“胆在肝之短叶间……盛精汁三合。”胆汁，又称精汁、清汁，是一种精纯、清静、味苦而呈黄绿色的液体。所以又称胆为“中精之府”、“中清之府”、“清静之府”。胆的主要功能是贮藏和排泄胆汁，并参与精神情志活动。

贮藏排泄胆汁

胆汁由肝脏分泌而贮藏于胆，经浓缩后再由胆排泄到小肠，有助于饮食物的消化，是脾胃消化吸收功能得以正常进行的重要条件之一。胆汁的生成和排泄受到肝脏主疏泄功能的控制和调节，是肝脏疏泄功能的具体体现之一。肝脏的疏泄功能正常，则可以化生胆汁，并贮藏于胆，排泄到小肠，协助饮食物的消化。肝的疏泄功能发生障碍，则会导致胆汁的化生和排泄障碍，不能正常地注入小肠则影响饮食水谷的消化，可表现为胁下胀满疼痛、厌食油腻、腹胀、泄泻等病症；若湿热浊邪，滞留胆系，久经煎熬，尚可形成砂石，阻闭气机，也可出现右肋胀痛，或痛引肩背不适、甚或局部剧烈绞痛等病症。

参与精神情志活动

胆的这一功能，古中医称之为决断。决断，即决定、判断。《素问·灵兰秘典论》说：“胆者，中正之官，决断出焉。”说明人对事物的决定和判断能力与胆的功能有关系。胆气充足，决断正常，则表现为遇事判断准确，临危不惧，勇敢果断。如若胆气虚弱，决断失常，则可出现遇事胆小怯懦，犹豫不决，优柔寡断；或遇剧烈刺激，则发生魂魄不安宁、惊骇失眠等病症。

胆在藏象学说中，既属六腑，又属奇恒之腑。这是由于胆在形态上中空有腔，排泄胆汁协助食物消化，并与肝脏有表里关系，形态特征均同于六腑，故属六腑之一。又因为胆贮藏胆汁功同五脏，不直接传化食物，并主决断与精神情志活动有关，功能均异于六腑，故又属奇恒之腑之一。

肝脏

肝脏的位置居膈下，存在于腹腔之右肋内。元·滑寿《十四经发挥》说：“其脏在后肋，右横肾之前，并胃，贯脊之第九椎。”肝脏的主要功能：一是疏泄气机，二是贮藏血液和调节血流量。这两方面的功能是肝气、肝血、肝阴、肝阳的共同作用而产生的。肝的系统联系是在体合筋，其华在爪，开窍于目，在液为泪，在志为怒。肝脏在五行中属木，与春季相应，为阴中之少阳。肝通过经脉的相互络属而与胆构成表里关系。中医学采用类比的方法，以木性升发、柔和、条达来阐述肝脏疏通、升发的生理。肝的特性是主升主动，喜条达而恶抑郁，故称之为“刚脏”。

肝的主要生理

主疏泄：肝脏疏泄气机的功能，又称“肝主疏泄”。所谓肝主疏泄是指肝气有疏通调畅全身气机的功能，所以朱震亨在《格致余论》中明确指出：“司疏泄者，肝也。”疏泄气机功能正常则使全身气血运行、情志反应、津液输布、脏腑组织功能活动均处于协调和畅的良好状态，因此肝脏对全身机能活动调节是通过疏泄全身的气机来实现的。具体表现在以下五个方面：

调畅精神情志：人体的精神情志活动以五脏的精气和功能活动为基础，而五脏的功能活动又有赖于气机的调畅和血液的正常运行，故人的精神情志活动必然与肝主疏泄功能密切相关。肝脏主疏泄功能正常则气机调畅，脏腑功能活动协调，表现为精神愉快、情志舒畅；肝失疏泄，精神情志即可出现异常变化。如肝之疏泄不及，则肝气郁结，又称为“肝郁”，常表现为精神抑郁；若疏泄太过，则肝气上逆，常引起精神情志活动亢奋，表现为急躁易怒、心烦失眠等。反之若在使人大怒的外界事物刺激下，又常常因为大怒而损伤肝脏，导致肝主疏泄功能失常，亦可见肝气郁结，气机不畅。因此中医有“肝喜条达而恶抑郁”及“暴怒伤肝”的理论。

维持气血运行：肝脏对全身气机的疏通和调畅，促使全身之气机通而不滞，散而不郁。人体的气血相依相随，运行不息，气为血之帅，气行则血行。故清·唐宗海《血证论·脏腑病机论》说：“肝属木，木气冲和调达，不致遏郁，则血脉得畅”。气血又为全身脏腑经络等组织器官功能活动的物质基础。所以肝主疏泄功能正常，则气机调畅，气血通达全身，经脉通利，脏腑功能和谐。如若肝脏主疏泄功能不及，疏通升发无力，则会导致气机郁滞，又称肝郁气滞或简称“气滞”、“气郁”，可表现为胸胁胀满、两乳及少腹胀痛不适等病症，进一步发展为局部刺痛，或形成癥积等气滞血瘀的病症；若疏泄太过，升发亢奋，则肝气上逆，血随气涌，可出现头目胀痛、面红目赤，或吐血、呕血等病症，甚则可因肝阳暴张，阳亢风动，气血上冲，导致血溢于脑而卒然昏仆、不省人事等危症，正如《素问·调经论》所说：“血之与气并走于上，则为大厥，厥则暴死，气复反则生，不反则死。”

促进脾胃消化吸收与输布：饮食物的消化、吸收、输布及排泄主要依赖于脾胃的运化功能，而肝脏主疏泄又是保证脾胃运化功能正常的重要条件。肝疏泄气机对脾胃运化功能的促进作用主要体现在这两个方面：一是协助脾升胃降。肝主疏泄，调畅气机有助于脾胃之气升降，只有脾升胃降，饮食物的消化、吸收及排泄才能得以正常进行。二是分泌及排泄胆汁。胆汁帮助食物的消化。所以清·唐宗海《血证论·脏腑病机论》说：“木之性主于疏泄，食气入胃，全赖肝木之气以疏泄之，而水谷乃化。”若肝失疏泄，气机失调，累及脾胃，则引起消化吸收障碍。如果肝气犯脾，导致脾气不升，则可出现腹胀、肠鸣、腹泻、胁肋胀痛或痛泻频作等症；如肝气犯胃，导致胃失和降，则可出现恶心呕吐、呃逆嗳气、泛酸、胃脘胀痛等症。若肝失疏泄，影响胆汁的分泌及排泄，则可出现胁肋不适、口苦、纳食不化、厌油腻食物，甚至黄疸等病症。

协助水液代谢：人体的水液代谢虽主要由肺、脾、肾三脏完成，但与肝主疏泄也有关联。水液的运行依赖于气的推动作用，只有气机调畅通达，水液才能维持正常的输布与排泄，即气行则水行。若肝失疏泄，气行阻滞，气不行水，则水液输布发生障碍。若水液凝聚而生痰，痰气交阻于咽喉，则可见梅核气；痰阻于经络，可见痰核；如若水液停留于腹腔，则可见腹水胀满，故《金匱要略·水气》说：“肝水者，其腹大不能自转侧，胁下腹痛。”这是因肝失疏泄而致水停于腹的病症。

调节生殖机能：人体生殖机能中，女子的月经和男子的排精与肝疏泄气机的功能密切相关。肝疏泄的气机调畅，冲、任二脉得其所助，则任脉通利，太冲脉盛，月经应时而至，孕育分娩顺利，所以民间有“女子以肝为先天”之说。而男子的排精亦赖于肝，朱震亨在《格致余论》中说：“主闭藏者肾也，司疏泄者肝也。”说明精气的封藏在肾（现代医学指明精液贮藏在睾丸，此处封藏之物非西医之精液而是中医之精），排泄在肝，气机调畅，则男子排精通畅。若肝疏泄失常，气机不畅，冲任二脉失和，女子可出现月经紊乱，或经行不畅，甚或痛经、闭经、不孕；男子可出现排精不畅或会阴胀痛不适、不育等病症。

主藏血：肝主藏血，是指肝具有贮藏血液，调节血流量及防止出血的功能。这一功能体现

在三个方面：

贮藏血液：是指肝具有贮藏一定血液于肝内及冲脉之中，以供给机体各部生理活动之所需的作用，故肝又有主“血海”之说。肝藏血，一方面可以濡养自身，防止肝气升发太过，从而使肝之阴血制约肝阳，勿使上亢，维持肝脏正常疏泄功能，以利冲和条达；另一方面：“肝藏血，血舍魂”（《灵枢·本神》），魂为神之变，且随神而动。明·张介宾《类经》说：“魂之为言，如梦寐恍惚、变幻游行之境，皆是也。”魂的活动以血为物质基础，肝血充足，则魂能安舍而不妄行游离。如若肝脏藏血不足，肝血亏虚，肝体失养，阴不制阳，肝阳上亢而升发太过，可出现眩晕、头目胀痛、面红目赤、头重足轻等症；肝血不足则魂不守舍，可出现惊骇恶梦、卧寐不安、梦游、呓语以及幻觉等症。

调节血流量：是指肝脏根据身体的不同生理状态，合理地分配和调节各部位所需血流量的多少。当机体处于安静休息状态时，外周对血液需要量相对减少，相对富余的血液就归藏于肝而蓄以备用；当机体处于活动状态时，血液的需求量相应增加，肝脏在升动之性的配合下，则将所贮蓄的血液通过经脉按生理需求将血液输送到相应部位。机体各个脏腑组织器官得到了肝血的濡养才能发挥正常的生理功能，如两目得到肝血的濡养后则视物清晰，筋脉得到肝血的滋养后则强健有力而活动自如，子宫得到肝血的充养则月经正常。所以王冰注释《素问·五藏生成》时说：“肝藏血，心行之，人动则血运于诸经，人静则血归于肝藏。”应当指出，肝调节血流量是以贮藏血液为前提的，若肝血不足，调节血流量失常，则会导致机体众多部位供血减少，脏腑组织失养而见各种病症，如血不养目，则两目干涩、视物昏花或夜眠；血不濡筋，则筋脉拘急、肢体麻木、屈伸不利；血海空虚，胞宫血亏，则月经量少，甚则经闭等症。

防止出血：指肝气能收摄约束血液，从而防止血液逸出脉外。这是气的固摄作用在肝脏的具体体现。肝气充足，收摄有力，则藏血正常，表现为血行脉内而无出血之患。若肝气虚弱，则藏血失常，收摄无力，或肝火旺盛，灼伤脉络，迫血妄行，临床上均可见吐血、呕血、衄血、咯血或月经过多、崩漏等出血病症。

肝疏泄气机，又主藏血，藏血是疏泄气机的物质基础，而疏泄气机则是藏血的具体表现。故常用“肝体阴而用阳”来表述二者的关系。“体阴”主要是指肝脏贮藏阴血之本体，“用阳”主要是指肝的气机主升主动之功能及特性。肝脏贮藏血液、调节血流量以及防止出血有赖于肝疏泄气机得以实现。而肝藏血又能制约肝阳，疏而不亢，则有助于肝的疏泄功能。所以二者存在着互限互用，相互制约的关系。在病理情况下，肝的阴血常表现为不足的虚证，即“肝体常不足”，而肝的疏泄功能失常则多为肝气郁结或者升动太过，常表现为实证或本虚标实之证，即“肝用常有餘”，这是肝脏的病理特点。故清·林珮琴《类证治裁·肝气论治》中说道：“肝为刚脏，职司疏泄，用药不宜刚而宜柔，不宜伐而宜和。”实属其从医之经验的总结。

肝的系统联系

肝在体合筋，其华在爪：筋，包括肌腱、韧带和筋膜。筋有连接和约束骨关节，主持运动和保护内脏等功能。所谓肝在体合筋，又称肝主筋，是指肝脏具有主管全身筋膜运动的功能。筋有赖于肝之阴血的滋养，才能发挥其正常的功能，故肝之阴血充盈，则肢体关节活动自如，强健有力；若肝之阴血不足，筋失所养，可表现为肢体关节活动失灵，或麻木不仁、屈伸不利，或手足震颤，或者易于疲劳，所以《素问·六节藏象论》称肝为“罢极之本”。此外脾胃与筋的关系也较密切，脾胃所运化的水谷精微可以养筋，若脾胃虚弱，气血生化乏源，也可使筋失所养，而导致肢软无力，甚或萎废不用。

爪：即爪甲。爪甲为筋延伸到体表的外露部分，故有“爪为筋之余”之说。所谓肝其华在爪，是指肝血濡养爪甲，可从爪甲色泽的枯荣反映出来肝脏之盛衰。故《素问·五藏生成》说：“肝之合筋也，其荣爪也。”肝血充足，爪得血养，则爪甲坚韧、红润光泽；若肝血不足，则爪甲失养，可见爪甲淡白枯槁、软薄或变形脆裂。

肝开窍于目：眼睛，又称精明，是人的视觉器官。《素问·脉要精微论》说：“夫精明者，所以视万物，别白黑，审短长。”这是对目视觉功能的简要描述。眼睛主要由白睛（指巩膜的部分，又称白眼）、黑睛（指虹膜的部分，又称黑眼）、瞳神（即瞳孔，又称瞳仁、瞳子）、眼睑（指上下眼皮，又称眼胞）、两眦（指内外眼角，包括其内之血络，又称目内外眦）等五个部分组成。眼科的五轮学说将其分别配属于五脏，即白睛为气轮，属肺；黑睛为风轮，属肝；瞳仁为水轮，属肾；眼睑为肉轮，属脾；两眦为血轮，属心。目之功能虽与五脏有关，但与肝的关系最为密切。肝的经脉又上连目系（目系又称眼系，为眼球内连于脑的脉络），视觉有赖于肝血的滋养，因而有“肝气通于目，肝和则目能辨五色矣。”（《灵枢·脉度》）之说。如肝气调和，肝血充足，则视物清晰、眼动自如。若肝之阴血不足，目失所养，则视物不清、双目干涩，或见夜盲；肝经风热，循经入目，则目赤痒痛；肝火上炎，上灼清窍，可见目赤肿痛之症；肝阳上亢，上扰清空，则头目眩晕；肝风内动，目系抽掣，则目斜上视；肝胆湿热，熏蒸于目，可出现白睛发黄等病症。可见肝病常可反映于目，故中医谓“目为肝之外候”也。

肝在液为泪：泪具有滋润眼睛和清洁眼球的功能。由于肝开窍于目，泪则由肝阴所化生，受肝气控制，故泪为肝之液。肝之功能正常，则泪液分泌适量，滋润于目而不外溢。肝病可出现泪液分泌异常，如肝之阴血不足，则泪液分泌减少，两目干涩；肝经湿热，则目眵增多；肝经风热，则迎风流泪等。

肝在志为怒：怒，即愤怒、恼怒。怒是人体在气愤不平，情绪激动时强烈的情感变化，属于不良的情志刺激。怒以肝藏血为物质基础，与肝疏泄气机主升发之用密切相关，故说肝在志为怒。当肝血充足，肝气平和，虽受外界刺激，但怒而不过，能有所节制；若肝之阴血不足，肝阳升泄太过，情绪不稳定，则稍遇刺激，随即勃发大怒，不可遏制，故《素问·藏气法时论》说：“肝病者……令人善怒。”如大怒可使肝气迅速上逆，而血随气升，

表现为头目胀痛、面红目赤，或吐血、呕血、气厥昏迷等病症；因郁怒又可使肝气不舒，故可见两胁胀满疼痛、两侧乳房或少腹作胀等病症，这即是大怒伤肝的道理所在。因此息怒宁志是中医学所提倡的养生护肝保健之法。

肝脏胆囊系统诸病

肝肾脾虚阴虚肝郁型急慢性肝炎

【药名】	乙肝宁颗粒
【处方】	黄芪 606g 白花蛇舌草 408g 茵陈 606g 金钱草 408g 党参 490g 蒲公英 408g 制何首乌 490g 牡丹皮 408g 丹参 490g 茯苓 408g 白芍 408g 白术 408g 川楝子 408g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦，或味甘、苦(含乳糖)。
【功能与主治】	补气健脾，活血化痰，清热解毒。用于慢性肝炎属脾气虚弱、血瘀阻络、湿热毒蕴证，症见胁痛、腹胀、乏力、尿黄；对急性肝炎属上述证候者亦有一定疗效。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 3 次；儿童酌减，治疗慢性肝炎者以 3 个月为一个疗程。
【注意】	服药期间忌食油腻、辛辣食物。
【规格】	(1) 每袋装 17g；(2) 每袋装 3g(含乳糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	乙肝养阴活血颗粒
【处方】	地黄，北沙参，麦冬，酒女贞子，五味子，黄芪，当归，制何首乌，白芍，阿胶珠，泽兰，牡蛎，橘红，丹参，川楝子，黄精(蒸)。
【性状】	本品为浅棕色至浅棕褐色的颗粒；味甜、微苦；或味微甜、苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	滋补肝肾，活血化瘀。用于肝肾阴虚型慢性肝炎，症见面色晦暗、头晕耳鸣、五心烦热、腰腿酸软、齿鼻衄血、肋下痞块、赤缕红斑、舌质红少苔、脉沉弦、细涩。
【用法与用量】	水冲服。一次 20g 或一次 10g(无蔗糖)，一日 3 次。
【注意】	忌烟、酒、油腻；肝胆湿热，脾虚气滞者忌用。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	乙肝益气解郁
【处方】	柴胡(醋炙) 62.5g 枳壳 62.5g 白芍 93.75g 橘叶 62.5g 丹参 93.75g 黄芪 125g 党参 75g 桂枝 31.25g 茯苓 93.75g 刺五加 93.75g 瓜蒌 93.75g 法半夏 75g 黄连 31.25g 决明子 93.75g 山楂 93.75g 五味子 62.5g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦；或味微甜、微酸涩、苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	益气化湿，疏肝解郁。用于肝郁脾虚型慢性肝炎，症见胁痛腹胀、痞满纳呆、身倦乏力、大便溏薄、舌质淡暗、舌体肿或有齿痕、舌苔薄白或白腻、脉沉弦或沉缓。
【用法与用量】	开水冲服。一次 20g 或一次 10g(无蔗糖)，一日 3 次。
【注意】	忌烟，酒，油腻；肝胆湿热，邪实证者忌用。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	复方益肝灵胶囊
【处方】	水飞蓟素 30g 五味子 700g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒及粉末；味微苦、涩。
【功能与主治】	益肝滋肾，解毒祛湿。用于肝肾阴虚，湿毒未清所致的胁痛，症见胁痛、纳差、腹胀、腰酸乏力、尿黄；慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒〔规格(1)〕，一次 3 粒〔规格(2)〕，一次 2 粒〔规格(3)〕，一次 1 粒〔规格(4)〕，一日 3 次；饭后服用。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每粒装 0.20g；(2) 每粒装 0.27g；(3) 每粒装 0.36g；(4) 每粒装 0.30g。
【贮藏】	密封，避光保存。

热毒血瘀型赤巴病急慢性黄疸型肝炎胆囊炎

【药名】	十三味榜嘎散
-------------	---------------

【处方】	本品系藏族验方：榜嘎 60g 波棱瓜子 30g 秦艽花 40g 印度獐牙菜 40g 巴夏嘎 40g 苦苣菜 40g 洪连 40g 小檗皮 40g 节裂角茴香 40g 金腰草 30g 人工牛黄 3g 红花 20g 止泻木子 30g。
【性状】	本品为黄绿色的粉末；气微香，味苦、甘。
【功能与主治】	清热解毒，凉肝利胆。用于热性“赤巴”病，胆囊炎，黄疸型肝炎。
【用法与用量】	口服一次 1~1.5g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	片仔癀
【处方】	本品为牛黄、麝香、三七、蛇胆等药味经加工制成的锭剂。
【性状】	本品为类扁椭圆形块状，块上有一椭圆环。表面棕黄色或灰褐色，有密细纹，可见霉斑。质坚硬，难折断。折断面微粗糙，呈棕褐色，色泽均匀，偶见少量菌丝体。粉末呈棕黄色或淡棕黄色，气微香，味苦、甘。
【功能与主治】	清热解毒，凉血化瘀，消肿止痛。用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎，痈疽疔疮，无名肿毒，跌打损伤及各种炎症。
【用法与用量】	口服。一次 0.6g，八岁以下儿童一次 0.15~0.3g，一日 2~3 次；外用研末用冷开水或食醋少许调匀涂在患处（溃疡者可在患处周围涂敷之），一日数次，常保持湿润，或遵医嘱。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	片仔癀胶囊
【处方】	片仔癀 300g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色的颗粒及细粉；气香，味苦、甘。
【功能与主治】	清热解毒，凉血化瘀，消肿止痛。用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎，痈疽疔疮，无名肿毒，跌打损伤及各种炎症。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一至五岁儿童一次 1 粒，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

慢性肝炎早期肝硬化

【药名】	护肝丸
【处方】	柴胡 417.3g 板蓝根 417.3g 猪胆粉 26.7g 茵陈 417.3g 五味子 224g 绿豆 170.7g。
【性状】	本品为褐色至棕褐色的浓缩水丸；味苦、涩。
【功能与主治】	疏肝理气，健脾消食。具有降低转氨酶作用。用于慢性肝炎及早期肝硬化。
【用法与用量】	口服，一次 3g，一日 3 次。
【注意】	无
【规格】	每 50 丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	护肝片
【处方】	柴胡 313g 板蓝根 313g 猪胆粉 20g 茵陈 313g 五味子 168g 绿豆 128g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至褐色；味苦。
【功能与主治】	疏肝理气，健脾消食。具有降低转氨酶作用。用于慢性肝炎及早期肝硬化。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.36g；(2) 薄膜衣片每片重 0.38g；(3) 糖衣片(片心重 0.35g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	护肝胶囊
【处方】	柴胡 313g 板蓝根 313g 猪胆粉 20g 茵陈 313g 五味子 168g 绿豆 128g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至褐色的粉末；味苦。
【功能与主治】	疏肝理气，健脾消食。具有降低转氨酶作用。用于慢性肝炎及早期肝硬化。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封。

肝胆湿热型急慢性黄疸性乙型肝炎胆囊炎

【药名】	护肝宁胶囊
-------------	--------------

【处方】	垂盆草 850g 丹参 250g 虎杖 500g 灵芝 200g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄褐色至棕褐色的颗粒和粉末；味苦、微酸、涩。
【功能与主治】	清热利湿退黄，舒肝化瘀止痛，降低丙氨酸转氨酶。用于湿热中阻、瘀血阻络所致的脘胁胀痛、口苦、黄疸、胸闷、纳呆；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4~5 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每粒装 0.35g。(2) 每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	护肝宁片
【处方】	垂盆草 850g 虎杖 500g 丹参 250g 灵芝 200g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦、微酸、涩。
【功能与主治】	清热利湿退黄，舒肝化瘀止痛，降低丙氨酸转氨酶。用于湿热中阻、瘀血阻络所致的脘胁胀痛、口苦、黄疸、胸闷、纳呆；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4~5 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 糖衣片(片心重 0.27g)；(2) 糖衣片(片心重 0.3g)；(3) 糖衣片(片心重 0.35g)；(4) 薄膜衣片每片重 0.27g；(5) 薄膜衣片每片重 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	当飞利肝宁胶囊
【处方】	水飞蓟 900g 当药 950g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至黄褐色的粉末；味苦。
【功能与主治】	清利湿热，益肝退黄。用于湿热郁蒸所致的黄疸，症见面黄或目黄、口苦尿黄、纳少乏力；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次；小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	忌酒及油腻食物。
【规格】	每粒装 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	双虎清肝颗粒
【处方】	金银花，虎杖，黄连，瓜蒌，白花蛇舌草，蒲公英，丹参，野菊花，紫花地丁，法半夏，麸炒枳实，甘草。
【性状】	本品为棕褐色的颗粒；气香，味微苦。
【功能与主治】	清热利湿，化痰宽中，理气活血。用于湿热内蕴所致的胃脘痞闷、口干不欲饮、恶心厌油、食少纳差、胁肋隐痛、腹部胀满、大便黏滞不爽或臭秽，或身目发黄，舌质暗、边红，舌苔厚腻或腻，脉弦滑或弦数者；慢性乙型肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1~2 袋，一日 2 次；或遵医嘱。
【注意】	脾虚便溏者慎用；忌烟酒及辛辣油腻食物。

【规格】	每袋装 12g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿肝炎颗粒
【处方】	茵陈 120g 栀子(姜炙) 30g 黄芩 60g 黄柏 60g 焦山楂 90g 大豆黄卷 90g 郁金 15g 通草 30g。
【性状】	本品为黄绿色至黄褐色的颗粒；味甜、微苦而涩。
【功能与主治】	清热利湿，解郁止痛。用于肝胆湿热所致的黄疸、胁痛、腹胀、发热、恶心呕吐、食欲减退、身体倦懒、皮肤黄染；黄疸型肝炎或无黄疸型肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一至三岁一次 5~10g，四至七岁一次 10~15g，八至十岁一次 15g，十一岁以上酌增，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	利肝隆颗粒
【处方】	板蓝根 400g 郁金 133g 甘草 133g 黄芪 200g 茵陈 83g 五味子 133g 当归 66.5g 刺五加浸膏 10g。
【性状】	本品为淡棕色至棕色的颗粒，味甜、微苦；或棕黄色至棕黑色的颗粒，气微，味微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	疏肝解郁，清热解郁，益气养血。用于肝郁湿热、气血两虚所致的两胁胀痛或隐痛、乏力、尿黄；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次，小儿酌减。
【注意】	忌烟酒及辛辣油腻食品。
【规格】	(1) 每袋装 10g；(2) 每袋装 3g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	肝炎康复丸
【处方】	茵陈 75g 郁金 75g 板蓝根 75g 当归 75g 菊花 75g 金钱草 75g 丹参 75g 滑石 75g 拳参 75g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的浓缩大蜜丸；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，利湿化郁。用于肝胆湿热所致的黄疸，症见目黄身黄、胁痛乏力、尿黄口苦；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 3 次。
【注意】	忌酒及油腻辛辣食物。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	垂盆草颗粒
【处方】	鲜垂盆草 20000g。

【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甜而苦，或味微甜而苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	清热解毒，活血利湿。用于急慢性肝炎湿热瘀结证。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2~3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每袋装(1)10g；(2)5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	茵山莲颗粒
【处方】	茵陈 556g 半枝莲 1390g 五味子 278g 栀子 278g 甘草 278g 板蓝根 278g。
【性状】	本品为浅棕褐色至棕褐色的颗粒；味苦、略甜。
【功能与主治】	清热解毒利湿。用于湿热蕴毒所致的胁痛、口苦、尿黄、舌苔黄腻、脉弦滑数；急、慢性肝炎，胆囊炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服，一次1~3袋，一日2次；或遵医嘱。
【注意】	忌烟酒及辛辣油腻食物。
【规格】	每袋装3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	茵芪肝复颗粒
【处方】	茵陈，焦栀子，大黄，白花蛇舌草，猪苓，柴胡，当归，黄芪，党参，甘草。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜，微苦。
【功能与主治】	清热解毒利湿，舒肝补脾。用于慢性乙型病毒性肝炎肝胆湿热兼脾虚肝郁证，症见右肋胀满、恶心厌油、纳差食少、口淡乏味。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	孕妇禁服；少数病例可出现恶心，腹泻，一般不影响继续治疗。
【规格】	每袋装18g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	茵栀黄口服液
【处方】	茵陈提取物12g 栀子提取物6.4g 黄芩提取物(以黄芩苷计)40g 金银花提取物8g。
【性状】	本品为棕红色液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，利湿退黄。用于肝胆湿热所致的黄疸，症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日3次。
【注意】	服药期间忌酒及辛辣之品。
【规格】	每支装10ml(含黄芩苷0.4g)。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	茵栀黄软胶囊
【处方】	茵陈提取物40g 栀子提取物21.3g 黄芩提取物(以黄芩苷计)133.3g 金银花

【性状】	提取物 26.67g。 本品为软胶囊，内容物为棕黄色至红棕色的油膏状物；气微香，味涩，微苦。
【功能与主治】	清热解毒，利湿退黄。用于肝胆湿热所致的黄疸，症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒〔规格(1)、(3)〕，或一次 4 粒〔规格(2)〕，一日 3 次。
【注意】	服药期间忌酒及辛辣之品。
【规格】	(1)(2) 每粒装 0.6g；(3) 每粒装 0.65g。
【贮藏】	密封。

【药名】	茵栀黄泡腾片
【处方】	茵陈提取物 60g 栀子提取物 32g 黄芩提取物(以黄芩苷计) 200g 金银花提取物 40g。
【性状】	本品为黄色至棕黄色的片；味微甜。
【功能与主治】	清热解毒，利湿退黄。用于肝胆湿热所致的黄疸，症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	用温开水溶解后服用。一次 2 片，一日 3 次。
【注意】	服药期间忌酒及辛辣之品。
【规格】	每片重 0.6g(含黄芩苷 0.2g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	茵栀黄胶囊
【处方】	茵陈提取物 60g 栀子提取物 32g 黄芩提取物(以黄芩苷计) 200g 金银花提取物 40g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄色或棕黄色的颗粒；气微香，味微苦。
【功能与主治】	清热解毒，利湿退黄。用于肝胆湿热所致的黄疸，症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒〔规格(1)〕，或一次 3 粒〔规格(2)〕，一日 3 次。
【注意】	服药期间忌酒及辛辣之品。
【规格】	(1) 每粒装 0.33g；(2) 每粒装 0.26g。
【贮藏】	密封。

【药名】	茵栀黄颗粒
【处方】	茵陈(绵茵陈)提取物 20g 栀子提取物 10.7g 黄芩提取物(以黄芩苷) 66.7g 金银花提取物 13.3g。
【性状】	本品为黄色至棕黄色的颗粒；味甜，微苦。
【功能与主治】	清热解毒，利湿退黄。用于肝胆湿热所致的黄疸，症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 2 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	茵胆平肝胶囊
【处方】	茵陈 500g 黄芩 100g 栀子 150g 当归 100g 龙胆 400g 猪胆粉 100g 炒白芍 100g 甘草 100g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色的颗粒和粉末；味苦。
【功能与主治】	清热，利湿，退黄。用于肝胆湿热所致的胁痛、口苦、尿黄、身目发黄；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次。
【注意】	胆道完全阻塞者禁服；忌酒及辛辣油腻食物。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	复方益肝丸
【处方】	茵陈，龙胆，蒲公英，垂盆草，苦杏仁，夏枯草，土茯苓，牡丹皮，红花，香附，枳壳，鸡内金，桂枝，柴胡，板蓝根，野菊花，山豆根，蝉蜕，人工牛黄，车前子，胡黄连，丹参，大黄，青皮，槟榔，人参，五味子，炙甘草。
【性状】	本品为棕褐色的浓缩水蜜丸；气香，味苦而后甜。
【功能与主治】	清热利湿，疏肝理脾，化痰散结。用于湿热毒蕴所致的胁肋胀痛、黄疸、口干口苦、苔黄脉弦；急、慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4g，一日 3 次，饭后服用。
【注意】	勿空腹服用；孕妇禁用；忌烟酒及辛辣油腻食物。
【规格】	每瓶装 36g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金有利胆胶囊
【处方】	川西獐牙菜 900g 金钱草 600g 大黄 90g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色的粉末；味微苦。
【功能与主治】	舒肝利胆，清热解毒。用于急、慢性胆囊炎属肝胆湿热证者。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

肝郁气滞脾虚型急慢性肝炎肝痛肝硬化胆囊炎

【药名】	二十五味松石丸
【处方】	本品系藏族验方：松石 50g 珍珠 10g 珊瑚 40g 朱砂 20g 诃子肉 50g 铁屑（诃子制）100g 余甘子 50g 五灵脂膏 40g 檀香 40g 降香 40g 木香 马兜铃 50g 鸭嘴花 50g 牛黄 5g 木香 60g 绿绒蒿 50g 船形乌头 40g 肉豆蔻 20g 丁香 25g 伞梗虎耳草 50g 毛诃子（去核）5g 天竺黄 35g 西红花 5g 木棉花 35g 麝香 0.25g 石灰华 35g。
【性状】	本品为黑色的水丸；气香，味苦、涩。
【功能与主治】	清热解毒，疏肝利胆，化痰。用于肝郁气滞，血瘀，肝中毒，肝痛，肝硬化，肝渗水及各种急、慢性肝炎和胆囊炎。
【用法与用量】	开水泡服，一次 1g，一日 1 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每 4 丸重 1g； (2) 每丸重 1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	七味铁屑丸
【处方】	本品系藏族验方：铁屑（诃子制）250g 北寒水石（奶制）300g 藏木香 150g 木香 100g 甘青资蓝 150g 红花 150g 五灵脂膏 80g。
【性状】	本品为黑色的水丸；气香，味苦。
【功能与主治】	行气活血，平肝清热止痛。用于肝区疼痛，肝脏肿大。
【用法与用量】	口服。一次 1g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每丸重 0.5g； (2) 每丸重 1g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	九味肝泰胶囊
【处方】	三七 80g 郁金 240g 蒺藜 240g 姜黄 80g 酒大黄 128g 黄芩 160g 蜈蚣 224g 山药 720g 五味子 64g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒；气微，味苦。
【功能与主治】	化痰通络，疏肝健脾。用于气滞血瘀兼肝郁脾虚所致的肋肋痛或刺痛，抑郁烦闷，食欲不振，食后腹胀脘痞，大便不调，或胁下痞块。
【用法与用量】	口服，一次 4 粒，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇忌用。
【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	平肝舒络丸
【处方】	柴胡 45g 醋青皮 30g 陈皮 45g 佛手 45g 乌药 45g 醋香附 45g 木香 45g 檀香 45g 丁香 30g 沉香 150g 广藿香 45g 砂仁 45g 豆蔻 45g 姜厚朴 45g 麸炒枳壳 45g 羌活 45g 白芷 45g 铁丝威灵仙(酒炙) 45g 细辛 45g 木瓜 45g 防风 45g 钩藤 45g 炒僵蚕 45g 胆南星(酒炙) 75g 天竺黄 30g 桑寄生 45g 何首乌(黑豆酒炙) 45g 牛膝 45g 川芎 30g 熟地黄 45g 醋龟甲 45g 醋延胡索 45g 乳香(制) 45g 没药(制) 45g 白及 45g 人参 45g 炒白术 45g 茯苓 45g 肉桂 30g 黄连 45g 冰片 45g 朱砂 150g 羚羊角粉 15g。
【性状】	本品为棕红色的大蜜丸；气凉香，味苦、辛。
【功能与主治】	平肝疏络，活血祛风。用于肝气郁结、经络不疏引起的胸胁胀痛、肩背串痛、手足麻木、筋脉拘挛。
【用法与用量】	温黄酒或温开水送服。一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胆宁片
【处方】	大黄，青皮，陈皮，山楂，虎杖，白茅根，郁金。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味甘、苦。
【功能与主治】	疏肝利胆，清热通下。用于肝郁气滞、湿热未清所致的右上腹隐隐作痛、食入作胀、胃纳不香、噎气、便秘；慢性胆囊炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5 片，一日 3 次。饭后服用。
【注意】	服用本品后，如每日排便增至 3 次以上者，应酌情减量。
【规格】	每片重 0.36g。
【贮藏】	密封。

【药名】	慢肝解郁胶囊
【处方】	白芍 41g 柴胡 31g 白术 20g 薄荷 20g 麦芽 136g 川楝子 17g 当归 31g 三棱 10g 茯苓 31g 甘草 20g 丹参 85g 香橼 68g 延胡索 34g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕色的粉末；气辛，味微苦。
【功能与主治】	疏肝解郁，健脾养血。用于肝郁脾虚所致的肝区胀痛，胸闷不舒，食欲不振，腹胀便溏者；迁延性肝炎或慢性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	澳泰乐颗粒
【处方】	返魂草，郁金，黄精，白芍，麦芽。
【性状】	本品为浅棕黄色至棕褐色的颗粒，味甜或味微甜。
【功能与主治】	舒肝理气、清热解毒。用于肝郁毒蕴所致的胁肋胀痛、口苦纳呆、乏力；

【用法与用量】	慢性肝炎见上述证候者。
【注意】	口服。一次1袋，一日3次。
【规格】	忌酒及辛辣油腻食物。
【贮藏】	(1)每袋装15g；(2)每袋装5g。
	密封。

肝胆湿热型胆胀尿黄胆囊炎胆结石

【药名】	乌军治胆片
【处方】	乌梅，佛手，牛至，甘草，威灵仙，大黄，枳实，栀子，槟榔，姜黄。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅黄棕色至棕褐色；味微苦。
【功能与主治】	疏肝解郁，利胆排石，泄热止痛。用于肝胆湿热所致的胁痛、胆胀，症见肋肋胀痛、发热、尿黄；胆囊炎、胆道感染或胆道术后见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日3次。
【注意】	孕妇慎用；忌烟酒及辛辣油腻食物。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.32g；(2)糖衣片片心重0.31g。
【贮藏】	密封。

【药名】	利胆排石片
【处方】	金钱草250g 黄芩75g 郁金75g 槟榔125g 芒硝25g 茵陈250g 木香75g 大黄125g 麸炒枳实50g 姜厚朴50g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦、咸。
【功能与主治】	清热利湿，利胆排石。用于湿热蕴毒、腑气不通所致的胁痛、胆胀，症见肋肋胀痛、发热、尿黄、大便不通；胆囊炎、胆石症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。排石：一次6~10片，一日2次。炎症：一次4~6片，一日2次。
【注意】	体弱、肝功能不良者慎用；孕妇禁用。

【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	利胆排石颗粒
【处方】	金钱草 420g 黄芩 126g 郁金 126g 槟榔 210g 芒硝 42g 茵陈 420g 木香 126g 大黄 210g 麸炒枳实 84g 姜厚朴 84g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味苦、咸。
【功能与主治】	清热利湿，利胆排石。用于湿热蕴毒、腑气不通所致的胁痛、胆胀，症见胁肋胀痛、发热、尿黄、大便不通；胆囊炎、胆石症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。排石：一次 2 袋，一日 2 次；炎症：一次 1 袋，一日 2 次。
【注意】	体弱、肝功能不良者慎用；孕妇禁用。
【规格】	每袋装 3g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	胆石通胶囊
【处方】	蒲公英，水线草，绵茵陈，广金钱草，溪黄草，大黄，枳壳，柴胡，黄芩，鹅胆粉。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄褐色至棕褐色的粉末；味略咸、微苦。
【功能与主治】	清热利湿，利胆排石。用于肝胆湿热所致的胁痛、胆胀，症见右肋胀痛、痞满呕恶、尿黄口苦；胆石症、胆囊炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎服。严重消化道溃疡、心脏病及重症肌无力者忌服。忌烟酒及辛辣油腻食物。
【规格】	每粒装 0.65g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胆乐胶囊
【处方】	猪胆汁酸 75g 陈皮 75g 南山楂 600g 郁金 240g 连钱草 600g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕色的粉末；味苦。
【功能与主治】	理气止痛，利胆排石。用于肝郁气滞所致的胁痛、胆胀，症见胁肋胀痛、纳呆尿黄；慢性胆囊炎、胆石症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	胆康胶囊
【处方】	柴胡 180g 蒲公英 360g 大黄 150g 郁金 180g 茵陈 380g 人工牛黄 40g 栀子 290g 薄荷素油 2g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的粉末；气香，味苦。
【功能与主治】	舒肝利胆，清热解毒，理气止痛。用于急、慢性胆囊炎，胆道结石。

【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次；30日为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.38g。
【贮藏】	密封。

【药名】	舒胆胶囊
【处方】	大黄172g 枳实215g 栀子215g 黄芩172g 茵陈215g 金钱草430g 柴胡172g 延胡索189g 木香215g 薄荷脑1g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的粉末；味微苦涩、辛凉。
【功能与主治】	疏肝利胆止痛，清热解毒排石。用于胆囊炎、胆管炎、胆道术后感染及胆道结石属湿热蕴结、肝胆气滞证候者。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日4次。
【注意】	寒湿困脾、脾虚便溏者慎用。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

肝胆湿热型口苦热淋湿热带下黄疸耳鸣耳聋头晕

【药名】	龙胆泻肝丸
【处方】	同龙胆泻肝丸(水丸)。
【性状】	本品为黄褐色的小蜜丸或大蜜丸；味苦、微甜。
【功能与主治】	清肝胆，利湿热。用于肝胆湿热，头晕目赤，耳鸣耳聋，耳肿疼痛，胁痛口苦，尿赤涩痛，湿热带下。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次6~12g(30~60丸)，大蜜丸一次1~2丸，一日2次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)小蜜丸每100丸重20g；(2)大蜜丸每丸重6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	龙胆泻肝丸(水丸)
【处方】	龙胆120g 黄芩60g 泽泻120g 盐车前子60g 地黄120g 柴胡120g 栀子(炒)60g 木通60g 酒当归60g 炙甘草60g。
【性状】	本品为暗黄色的水丸；味苦。
【功能与主治】	清肝胆，利湿热。用于肝胆湿热，头晕目赤，耳鸣耳聋，耳肿疼痛，胁痛口苦，尿赤涩痛，湿热带下。
【用法与用量】	口服。一次3~6g，一日2次。

【注意】	孕妇慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	青叶胆片
【处方】	青叶胆 1570g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕绿色；味苦。
【功能与主治】	清肝利胆，清热利湿。用于黄疸尿赤，热淋涩痛。
【用法与用量】	口服。一次4~5片，一日4次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	泻青丸
【处方】	龙胆 50g 酒大黄 50g 防风 50g 羌活 50g 栀子 50g 川芎 75g 当归 50g 青黛 25g。
【性状】	本品为黑褐色的大蜜丸或水蜜丸；味苦。
【功能与主治】	清肝泻火。用于肝火上炎所致耳鸣耳聋，口苦头晕，两肋疼痛，小便赤涩。
【用法与用量】	口服，水蜜丸一次7g，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	水蜜丸每100丸重10g；大蜜丸每丸重10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清肝利胆口服液
【处方】	茵陈，山银花，栀子，厚朴，防己。
【性状】	本品为棕红色澄明液体；味苦、甜。
【功能与主治】	清利肝胆湿热。用于湿热蕴结肝胆所致的纳呆、胁痛、疲倦、乏力、尿黄、苔腻、脉弦。
【用法与用量】	口服。一次20~30ml，一日2次，10天为一疗程。
【注意】	忌烟酒及辛辣油腻食物。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	避光，密封，置阴凉处。

【药名】	清肝利胆胶囊
【处方】	茵陈，山银花，栀子，厚朴，防己。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至黑褐色的粉末；味苦。
【功能与主治】	清利肝胆湿热。用于湿热蕴结肝胆所致的纳呆、胁痛、疲倦、乏力、尿黄、苔腻、脉弦。
【用法与用量】	口服。一次4~6粒，一日2次，10天为一疗程。
【注意】	忌烟酒及辛辣油腻食物。
【规格】	每粒装0.35g。

【贮藏】	密封。
-------------	-----

【药名】	消炎利胆片
【处方】	穿心莲 868g 溪黄草 868g 苦木 868g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显灰绿色至褐绿色；味苦。
【功能与主治】	清热，祛湿，利胆。用于肝胆湿热所致的胁痛、口苦；急性胆囊炎、胆管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次6片〔规格(1)、(3)〕或3片〔规格(2)〕，一日3次。
【注意】	服药期间忌烟酒及油腻厚味食物。
【规格】	(1)薄膜衣小片(0.26g，相当于饮片2.6g)；(2)薄膜衣大片(0.52g，相当于饮片5.2g)；(3)糖衣片(片心重0.25g，相当于饮片2.6g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	黄疸肝炎丸
【处方】	茵陈 64g 滇柴胡 48g 炒栀子 48g 青叶胆 16g 醋延胡索 48g 郁金(醋炙) 32g 醋香附 48g 麸炒枳壳 48g 槟榔 48g 青皮 32g 佛手 32g 酒白芍 64g 甘草 16g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的大蜜丸，味苦、微甜。
【功能与主治】	舒肝理气，利胆退黄。用于肝气不舒、湿热蕴结所致的黄疸，症见皮肤黄染、胸胁胀痛、小便短赤；急性肝炎、胆囊炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1~2丸，一日3次。
【注意】	孕妇、肝硬化及脾胃虚寒者慎用。
【规格】	每丸重9g。
【贮藏】	密封。

肝气不舒型胸胁痞闷疼痛食滞不清呕吐酸水

【药名】	柴胡舒肝丸
【处方】	茯苓 100g 麸炒枳壳 50g 豆蔻 40g 酒白芍 50g 甘草 50g 醋香附 75g 陈皮 50g 桔梗 50g 姜厚朴 50g 炒山楂 50g 防风 50g 六神曲(炒) 50g 柴胡 75g 黄芩 50g 薄荷 50g 紫苏梗 75g 木香 25g 炒槟榔 75g 醋三棱 50g 酒大黄 50g 青皮(炒) 50g 当归 50g 姜半夏 75g 乌药 50g 醋莪术 50g。
【性状】	本品为黑褐色的小蜜丸或大蜜丸，味甜而苦。
【功能与主治】	舒肝理气，消胀止痛。用于肝气不舒，胸胁痞闷，食滞不清，呕吐酸水。

【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 10g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)小蜜丸每 100 丸重 20g；(2)大蜜丸每丸重 10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	舒肝丸
【处方】	川楝子 150g 白芍(酒炒)120g 木香 80g 豆蔻 60g 姜厚朴 60g 醋延胡索 100g 片姜黄 100g 沉香 100g 砂仁 80g 陈皮 80g 枳壳(炒) 100g 茯苓 100g 朱砂 27g。
【性状】	本品为棕红色至棕色的水蜜丸、小蜜丸、大蜜丸或水丸；气微，味甘、后微苦。
【功能与主治】	舒肝和胃，理气止痛。用于肝郁气滞，胸胁胀满，胃脘疼痛，嘈杂呕吐，暖气泛酸。
【用法与用量】	口服。水丸一次 2.3g，水蜜丸一次 4g，小蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	水丸每 20 丸重 1.3g；水蜜丸每 100 丸重 20g；小蜜丸每 100 丸重 20g；大蜜丸每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

中医对于心脏系统的研究和诊断

心脏

心居于胸中，两肺之间，膈膜之上，内部有孔窍相通，外部有心包护卫。心的形态在《类经图翼·经络一》中有所描述：“心象尖圆，形如莲蕊。”心在五行中属火，为阳中之太阳，通于夏气。心的主要功能有二：一是推动血液运行，二是主管生命以及精神活动。前人对此概括为“主血脉”和“藏神”。正如明·李梴《医学入门》所说：“有血肉之心……有神明之心。”这两方面的功能是由心气、心血、心阴、心阳的共同作用而完成的。心的系统联系是在体合脉，其华在面，开窍于舌，在液为汗，在志为喜。心通过经脉的相互络属，与小肠构成表里关系。心在脏腑中位居首要地位，起主要作用，所以被喻为“君主之官”，又称为“五脏六腑之大主”。

心的主要生理

主血脉：心脏推动血液运行的功能称为主血脉。人体的血液，运行于血脉之中，依赖心脏的搏动而循环不已，故《素问·五藏生成》说：“诸血者，皆属于心。”《诸病源候论》也说：“心主血，血之行身，通遍经络，循环腑脏。”清·周学海《读医随笔》则说得更为具体透彻：“凡人周身百脉之血，发源于心，亦归宿于心，循环不已。”所以血液循环的动力在于心脏。

中医学还认为心脏与血液的生成有关，即脾胃化生的水谷精微上输于心肺，经心阴(火)的温煦变化而赤成为血液，所以《素问·阴阳应象大论》又说：“心生血”。心脏的正常

搏动要依靠心气、心阳的推动和温煦，以及心血、心阴的营养和滋润，才能维持正常的心脏活动，从而保障血液在全身的正常循行。心脏推动血液运行功能正常，则心之阳气旺盛；阳血充盛，心搏均匀和顺，血脉通利，血行周身，表现为面色红润光泽、舌色淡红荣润、脉象和缓有力、心胸畅达而无不适之感。如若心血不足，血液亏少，则血脉空虚，表现为面色无华、舌质淡白、脉象细弱无力、心胸动悸等；若心气不足，行血无力，脉道不利，血行不畅，则血脉瘀阻，表现为面色晦暗、唇舌青紫、脉象涩滞或节律不齐、心胸憋闷或刺痛，轻者少顷即止，重者可痛至面青、唇舌俱紫、大汗淋漓，甚至可致暴亡。所以中医临床上常从面色、舌色、脉象和心胸部感觉等方面来观察心脏推动血液运行的功能正常与否。

主藏神：心藏神指心脏具有主管生命和精神活动的功能，又称“心主神明”。神包括生理和心理活动，如人的形象、面色、眼神、言语、应答、肢体姿态和人的精神、意识、思维活动等等，这些活动都由心主宰。所以《素问·灵兰秘典论》说：“心者，君主之官，神明出焉。”《灵枢·邪客》又说：“心者，五脏六腑之大主也，精神之所舍也”。心之所以能主神明，是以心血为基础的。血是神的主要物质基础，神是血液的功能表现，故《灵枢·营卫生会》说：“血者，神气也”。

心主藏神，其表现在心脏主宰人体脏腑组织的一切生理活动，心之行血、肺之呼吸、脾之运化、肝之疏泄、肾之藏精、胃之受纳、小肠之化物、大肠之传导以及人的动、言、视、听、嗅等等，所有的生命活动都是在心的主宰下进行的。心神正常，人体脏腑组织的各项功能活动便有所主，并相互协调，彼此合作，保证了生命活动健康有序，身体安泰无恙。

其二表现在心主宰人体的心理活动，主要是人体的精神意识思维活动，如《孟子·告子上》中说：“心之官则思。”说明心在思维活动中的重要作用。心还能主宰情感活动，如张介宾在《类经》中说：“心为五脏六腑之大主，而总统魂魄，兼该志意，故忧动于心则肺应，思动于心则脾应，怒动于心则肝应，恐动于心则肾应；此所以五志惟心所使也。”又说：“情志之伤，虽五脏各有所属，然求其所由，则无不从心而发。”心主神明正常，则精神饱满、意识清楚、思维敏捷、反应灵敏、七情调和、寤寐正常。若心血不足，则心神失养，导致神志不宁，可见心悸失眠、多梦健忘以及精神萎靡、反应迟钝等；若血热扰心，则神失所主，导致神志失常，可见神昏、谵语、狂躁不安等，说明心主神明的功能正常与否，直接关系到全身脏腑的治与乱，决定着人体生命的存与亡，故《素问·移精变气论》说“得神者昌，失神者亡。”

心主血和心藏神的两种功能是密切相关的。心主血，为心藏神提供了物质基础。心藏神，则能主宰人体脏腑组织的功能和血的正常循行。所以在病理情况下两者常相互影响。如果心血不足，心神失养，则可出现精神恍惚、心悸烦躁、失眠多梦等心神失常之症；心神的异常，也可以影响到心主血的功能，如在精神过度紧张或惊恐等情况下，常见心跳和脉搏加快，每兼面红或面色苍白等血行异常的表现。

心的系统联系

心脏的主要系统联系体现在体、华、窍、液、志五方面。

心在体合脉，其华在面：体，即形体。而形体有广义和狭义之分。广义的形体，泛指有形态结构的组织器官，如五官、躯干、四肢、脏腑等等。而狭义的形体是指筋、脉、肉、皮、骨五者，故又称为“五体”，是指形体的五个层次。五脏主五体是指筋、脉、肉、皮、骨分别与五脏有某种特定的对应关系，即心在体合脉，肺在体合皮，脾在体合肉，肝在体合筋，肾在体合骨。所谓心在体合脉，是指全身的血脉与心连通，并与心脏配合，共同完成推动血液循行的功能。脉是“五体”之一，又为“奇恒之腑”之一。

华，有荣华、光彩的意思。“华”有五，即爪、面、唇、毛、发五者，合称“五华”，是指五脏的精气表现在体表的五个特定部位。五脏之华分别是心其华在面，肺其华在毛，脾其华在唇，肝其华在爪，肾其华在发。所谓心其华在面，是指心的生理功能正常与否，可以显露在面部的色泽变化上。心主血，面部血脉丰富，全身气血皆可上注于面；心属火，火性上炎，旺于面部；加之面部皮肤易于观察，所以面部色泽能够反映出心气的盛衰和心血的盈亏；此外面部表情反映了心主神志活动状况。故曰心“其华在面”。

心脏的功能健全，心气旺盛，心血充盈，则血脉通盛，面得血荣，可见脉象和缓有力、面色红润光泽、表情丰富自然；若心血瘀阻，则脉象细涩或脉结、代，可见面色青紫晦暗；若心血亏少，则血脉空虚，面失血荣，则表现为脉象细弱、面色淡白无华；若心气暴脱，则表现为脉微欲绝、面色苍白或暗涩。

心开窍于舌：窍，即孔窍，包括头面的眼、耳、口、鼻、舌五官及下窍二阴，合称为九窍。由于五脏与官窍之间有某种特定的对应关系，所以将与某个脏器有特定对应关系的官窍称为该脏所“开”的窍。五脏所“开”的窍分别是心开窍于舌，肺开窍于鼻，脾开宜于口，肝开窍于目，肾开窍于耳及二阴。舌是口腔中随意运动的器官，位于口腔底部，具有感受味觉、搅拌食物、辅助吞咽和发音等功能。心开窍于舌，又称“舌为心之苗”，是指舌为心之外候。在结构上，手少阴心经及别络联系于舌，如《灵枢·经脉》说：“手少阴之别…系舌本。”在生理功能方面，心主血脉和主神志与舌的色泽、运动、味觉、语言表达有关，而心之气血上通并营养于舌，所以《素问·阴阳应象大论》说：“心主舌…在窍为舌。”《灵枢·脉度》说：“心气通于舌，心和则舌能知五味矣。”舌是一个血脉极其丰富的器官，加之舌面又无表皮覆盖，因此舌色最能敏感地反映心主血的生理状态。心推动血液运行和心藏神的功能正常，则表现为舌体红活荣润、柔软灵活、味觉灵敏、语言流利清晰。若心阳不足，则舌质淡而胖嫩；心血不足，则舌质淡白；心阴不足，则舌红瘦瘪；心火上炎，则舌尖红赤或舌体糜烂；心血瘀阻，则舌质紫暗或见瘀点瘀斑；心神失常，则舌卷、舌强、语蹇或失语等。

舌不但与心之关系密切，舌和五脏均有关联，通过望舌亦可有助于对其他脏腑病变的诊断。

心在液为汗：液，是指泪、汗、涎、涕、唾五者，乃体表孔窍所分泌的正常液体。五脏与五液之间有某种特定的对应关系，故将与某脏有特定关系的液体称为该脏所主的“液”。其分别是心在液为汗，肺在液为涕，脾在液为涎，肝在液为泪，肾在液为唾。心在液为汗，

又称汗为“心之液”，是指心与汗有密切的关系。《素问·阴阳别论》说：“阳加于阴谓之汗。”即是说体内的阳气蒸发阴津于体表，从汗孔排出而形成汗液。汗液的分泌和排泄有调节体温，保持阴液与阳气的平衡，排出废物与邪气，以及润泽皮肤的作用。由于汗为津液所化，血液与津液同源源于脾胃化生的水谷精微，相互间又可相互转化，故有“血汗同源”之说。而血又为心所主，故有“汗为心之液”之说。正如明·李中梓《医宗必读》所说：“心之所藏，在内者为血，在外者为汗，汗者心之液也。”若心之阳气虚，则因气虚不能固摄而见自汗；心之阴血虚，则因阴虚内热不能内守而盗汗。然而汗液的排泄是比较复杂的，不仅与心关系密切，还与肺的宣发和卫气司开合的功能相关。

心在志为喜：志，即情志、情感，是人对客观外界刺激所表现的情绪反映。情感变化主要有喜、怒、思、悲(忧)、恐(惊)，常称为“五志”，因为五胃与五志间有某种特定的对应关系，故将与某脏有对应关系的情感活动称为该脏所主的“志”，其分别是心在志为喜，肺在志为悲为忧，脾在志为思，肝在志为怒，肾在志为惊为恐。

喜，即欢喜、喜悦，是心情愉快的情感活动。人体保持喜悦的心情，可使气血和调，营卫通畅，全身舒适，对健康大裨益。故《素问·举痛论》说：“喜则气和志达，营卫通利。”心在志为喜，是指心的生理功能与喜的情志活动有关。心之功能正常，则情志安和，欢喜适度，身心健康。若喜乐过度，则可使心神涣散不收、注意力难以集中，反而损伤心神，重者可见精神错乱，甚或心气暴脱而亡等；若心气逆乱，则喜笑不休；若心气不足，则令人悲伤等。

心脏系统诸病

瘀血痰瘀闭阻型胸痛心悸眩晕冠心病心绞痛

【药名】	丹七片
【处方】	丹参 250g 三七 250g。
【性状】	本品为浅黄棕色的片；糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅黄棕色；气微，味微苦、甜。
【功能与主治】	活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血闭阻所致的胸痹心痛，眩晕头痛，经期腹痛。
【用法与用量】	口服。一次 3~5 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	(1) 素片每片重 0.3g；(2) 薄膜衣片每片重 0.32g；(3) 糖衣片片心重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	双丹口服液
【处方】	丹参 600g 牡丹皮 300g。

【性状】	本品为红棕色的液体；味辛、微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血痹阻所致的胸痹，症见胸闷、心痛。
【用法与用量】	口服。一次 20ml，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	通窍镇痛散
【处方】	石菖蒲 125g 郁金 125g 荜茇 125g 醋香附 125g 木香 125g 丁香 125g 檀香 125g 沉香 125g 苏合香 125g 安息香 125g 冰片 37.5g 乳香 125g。
【性状】	本品为棕色至深棕色的粉末；气香，味微苦、辛。
【功能与主治】	行气活血，通窍止痛。用于痰瘀闭阻，心胸憋闷疼痛，或中恶气闭，霍乱，吐泻。
【用法与用量】	姜汤或温开水送服。一次 3g，一日 2 次。
【注意】	孕妇禁用；忌气恼，辛辣食物。
【规格】	每瓶装 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	丹参片
【处方】	丹参 1000g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色，味微苦、涩。
【功能与主治】	活血化瘀。用于瘀血闭阻所致的胸痹，症见胸部疼痛、痛处固定、舌质紫暗，冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

瘀血阻络型冠心病高血压高血脂动脉硬化

【药名】	心血宁片
【处方】	葛根提取物 150g 山楂提取物 25g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色至黑棕色；味苦、涩。
【功能与主治】	活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻络引起的胸痹，心痛，眩晕；冠心病心绞痛，高血压，高脂血症等见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)糖衣片，片心重 0.2g；(2)薄膜衣片，每片重 0.21g。
【贮藏】	密封。

【药名】	心血宁胶囊
【处方】	葛根提取物 300g 山楂提取物 50g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕色至黑褐色的颗粒及粉末；味苦、涩。
【功能与主治】	活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻络引起的胸痹，心痛，眩晕；冠心病心绞痛，高血压，高脂血症等见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	心脑宁胶囊
【处方】	银杏叶 400g 小叶黄杨 400g 丹参 400g 大果木姜子 400g 薤白 400g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末或颗粒；气香，味辛而后苦。
【功能与主治】	活血行气，通络止痛。用于气滞血瘀的胸痹，头痛，眩晕，症见胸闷刺痛，心悸不宁，头晕目眩；冠心病、脑动脉硬化见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装 0.45g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	心脑康片
【处方】	丹参 40g 制何首乌 30g 赤芍 30g 枸杞子 30g 葛根 30g 川芎 30g 红花 20g 泽泻 30g 牛膝 30g 地龙 30g 郁金 3g 远志(蜜炙) 30g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色；味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，通窍止痛。用于瘀血阻络所致的胸痹、眩晕，症见胸闷、心前区刺痛、眩晕、头痛；冠心病心绞痛、脑动脉硬化见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每片重 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	心脑康胶囊
【处方】	丹参 40g 赤芍 30g 葛根 30g 红花 20g 牛膝 30g 郁金 3g 九节菖蒲 30g 鹿心粉 30g 制何首乌 30g 枸杞子 30g 川芎 30g 泽泻 30g 地龙 30g 远志(蜜炙) 30g 炒酸枣仁 20g 甘草 20g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至深棕色的颗粒和粉末；味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，通窍止痛。用于瘀血阻络所致的胸痹、眩晕，症见胸闷、心前区刺痛、眩晕、头痛；冠心病心绞痛、脑动脉硬化见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。

【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每粒装 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	脑心清片
【处方】	柿叶提取物 50g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至褐色，味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，通络。用于脉络瘀阻，眩晕头痛，肢体麻木，胸痹心痛，胸中憋闷，心悸气短；冠心病、脑动脉硬化症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2~4 片〔规格(1)〕或一次 1~2 片〔规格(2)〕，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每片重 0.41g(含柿叶提取物 50mg)；(2) 每片重 0.41g(含柿叶提取物 100mg)。
【贮藏】	密封。

【药名】	益心酮片
【处方】	山楂叶提取物 32g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅棕色；气特异，味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，宣通血脉。用于瘀血阻脉所致的胸痹，症见胸闷憋气、心前区刺痛、心悸健忘、眩晕耳鸣；冠心病心绞痛、高脂血症、脑动脉供血不足见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每片含山楂叶提取物 32mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	银杏叶片
【处方】	银杏叶提取物 40g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅棕黄色至棕褐色；味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语蹇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述证候者。
【用法与用量】	口服。〔规格(1)〕一次 2 片、〔规格(2)〕一次 1 片，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每片含总黄酮醇苷 9.6mg、萜类内酯 2.4mg； (2) 每片含总黄酮醇苷 19.2mg、萜类内酯 4.8mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	银杏叶胶囊
【处方】	银杏叶提取物 40g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕黄色至棕褐色的粉末或颗粒和粉末；味微苦。

【功能与主治】	活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语蹇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述证候者。
【用法与用量】	口服。〔规格(1)〕一次2粒或一次1粒〔规格(2)〕，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每粒含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg； (2) 每粒含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg； (3) 每粒装0.25g(含总黄酮醇苷40mg、萜类内酯10mg)。
【贮藏】	密封。

【药名】	银杏叶滴丸
【处方】	银杏叶提取物16g。
【性状】	本品为棕褐色的滴丸或薄膜衣滴丸，除去包衣后显棕褐色；味苦。
【功能与主治】	活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语蹇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5丸，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每丸重60mg；(2) 薄膜衣丸每丸重63mg。
【贮藏】	密封，避光。

【药名】	舒胸片
【处方】	三七100g 红花100g 川芎200g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显褐色；气微，味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻滞所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5片，一日3次。
【注意】	孕妇慎用；热证所致瘀血忌用。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重0.25g；(2) 薄膜衣片每片重0.31g；(3) 糖衣片(片心重0.25g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	舒胸片胶囊
【处方】	三七166.7g 红花166.7g 川芎333.3g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气微，味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻滞所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次。
【注意】	孕妇慎用；热证所致瘀血忌用。
【规格】	每粒装0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	舒胸片颗粒
【处方】	三七 166.7g 红花 166.7g 川芎 333.3g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微，味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻滞所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3袋，一日3次。
【注意】	孕妇慎用；热证所致瘀血忌用。
【规格】	(1)每袋装1g；(2)每袋装2g；(3)每袋装3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	精制冠心口服液
【处方】	丹参 456g 赤芍 228g 川芎 228g 红花 228g 降香 152g。
【性状】	本品为棕褐色的液体；味微甜、微苦。
【功能与主治】	活血化瘀。用于瘀血内停所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	精制冠心片
【处方】	丹参 375g 赤芍 187.5g 川芎 187.5g 红花 187.5g 降香 125g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；气微香，味微苦、辛。
【功能与主治】	活血化瘀。用于瘀血内停所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次6~8片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片 (1)每片重0.32g；(2)每片重0.35g；(3)每片重0.38g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	精制冠心软胶囊
【处方】	丹参 562.5g 赤芍 281.3g 川芎 281.3g 红花 281.3g 降香 187.5g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为含有棕黄色至棕褐色悬浮浸膏的油状物；气微香，味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀。用于瘀血内停所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4~5粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	精制冠心颗粒
【处方】	丹参 351g 赤芍 175g 川芎 175g 红花 175g 降香 117g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味微甜、微苦。
【功能与主治】	活血化瘀。用于瘀血内停所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 13g。
【贮藏】	密封。

气滞血瘀型胸痛心悸眩晕心慌气短心绞痛

【药名】	山玫胶囊
【处方】	山楂叶，刺玫果。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的粉末；味微苦、酸、涩。
【功能与主治】	益气化瘀。用于冠心病、动脉硬化气滞血瘀证，症见胸痛、痛有定处、胸闷憋气，或眩晕、心悸、短、乏力、舌质紫暗。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每粒装 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	血府逐瘀口服液
【处方】	柴胡 17g 地黄 50g 红花 50g 麸炒枳壳 33g 川芎 25g 桔梗 25g 当归 50g 赤芍 33g 桃仁 67g 甘草 17g 牛膝 50g。
【性状】	本品为棕红色的液体；味甜、苦、微辛辣。
【功能与主治】	活血祛瘀，行气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹、头痛日久、痛如针刺而有定处、内热烦闷、心悸失眠、急躁易怒。
【用法与用量】	空腹服。一次 20ml，一日 3 次。

【注意】	忌食辛冷食物。孕妇禁用。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	血府逐瘀丸
【处方】	柴胡 50g 地黄 150g 红花 150g 麸炒枳壳 100g 川芎 75g 桔梗 75g 当归 150g 赤芍 100g 桃仁 200g 甘草 50g 牛膝 150g。
【性状】	本品为褐色的大蜜丸；味甜、辛。
【功能与主治】	活血祛瘀，行气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹、头痛日久、痛如针刺而有定处、内热烦闷、心悸失眠、急躁易怒。
【用法与用量】	空腹时用红糖水送服。一次 1~2 丸。一日 2 次。
【注意】	忌食辛冷食物。孕妇禁用。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	血府逐瘀胶囊
【处方】	柴胡 27g 地黄 81g 红花 81g 当归 81g 赤芍 54g 炒桃仁 108g 麸炒枳壳 54g 甘草 27g 川芎 40g 牛膝 81g 桔梗 40g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气辛，味微苦。
【功能与主治】	活血祛瘀，行气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹、头痛日久、痛如针刺而有定处、内热烦闷、心悸失眠、急躁易怒。
【用法与用量】	口服。一次 6 粒，一日 2 次；1 个月为一个疗程。
【注意】	忌食辛冷食物；孕妇禁用。
【规格】	每粒装 0.4g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	复方血栓通胶囊
【处方】	三七 250g 黄芪 80g 丹参 50g 玄参 80g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰黄色至灰褐色的粉末；味苦、微甘。
【功能与主治】	活血化瘀，益气养阴。用于血瘀兼气阴两虚证的视网膜静脉阻塞，症见视力下降或视觉异常、眼底瘀血征象、神疲乏力、咽干、口干；以及用于血瘀兼气阴两虚的稳定性劳累型心绞痛，症见胸闷、胸痛、心悸、心慌、气短、乏力、心烦、口干。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	麝香保心丸
【处方】	人工麝香，人参提取物，人工牛黄，肉桂，苏合香，蟾酥，冰片。
【性状】	本品为黑褐色有光泽的水丸，破碎后断面为棕黄色；味苦、辛凉，有麻舌

<p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>感。</p> <p>芳香温通，益气强心。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见心前区疼痛、固定不移；心肌缺血所致的心绞痛、心肌梗死见上述证候者。</p> <p>口服。一次1~2丸，一日3次；或症状发作时服用。</p> <p>孕妇禁用。</p> <p>每丸重22.5mg。</p> <p>密封。</p>
--	---

气滞血瘀型冠心病心绞痛胸闷刺痛

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>复方丹参丸</p> <p>丹参 1350g 三七 423g 冰片 24g。</p> <p>本品为包衣的浓缩水丸，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；气芳香，味微苦。</p> <p>活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。</p> <p>口服。一次1g〔规格(1)〕或一次0.7g规格(2)〕，一日3次。</p> <p>孕妇慎用。</p> <p>(1)每1g相当于生药量1.80g；(2)每1g相当于生药量2.57g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p>	<p>复方丹参片</p> <p>丹参 450g 三七 141g 冰片 8g。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；气芳香，味微苦。</p> <p>活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。</p>
--	--

【用法与用量】	口服，一次3片〔规格(1)(3)〕或1片〔规格(2)〕，一日3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)薄膜衣小片每片重0.32g(相当于饮片0.6g)；(2)薄膜衣大片每片重0.8g(相当于饮片1.8g)；(3)糖衣片(相当于饮片0.6g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方丹参胶囊
【处方】	丹参450g 三七141g 冰片8g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气芳香，味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方丹参喷雾剂(复方丹参气雾剂)
【处方】	丹参464g 三七145.4g 冰片8.25g。
【性状】	本品为红橙色至红褐色的澄明液体；气芳香，味苦而后甜。
【功能与主治】	活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口腔喷射，吸入。一次喷1~2下，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)每瓶装8ml；(2)每瓶装10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方丹参颗粒
【处方】	丹参1350g 三七423g 冰片24g。
【性状】	本品为薄膜衣颗粒，研碎后显棕色至棕褐色；气芳香，味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每袋装1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方丹参滴丸
【处方】	丹参，三七，冰片。
【性状】	本品为棕色的滴丸，或为薄膜衣滴丸，除去包衣后显黄棕色至棕色；气香，味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；

<p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>冠心病心绞痛见上述证候者。</p> <p>吞服或舌下含服。一次10丸，一日3次。28天为一个疗程；或遵医嘱。</p> <p>孕妇慎用。</p> <p>(1)每丸重25mg；(2)薄膜衣滴丸每丸重27mg。</p> <p>密封。</p>
--	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>冠心丹参片</p> <p>丹参200g 三七200g 降香油1.75ml。</p> <p>本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气微香、味甘、微苦。</p> <p>活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸闷、胸痹、心悸、气短；冠心病见上述证候者。</p> <p>口服。一次3片，一日3次。</p> <p>无。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>冠心丹参胶囊</p> <p>丹参200g 三七200g 降香油1.75ml。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味甘、苦，</p> <p>活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸闷、胸痹、心悸、气短；冠心病见上述证候者。</p> <p>口服，一次3粒，一日3次。</p> <p>无。</p> <p>每粒装0.3g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>速效救心丸</p> <p>川芎，冰片。</p> <p>本品为棕黄色的滴丸，气凉，味微苦。</p> <p>行气活血，祛瘀止痛，增加冠脉血流量，缓解心绞痛。用于气滞血瘀型冠心病，心绞痛。</p> <p>含服。一次4~6丸，一日3次；急性发作时，一次10~15丸。</p> <p>孕妇禁用，寒凝血瘀、阴虚血瘀胸痹心痛不宜单用。有过敏史者慎用。伴有中重度心力衰竭的心肌缺血者慎用。在治疗期间，心绞痛持续发作，宜加用硝酸酯类药物。</p> <p>每丸重40mg。</p> <p>密封，置阴凉干燥处。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p>	<p>活血通脉片</p> <p>鸡血藤91g 桃仁18g 丹参91g 赤芍45g 红花36g 降香36g 郁金45g 三七</p>
---------------------------------------	--

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>91g 川芎 27g 陈皮 91g 木香 36g 石菖蒲 45g 枸杞子 91g 酒黄精 182g 人参 45g 麦冬 91g 冰片 9g。</p> <p>本品为黄褐色至棕褐色的素片、糖衣片或薄膜衣片，包衣片除去包衣后显黄褐色至棕褐色；气香，味微苦。</p> <p>行气活血，通脉止痛。用于冠心病心绞痛气滞血瘀证。</p> <p>口服。一次5片(大片)或一次8片(小片)，一日3~4次；或遵医嘱。</p> <p>孕妇慎服。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>心宁片</p> <p>丹参 300g 川芎 150g 红花 150g 赤芍 150g 槐花 150g 三七 54g 降香 150g。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味辛。</p> <p>理气止痛，活血化痰。用于气滞血瘀所致胸痹，症见胸闷、胸痛、心悸、气短；冠心病心绞痛见上述证候者。</p> <p>口服。一次2~3片(大片)，一次6~8片(小片)，一日3次。</p> <p>孕妇忌服。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>黄杨宁片</p> <p>环维黄杨星 D0.5g。</p> <p>本品为白色或微黄色的片；味苦。</p> <p>行气活血，通络止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹心痛、脉结代；冠心病、心律失常见上述证候者。</p> <p>口服。一次1~2mg，一日2~3次。</p> <p>无。</p> <p>(1) 每片含环维黄杨星 D0.5mg；(2) 每片含环维黄杨星 D1mg。</p> <p>密封。</p>
---	---

气滞血瘀型冠心病高血压高血脂心绞痛脑梗

【药名】	心可舒片
【处方】	丹参 294g 三七 19.6g 葛根 294g 山楂 294g 木香 19.6g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕色；气味微酸、涩。
【功能与主治】	活血化瘀，行气止痛。用于气滞血瘀引起的胸闷、心悸、头晕、头痛、颈项疼痛；冠心病心绞痛、高血脂、高血压、心律失常见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次4片〔规格(1)〕或2片〔规格(2)〕，一日3次，或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每片重(1)0.31g；(2)0.62g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乐脉丸
【处方】	丹参 998g 川芎 499g 赤芍 499g 红花 499g 香附 249.5g 木香 249.5g 山楂 124.8g。
【性状】	本品为黑色的浓缩水丸或棕褐色至褐色的包衣浓缩水丸；味微苦。
【功能与主治】	行气活血，化瘀通脉。用于气滞血瘀所致的头痛、眩晕、胸痛、心悸；冠心病心绞痛、多发性脑梗死见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1~2袋，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装1.5g(浓缩水丸)；(2)每袋装1.2g(包衣浓缩水丸)。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	乐脉片
【处方】	丹参 499g 川芎 249.5g 赤芍 249.5g 红花 249.5g 香附 124.75g 木香 124.75g 山楂 62.4g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显黄色至棕色；味微苦。
【功能与主治】	行气活血，化瘀通脉。用于气滞血瘀所致的头痛、眩晕、胸痛、心悸；冠心病心绞痛、多发性脑梗死见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3~6片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每片重(1)0.45g；(2)0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乐脉胶囊
【处方】	丹参 499g 川芎 249.5g 赤芍 249.5g 红花 249.5g 香附 124.75g 木香 124.75g 山楂 62.4g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄色至棕褐色的颗粒或粉末；气微，味微苦。
【功能与主治】	行气活血，化瘀通脉。用于气滞血瘀所致的头痛、眩晕、胸痛、心悸；冠心病心绞痛、多发性脑梗死见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3~6粒〔规格(1)、(2)、(3)〕，一次4~6粒〔规格(4)〕，

【注意】	一日3次。
【规格】	无。
【贮藏】	每粒装(1)0.56g; (2)0.5g; (3)0.45g; (4)0.42g。
	密封。

【药名】	乐脉颗粒
【处方】	丹参499g 川芎249.5g 赤芍249.5g 红花249.5g 香附124.75g 木香124.75g 山楂62.4g。
【性状】	本品为黄棕色至棕色的颗粒；味微苦。
【功能与主治】	行气活血，化瘀通脉。用于气滞血瘀所致的头痛、眩晕、胸痛、心悸；冠心病心绞痛、多发性脑梗死见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1~2袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装3g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	利脑心胶囊
【处方】	丹参，川芎，粉葛，地龙，赤芍，红花，郁金，制何首乌，泽泻，枸杞子，炒酸枣仁，远志，九节菖蒲，牛膝，甘草。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色的粉末；味苦。
【功能与主治】	活血祛瘀，行气化痰，通络止痛。用于气滞血瘀，痰浊阻络所致的胸痹刺痛、绞痛，固定不移，入夜更甚，心悸不宁，头晕头痛；冠心病、心肌梗死，脑动脉硬化、脑血栓见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次，饭后服用。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	银丹心脑血管软胶囊
【处方】	银杏叶500g 灯盏细辛300g 山楂400g 三七200g 丹参500g 绞股蓝300g 大蒜400g 艾片10g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为棕色至棕褐色的膏状物；气辛，味微苦。
【功能与主治】	苗医：蒙修，蒙柯，陇蒙柯，给俄，告俄蒙给。中医：活血化瘀、行气止痛，消食化滞。用于气滞血瘀引起的胸痹，胸闷，气短，心悸等；冠心病心绞痛、高脂血症、脑动脉硬化、中风、中风后遗症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

心血瘀阻型胸痛胸闷冠心病心绞痛

【药名】	复方川芎片
【处方】	川芎 485g 当归 485g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕褐色；具特异香气，味甜、微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，通脉止痛。用于冠心病稳定型心绞痛属心血瘀阻证者。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日3次；饭后服用或遵医嘱。
【注意】	孕妇或哺乳期妇女慎用。
【规格】	每片重0.412g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	复方川芎胶囊
【处方】	川芎 485g 当归 485g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色的粉末；具特异香气，味甜、微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，通脉止痛。用于冠心病稳定型心绞痛属心血瘀阻证者。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次；饭后服用或遵医嘱。
【注意】	孕妇或哺乳期妇女慎用。
【规格】	每粒装0.37g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	复方龙血竭胶囊
【处方】	龙血竭 260g 三七 140g 冰片 2g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为红色至红棕色的粉末；气特异，味淡、涩，嚼之有炭粒感并微粘齿。
【功能与主治】	活血化瘀，通窍止痛。用于稳定性劳力性冠心病心绞痛Ⅰ、Ⅱ级，中医辨证为心血瘀阻证，症见胸闷刺痛、绞痛，固定不移，入夜更甚，时或心悸不宁，舌质紫暗，脉沉。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次。饭后半小时服用。
【注意】	上消化道疾病的患者应慎服。

【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	冠心舒通胶囊
【处方】	广枣 480g 丹参 240g 丁香 60g 冰片 30g 天竺黄 30g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为淡棕黄色至深棕红色的粉末；气芳香，味辛凉、微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，通经活络，行气止痛。用于胸痹心血瘀阻证，症见胸痛、胸闷、心慌、气短；冠心病、心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次；4 周为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	地奥心血康胶囊
【处方】	地奥心血康。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄色至棕黄色的颗粒和粉末；味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，行气止痛，扩张冠脉血管，改善心肌缺血。用于预防和治疗冠心病，心绞痛以及瘀血内阻之胸痹、眩晕、气短、心悸、胸闷或痛。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒含地奥心血康 100mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	心舒宁片
【处方】	毛冬青 1080g 葛根 170g 豨莶草 330g 银杏叶 540g 益母草 330g 柿叶 40g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、微甘。
【功能与主治】	活血化瘀。用于心脉瘀阻所致的胸痹、心痛、冠心病心绞痛、冠状动脉供血不全见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5~8 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	糖衣片，片心重 0.29g。
【贮藏】	密封。

【药名】	心元胶囊
【处方】	本品系由制何首乌、丹参、地黄等药味加工制成的胶囊剂。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	滋肾养心，活血化瘀。用于胸痹心肾阴虚、心血瘀阻证，症见胸闷不适、胸部刺痛或绞痛、或胸痛彻背、固定不移、入夜更甚、心悸盗汗、心烦不寐、腰酸膝软、耳鸣头晕；冠心病稳定型劳累性心绞痛、高脂血症见上述证候者。

【用法与用量】	口服。一次 3~4 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

肝肾不足瘀血内停型胸痹胸闷冠心病

【药名】	保心片
【处方】	三七 45g 丹参 540g 川芎 360g 山楂 450g 制何首乌 157.5g 何首乌 292.5g。
【性状】	本品为棕褐色的片；气香，味微甜、微苦。
【功能与主治】	滋补肝肾，活血化瘀。用于肝肾不足、瘀血内停所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片，一日 3 次
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每片重 0.52g。
【贮藏】	密封。

气虚血瘀型胸痹心痛头痛眩晕

【药名】	正心降脂片
【处方】	羊红膻 370g 决明子 260g 陈皮 130g 何首乌 162g 黄芪 364g 丹参 260g 葛根

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>163g 槐米 130g。</p> <p>品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；气微，味淡、微涩。</p> <p>益气活血，祛痰降浊。用于气虚血瘀，痰浊蕴结所致的胸痹、心痛、头痛、眩晕。</p> <p>口服。一次4片，一日3次。</p> <p>心动过缓及低血压患者慎用。</p> <p>(1)薄膜衣片每片重0.31g；(2)糖衣片片心重0.3g。</p> <p>密封。</p>
---	--

气虚血瘀型冠心病心绞痛胸痛胸闷气短

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>正心泰片</p> <p>黄芪，葛根，槲寄生，丹参，山楂，川芎。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；气微，味微苦。</p> <p>补气活血，化瘀通络。用于气虚血瘀所致的胸痹，症见胸痛、胸闷、心悸、气短、乏力；冠心病心绞痛见上述证候者。</p> <p>口服。一次4片，一日3次。</p> <p>孕妇慎用。</p> <p>(1)薄膜衣片，每片重0.36g。(2)糖衣片，片心重0.36g。</p> <p>密闭，防潮，置阴凉干燥处。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>正心泰胶囊</p> <p>黄芪，葛根，槲寄生，丹参，山楂，川芎。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的粉末；气微，味微苦。</p> <p>补气活血，化瘀通络。用于气虚血瘀所致的胸痹，症见胸痛、胸闷、心悸、气短、乏力；冠心病心绞痛见上述证候者。</p> <p>口服。一次4粒，一日3次。</p> <p>孕妇慎用。</p> <p>每粒装0.46g。</p> <p>密闭，防潮，置阴凉干燥处。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p>	<p>灵宝护心丹</p> <p>人工麝香，蟾酥，人工牛黄，冰片，红参，三七，琥珀，丹参，苏合香。</p> <p>本品为红棕色的浓缩水丸；气香，味苦、辛、微麻。</p> <p>强心益气，通阳复脉，芳香开窍，活血镇痛。用于气虚血瘀所致的胸痹，症见胸闷气短、心前区疼痛、脉结代；心动过缓型病态窦房结综合征及冠心病心绞痛、心律失常见上述证候者。</p> <p>口服。一次3~4丸，一日3~4次。饭后服用或遵医嘱。</p> <p>孕妇忌服。少数患者在服药初期偶见轻度腹胀、口干，继续服药后症状可</p>
---	--

【规格】	自行消失，无需停药。
【贮藏】	每10丸重0.08g。 密封。

【药名】	芪参胶囊
【处方】	黄芪285g 丹参155g 人参75g 茯苓103g 三七148g 水蛭155g 红花103g 川芎103g 山楂155g 蒲黄103g 制何首乌103g 葛根155g 黄芩103g 玄参103g 甘草148g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的粉末和颗粒；气微腥，味微苦。
【功能与主治】	益气活血，化瘀止痛。用于冠心病稳定型劳累型心绞痛Ⅰ、Ⅱ级，中医辨证属气虚血瘀证者，症见胸痛，胸闷，心悸气短，神疲乏力，面色紫暗，舌淡紫，脉弦而涩。
【用法与用量】	饭后温开水送服。一次3粒，一日3次。42天为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	参芍片
【处方】	白芍1950g 人参茎叶总皂苷13g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅棕黄色至深棕色；味甜、苦。
【功能与主治】	活血化瘀，益气止痛。适用于气虚血瘀所致的胸闷，胸痛，心悸，气短；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日2次。
【注意】	妇女经期及孕妇慎用。
【规格】	薄膜衣片每片重0.3g；糖衣片片心重0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	参芍胶囊
【处方】	白芍1950g 人参茎叶总皂苷13g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕黄色至深棕色的颗粒及粉末；味甜、苦。
【功能与主治】	活血化瘀，益气止痛。适用于气虚血瘀所致的胸闷，胸痛，心悸，气短；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日2次。
【注意】	妇女经期及孕妇慎用。
【规格】	每粒装0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	养心氏片
【处方】	黄芪，党参，丹参，葛根，淫羊藿，山楂，地黄，当归，黄连，醋延胡索，灵芝，人参，炙甘草。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦。

【功能与主治】	益气活血，化瘀止痛。用于气虚血瘀所致的胸痹，症见心悸气短、胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见于上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4~6片〔规格(1)、(3)〕；一次2~3片〔规格(2)〕，一日3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.3g；(2)薄膜衣片每片重0.6g；(3)糖衣片(片心重0.3g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	参桂胶囊
【处方】	红参400g 川芎450g 桂枝300g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；气香，味辛、苦。
【功能与主治】	益气通阳，活血化瘀。用于心阳不振，气虚血瘀所致的胸痛。症见胸部刺痛，固定不移，入夜更甚，遇冷加重，或畏寒喜暖，面色少华；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	诺迪康胶囊
【处方】	本品为圣地红景天经加工制成的硬胶囊。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄棕色至棕黑色的颗粒及粉末，气香，味苦、涩。
【功能与主治】	益气活血，通脉止痛。用于气虚血瘀所致胸痹，症见胸闷、刺痛或隐痛、心悸气短、神疲乏力、少气懒言、头晕目眩；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1~2粒，一日3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每粒装0.28g。
【贮藏】	密封。

【药名】	通心络胶囊
【处方】	本品系由人参、水蛭、全蝎、赤芍、蝉蜕、土鳖虫、蜈蚣、檀香、降香、乳香(制)、酸枣仁(炒)、冰片经加工制成的胶囊。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰棕色至灰褐色的颗粒和粉末；气香、腥，味微咸、苦。
【功能与主治】	益气活血，通络止痛。用于冠心病心绞痛属心气虚乏、血瘀络阻证，症见胸部憋闷，刺痛、绞痛，固定不移，心悸自汗，气短乏力，舌质紫暗或有瘀斑，脉细涩或结代。亦用于气虚血瘀络阻型中风病，症见半身不遂或偏身麻木，口舌歪斜，言语不利。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒，一日3次。
【注意】	出血性疾患、孕妇及妇女经期及阴虚火旺型中风禁用。

【规格】	每粒装 0.26g。
【贮藏】	密封。

【药名】	镇心痛口服液
【处方】	党参，三七，醋延胡索，地龙，薤白，炒葶苈子，肉桂，冰片，薄荷脑。
【性状】	本品为深棕红色液体；气香，味苦，微酸。
【功能与主治】	益气活血，通络化痰。用于气虚血瘀、痰阻脉络、心阳失展所致的胸痹，症见胸痛、胸闷、心悸、气短、乏力肢冷；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 20ml，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用；本品久存后可出现轻微沉淀，请振摇均匀后服用，不影响功效。
【规格】	(1) 每支装 10ml；(2) 每支装 20ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	麝香通心滴丸
【处方】	人工麝香，人参茎叶总皂苷，蟾酥，丹参，人工牛黄，熊胆粉，冰片。
【性状】	本品为薄膜衣滴丸，除去包衣后显棕红色至棕色；气香，味微苦而有持久的麻辣感。
【功能与主治】	芳香益气通脉，活血化瘀止痛。用于冠心病稳定型劳累性心绞痛气虚血瘀证，症见胸痛胸闷，心悸气短，神倦乏力。
【用法与用量】	口服。一次 2 丸，一日 3 次。
【注意】	(1) 极个别患者用药后出现身热、颜面潮红、停止服药后很快缓解；极个别患者可出现舌麻辣感。较高剂量服用可导致 ALT 升高。(2) 孕妇禁用。(3) 肝肾功能不全者慎用。(4) 本品含有毒性药材蟾酥，请按说明书规定剂量服用。(5) 临床试验期间，有 1 例出现中度青光眼、眼压增高；1 例轻度身热、颜面潮红；1 例轻度胃脘部胀痛不适。这 3 例受试者均已缓解，认为与试验的药物可能无关。(6) 运动员慎用。
【规格】	每丸重 35mg。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

气虚血瘀型怔忡心悸房性早搏室性早搏

【药名】	复脉定胶囊
【处方】	党参，黄芪，远志，桑椹，川芎。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄褐色或深褐色的颗粒和粉末；味苦，微麻。
【功能与主治】	补气活血，宁心安神。用于气虚血瘀所致的心悸、脉结代；轻、中度房性早搏或室性早搏见有上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次。
【注意】	(1) 多源性室性早搏、R 在 T 上的室性早搏及其他严重心律失常者非本品的适应症。(2) 长期应用西药而不能停药者，非本品的适应症。

【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封，防潮。

痰热瘀阻型冠心病心绞痛

【药名】	丹葵片
【处方】	瓜蒌皮 86g 薤白 40g 葛根 138g 川芎 52g 丹参 138g 赤芍 52g 泽泻 138g 黄芪 114g 骨碎补 26g 郁金 52g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦、涩、微酸。
【功能与主治】	宽胸通阳，化痰散结，活血化瘀。用于痰瘀互结所致的胸痹心痛，症见胸闷胸痛，憋气，舌质紫暗，苔白腻，冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	饭后服用。一次 5 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁用；产妇及便溏泄泻者慎用；部分患者服药后可出现大便偏稀；少数患者服药期间可出现口干。
【规格】	(1)糖衣片片心重 0.3g；(2)薄膜衣片每片重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	心速宁胶囊
【处方】	黄连 334g 茯苓 250g 常山 250g 苦参 250g 人参 167g 甘草 167g 半夏 250g 枳实 167g 莲子心 42g 青蒿 250g 麦冬 250g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕黑色粉末；味辛、微苦。
【功能与主治】	清热化痰，宁心定悸。用于痰热扰心所致的心悸，胸闷，心烦，易惊，口干口苦，失眠多梦，眩晕，脉结代；冠心病、病毒性心肌炎引起的轻、中度室性过早搏动见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。
【注意】	(1)有胃病者宜饭后服用。(2)服药中出现恶心等反应时，可减量服用或暂停用药。(3)本品组方中常山有催吐等副作用，应用时应注意其不良反应。
【规格】	每粒装 0.48g。
【贮藏】	密封。

阳虚血瘀型胸闷心悸气短五心烦热冠心病心绞痛

【药名】	羊藿三七胶囊
【处方】	淫羊藿 1500g 三七 500g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的颗粒或粉末；味苦。
【功能与主治】	温阳通脉，化瘀止痛。用于阳虚血瘀所致的胸痹，症见胸痛，胸闷，心悸，乏力，气短等；冠心病，心绞痛属上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3~4粒，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	滋心阴口服液
【处方】	麦冬，赤芍，北沙参，三七。
【性状】	本品为红棕色的澄清液体；气微香，味甜、微苦。
【功能与主治】	滋养心阴，活血止痛。用于阴虚血瘀所致的胸痹，症见胸闷胸痛、心悸怔忡、五心烦热、夜眠不安、舌红少苔；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	滋心阴胶囊
【处方】	麦冬，赤芍，北沙参，三七。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至黑褐色的颗粒；气微香，味微苦。
【功能与主治】	滋养心阴，活血止痛。用于阴虚血瘀所致的胸痹，症见胸闷胸痛、心悸怔忡、五心烦热、夜眠不安、舌红少苔；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.35g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	滋心阴颗粒
【处方】	麦冬，赤芍，北沙参，三七。
【性状】	本品为淡棕黄色至棕色的颗粒；气微香，味微苦。
【功能与主治】	滋养心阴，活血止痛。用于阴虚血瘀所致的胸痹，症见胸闷胸痛、心悸怔忡、五心烦热、夜眠不安、舌红少苔；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装6g。
【贮藏】	密封。

气阴两虚型高血压冠心病胸闷心绞痛病毒性心肌炎

【药名】	心舒胶囊
【处方】	丹参 63g 三七 50g 冰片 50g 藤合欢 250g 木香 50g 苏合香 13g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕色的颗粒和粉末；气芳香，味苦、辛凉。
【功能与主治】	行气活血，通窍，解郁。用于冠心病引起的胸闷气短，心绞痛。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日2~3次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	心通口服液
【处方】	黄芪，党参，麦冬，何首乌，淫羊藿，葛根，当归，丹参，皂角刺，海藻，昆布，牡蛎，枳实。
【性状】	本品为棕红色的澄清液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	益气活血，化痰通络。用于气阴两虚、痰瘀痹阻所致的胸痹，症见心痛、胸闷、气短、呕恶、纳呆；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次10~20ml，一日2~3次。
【注意】	孕妇禁用；如有服后泛酸者，可于饭后服用。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	心悦胶囊
【处方】	西洋参茎叶总皂苷 50g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为淡黄色粉末；气微，味苦。
【功能与主治】	益气养心，利血。用于冠心病心绞痛属于气阴两虚证者。
【用法与用量】	口服。一次2粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	心荣口服液
【处方】	黄芪，麦冬，赤芍，地黄，五味子，桂枝。

【性状】	本品为棕红色液体；味甜、苦。
【功能与主治】	助阳，益气，养阴。用于心阳不振、气阴两虚所致的胸痹，症见胸闷隐痛、心悸气短、头晕目眩、倦怠懒言、面色少华；冠心病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次20ml，一日3次，六周为一疗程，或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用；偶见口干，恶心，大便失调，一般不影响治疗；本品久置可有沉淀，摇匀后服用。
【规格】	每支10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	芪冬颐心口服液
【处方】	黄芪，麦冬，人参，茯苓，地黄，龟甲(烫)，煅紫石英，桂枝，淫羊藿，金银花，丹参，郁金，枳壳(炒)。
【性状】	本品为棕黄色至棕红色的液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	益气养心，安神止悸。用于气阴两虚所致的心悸、胸闷、胸痛、气短乏力、失眠多梦、自汗、盗汗、心烦；病毒性心肌炎、冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次20ml，一日3次，饭后服用，或遵医嘱。28天为一疗程。
【注意】	孕妇忌服。偶见服药后胃部不适，宜饭后服用。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	芪冬颐心颗粒
【处方】	黄芪720g 麦冬360g 人参180g 茯苓360g 地黄260g 龟甲(烫)180g 煅紫石英520g 桂枝260g 淫羊藿360g 金银花360g 丹参260g 郁金180g 枳壳(炒)180g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	益气养心，安神止悸。用于气阴两虚所致的心悸、胸闷、胸痛、气短乏力、失眠多梦、自汗、盗汗、心烦；病毒性心肌炎、冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次，饭后服用或遵医嘱。28天为一疗程。
【注意】	孕妇忌服。偶见服药后胃部不适，宜饭后服用
【规格】	每袋装5g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	益心通脉颗粒
【处方】	黄芪，人参，北沙参，玄参，丹参，川芎，郁金，炙甘草。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甘、微苦。
【功能与主治】	益气养阴，活血通络，用于气阴两虚、瘀血阻络所致的胸痹，症见胸闷心痛、心悸气短、倦怠汗出、咽喉干燥；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	温开水冲服。一次1袋，一日3次。4周为一疗程，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每袋装10g。

【贮藏】	密封。
【药名】	益心舒丸
【处方】	人参 300g 麦冬 300g 黄芪 300g 五味子 200g 丹参 400g 川芎 200g 山楂 300g。
【性状】	本品为黄棕色至红棕色丸的浓缩水丸；气微，味微苦。
【功能与主治】	益气复脉，活血化瘀，养阴生津。用于气阴两虚，瘀血阻脉所致的胸痹，症见胸痛胸闷，心悸气短，脉结代；冠心病心绞痛见上述证候者，
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 2g。
【贮藏】	密封。
【药名】	益心舒片
【处方】	人参 300g 麦冬 300g 黄芪 300g 五味子 200g 丹参 400g 川芎 200g 山楂 300g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显灰棕色至棕褐色，味酸、苦、微甘。
【功能与主治】	益气复脉，活血化瘀，养阴生津。用于气阴两虚，瘀血阻脉所致的胸痹，症见胸痛胸闷，心悸气短，脉结代；冠心病心绞痛见上述证候者，
【用法与用量】	口服。一次 2 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每片重 0.6g。
【贮藏】	密封，置干燥处。
【药名】	益心舒胶囊
【处方】	人参 200g 麦冬 200g 五味子 133g 黄芪 200g 丹参 267g 川芎 133g 山楂 200g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末，气微香，味微苦。
【功能与主治】	益气复脉，活血化瘀，养阴生津。用于气阴两虚，瘀血阻脉所致的胸痹，症见胸痛胸闷，心悸气短，脉结代；冠心病心绞痛见上述证候者，
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒重 0.4g。
【贮藏】	密封。
【药名】	益心舒颗粒
【处方】	人参 150g 麦冬 150g 黄芪 150g 五味子 100g 丹参 200g 川芎 100g 山楂 150g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	益气复脉，活血化瘀，养阴生津。用于气阴两虚，瘀血阻脉所致的胸痹，症见胸痛胸闷，心悸气短，脉结代；冠心病心绞痛见上述证候者，
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 4g；(2) 每袋装 4g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	通脉养心口服液
【处方】	地黄 100g 鸡血藤 100g 麦冬 60g 甘草 60g 制何首乌 60g 阿胶 60g 五味子 60g 党参 60g 醋龟甲 40g 大枣 40g 桂枝 20g。
【性状】	本品为红棕色的液体；味甜、苦。
【功能与主治】	益气养阴，通脉止痛。用于冠心病气阴两虚证，症见胸痛、胸闷、心悸、气短、脉弦细。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	通脉养心丸
【处方】	地黄 100g 鸡血藤 100g 麦冬 60g 甘草 60g 制何首乌 60g 阿胶 60g 五味子 60g 党参 60g 醋龟甲 40g 大枣 40g 桂枝 20g。
【性状】	本品为包糖衣或包薄膜衣的浓缩水丸，除去包衣后显棕褐色；味甘、苦。
【功能与主治】	益气养阴，通脉止痛。用于冠心病心绞痛及心律不齐之气阴两虚证，症见胸痛、胸闷、心悸、气短、脉结代。
【用法与用量】	口服。一次 40 丸，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	每 10 丸重 1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	康尔心胶囊
【处方】	三七 150g 人参 80g 麦冬 80g 丹参 120g 枸杞子 150g 何首乌 120g 山楂 230g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	益气养阴，活血止痛。用于气阴两虚、瘀血阻络所致的胸痹，症见胸闷心痛、心悸气短、腰膝酸软、耳鸣眩晕；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.4g。
【贮藏】	密封。

气阴两虚心脉瘀阻型心悸气短胸痛室性早搏房性早搏

【药名】	参松养心胶囊
【处方】	本品由人参、麦冬、山茱萸、桑寄生、土鳖虫、赤芍、黄连、南五味子、龙骨等药味经加工制成的胶囊剂。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄褐色至棕褐色的颗粒和粉末；味苦。
【功能与主治】	益气养阴，活血通络，清心安神。用于治疗冠心病室性早搏属气阴两虚，心络瘀阻证，症见心悸不安，气短乏力，动则加剧，胸部闷痛，失眠多梦，盗汗，神倦懒言。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒，一日3次。
【注意】	应注意配合原发性疾病的治疗；个别患者服药期间可出现胃胀。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	稳心片
【处方】	党参 675g 黄精 900g 三七 135g 琥珀 90g 甘松 450g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显黄色至黄褐色；味微苦。
【功能与主治】	益气养阴，活血化瘀。用于气阴两虚，心脉瘀阻所致的心悸不宁、气短乏力、胸闷胸痛；室性早搏、房性早搏见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日3次，或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用。缓慢性心律失常禁用。
【规格】	每片重0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	稳心胶囊
【处方】	党参 675g 黄精 900g 三七 135g 琥珀 90g 甘松 450g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄色至黄褐色的颗粒；味微苦。
【功能与主治】	益气养阴，活血化瘀。用于气阴两虚，心脉瘀阻所致的心悸不宁、气短乏力、胸闷胸痛；室性早搏、房性早搏见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次，或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用。缓慢性心律失常禁用。
【规格】	每粒装0.45g。
【贮藏】	密封。

【药名】	稳心颗粒
【处方】	党参，黄精，三七，琥珀，甘松。
【性状】	本品为棕黄色至棕色的颗粒；味甜、微苦或味微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	益气养阴，活血化瘀。用于气阴两虚，心脉瘀阻所致的心悸不宁、气短乏力、胸闷胸痛；室性早搏、房性早搏见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次，或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用。缓慢性心律失常禁用。

【规格】	(1) 每袋装 9g；(2) 每袋装 5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

气阴不足心脉瘀阻型心悸气短胸闷自汗乏力脉微

【药名】	冠心生脉口服液
【处方】	人参，麦冬，醋五味子，丹参，赤芍，郁金，三七。
【性状】	本品为红棕色的澄清液体；气香，味酸甜、微苦。
【功能与主治】	益气生津，活血通脉。用于气阴不足，心脉瘀阻所致的心悸气短，胸闷作痛，自汗乏力，脉微结代。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

心气不足心阳不振型冠心病心绞痛胸闷畏寒

【药名】	益心丸
【处方】	红参 882g 牛角尖粉 294g 蟾酥 147g 冰片 176g 红花 59g 人工牛黄 353g 附片(黑顺片)353g 人工麝香 59g 三七 382g 安息香 176g 珍珠 206g。
【性状】	本品为黑色的浓缩丸；气香，味苦、凉、有麻舌感。
【功能与主治】	益气温阳，活血止痛。用于心气不足、心阳不振、瘀血闭阻所致的胸痹，症见胸闷心痛，心悸气短、畏寒肢冷、乏力自汗；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	舌下含服或吞服。一次 1~2 丸，一日 1~2 次。
【注意】	孕妇禁用，月经期慎用。
【规格】	每 10 丸重 0.22g。
【贮藏】	密封。

【药名】	舒心口服液
【处方】	党参 225g 黄芪 225g 红花 150g 当归 150g 川芎 150g 三棱 150g 蒲黄 150g。
【性状】	本品为棕红色的澄清液体；气微香，味甜、微苦、涩。
【功能与主治】	补益心气，活血化瘀。用于心气不足，瘀血内阻所致的胸痹，症见胸闷憋气、心前区刺痛、气短乏力；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 20ml，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每支装 20ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	舒心糖浆
【处方】	党参 150g 三棱 100g 红花 100g 川芎 100g 蒲黄 100g。
【性状】	本品为棕褐色的黏稠液体，气微，味甜、微苦。
【功能与主治】	补益心气，活血化瘀。用于心气不足，瘀血内阻所致的胸痹，症见胸闷憋气、心前区刺痛、气短乏力；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 30~35ml，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每瓶装 100ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

肝阳上亢型高血压头痛眩晕口苦耳鸣高脂血症

【药名】	安宫降压丸
【处方】	郁金 100g 栀子 100g 天麻 20g 黄芪 80g 党参 150g 醋五味子 40g 人工牛黄 100g 冰片 25g 黄连 100g 黄芩 80g 珍珠母 50g 白芍 80g 麦冬 80g 川芎 80g 水牛角浓缩粉 100g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味苦。
【功能与主治】	清热镇惊，平肝潜阳。用于肝阳上亢、肝火上炎所致的眩晕，症见头晕、目眩、心烦、目赤、口苦、耳鸣耳聋；高血压病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用；无高血压症状时停药或遵医嘱。
【规格】	每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	松龄血脉康胶囊
【处方】	鲜松叶，葛根，珍珠层粉。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅褐色至褐色的粉末；气微，味苦。
【功能与主治】	平肝潜阳，镇心安神。用于肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压病及原发性高脂血症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次，或遵医嘱。

【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	全杜仲胶囊
【处方】	杜仲 2500g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的粉末；气微，味微咸。
【功能与主治】	补肝肾，强筋骨，降血压。用于肾虚腰痛，腰膝无力。高血压见上述症状者。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 粒，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.48g(相当于原药材 2.5g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	心安宁片
【处方】	葛根 213g 山楂 244g 制何首乌 183g 珍珠粉 3g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；气微，味甘。
【功能与主治】	养阴宁心，化痰通络，降血脂。用于血脂过高，心绞痛以及高血压引起的头痛、头晕、耳鸣、心悸。
【用法与用量】	口服。一次 5 片，一日 3 次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片，每片重 0.31g；(2)糖衣片，片心重 0.30g。
【贮藏】	密封。

【药名】	罗布麻茶
【处方】	罗布麻叶 3000g。
【性状】	本品为袋装茶剂，内容物为绿色至绿褐色的叶，多破碎；气微，味淡。
【功能与主治】	平肝安神，清热利水。用于肝阳眩晕，心悸失眠，浮肿尿少；高血压病，神经衰弱，肾炎浮肿。
【用法与用量】	开水冲泡代茶饮。一次 1~2 袋，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 3g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	复方羚角降压片
【处方】	羚羊角 8.6g 夏枯草 582g 黄芩 186g 槲寄生 582g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的片，或为薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	平肝泄热。用于肝火上炎、肝阳上亢所致的头晕、头胀、头痛、耳鸣；高血压病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 2~3 次。

【注意】	无。
【规格】	(1)素片每片重 0.35g；(2)薄膜衣片每片重 0.31g；(3)薄膜衣片每片重 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	脑立清丸
【处方】	磁石 200g 赭石 350g 珍珠母 100g 清半夏 200g 酒曲 200g 牛膝 200g 冰片 50g 酒曲(炒)200g 薄荷脑 50g 猪胆汁 350g(或猪胆粉 50g)。
【性状】	本品为深褐色的水丸；气芳香，味微苦。
【功能与主治】	平肝潜阳，醒脑安神。用于肝阳上亢，头晕目眩，耳鸣口苦，心烦难寐；高血压见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇及体弱虚寒者忌服。
【规格】	每 10 丸重 1.1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	脑立清胶囊
【处方】	磁石 42.4g 冰片 10.8g 熟酒曲 42.4g 牛膝 42.4g 珍珠母 20.8g 酒曲 42.4g 薄荷脑 10.8g 赭石 73.3g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为红棕色的粉末；气清香，味清凉、微苦。
【功能与主治】	平肝潜阳，醒脑安神。用于肝阳上亢，头晕目眩，耳鸣口苦，心烦难寐；高血压见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 2 次。
【注意】	孕妇及体弱虚寒者忌服。
【规格】	每粒装 0.33g。
【贮藏】	密封。

寒凝气滞心脉不通型胸闷心痛冠心病心绞痛

【药名】	冠心苏合丸
【处方】	苏合香 50g 冰片 105g 乳香(制)105g 檀香 210g 土木香 210g。
【性状】	本品为深棕色至棕褐色的大蜜丸；气芳香，味苦、凉。
【功能与主治】	理气，宽胸，止痛。用于寒凝气滞、心脉不通所致的胸痹，症见胸闷、心前区疼痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	嚼碎服。一次 1 丸，一日 1~3 次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇禁用。

【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	冠心苏合胶囊
【处方】	苏合香 25g 冰片 52.5g 醋乳香 52.5g 檀香 105g 土木香 105g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕色的粉末；或为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气香，味苦、凉。
【功能与主治】	理气，宽胸，止痛。用于寒凝气滞、心脉不通所致的胸痹，症见胸闷、心前区疼痛；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	含服或吞服。一次 2 粒，一日 1~3 次。临睡前或发病时服用。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	神香苏合丸
【处方】	人工麝香 50g 水牛角浓缩粉 400g 安息香 100g 香附 200g 沉香 200g 苏合香 200g 冰片 50g 乳香(制)100g 白术 200g 木香 200g 丁香 200g。
【性状】	本品为棕褐色的水丸；气香，味苦而辛。
【功能与主治】	温通宜痹，行气化浊。用于寒凝心脉、气机不扬所致的胸痹，症见心痛、胸闷、胀满、遇寒加重；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 0.7g，一日 1~2 次，
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每瓶装 0.7g。
【贮藏】	密封。

【药名】	宽胸气雾剂
【处方】	细辛油 23ml 檀香油 70ml 高良姜油 32ml 荜茇油 15ml 冰片 22.5g。
【性状】	本品为定量阀门气雾剂，在耐压容器中的药液为浅黄色的澄清液体；喷出时具特异香气，味苦、辛辣。
【功能与主治】	辛温通阳，理气止痛。用于阴寒阻滞、气机郁痹所致的胸痹，症见胸闷、心痛、形寒肢冷；冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	将瓶倒置，喷口对准舌下喷，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶含内容物 5.8g，其中药液 2.7ml (含挥发油 0.6ml)；每瓶 60 揲，每揲重 69mg。(2) 每瓶装 20ml，内含挥发油 2ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

心力衰竭型心悸气短胸闷喘促面肢浮肿

【药名】	芪蒺强心胶囊
【处方】	黄芪 450g 人参 225g 黑顺片 11295g 丹参 225g 葶苈子 150g 泽泻 225g 玉竹 75g 桂枝 90g 红花 90g 香加皮 180g 陈皮 75g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色至黑褐色的颗粒；味苦。
【功能与主治】	益气温阳，活血通络，利水消肿。用于冠心病、高血压病所致轻、中度充血性心力衰竭证属阳气虚乏，络瘀水停证，症见心慌气短，动则加剧，夜间不能平卧，下肢浮肿，倦怠乏力，小便短少，口唇青紫，畏寒肢冷，咳吐稀白痰。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	参附强心丸
【处方】	人参 200g 附子(制)160g 桑白皮 200g 猪苓 300g 葶苈子 240g 大黄 120g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸或棕色至棕褐色的水蜜丸；味甜、微苦。
【功能与主治】	益气助阳，强心利水。用于慢性心力衰竭而引起的心悸、气短、胸闷喘促、面肢浮肿等症，属于心肾阳衰者。
【用法与用量】	口服。大蜜丸一次 2 丸，水蜜丸一次 5.4g，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇禁服；宜低盐饮食。
【规格】	(1)大蜜丸每丸重 3g；(2)水蜜丸每 10 丸重 0.9g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

心气虚损型胸痹心痛气短心悸乏力头晕

【药名】	补心气口服液
【处方】	黄芪，人参，石菖蒲，薤白。
【性状】	本品为红棕色的澄清液体；气微香，味甜、微苦。
【功能与主治】	补益心气，理气止痛。用于气短、心悸、乏力、头晕心气虚损型胸痹心痛。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 3 次。

【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	熊胆救心丸
【处方】	熊胆粉 0.2g 蟾酥 1.67g 冰片 2g 人工麝香 0.2g 人参 6.7g 珍珠 3.4g 人工牛黄 0.5g 猪胆粉 1.5g 水牛角浓缩粉 1.67g。
【性状】	本品为黑色的水丸；气香，味先苦而后有持久的麻辣感。
【功能与主治】	强心益气，芳香开窍。用于心气不足所致的胸痹，症见胸闷、心痛、气短、心悸。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次。
【注意】	小儿及孕妇禁用。
【规格】	每 10 粒重 0.25g。
【贮藏】	密封。

中医对于呼吸系统的研究和诊断

肺脏

肺位于胸腔，分居在左右，向上连接气道，以喉为门户。由于肺在人体脏腑中位置最高，覆盖于其他脏腑之上，因此有“华盖”之称。关于肺的形态，有明·赵献可《医贯·内经十二官·形影图说》说：“喉下为肺，两叶白莹，谓之华盖，以覆诸脏，虚如蜂巢，下无透窍，故吸之则满，呼之则虚。”说明肺脏是质地疏松的分叶状脏器。由于肺叶娇嫩，通过鼻直接与外界相通，且外合皮毛，与自然环境息息相通，易被外邪侵害，又不耐寒热，故又称为娇脏。由于“肺与心皆居膈上，位高近君，犹之宰辅”（《类经·藏象类》），故称之为“相傅之官”。肺的主要功能是：主管呼吸，助心行血，促进水液输布和排泄。肺的这些功能，主要依赖于肺气的推动、肺阴的濡养以及肺阳的温煦作用。肺的系统联系是在体合皮，其华在毛，开窍于鼻，在液为涕，在志为忧（悲）。其在五行中属金，为清肃之脏，喜润而恶燥，为阳中之少阴，通于秋气。肺通过经脉的相互络属而与大肠构成表里关系。

肺的主要生理

肺主宣发肃降：宣发，即宣布、发散，有向上、向外之意；肃降，即清肃、下降，有向下、向内之意。所谓宣发是指肺气具有向上的升宣和向外周布散的作用。主要体现在四个方面：一是排出体内代谢后产生的浊气，而完成气体交换；二是将脾上输于肺的津液和水谷精微布散到全身，外达于皮毛；三是宣发卫气于体表，以防御外邪，并温养肌表，调节汗孔开合，控制汗液排泄，维持体温的恒定；四是通过肺气的向外运动，将会聚于肺的血液经清浊之气交换后布散至全身。所谓肃降是指肺气具有向下、向内、清肃通降和使呼吸道保持洁净的作用。

主要体现在五个方面：一是吸入自然界的清气，并向下布散；二是将脾转输于肺的津液和水谷精微向下布散，并把代谢后的水液下输至肾和膀胱；三是清除肺和呼吸道内的异

物，保持其洁净和通畅；四是通过肺气的向内运动，使周身含有浊气的血液流经于肺并加以清除，使血液保持洁净；五是肺气的肃降还有利于大肠向下传导糟粕。宣发和肃降的关系是相互依存、互相制约、不能分割的，二者相反相成。

肺气的宣发和肃降，常简称为肺主宣降，两者共同的生理效应简言之有五：一是维持呼吸运动正常，二是辅助心脏推动血行，三是输布水谷精微于全身，四是布散卫气于体表，五是促进水液输布排泄。可见肺气的宣发肃降运动是肺进行一切生理活动的基础，肺失宣降是肺脏功能障碍的基本病机，故宣降肺气就成为治疗肺病的主要方法。

主气：《素问·五藏生成》说：“诸气者，皆属于肺。”十分明确地指出了主气是肺的主要功能。肺主一身之气的功能包括主呼吸之气、主管气的生成，以及对全身气机运行的调节三方面。然此三者总以肺主呼吸之气为基础。

主呼吸之气：肺主呼吸之气的功能也称“司呼吸”，是指肺主管呼吸运助，为体内外清浊之气交换的场所。肺主呼吸主要表现为肺“一呼一吸，与天气通”（《医源》），从而吸入自然界的清气，呼出体内的浊气，“吸之则满，呼之则虚”，以实现体内外清浊之气的交换。肺的这一功能正常，则表现为呼吸运动均匀和调，气道畅通，清气吸入充分，宗气生成充足，脏腑组织之气旺盛，全身气机升降出入协调，从而维持了人体生命活动的正常进行。若肺主管呼吸的功能减弱，影响宗气的生成和全身之气的升降出入运动，则表现为少气不足以息、声低气弱、疲倦乏力等症；若病邪犯肺，宣降失常，则表现为胸闷、咳嗽、喘促等呼吸不利的症状。一旦发展到肺的呼吸功能丧失、则清气不能吸入，浊气不能排出，人的生命活动就会终止。

主管气的生成：肺吸入自然界的清气是人体一身之气生成的主要来源之一，特别是宗气的生成。宗气是在肺的气化作用下，将吸入的自然界清气与脾转输至肺的水谷精气结合而成。宗气生成之后，上聚于胸中气海，下达于丹田，然后布散于全身。既能行于喉咙，以促进肺的呼吸运动，又可灌注于心脉而促进气血的运行，发挥其温养脏腑组织的重要作用。可见肺是以呼吸运动为核心，通过生成宗气而发挥主一身之气生成的作用。

调节全身气机：肺的呼吸运动，主要表现为气的升、降、出、入运动。通过肺有节律地、不停顿地一呼一吸，调节全身之气的升、降、出、入运动，使整体气机活动始终处于协调平衡的正常状态。肺气运动的特征为主降，故肺主要以影响整体气机“降”的环节而调节一身气机的活动。

综上所述，“肺主气”是指人体正常状态的气，皆由肺脏主宰，这一功能虽然体现三个方面，然而以肺主呼吸为其核心，并体现于主气的各方面。在此基础上完成了一身之气的生成及对整体气机的调节，故曰：“肺者，气之本”（《素问·六节藏象论》）。因此说肺主管呼吸的功能是维持生命活动的基本条件。

助心行血：肺脏助心行血功能的结构基础是“肺朝百脉”。朝，即聚会、朝向；百脉，

泛指人体全身的血脉。所谓肺朝百脉是指全身的血液都要通过血脉而聚会于肺，经过肺的吸清呼浊，气体交换，然后再将富含清气的血液输送至全身的功能。由此可知，一方面许多血脉汇聚到肺，另一方面肺又朝向全身的血脉，使心肺在结构上相互联系。肺助心行血的生理基础是“肺司呼吸”的功能，肺通过呼吸运动，调节全身气机，从而促进血液在全身的运行。

肺助心行血的生理作用主要表现在三个方面：一是全身血脉及脉中之血要不断地朝向和汇聚于肺。二是肺主管血之清浊转化。清血是指含有自然界大量清气的血液；浊血是指携带有体内大量浊气的血液。肺通过朝百脉的途径，促使心血不断地在肺中进行气体交换，确保心血的清浊转化，从而维持人体生命活动正常进行。故《类经图翼·经络一》中指出：“肺者生气之原……一呼一吸，消息自然，司清浊之运化。”三是肺通过生成宗气助心行血。心脏搏动是血液循环的基本动力，心搏又主要依赖心气的推动，而心气的盛衰与宗气密切相关，宗气影响着心搏的强弱和节律。宗气“贯心脉”而助心行血，正是通过肺朝百脉实现的，故《灵枢·刺节真邪》说：“宗气不下，脉中之血，凝而留止。”肺气旺盛，吸清呼浊则平稳，气体交换协调，血中清气丰富，宗气生成充沛，助心推动血行，则血行正常；若肺气虚弱，吸清呼浊减弱，气体交换失调，血中浊气增加，清气减少，宗气生成不足，推动血行无力，则血行障碍，心律失常，可表现为胸中憋闷胀痛、咳喘无力、心悸、口唇发绀、舌质青紫等病症。

促进水液输布和排泄：肺具有促进水液输布和排泄的功能，又称为“肺主通调水道”，是指肺通过宣发肃降对体内水液的输布和排泄起着疏通和调节的作用，以维持体内水液代谢平衡的功能。

肺通调水道的功能，是肺气的宣发和肃降在水液代谢方面的体现。肺气宣发可将津液输布于全身各脏腑器官与皮毛，以发挥其滋润润养作用，部分津液经代谢后可依靠卫气“司开合”的作用，从汗孔排出体外。肺气肃降可使津液随气下行，上焦及全身代谢后的水液下输至肾和膀胱，经气化为尿，排出体外。正因为肺气宣发和肃降能够推动水液的输布和排泄，维持水液代谢平衡，所以又称“肺主行水”。由于肺位最高，主肃降，不断地将上焦水液下输至肾和膀胱，以调节体内的水液代谢，故又有“肺为水之上源”之说。如果肺失宣降，行水无力，水道不通，水液输布排泄障碍，则汗、尿不能正常排泄，使多余的水液不能排出而停聚于体内，则可见咳喘、咯痰、浮肿、尿少等症。所以临床上常用宣肺利水的方法，治疗水肿等病症，即是肺主通调水道理论的具体应用。这种宣肺利水消肿的治法被形象地喻为“提壶揭盖法”。

肺的系统联系

肺在体合皮，其华在毛：皮，即皮肤；毛，即毫毛。皮肤覆盖于人体表面，包括毫毛、汗孔等附属物，为一身之表，具有防御外邪、排泄汗液、辅助呼吸、调节体温及感觉等功能。它是人体的外围屏障，称作人身之“藩篱”。《素问·五藏生成》说：“肺之合皮也，其荣毛也。”所谓肺在体合皮，是指肺与皮肤有密切的配合关系。肺其华在毛是指肺的功

能盛衰可以从毫毛的色泽上得以体现。

肺与皮毛的关系体现在两个方面：一是肺气宣发，输精于皮毛。肺气将卫气、津液和水谷精微布散至体表，以温养和润泽皮毛，从而发挥其护卫肌表、抗御外邪的屏障作用；二是皮毛上的汗孔具有宣肺气而助呼吸的作用，故谓汗孔为“气门”，又称为鬼门、玄府、毛窍。汗孔的开合，由肺所宣发的卫气主管，汗孔的开合不仅能调节体温和水液代谢，排泄汗液，而且也随着肺气的宣降进行着体内外的气体交换，从而具有辅助呼吸的作用。所以清·唐宗海在《中西汇通医经精义》中指出，皮毛有“宣肺气”的作用，并指出“遍身毛窍，俱随呼吸之气以为鼓伏”。

肺的功能正常，宣发有力，卫气、津液和水谷精微能够畅达表皮，皮毛得到滋养，则皮肤致密柔韧，毫毛柔润光泽，抗御外邪能力强盛，触觉灵敏。反之肺气虚弱，其宣发卫气、津液和输精于皮毛的功能减弱，皮毛失养，则卫表不固，抗御外邪能力降低，汗孔开合失度，可出现畏寒、多汗或自汗易感冒、皮毛憔悴枯槁、触觉迟钝等现象。若外邪侵犯皮毛，毛窍闭塞，导致肺气不宣，又可见无汗、咳喘等病症。故临床用宣发肺气的药物治疗往往能起到发汗平喘的效果。

肺开窍于鼻，喉为肺之门户：鼻位于面部中央。上端狭窄，突于两眶之间者名额，又名山根、王宫；其前下端尖部高处、名为鼻准，又名准头、面王；鼻准两旁圆形隆起部分，名为鼻翼；鼻的下方有两个鼻孔，两孔间有间隔。额以下至鼻准，有鼻柱骨突起，名鼻梁，又名天柱。鼻与喉相通而下连于肺，由于肺司呼吸，而鼻为呼吸道的最上端，鼻孔是清气与浊气出入的最外通道，故有“鼻为肺窍”之说。所谓肺开窍于鼻，是指肺的生理功能与鼻的关系密切。鼻虽有主通气、司嗅觉和助发音的功能，但都必须依赖肺气的功能正常。肺气调和，呼吸平稳，则鼻窍通利、嗅觉灵敏、声音清晰；若外邪犯肺，肺气不利，可见鼻塞、流涕、喷嚏、不辨香臭、声音重浊等症；外邪侵袭，也常从口鼻而入，引发肺部病变。

喉不仅是清气、浊气出入的门户，又是发声器官，其功能亦受肺气的影响。如果肺气充沛，喉咙通利，则发音清晰响亮。若肺气虚弱，或肺之阴津不足，喉失所养，喉部不利，则声音嘶哑或失音，其证属虚，故称“金破不鸣”；若外邪犯肺，肺气失宣，喉部不畅，则喉痒喉痛，亦可见声音嘶哑或失音，其证属实，故称“金实不鸣”；若热邪壅滞于肺，灼熏喉部，则可见喉部红肿疼痛，甚则溃烂成脓等严重病症。

咽和喉位置相邻，功能相关，故常咽喉并称。咽上通于鼻，正前方系舌本通于口；其下为会厌所分隔，前方连于气道者合声门称为喉咙，与肺相通，则属肺系；后方连于食管者直贯胃腑，为胃之通道，则属胃系。悬雍垂居于咽中，为音声之关。咽的主要生理功能是进饮食。正如金·张从正《儒门事亲》所说：“咽与喉……喉以呼（注：“呼”原作“喉”，文义不属，据四库本改）气，故喉气通于天；咽以嚥物，故咽气通于地。”咽为水谷之通道，每当饮食入口，经过咽下分泌的唾液滋润和咀嚼后，通过咽的吞咽，顺食道而下，直入胃中，则表现为吞咽通利，胃纳正常。若胃火上炎，灼伤于咽，则可见咽部疼痛，进食不

利等症；若胃的气血瘀结，阴液枯槁，则可见吞咽梗阻，食物难下，甚至水饮难入，形体瘦削等重症。

肺在液为涕：涕，即鼻液，乃肺宣发之津液，由鼻分泌而成，具有清洁濡润和保护鼻窍的作用，并能防御外邪，有利于肺的呼吸。由于鼻为肺窍，涕为肺之津液所化，故肺在液为涕。肺气旺盛，肺津充足则表现为涕液润泽鼻窍而不外溢。肺罹疾患，常可见涕液的分泌和质地发生异常改变，因此察涕液有助于对肺病的诊断。若肺感风寒，则鼻流清涕；肺感风热，则涕黄稠浊，或有异味；肺感燥邪，损伤肺津，则鼻干少涕或无涕；肺气虚弱，气不援津，则鼻流清涕。

肺在志为悲〔忧〕：悲伤、忧愁均属情感活动。二者虽有所不同，但对人体的影响大致相同，悲和忧同属肺志，是肺气在情志方面的生理反应，不会导致人体直接发病，肺气调和，则遇事悲忧适度。若过度的悲伤和忧愁，则易于耗伤肺气，使人意志消沉，可见少气懒言、呼吸气短、休倦乏力等肺气不足之症。反之当肺气不足时也易于出现悲伤过度的情绪低落变化，这是由于肺的功能减退时，机体对外界不良刺激的耐受性下降所致。

咳嗽

咳嗽是指肺失宣降，肺气上逆作声，咯吐痰液而言，为肺系疾病的主要证候之一。分别言之，有声无痰为咳，有痰无声为嗽，一般多为痰声并见，难以截然分开，故以咳嗽并称。

咳嗽病名最早见于《内经》，该书对咳嗽的成因、症状、证候分类、病理转归及治疗等问题作了较系统的论述。如《素问·宣明五气》篇说：“五气所病……肺为咳”。指出咳嗽的病位在肺。对咳嗽病因的认识，《素问·咳论》篇指出咳嗽系由“皮毛先受邪气，邪气以从其合也”，“五脏六腑，皆令人咳，非独肺也。”五脏六腑之咳“皆聚于胃，关于肺”，说明外邪犯肺可以致咳，其他脏腑受邪，功能失调而影响于肺者亦可致咳，咳嗽不只限于肺，也不离乎肺。该篇依据咳嗽的不同表现，将其分为肺、肝、心、脾、肾、胃、大肠、小肠、胆、膀胱、三焦诸咳，从而确立了以脏腑分类的方法，为后世医家对咳嗽病证的研究奠定了理论基础。

咳嗽的治法方药历代均有论述，如汉代张仲景治虚火咳逆的麦门冬汤，至今仍为临床应用。后世在张仲景的基础上，对咳嗽的治法方药提出了许多新的见解。如《景岳全书·咳嗽》指出：“外感之邪多有余，若实中有虚，则宜兼补以散之。内伤之病多不足，若虚中夹实，亦当兼清以润之”，提出外感咳嗽宜“辛温”发散为主，内伤咳嗽宜“甘平养阴”为主的治疗原则，丰富了辨证论治的内容。

咳嗽既是独立性的病证，又是肺系多种疾病的一个症状。西医学中急慢性支气管炎、部分支气管扩张症、慢性咽炎等以咳嗽为主要表现者可辨证论治。部分慢性咳嗽经久反复，可发展至喘，称为咳喘，多表现为寒饮伏肺或肺气虚寒的证候，属痰饮病中的“支饮”或“喘证”，应当辨证论治。

病机

咳嗽的病变主脏在肺，与肝、脾有关，久则及肾。主要病机为邪犯于肺，肺气上逆。因肺主气，司呼吸，上连气道、喉咙，开窍于鼻，外合皮毛，内为五脏华盖，其气贯百脉而通它脏，不耐寒热，称为“娇脏”，易受内外之邪侵袭而致宣肃失司。肺脏为了祛除病邪外达，以致肺气上逆，冲激声门而发为咳嗽。诚如《医学心悟》所说：“肺体属金，警若钟然，钟非叩不鸣，风、寒、暑、湿、燥、火六淫之邪，自外击之则鸣；劳欲情志，饮食炙搏之火，自内攻之则亦鸣”。《医学三字经·咳嗽》篇亦说：“肺为脏腑之华盖，呼之则虚，吸之则满，只受得本脏之正气，受不得外来之客气，客气干之则呛而咳矣；只受得脏腑之清气，受不得脏腑之病气，病气干之，亦呛而咳矣”。提示咳嗽是内外病邪犯肺，肺脏祛邪外达的一种病理反应。

外感咳嗽：属于邪实，为六淫外邪犯肺，肺气壅遏不畅所致。因于风寒者，肺气失宣，津液凝滞；因于风热者，肺气不清，热蒸液聚为痰；因于风燥者，燥邪灼津生痰，肺气失于润降，则发为咳嗽。若外邪未能及时解散，还可发生演变转化，如风寒久郁化热，风热灼津化燥，肺热蒸液成痰等。

内伤咳嗽：病理因素主要为“痰”与“火”。而痰有寒热之别，火有虚实之分。痰火可互为因果，痰可郁而化火(热)，火能炼液灼津为痰。因其常反复发作，迁延日久，脏气多虚，故病理性质属邪实与正虚并见。虚实之间尚有先后主次的不同。它脏有病而延及肺者，多因实致虚。如肝火犯肺者，每见气火炼液为痰，灼伤肺津。痰湿犯肺者，多因湿困中焦，水谷不能化为精微上输以养肺，反而聚生痰浊，上干于肺，久延则使肺脾气虚，气不化津，痰浊更易滋生，此即“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”的道理。甚则病及于肾，以致肺虚不能主气，肾虚不能纳气，由咳致喘。如痰湿蕴肺，遇外感引触，痰从热化，则易耗伤肺阴。肺脏自病者，多因虚致实。如肺阴不足每致阴虚火炎，灼津为痰；肺气亏虚，气不化津，津聚成痰，甚则痰从寒化为饮。

外感咳嗽与内伤咳嗽可相互为病。外感咳嗽如迁延失治，邪伤肺气，更易反复感邪，而致咳嗽屡作，肺脏益伤，逐渐转为内伤咳嗽。内伤咳嗽，肺脏有病，卫外不强，易受外邪引发或加重，在气候转冷时尤为明显。久则肺脏虚弱，阴伤气耗，由实转虚。于此可知，咳嗽虽有外感、内伤之分，但两者又可互为因果。

影响本病转归及预后的因素较多。一般而言，外感咳嗽其病尚浅而易治，但燥与湿二者较为缠绵。因湿邪困脾，久则脾虚而致积湿生痰，转为内伤之痰湿咳嗽。燥伤肺津，久则肺阴亏耗，成为内伤阴虚肺燥之咳嗽，故有“燥咳每成癆”之说。内伤咳嗽多呈慢性反复发作过程，其病较深，治疗难取速效。如痰湿咳嗽之部分老年患者，由于反复病久，肺脉两伤，可出现痰从寒化为饮，病延及肾的转归，表现为“寒饮伏肺”或“肺气虚寒”证候，成为痰饮咳嗽。至于肺阴亏虚咳嗽，虽然初起轻微，但如延误失治，则往往逐渐加重，成为劳损。部分患者病情逐渐加重，甚至累及于心，最终导致肺、脾、肾诸脏皆虚，痰浊、水饮、气滞、血瘀互结而演变成肺胀。

哮喘

哮喘是一种发作性的痰鸣气喘疾患。发时喉中有哮喘声，呼吸气促困难，甚则喘息不能平卧。《内经》虽无哮喘之名，但在许多篇章里，都有有关哮喘症状、病因病机的记载。如《素问·阴阳别论》所说之“阴争于内，阳扰于外，魄汗未藏，四逆而起，起则熏肺，使人喘鸣”，即包括哮喘症状在内。汉·张仲景《金匱要略·肺痿肺癰咳嗽上气病脉证并治》篇曰：“咳而上气，喉中水鸡声，射干麻黄汤主之。”明确指出了哮喘发作时的特征及治疗，并从病理上将其归属于痰饮病中的“伏饮”证。在《痰饮咳嗽病脉证并治》篇中指出：“膈上病痰，满喘咳吐，发则寒热，背痛腰疼，目泣自出；其人振振身瞤剧，必有伏饮”。此后还有呷嗽、哮喘、齁齁等形象性的命名。元·朱丹溪首创哮喘病名，在《丹溪心法》一书中作为专篇论述，并认为“哮喘必用薄滋味，专主于痰”，提出“未发以扶正气为主，既发以攻邪气为急”的治疗原则。明·虞抟《医学正传》则进一步对哮与喘作了明确的区别，指出“哮以声响言，喘以气息言”。后世医家鉴于“哮必兼喘”，故一般统称“哮喘”，而简名“哮证”、“哮喘”。

以上所论哮喘为一种发作性疾病，属于痰饮病的“伏饮”证，包括西医学的支气管哮喘、喘息性支气管炎、嗜酸性粒细胞增多症(或其他急性肺部过敏性疾患)引起的哮喘：若因肺系或其他多种疾病引起的痰鸣气喘症状，则属于喘证、肺胀等病证范围，但亦可依此辨证论治。

病因

外邪侵袭

外感风寒或风热之邪，未能及时表散，邪蕴于肺，壅阻肺气，气不布津，聚液生痰。如《临证指南医案·哮》说：“若夫哮证，亦由初感外邪，失于表散，邪伏于里，留于肺俞”。或因吸入烟尘、花粉、动物毛屑、异味气体等，影响肺气的宣降，津液凝聚，痰浊内生而致哮。”

饮食不当

过食生冷，寒饮内停，或嗜食酸咸甘肥，积痰蒸热，或进食海膻发物，以致脾失健运，痰浊内生，上干于肺，壅塞气道，而致诱发。《医碥·哮喘》曰：“哮哲者……得之食味酸咸太过，渗透气管，痰入结聚，一遇风寒，气郁痰壅即发。”故古又有称为“食哮”、“鱼腹哮”、“卤哮”、“糖哮”、“醋哮”者。

体虚病后

素质不强，则易受邪侵。如幼儿哮喘往往由于禀赋不足所致，故有称“幼稚天哮”者。若病后体弱，如幼年患麻疹、顿咳，或反复感冒、咳嗽日久等导致肺虚。肺气不足，阳虚阴盛，气不化津，痰饮内生，或阴虚阳盛，热蒸液聚，痰热胶固，均可致哮。一般而言，素质不强多者多以肾为主，而病后所致者多以肺为主。

病机

病理因素以痰为主，如朱丹溪说：“哮喘专主于痰”。痰的产生主要由于人体津液不归正化，凝聚而成，如伏藏于肺，则成为发病的潜在“夙根”，因各种诱因如气候、饮食、情志、劳累等诱发，这些诱因每多错杂相关，其中尤以气候变化为主。《景岳全书·喘促》曰：“喘有夙根，遇寒即发，或遇劳即发者，亦名哮喘。”《症因脉治·哮喘》亦指出：“哮喘之因，痰饮留伏，结成窠臼，潜伏于内，偶有七情之犯，饮食之伤，或外有时令之风寒束其肌表，则哮喘之症作矣。”进而论之，哮喘“夙根”论的实质，主要在于脏腑阴阳失调，素体偏盛偏虚，对津液的运化失常，肺不能布散津液，脾不能输化水精，肾不能蒸化水液，而致凝聚成痰，若痰伏于肺则成为潜在的病理因素。

发作时的基本病理变化为“伏痰”遇感引触，痰随气升，气因痰阻，相互搏结，壅塞气道，肺管狭窄，通畅不利，肺气宣降失常，引动停积之痰，而致痰鸣如吼，气息喘促。《证治汇补·哮喘》说：“哮即痰喘之久而常发者，因内有壅塞之气，外有非时之感，膈有胶固之痰，三者相合，闭拒气道，搏击有声，发为哮喘。”若病因于寒，素体阳虚，痰从寒化，属寒痰为患，则发为冷哮；病因于热，素体阳盛，痰从热化，属痰热为患，则发为热哮；如“痰热内郁，风寒外束”引起发作者，可以表现为外寒内热的寒包热哮；痰浊伏肺，肺气壅实，风邪触发者则表现为风痰哮；反复发作，正气耗伤或素体肺肾不足者，可表现为虚哮。

若长期反复发作，寒疾伤及脾肾之阳，痰热耗灼肺肾之阴，则可从实转虚，在平时表现肺、脾、肾等胃气虚弱之候。肺虚不能主气，气不化津，则痰浊内蕴，肃降无权，并因卫外不固，而更易受外邪的侵袭诱发；脾虚不能化水谷为精微，上输养肺，反而积湿生痰，上贮于肺，则影响肺气的升降；肾虚精气亏乏，摄纳失常，则阳虚水泛为痰，或阴虚虚火灼津成痰，上干于肺，加重肺气之升降失常。由于三脏之间的相互影响，可致同病，表现肺脾气虚或肺肾两虚之象。在平时亦觉短气，疲乏，并有轻度哮喘，难以全部消失。一旦大发作时，容易持续不解，邪实与正虚错综并见。肺肾两虚而痰浊又复壅盛，严重者肺不能治理调节心血的运行，肾虚命门之火不能上济于心，则心阳亦同时受累，甚至发生喘脱之危候。

总之，哮喘是一种反复发作，缠绵难愈的疾病。有部分青少年的患者，随着年龄的增长，正气渐充，肾气日盛，再辅以药物治疗，可以终止发作，而中老年及体弱患者，肾气渐衰弱，发作频繁，则不易根除。或在平时亦有轻度哮喘，若大发作时持续不已，可出现喘急鼻扇，胸高气促，张口抬肩，汗出肢冷，面色青紫，肢体浮肿，烦躁昏昧等喘脱之危候。如长期不愈，反复发作，病由肺脏影响及脾、肾、心，可导致肺气胀满，不能敛降之肺胀重证。

喘证

喘即气喘、喘息。喘证是以呼吸困难，甚至张口抬肩，鼻翼扇动，不能平卧为临床特

征的病证。喘证的症状轻重不一，轻者仅表现为呼吸困难，不能平卧；重者稍动则喘息不已，甚则张口抬肩，鼻翼扇动；严重者，喘促持续不解，烦躁不安，面青唇紫，肢冷，汗出如珠，脉浮大无根，甚则发为喘脱。

喘证名称、症状表现和病因病机最早见于《黄帝内经》。如《灵枢·五阅五使》篇说：“肺病者，喘息鼻张”。《灵枢·本脏》篇：“肺高则上气，肩息咳”。提出肺为主病之脏，并描述了喘证的症状表现。《素问·五邪》篇说：“邪在肺，则病皮肤痛，寒热，上气喘，汗出，喘动肩背。”《素问·举痛论》又说：“劳则喘息汗出。”指出喘证病因既有外感，也有内伤，病机亦有虚实之别。此外，《素问·喘论》云：“心痰者，脉不通，烦则心下鼓，暴上气而喘。”《素问·经脉别论》云：“有所坠恐，喘出于肝”，提示喘虽以肺为主，亦涉及它脏。汉·张仲景《金匱要略·肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治》中所言“上气”即是指气喘、肩息、不能平卧的证候，亦包括“喉中水鸡声”的哮病和“咳而上气”的肺胀。金元时期的医家对喘证的论述各有补充。如刘河间论喘因于火热，他说“病寒则气衰而息微，病热则气关而息粗……故寒则息迟气微，热则息数气粗而为喘也。”而元·朱丹溪认识到七情、饱食、体虚等皆可成为内伤致喘之因，在《丹溪心法·喉》中说：“六淫七情之所感伤，饱食动作，脏气不和，呼吸之息，不得宣畅而为喘急。亦有脾肾俱虚，体弱之人，皆能发喘”。明代张景岳把喘证归纳成虚实两大证。《景岳全书·喘促》：“实喘者有邪，邪气实也；虚喘者无邪，元气虚也。”指出了喘证的辨证纲领。清·叶天士《临证指南医案·喉》提出：“在肺为实，在肾为虚”。林佩琴《类证治裁·喘证》认为：“喘由外感者治肺，由内伤者治肾。”这些论点，对指导临床实践具有重要意义。

喘证虽是一个独立的病证，但可见于多种急慢性疾病过程中，所涉及的范围很广，不仅多见于肺系疾病，且可因其他脏腑病变影响于肺所致，因此应结合辨病，西医学如肺炎、喘息性支气管炎、肺气肿、肺源性心脏病、心源性哮喘、肺结核、矽肺以及癆症等发生以呼吸困难为主要表现时，均可参照辨证施治。

病机

喘证的发病机理主要在肺和肾，涉及肝脾。因肺为气之主，司呼吸，外合皮毛，内为五脏华盖，为气机出入升降之枢纽。肺的宣肃功能正常，则吐浊吸清，呼吸调匀。肾主摄纳，有助于肺气肃降，故有“肺为气之主，肾为气之根”之说。若外邪侵袭，或它脏病气上犯，皆可使肺失宣降，肺气胀满，呼吸不利而致喘。如肺虚气失所主，亦可少气不足以息而为喘。肾为气之根，与肺同司气体之出纳，故肾元不固，摄纳失常则气不归原，阴阳不相接续，气逆于肺而为喘。另外，如脾经痰浊上干，以及中气虚弱，土不生金，肺气不足；或肝气上逆乘肺，升多降少，均可致肺气上逆而为喘。

喘证的病理性质有虚实之分。实喘在肺，为外邪、痰浊、肝郁气逆，邪壅肺气，宣降不利所致；虚喘责之肺、肾两脏，因阳气不足，阴精亏耗，而致肺肾出纳失常，且尤以气虚为主。实喘病久伤正，由肺及肾；或虚喘复感外邪，或夹痰浊，则病情虚实错杂，每多

表现为邪气壅阻于上，肾气亏虚于下的上盛下虚证候。

喘证的严重阶段，不但肺肾俱虚，在孤阳欲脱之时，每每影响到心。因心脉上通于肺，肺气治理调节心血的运行，宗气贯心肺而行呼吸；肾脉上终于心，心肾相互既济，心阳根于命门之火，心脏阳气的盛衰，与先天肾气及后天呼吸之气皆有密切关系。故肺肾俱虚，亦可导致心气、心阳衰急；鼓动血脉无力，血行瘀滞，面色、唇舌、指甲青紫，甚至出现喘汗致脱，亡阴、亡阳的危重局面。

喘证的预后与病程的长短、病邪的性质、病位的深浅有关。一般而论，实喘易治，虚喘难疗。实喘由于邪气壅阻，祛邪利肺则愈，故治疗较易；虚喘为气失摄纳，根本不固，补之未必即效，且每因体虚易感外邪，诱致反复发病，往往喘甚而致汗脱，故难治。《临证指南医案·喘》曾言：“若由外邪壅遏而致者，邪散则喘亦止，后不复发，此喘证之实者也；若因根本有亏，肾虚气逆，浊阴上冲而喘者，此不过一二日之间，则势必危笃，用药亦难奏效，此喘证之属虚者也。”若实喘邪气闭肺，喘息上气，胸闷如窒，呼吸窘迫，身热不得卧，脉急数；虚喘下虚上盛，阴阳离决，孤阳浮越，冲气上逆，见足冷头汗，如油如珠，喘息鼻扇，摇身撷肚，张口抬肩，胸前高起，面赤躁扰，直视便溏，脉浮大急促无根者，均属危候，必须及时救治。

肺痈

肺痈是肺叶生疮，形成脓疮的一种病证，属内痛之一。临床以咳嗽、胸痛、发热、咯吐腥臭浊痰，甚则脓血相兼为主要特征。

肺痈病名首见于汉·张仲景《金匱要略·肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治》，该篇有“咳而胸满振寒，脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥者，为肺痈”的记载，认为其发病原因是“风中于卫，呼气不入，热过于营，吸而不出；风伤皮毛，热伤血脉……热之所过，血为之凝滞，蓄结痈脓”。未成脓时，治以泻肺去痈，用葶苈大枣泻肺汤，已成脓者，治以排脓解毒，用桔梗汤，并提出“始萌可救，脓成则死”的预后判断和强调早期治疗的重要性。后世医家在此基础上续有发展，如隋·巢元方《诸病源候论》强调正虚是发病的重要内因；唐·孙思邈《备急千金要方》创用苇茎汤以清热排脓、活血消痈，成为后世治疗本病之要方；清·张璐《张氏医通·肺痈》强调“肺痈危证乘初起时，极力攻之，庶可救疗”；清·沈金鳌《杂病源流犀烛》力主“清热涤痰”为原则；清·喻昌《医门法律》倡议“以清肺热，救肺气”为要着。明·陈实功《外科正宗》根据病机演变及证候表现，提出初起在表者宜散风清肺，已有里热者宜降火抑阴，成脓者宜平肺排脓，脓溃正虚者宜补肺健脾等治疗原则，对后世分期论治影响较大。近代，大多按肺痈的病机演变分期论治，着重加强清热解毒消痈之力，提高了临床疗效。

根据肺痈的临床表现，与西医学所称肺脓肿基本相同。其它如化脓性肺炎、肺坏疽及支气管扩张、支气管囊肿、肺结核空洞等伴化脓感染而现肺痈证候者，亦可参考辨证施治。

病机

本病病位在肺。总属邪热郁肺，蒸液成痰，邪阻肺络，血滞为瘀，而致痰热与瘀血互结，蕴酿成痈，血败肉腐化脓，肺损络伤，脓疡溃破外泄。其病理主要表现为邪盛的实热证候，脓疡溃后方见阴伤气耗之象。成痈化脓的病理基础，主要在于血瘀。血瘀则热聚，血败肉腐酿脓。正如《灵枢·痈疽》篇所说：“荣卫稽留于经脉之中，则血泣而不行，不行则卫气从之而不通，壅遏而不得行，故热。大热不止，热胜则肉腐，肉腐则为脓。”《医门法律·肺痿肺痈门》亦谓：“肺痈属在有形之血”。《柳选四家医案·环溪草堂医案》明确指出“瘀热”的病理概念：“肺痈之病，皆因邪瘀阻于肺络，久蕴生热，蒸化成脓。”

肺痈的病理演变过程，可以随着病情的发展、邪正的消长，表现为初(表证)期、成痈期、溃脓期、恢复期等不同阶段。初期(表证期)因风热(寒)之邪侵袭卫表，内郁于肺，或内外合邪，肺卫同病，蓄热内蒸，热伤肺气，肺失清肃，出现恶寒、发热、咳嗽等肺卫表证；成痈期为邪热壅肺，蒸液成痰，气分热毒浸淫及血，热伤血脉，血为之凝滞，热壅血瘀，蕴酿成痈，表现高热、振寒、咳嗽、气急、胸痛等痰瘀热毒蕴肺的证候；溃脓期，痰热与瘀血壅阻肺络，肉腐血败化脓，继则肺损络伤，脓疡内溃外泄，排出大量腥臭脓痰或脓血痰；恢复期，脓疡溃后，邪毒渐尽，病情渐趋向好转，但因肺体损伤，故可见邪去正虚，阴伤气耗的病理过程。随着正气的逐渐恢复，病灶趋向愈合。溃后如脓毒不净，邪恋正虚，每致迁延反复，日久不愈，病势时轻时重，最终转为慢性。《张氏医通·肺痈》曾说：“肺痈溃后，脓痰渐稀，气息渐减，忽然臭疾复盛，此余毒未尽，内气复发……但虽屡发，而势渐轻，可许收功，若屡发而疾秽转甚，脉形转疾者，终成不起也。”

凡患本病如能早期确诊，及时治疗，在初期即可阻断病情的发展不致成痈；若在成痈期能使痈肿得到部分消散，则病情较轻，疗程也较短。老人、儿童、体弱和饮酒成癖者患之，因正气虚弱，或肺有郁热，须防其病情迁延不愈或发生变化。

溃脓期是病情顺与逆的转折点：一是顺证：溃后声音清朗，脓血稀而渐少，腥臭味转淡，饮食知味，胸胁稍痛，身体不热，坐卧如常，脉象缓滑。二是逆证：溃后音哑无力，脓血如败卤，腥臭异常，气喘，鼻扇，胸痛，坐卧不安，饮食少进，身热不退，颧红，爪甲青紫带弯，脉短涩或弦急，为肺叶腐败之恶候。

肺癆

肺癆是具有传染性的慢性虚弱疾患，以咳嗽、咯血、潮热、盗汗及身体逐渐消瘦为主要临床特征。病轻者，不一定诸症悉具，重者则每多兼见。对于本病的名称，历代变迁不一，归纳而言，大致有两大类：一类是因其具有传染性而定名的，如尸注、虫疰、传尸、鬼疰等；一类是因其症状特点而定名的，如痞癆骨蒸、劳嗽、肺痿疾、伏连、急癆等。

早在《内经》，对本病的临床特点即有较具体的记载，认为本病属于“虚劳”范围的

慢性虚损性疾病，如《素问·玉机真脏论》说：“大骨枯槁，大肉陷下，胸中气满，喘息不便，内痛引肩项，身热，脱肉破腠……肩髓内消。”《灵枢·玉版》篇云：“咳，脱形，身热，脉小以疾”，均生动地描述了肺癆的主症及其慢性消耗表现。汉代张仲景《金匱要略·虚劳病脉证并治》篇叙述了本病及其合并症，指出“若肠鸣、马刀、挟瘦者，皆为劳得之。”华佗《中藏经·传尸》已认识到本病具有传染的特点，认为“人之血气衰弱，脏腑虚羸……或因酒食而迁，或问病吊丧而得……中此病死之气，染而为疾。”唐·王焘《外台秘要·传尸》则进一步说明了本病的危害：“传尸之候……莫问老少男女，皆有斯疾……不解疗者，乃至天门。”到唐宋晚清时期，明确了本病的病位、病机和治则。唐·孙思邈《千金要方》把“尸注”列入肺脏病篇，明确病位主要在肺。宋·许叔微《普济本事方·诸虫飞尸鬼注》提出本病是由“肺虫”引起，说：“肺虫居肺叶之内，蚀入肺系，故成瘵疾，咳血声嘶。”元·朱丹溪倡“瘵瘵主乎阴虚”之说，确立了滋阴降火的治疗大法。葛可久《十药神书》收录十方，为治疗肺癆我国现存的第一部专著。明·虞抟《医学正传·劳极》则提出“杀虫”和“补虚”的两大治疗原则。

根据本病临床表现及其传染特点，与西医学的肺结核基本相同。若因肺外结核引起的劳损，也可参照辨证论治。

病机

从“瘵虫”侵犯的病变部位而言，主要在于肺脏。由于肺主呼吸，受气于天，吸清呼浊，若肺脏本体虚弱，卫外功能不强，或因其他脏器病变耗伤肺气，导致肺虚，则“瘵虫”极易犯肺，侵蚀肺体，而致发病。《证治汇补·传尸瘵》曾说：“虽分五脏见症，然皆统归于肺”，均明确突出病位主要在肺，因而在临床表现上，多见干咳、咽燥、痰中带血，以及喉疮声嘶等肺系症状。故瘵疾中以肺癆为最常见。

由于脏腑之间有互相滋生、制约的关系，因此在病理情况下，肺脏局部病变，也必然会影响到其他脏器和整体，故有“其邪辗转，乘于五脏”之说，其中与脾肾两脏的关系最为密切，同时也可涉及心肝。

肺肾相生，肾为肺之子，肺虚肾失滋生之源，或肾虚相火灼金，上耗母气，可致肺肾两虚。在肺阴亏损的基础上，伴见骨蒸、潮热、男子遗精、女子月经不调等肾虚症状。若肺虚不能制肝，肾虚不能养肝，肝火偏旺，上逆侮肺，可见性急善怒，胸肋掣痛等症。如肺虚心火乘之，肾虚水不济火，心火偏亢，还可伴见虚烦不寐、盗汗等症。

脾为肺之母。《素问·经脉别论》云：“脾气散精，上归于肺。”肺虚子盗母气则脾亦虚；脾虚不能化水谷精微，上输以养肺，则肺亦虚，终致肺脾同病，土不生金，肺阴虚与脾气虚两候同时出现，伴见疲乏、食少、便溏等脾虚症状。

肺癆久延而病重者，因精血亏损可以发展到肺、脾、肾三脏交亏。或因肺病及肾，肾虚不能助肺纳气；或因脾病及肾，脾不能化精以资肾，由后天而损及先天；甚则肺虚不能佐心治节血脉之运行，而致气虚血瘀，出现气短、喘息、心慌、唇紫、浮肿、肢冷等重症。

病理性质主要在阴虚，并可导致气阴两虚，甚则阴损及阳。肺喜润而恶燥，而瘵虫犯

肺，侵蚀肺叶，肺体受病，阴分先伤，故见阴虚肺燥之候。故《丹溪心法·癆瘵》云：“癆瘵主乎阴虚”。由于病情有轻重之分，病变发展阶段不同，病理也随之演变转化。一般而言，初起肺体受损，肺阴耗伤，肺失滋润，故见肺阴亏损之候；继则阴虚生内热，而致阴虚火旺；或因阴伤气耗，阴虚不能化气，导致气阴两虚，甚则阴损及阳，而见阴阳两虚之候。

一般而言，凡正气较强，病情轻浅，为时短暂，早期治疗者，可获康复。若正气虚弱，治疗不及时，迁延日久，每多演变恶化，全身虚弱症状明显。出现大骨枯槁，大肉尽脱，肌肤甲错，兼有多种合并症。如喉疮声哑，咯血浅红色，似肉似肺；久泻不能自制，腹部冷痛，或有结块；猝然胸痛，喘息胸高，不能平卧；喘息短气，口如鱼口，面浮足肿，面色青晦；内热不退，或时寒时热，汗出如水；脉小数疾者，俱属难治的恶候。

此外，少数患者可呈急性发病，出现剧烈咳嗽，喘促倚息，咳吐大量鲜血，寒热如疟等严重症状，俗称“急癆”、“百日癆”，预后较差。

肺胀

肺胀是多种慢性肺系疾患反复发作，迁延不愈，导致肺气胀满，不能敛降的一种病证。临床表现为胸部膨满，憋闷如塞，喘息上气，咳嗽痰多，烦躁，心悸，面色晦暗，或唇甲紫绀，脘腹胀满，肢体浮肿等。其病程缠绵，时轻时重，经久难愈，严重者可出现神昏、痉厥、出血、喘脱等危重证候。

早在《内经》就有关于肺胀病名的记载，指出病因病机及证候表现，如《灵枢·胀论》篇说：“肺胀者，虚满而喘咳。”《灵枢·经脉》篇又说：“肺手太阳之脉……是动则病肺胀满膨膨而喘咳。”汉·张仲景《金匱要略·肺痿肺痛咳嗽上气病脉证治》篇指出：“咳而上气，此为肺胀，其人喘，目如脱状”，书中所载治疗肺胀之越婢加半夏汤、小青龙加石膏汤等方至今仍被临床所沿用。此外在《痰饮咳嗽病脉证并治》篇中所述之支饮，症见“咳逆倚息，短气不得卧，其形如肿”，当亦属于肺胀范畴。隋·巢元方《诸病源候论·咳逆短气候》认为，肺胀的发病机理是由于“肺虚为微寒所伤则咳嗽，嗽则气还于肺间则肺胀，肺胀则气逆，而肺本虚，气为不足，复为邪所乘，壅痞不能宣畅，故咳逆，短乏气也。”后世医籍多将本病附载于肺痿、肺痛之后，有时亦散见于痰饮、喘促、咳嗽等门，在认识上不断有所充实发展。如元·朱丹溪提出肺胀的发生与痰瘀互结，阻碍肺气有关。清·张璐《张氏医通》认为肺胀以“实证居多”，李用粹《证治汇补·咳嗽》提出对肺胀的辨证施治当分虚实两端，“又有气散而胀者，宜补肺，气逆而胀者，宜降气，当参虚实而施治。”对肺胀的临床辨治有一定的参考价值。

根据肺胀的临床证候特点，与西医学中慢性支气管炎合并肺气肿、肺源性心脏病相类似，肺性脑病则常见于肺胀的危重变证，可参考进行辨治。但由于本病是临床常见的慢性疾病，病理演变复杂多端，还当与咳嗽、痰饮（支饮、溢饮）等互参，注意与心悸、水肿（喘肿）、喘厥等病证的联系。

病机

病变首先在肺，继则影响脾、肾，后期病及于心。因肺主气，开窍于鼻，外合皮毛，职司卫外，为人身之藩篱，故外邪从口鼻、皮毛入侵，每多首先犯肺，以致肺之宣降功能不利，气逆于上而为咳，升降失常则为喘。久则肺虚，肺之主气功能失常，影响呼吸的出入，肺气壅滞，还于肺间，导致肺气胀满，不能敛降。如若肺病及脾，子盗母气，脾失健运，则可导致肺脾两虚。肺为气之主，肾为气之根，若久病肺虚及肾，金不生水，致肾气衰惫，肺不主气，肺不纳气，则气喘日益加重，呼吸短促难续，吸气尤为困难，动则更甚。心脉上通于肺，肺气辅佐心脏治理、调节心血的运行，心阳根于命门真火，故而肺虚治节失职，或肾虚命门火衰，均可病及于心，使心气、心阳衰竭，甚则可以出现喘脱等危候。

病理因素主要为痰浊、水饮与血瘀互为影响，兼见同病。痰的产生，病初由肺气郁滞，脾失健运，津液不归正化而成，渐因肺虚不能化津，脾虚不能转输，肾虚不能蒸化，痰浊愈益潴留，喘咳持续难已。久阳虚阴盛，气不化津，痰从寒化为饮为水，饮留上焦，迫肺则咳逆上气，凌心则心悸气短；痰湿困于中焦，则纳减呕恶，脘腹胀满，便溏；饮溢肌肤则为水肿尿少；饮停胸胁、腹部而为悬饮、水膨之类。痰浊潴肺，病久势深，肺虚不能治理调节心血的运行，“心主”营运过劳，心气、心阳虚衰，无力推动血脉、则致血行涩滞，可见心动悸，脉结代，口、舌、甲床紫绀，颈脉动甚。肺脾气虚，气不摄血，可导致咳血、吐血、便血等。心主血而肝藏血，肝主疏泄，为调血之脏，心脉不利，肝脏疏调失职，血郁于肝，瘀结胁下，则致癥积。

痰浊、水饮、血瘀三者之间又互相影响和转化。如痰从寒化则成饮；饮溢肌表则为水；痰浊久留，肺气郁滞，心脉失畅则血郁为瘀；瘀阻血脉，“血不利则为水”。但一般早期以痰浊为主，渐而痰瘀并见，终至痰浊、血瘀、水饮错杂为患。

病程中由于肺虚卫外不固，尤易感受外邪而使病情诱发或加重。若复感风寒，则可成为外寒内饮之证。感受风热或痰郁化热，可表现为痰热证。如痰浊壅盛，或痰热内扰，闭阻气道，蒙蔽神窍，则可发生烦躁、嗜睡、昏迷等变证。若痰热内郁，热动肝风，可见肉瞤、震颤，甚则抽搐，或因动血而致出血。

病理性质多属标实本虚，但有偏实、偏虚的不同，且多以标实为急。外感诱发时则偏于邪实，平时偏于本虚。早期由肺而及脾、肾，多属气虚、气阴两虚；晚期以肺、肾、心为主，气虚及阳，或阴阳两虚，但纯属阴虚者罕见。正虚与邪实每多互为因果。如阳虚卫外不固，易感外邪，痰饮难蠲；阴虚则外邪、痰浊易从热化，故虚实诸候常夹杂出现，每致愈发愈频，甚则持续不已。

本病多属积渐而成，病程缠绵，经常反复发作，难以期望根治。尤其是老年患者，发病后若不及时控制，极易发生变端。故《金匱要略·肺痿肺癰咳嗽上气病脉证治》说：“上气，面浮肿，肩息，其脉浮大，不治，又加利，尤甚。”《证治汇补·咳嗽》说：“若肺胀壅遏，不得卧眠，喘息鼻扇者难治。”如气不摄血，则见咳吐泡沫血痰，或致吐血、便血；如若痰迷心窍，肝风内动，则谵语昏迷，震颤，抽搐；如见喘脱，神昧，汗出，肢冷，

脉微欲绝者，乃阴阳消亡危重之候。

肺痿

肺痿，是指肺叶痿弱不用，临床以咳吐浊唾涎沫为主症，为肺脏的慢性虚损性疾患。《金匱要略心典·肺痿肺癰咳嗽上气病脉证治》说：“痿者萎也，如草木之萎而不荣。”肺痿病名，最早见于张仲景的《金匱要略》。该书将肺痿列为专篇，对肺痿的主症特征、病因、病机、辨证均做了较为系统的介绍。如《金匱要略·肺痿肺癰咳嗽上气病脉证治》说：“寸口脉数，其人咳，口中反有浊唾涎沫者何？师曰：为肺癰之病”。唐孙思邈《千金要方·肺痿门》将肺痿分为热在上焦及肺中虚冷二类，认为“肺痿虽有寒热之分，从无实热之例。”提出虚寒肺痿可用生姜甘草汤、甘草汤，虚热肺痿可用炙甘草汤、麦门冬汤等。历代医家均认识到肺痿是多种肺系疾病的慢性转归，肺癰、肺癆、久嗽、喘哮等伤肺，均有转化成为肺痿的可能，故常与相关疾病合并叙述。唐·王焘《外台秘要·咳嗽门》引许仁则论云：“肺气嗽经久将成肺痿；其状不限四时冷热，昼夜嗽常不断，唾白如雪，细沫稠黏，喘息气上，乍寒乍热，发作有时，唇、口、喉、舌干焦，亦有时唾血者，渐觉瘦悴，小便赤，颜色青白，毛耸，此亦成蒸。”说明久嗽劳嗽，劳热熏肺，肺阴大伤，进一步发展则成肺痿。

明·王肯堂《证治准绳·诸气门》说：“久嗽咳血成肺痿”。陈实功《外科正宗·肺癰论》中说：“久嗽劳伤，咳吐痰血，寒热往来，形体消削，咯吐瘀脓，声哑咽痛，其候传为肺痿。”指出肺癰溃后“热毒不净，伤阴耗气，可以转为肺痿。清·张璐《张氏医通·肺痿》将其治疗要点概括为“缓而图之，生胃津，润肺燥，下逆气，开积痰，止浊唾，补真气……散火热”七个方面，旨在“以通肺之小管”，“以复肺之清肃。”理义精深，非常切合实用。沈金鳌《杂病源流犀烛·肺病源流》进一步对肺痿的用药忌宜等作了补充：“其症之发，必寒热往来，自汗，气急，烦间多唾，或带红线脓血，宜急治之，切忌升散辛燥温热。大约此症总以养肺、养气、养血、清金、降火为主”。

凡某些慢性肺实质性病变如肺纤维化、肺硬变、肺不张等，临床表现肺痿特征者，均可对应分析病症而辨证施治。

病机

本病发病机理，总缘肺脏虚损，津气严重耗伤，以致肺叶枯萎。因津伤则燥，燥盛则干，肺叶弱而不用则痿。清·喻嘉言《医门法律·肺痿肺癰门》说：“肺痿者，肺气痿而不振也”。“总由肺中津液不输于肺，肺失所养，转枯转燥”，“于是肺火日炽，肺热日深，肺中小管日窒。”指出肺脏虚损，津液亡失，则肺叶枯萎而不用。

病理性质有肺燥津伤、肺气虚冷之分。尤在泾在《金匱要略心典·肺痿肺癰咳嗽上气病脉证治》说：“盖肺为娇脏，热则气灼，故不用而痿；冷则气沮，故亦不用而痿也。”是以其病理表现有虚热、虚寒两类，一是虚热肺痿：一为本脏自病所转归，一由失治误治或它脏之病导致。因热在上焦，消亡津液，阴虚生内热，津枯则肺燥，肺燥且热，清肃之令不行，脾胃上输之津液转从热化，煎熬而成浊唾涎沫。或因脾阴胃液耗伤，不能上输于

肺，肺失濡养，遂致肺叶枯萎。火逆上气则喘咳气促，虚火灼津炼液而成浊唾涎沫。二是虚寒肺痿：肺气虚冷，不能温化、固摄津液，由气虚导致津亏；或阴伤及阳，气不化津，以致肺失濡养，渐致肺叶枯萎不用。肺气虚冷，不能温化、布散脾胃上输之津液则反而聚为涎沫；肺气失于治节，“上虚不能制下”，膀胱失于约束，则小便频数，或逼尿失禁。

综上所述，本病总由肺虚，津气大伤，失于濡养，以致肺叶枯萎。其病位在肺，但与脾、胃、肾等脏密切相关。脾虚气弱，无以生化、布散津液，或胃阴耗伤，胃津不能上输养肺，土不生金，均可致肺燥津枯，肺失濡养；久病及肾，肾气不足，气不化津，或因肾阴亏耗，肺失濡养，亦可发为肺痿。

肺痿属内伤虚证，病情较重而迁延难愈，如治疗正确，调理适宜，病情稳定改善，可带病延年，或可获愈。如治疗不当，或不注意调摄，则使病情恶化，以至不治。若见张口短气，喉哑声嘶，咯血，皮肤干枯，脉沉涩而急或细数无神者，预后多不良。

呼吸系统诸病

燥热痰热蕴肺型痰黄黏燥咳少痰干咳支气管炎

【药名】	二母宁嗽丸
【处方】	川贝母 225g 知母 225g 石膏 300g 炒栀子 180g 黄芩 180g 蜜桑白皮 150g 茯苓 150g 炒瓜蒌子 150g 陈皮 150g 麸炒枳实 150g 炙甘草 30g 五味子(蒸) 30g。
【性状】	本品为棕褐色的水蜜丸或大蜜丸；气微香，味甜，微苦。
【功能与主治】	清肺润燥，化痰止咳。用于燥热蕴肺所致的咳嗽、痰黄而黏不易咳出、胸闷气促、久咳不止、声哑喉痛。
【用法与用量】	口服。大蜜丸一次 1 丸，水蜜丸一次 6g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 大蜜丸每丸重 9g；(2) 水蜜丸每 100 丸重 10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄蛇胆川贝液
【处方】	人工牛黄，川贝母，蛇胆汁，薄荷脑。
【性状】	本品为淡黄色至棕黄色液体；味甜、微苦，有凉喉感。
【功能与主治】	清热、化痰、止咳。用于热痰、燥痰咳嗽，症见咳嗽、痰黄或干咳、咯痰不爽。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 3 次；小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	1) 每支装 10ml；(2) 每瓶装 100ml；(3) 每瓶装 150ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	祛痰灵口服液
【处方】	鲜竹沥 450ml 鱼腥草 180g。
【性状】	本品为淡棕黄色至棕黄色的液体，气香，味甜。
【功能与主治】	清肺化痰。用于痰热壅肺所致的咳嗽、痰多、喘促；急、慢性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 30ml，一日 3 次；二岁以下一次 15ml，一日 2 次；二至六岁一次 30ml，一日 2 次；六岁以上一次 30ml，一日 2~3 次；或遵医嘱。
【注意】	便溏者慎用。
【规格】	每支装 30ml。
【贮藏】	密封，遮光，置阴凉处保存。

【药名】	葶贝胶囊
【处方】	葶苈子，蜜麻黄，川贝母，苦杏仁，瓜蒌皮，石膏，黄芩，鱼腥草，旋覆花，赭石，白果，蛤蚧，桔梗，甘草。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕红色至棕色的粉末；气微，味苦。
【功能与主治】	清肺化痰，止咳平喘。用于痰热壅肺所致的咳嗽、咯痰、喘息、胸闷、苔黄或黄腻；慢性支气管炎急性发作见上述证候者。
【用法与用量】	饭后服用。每次 4 粒，一日 3 次；7 天为一疗程或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	竹沥达痰丸
【处方】	黄芩 200g 大黄(酒制) 200g 甘草 100g 半夏(制) 150g 橘红 200g 沉香 50g。
【性状】	本品为绿褐色的水丸；气微香，味苦。
【功能与主治】	豁除顽痰，清火顺气。用于痰热上壅，顽痰胶结，咳喘痰多，大便干燥，烦闷癫狂。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	每 50 丸重 3g。
【贮藏】	密封。

肺肾阴虚型燥咳少痰痰中带血虚劳久咳哮喘气短

【药名】	百合固金口服液
【处方】	百合 23g 地黄 46g 熟地黄 69g 麦冬 34g 玄参 18g 川贝母 23g 当归 23g 白芍 23g 桔梗 18g 甘草 23g。
【性状】	本品为棕色的液体；气微香，味甘、微苦。
【功能与主治】	养阴润肺，化痰止咳。用于肺肾阴虚，燥咳少痰，痰中带血，咽干喉痛。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 10ml；(2) 每瓶装 20ml；(3) 每瓶装 100ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	百合固金丸
【处方】	百合 100g 熟地黄 300g 玄参 80g 当归 100g 桔梗 80g 地黄 200g 麦冬 150g 川贝母 100g 白芍 100g 甘草 100g。
【性状】	本品为黑褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸微甜。
【功能与主治】	养阴润肺，化痰止咳。用于肺肾阴虚，燥咳少痰，痰中带血，咽干喉痛。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 小蜜丸每 100 丸重 20g；(2) 大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	百合固金丸(浓缩丸)
【处方】	百合 100g 熟地黄 300g 玄参 80g 当归 100g 桔梗 80g 地黄 200g 麦冬 150g 川贝母 100g 白芍 100g 甘草 100g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的浓缩丸；味甜、微苦。
【功能与主治】	养阴润肺，化痰止咳。用于肺肾阴虚，燥咳少痰，痰中带血，咽干喉痛。

【用法与用量】	口服。一次8丸，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每8丸相当饮片3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	百合固金片
【处方】	百合45.8g 熟地黄137.4g 玄参36.6g 当归45.8g 桔梗36.6g 地黄91.6g 麦冬68.7g 川贝母45.8g 白芍45.8g 甘草45.8g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；味甜、微苦。
【功能与主治】	养阴润肺，化痰止咳。用于肺肾阴虚，燥咳少痰，痰中带血，咽干喉痛。
【用法与用量】	口服。一次5片〔规格(1)〕或一次3片〔规格(2)〕，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每片重0.4g；(2)每片重0.45g。
【贮藏】	密封。

【药名】	百合固金颗粒
【处方】	百合25.4g 熟地黄76.3g 玄参20.3g 当归25.4g 桔梗20.3g 地黄50.8g 麦冬38.1g 川贝母25.4g 白芍25.4g 甘草25.4g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	养阴润肺，化痰止咳。用于肺肾阴虚，燥咳少痰，痰中带血，咽干喉痛。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	蛤蚧定喘丸
【处方】	蛤蚧11g 瓜蒌子50g 紫菀75g 麻黄45g 醋鳖甲50g 黄芩50g 甘草50g 麦冬50g 黄连30g 百合75g 炒紫苏子25g 石膏25g 炒苦杏仁50g 煅石膏25g。
【性状】	本品为棕色至棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；气微，味苦、甜。
【功能与主治】	滋阴清肺，止咳平喘。用于肺肾两虚，阴虚肺热所致的虚劳久咳、年老哮喘、气短烦热、胸满郁闷、自汗盗汗。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次5~6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)小蜜丸每60丸重9g；(2)大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	蛤蚧定喘胶囊
【处方】	蛤蚧28.2g 炒紫苏子64.1g 瓜蒌子128.2g 炒苦杏仁128.2g 麻黄115.4g 石膏64.1g 甘草128.2g 紫菀192.3g 醋鳖甲128.2g 黄芩128.2g 麦冬128.2g 黄连76.9g 百合192.3g 煅石膏64.1g。

【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕色的颗粒与粉末，味苦。
【功能与主治】	滋阴清肺，止咳平喘。用于肺肾两虚、阴虚肺热所致的虚劳咳喘、气短胸满、自汗盗汗。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日2次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

肺脾气虚肾不纳气型咳嗽气管炎肺气肿支气管哮喘

【药名】	固本咳喘片
【处方】	党参 151g 白术(麸炒) 151g 茯苓 100g 麦冬 151g 盐补骨脂 151g 炙甘草 75g 醋五味子 75g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味甜、微酸、微苦、涩。
【功能与主治】	益气固表，健脾补肾。用于脾虚痰盛、肾气不固所致的咳嗽、痰多、喘息气促、动则喘剧；慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每片重0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	固肾定喘丸
【处方】	熟地黄 72g 牡丹皮 52g 盐补骨脂 156g 车前子 104g 盐益智仁 52g 山药 104g 金樱子肉 52g 附片(黑顺片) 78g 牛膝 104g 砂仁 42g 茯苓 104g 肉桂 52g 泽泻 78g。
【性状】	本品为黑色的包衣水蜜丸，除去包衣后显棕褐色；气芳香，味苦。

【功能与主治】	温肾纳气，健脾化痰。用于肺脾气虚、肾不纳气所致的咳嗽、气喘、动则尤甚；慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1.5~2.0g，一日2~3次，可在发病预兆前服用，也可预防久喘复发，一般服15天为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	慢支固本颗粒
【处方】	黄芪，白术，当归，防风。
【性状】	本品为灰黄色至黄棕色的颗粒；气微香，味微甘、辛。
【功能与主治】	补肺健脾，固表和营。用于慢性支气管炎缓解期之肺脾气虚证，症见乏力，自汗，恶风寒，咳嗽、咯痰，易感冒，食欲不振。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装10g。
【贮藏】	密封。

肺虚型咳嗽气喘痰多肺气肿气管炎支气管炎

【药名】	复方蛤青片
【处方】	干蟾180g 黄芪225g 白果90g 紫菀112.5g 苦杏仁112.5g 前胡67.5g 附片22.5g 南五味子67.5g 黑胡椒22.5g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色至棕褐色；气微，味微苦、涩。
【功能与主治】	补气敛肺，止咳平喘，温化痰饮。用于肺虚咳嗽，气喘痰多；老年慢性气管炎、肺气肿、喘息性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3片，一日3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	润肺止咳丸
【处方】	天冬15g 地黄9g 天花粉15g 瓜蒌子(蜜炙)15g 蜜桑白皮15g 炒紫苏子9g 炒苦杏仁6g 紫菀15g 浙贝母9g 款冬花15g 桔梗6g 醋五味子15g 前胡6g 醋青皮15g 陈皮9g 炙黄芪9g 炒酸枣仁9g 黄芩15g 知母9g 淡竹叶9g 炙

【性状】	甘草 6g。
【功能与主治】	本品为黄褐色至棕褐色的大蜜丸；味甜、微苦。 润肺定喘，止咳化痰。用于肺气虚弱所致的咳嗽喘促、痰涎壅盛、久嗽声哑。
【用法与用量】	口服。一次 2 丸，一日 2 次。
【注意】	忌食油腻食物。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

肺热型咳嗽痰多作喘支气管炎

【药名】	清肺化痰丸
【处方】	酒黄芩 60g 瓜蒌子 60g 胆南星(砂炒)30g 陈皮 60g 麸炒枳壳 60g 桔梗 60g 炒莱菔子 30 甘草 30g 苦杏仁 60g 川贝母 30g 法半夏(砂炒)60g 茯苓 60g 蜜麻黄 30g 白苏子 30g 蜜款冬花 30g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；味甜、苦、微麻。
【功能与主治】	降气化痰，止咳平喘。用于肺热咳嗽，痰多作喘，痰涎壅盛，肺气不畅。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)水蜜丸每袋装 6g；(2)大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	蛇胆川贝软胶囊
【处方】	蛇胆汁 21.4g 川贝母 128.6g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为浅黄色的油状混悬物；味微苦。
【功能与主治】	清肺，止咳，除痰。用于肺热咳嗽，痰多。
【用法与用量】	口服。一次 2~4 粒，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	蛇胆川贝胶囊
【处方】	蛇胆 49g 川贝母 295g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄色至浅棕色的粉末；味甘、苦。
【功能与主治】	清肺，止咳，除痰。用于肺热咳嗽，痰多。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 粒，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	蛇胆川贝散
【处方】	蛇胆汁 100g 川贝母 600g。
【性状】	本品为浅黄色至浅棕黄色的粉末；味甘、苦。
【功能与主治】	清肺，止咳，除痰。用于肺热咳嗽，痰多。
【用法与用量】	口服。一次 0.3~0.6g，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 (1)0.3g；(2)0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	五味沙棘散
【处方】	本品系蒙古族验方：沙棘膏 180g 木香 150g 白葡萄干 120g 甘草 90g 梔子 60g。
【性状】	本品为深棕色的粉末；气香，味酸、甘而苦、涩。
【功能与主治】	清热祛痰，止咳定喘。用于肺热久嗽，喘促痰多，胸中满闷，胸胁作痛；慢性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3g，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装 3g；(2)每袋装 15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	羚羊清肺颗粒
【处方】	浙贝母 31.7g 前胡 19.8g 天冬 19.8g 地黄 39.6g 石斛 79.3g 蜜枇杷叶 39.6g 金果榄 19.8g 大青叶 19.8g 黄芩 19.8g 牡丹皮 19.8g 甘草 11.9g 陈皮 23.8g 蜜桑白皮 19.8g 麦冬 19.8g 天花粉 39.6g 玄参 39.6g 桔梗 39.6g 炒苦杏仁 19.8g 金银花 39.6g 梔子 39.6g 板蓝根 19.8g 薄荷 19.8g 熟大黄 19.8g 羚羊角粉 4.8g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	清肺利咽，清瘟止嗽。用于肺胃热盛，感受时邪，身热头晕，四肢酸懒，咳嗽痰盛，咽喉肿痛，鼻衄咳血，口干舌燥。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

肺心病气虚血瘀型咳喘气促乏力酸软口唇紫绀

【药名】	补肺活血胶囊
【处方】	黄芪 720g 赤芍 720g 补骨脂 360g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的细颗粒和粉末；气微香，味微酸，苦。
【功能与主治】	益气活血，补肺固肾。用于肺心病(缓解期)属气虚血瘀证，症见咳嗽气促，或咳喘胸闷，心悸气短，肢冷乏力，腰膝酸软，口唇紫绀，舌淡苔白或舌紫暗。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封。

阴虚肺燥肺热型燥咳痰喘少痰胸闷气短口燥咽干

【药名】	枇杷叶膏
【处方】	枇杷叶。
【性状】	本品为黑褐色稠厚的半流体；味甜、微涩。
【功能与主治】	清肺润燥，止咳化痰。用于肺热燥咳，痰少咽干。
【用法与用量】	口服。一次 9~15g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	养阴清肺丸
【处方】	地黄 200g 麦冬 120g 玄参 160g 川贝母 80g 白芍 80g 牡丹皮 80g 薄荷 50g 甘草 40g。
【性状】	本品为棕黑色至黑色的大蜜丸或水蜜丸，味甜、微苦。
【功能与主治】	养阴润燥，清肺利咽。用于阴虚肺燥，咽喉干痛，干咳少痰或痰中带血。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	水蜜丸每 100 粒重 10g；大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	养阴清肺口服液
【处方】	地黄 100g 麦冬 60g 玄参 80g 川贝母 40g 白芍 40g 牡丹皮 40g 薄荷 25g 甘草 20g。
【性状】	本品为黄棕色至红棕色的澄清液体；有薄荷及牡丹皮的香气，味甜、微苦、

<p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>有清凉感。</p> <p>养阴润燥，清肺利咽。用于阴虚肺燥，咽喉干痛，干咳少痰或痰中带血。</p> <p>口服。一次10ml，一日2~3次。</p> <p>无。</p> <p>每支装10ml。</p> <p>密封，置阴凉处。</p>
--	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>养阴清肺膏</p> <p>地黄100g 麦冬60g 玄参80g 川贝母40g 白芍40g 牡丹皮40g 薄荷25g 甘草20g。</p> <p>本品为棕褐色稠厚的半流体；气香，味甜，有清凉感。</p> <p>养阴润燥，清肺利咽。用于阴虚肺燥，咽喉干痛，干咳少痰或痰中带血。</p> <p>口服。一次10~20ml，一日2~3次。</p> <p>无。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>洋参保肺丸</p> <p>罂粟壳120g 川贝母60g 砂仁30g 麻黄30g 石膏30g 玄参60g 五味子(醋炙)30g 陈皮60g 枳实60g 苦杏仁60g 甘草60g 西洋参45g。</p> <p>本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微苦。</p> <p>滋阴补肺，止咳定喘。用于阴虚肺热，咳嗽痰喘，胸闷气短，口燥咽干，睡卧不安。</p> <p>口服。一次2丸，一日2~3次。</p> <p>感冒咳嗽者忌服。</p> <p>每丸重6g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>八味檀香散</p> <p>本品系蒙古族验方：檀香200g 石膏100g 红花100g 甘草100g 丁香100g 北沙参100g 拳参100g 白葡萄干100g。</p> <p>本品为棕黄色的粉末，气香，味甘、微涩而凉。</p> <p>清热润肺，止咳化痰，用于肺热咳嗽，痰中带脓。</p> <p>口服。一次2~3g，一日1~2次。</p> <p>无。</p> <p>每袋装15g。</p> <p>密封，防潮。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p>	<p>川贝雪梨膏</p> <p>梨清膏400g 川贝母50g 麦冬100g 百合50g 款冬花25g。</p> <p>本品为棕黄色的稠厚半流体；味甜。</p>
--	--

【功能与主治】	润肺止咳，生津利咽。用于阴虚肺热，咳嗽，喘促，口燥咽干。
【用法与用量】	口服。一次 15g，一日 2 次。
【注意】	忌辛辣食物。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	二冬膏
【处方】	天冬 500g 麦冬 500g。
【性状】	本品为黄棕色稠厚的半流体；味甜、苦。
【功能与主治】	养阴润肺。用于肺阴不足引起的燥咳痰少、痰中带血、鼻干咽痛。
【用法与用量】	口服。一次 9~15g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

虚劳久咳型痰喘支气管哮喘肺气肿肺心病

【药名】	二母安嗽丸
【处方】	知母 108g 玄参 108g 罌粟壳 216g 麦冬 108g 款冬花 324g 紫菀 108g 苦杏仁 108g 百合 108g 浙贝母 54g。
【性状】	本品为褐色至黑褐色的大蜜丸；味甜、苦。
【功能与主治】	清肺化痰，止嗽定喘。用于虚劳久嗽，咳嗽痰喘，骨蒸潮热，音哑声重，口燥舌干，痰涎壅盛。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	七味葡萄散
【处方】	本品系蒙古族验方：白葡萄干 180g 石膏 90g 红花 90g 甘草 90g 香附 60g 肉桂 60g 石榴 60g。
【性状】	本品为黄棕色的粉末；气香，味甘、微涩。
【功能与主治】	清肺，止嗽，定喘。用于虚劳咳嗽，年老气喘，胸满郁闷。
【用法与用量】	口服。一次 3g，一日 1~2 次，
【注意】	无。
【规格】	每袋装 15g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	强力枇杷膏(蜜炼)
【处方】	罂粟壳 50g 白前 9g 桔梗 6g 枇杷叶 69g 百部 15g 桑白皮 6g 薄荷脑 0.15g。
【性状】	本品为黄棕色稠厚的半流体；气香，味甜。
【功能与主治】	养阴敛肺，镇咳祛痰。用于久咳劳嗽、支气管炎。
【用法与用量】	口服。一次 20g，一日 3 次，小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 180g。(2) 每瓶装 240g。(3) 每瓶装 300g。
【贮藏】	密封。

【药名】	止咳喘颗粒
【处方】	满山红 556g 桔梗 167g 炙甘草 194g。
【性状】	本品为黄棕色的颗粒；味甜。
【功能与主治】	止咳，平喘，祛痰。用于支气管炎，咳喘，痰多，痰稠，感冒咳嗽，肺病吐脓，胸满胁痛。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 3 次，小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	如意定喘片
【处方】	蛤蚧 14g 制蟾酥 0.8g 黄芪 45g 地龙 45g 麻黄 45g 党参 45g 苦杏仁 72g 白果 45g 枳实 21g 天冬 36g 南五味子(酒蒸) 45g 麦冬 36g 紫菀 36g 百部 18g 枸杞子 27g 熟地黄 45g 远志 18g 葶苈子 18g 洋金花 18g 石膏 18g 炙甘草 45g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显浅棕色至棕褐色，气微，味微甜、微苦。
【功能与主治】	宣肺定喘，止咳化痰，益气养阴。用于气阴两虚所致的久咳气喘、体弱痰多；支气管哮喘、肺气肿、肺心病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2~4 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	糖衣片(片心重 0.25g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	牡荆油胶丸
【处方】	本品为牡荆油与适量稀释剂经加工制成的胶丸。
【性状】	本品为黄棕色的透明胶丸，内容为淡黄色至橙黄色的油质液体；有特殊的香气。
【功能与主治】	祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎。
【用法与用量】	口服。一次1~2丸，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每丸含牡荆油20mg。
【贮藏】	密封，遮光，置阴凉处。

【药名】	金水宝片
【处方】	发酵虫草菌粉(Cs-4)500g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅棕色至棕褐色；气香，味微苦。
【功能与主治】	补益肺肾，秘精益气。用于肺肾两虚，精气不足，久咳虚喘，神疲乏力，不寐健忘，腰膝痠软，月经不调，阳痿早泄；慢性支气管炎、慢性肾功能不全、高脂血症、肝硬化见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5片〔规格(1)〕，一次4片〔规格(2)〕，一次2片〔规格(3)〕，一日3次；用于慢性肾功能不全者，一次10片〔规格(1)〕，一次8片〔规格(2)〕，一次4片〔规格(3)〕，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)糖衣片(每片含发酵虫草菌粉0.2g)；(2)薄膜衣片每片重0.42g。(3)薄膜衣片每片重0.75g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金水宝胶囊
【处方】	发酵虫草菌粉(Cs-4)330g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容为黄棕色至浅棕褐色的粉末；气香，味微苦。
【功能与主治】	补益肺肾，秘精益气。用于肺肾两虚，精气不足，久咳虚喘，神疲乏力，不寐健忘，腰膝痠软，月经不调，阳痿早泄；慢性支气管炎、慢性肾功能不全、高脂血症、肝硬化见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次；用于慢性肾功能不全者，一次6粒，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.33g。
【贮藏】	密封。

胸满气逆型咳喘胸塞喘急气短气管炎

【药名】	苏子降气丸
【处方】	炒紫苏子 145g 前胡 145g 姜半夏 145g 沉香 102g 厚朴 145g 甘草 145g 陈皮 145g 当归 102g。
【性状】	本品为浅黄色或黄褐色的水丸；气微香，味甜。
【功能与主治】	降气化痰，温肾纳气。用于上盛下虚、气逆痰壅所致的咳嗽喘息、胸膈痞塞。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 1~2 次。
【注意】	阴虚，舌红无苔者忌服。
【规格】	每 13 粒重 1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	克咳片
【处方】	麻黄 360g 罂粟壳 360g 甘草 360g 苦杏仁 360g 莱菔子 112.5g 桔梗 112.5g 石膏 112.5g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显浅黄色至棕褐色；味微苦。
【功能与主治】	止咳，定喘，祛痰。用于咳嗽，喘急气短。
【用法与用量】	口服。一次 2 片〔规格(1)〕或一次 3 片〔规格(2)〕，一日 2 次。
【注意】	心动过速者慎用。高血压及冠心病患者忌服。儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用。不宜常服。
【规格】	每片重(1)0.54g；(2)0.46g。
【贮藏】	密封。

【药名】	咳特灵片
【处方】	小叶榕干浸膏 180g 马来酸氯苯那敏 0.7g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显红棕色；味微苦。
【功能与主治】	镇咳平喘，消炎祛痰。用于咳喘及慢性支气管炎。
【用法与用量】	口服。一次 3 片，一日 2 次。
【注意】	用药期间不宜驾驶机动车、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。
【规格】	每片含小叶榕干浸膏 180mg，马来酸氯苯那敏 0.7mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	咳特灵胶囊
【处方】	小叶榕干浸膏 360g 马来酸氯苯那敏 1.4g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕红色至红棕色粉末或四色颗粒；味微苦。
【功能与主治】	镇咳平喘，消炎祛痰。用于咳喘及慢性支气管炎。
【用法与用量】	口服。一次 1 粒，一日 3 次。
【注意】	用药期间不宜驾驶机动车、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。
【规格】	每粒含小叶榕干浸膏 360mg，马来酸氯苯那敏 1.4mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	消炎止咳片
【处方】	胡颓子叶 167g 太子参 167g 罌粟壳 10g 黄荆子 104g 穿心莲 104g 桔梗 125g 百部 83g 麻黄 21g 南沙参 31g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显污绿色至棕褐色；气微，味苦。
【功能与主治】	消炎，镇咳，化痰，定喘。用于咳嗽痰多，胸满气逆。气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 糖衣片(片心重 0.3g、0.4g)；(2) 薄膜衣片(每片重 0.3g、0.31g、0.35g、0.41g、0.42g)。
【贮藏】	密封。

阳虚痰阻型咳嗽痰多白痰喘促畏寒冬季加重

【药名】	定喘膏
【处方】	血余炭 400g 洋葱 400g 附子 200g 生川乌 200g 制天南星 200g 干姜 200g。
【性状】	本品为摊于布上或纸上的黑膏药。
【功能与主治】	温阳祛痰，止咳定喘。用于阳虚痰阻所致的咳嗽痰多、气急喘促、冬季加重。
【用法与用量】	温热软化，外贴肺俞穴。
【注意】	无。
【规格】	每张净重(1)10g。(2)20g。
【贮藏】	密闭，置阴凉干燥处。

【药名】	痰饮丸
【处方】	肉桂 167g 淡附片 250g 苍术 500g 麸炒白术 500g 炒紫苏子 333g 炒莱菔子

【性状】	500g 干姜 167g 炒白芥子 250g 炙甘草 167g。
【功能与主治】	本品为棕褐色至黑褐色的浓缩水丸；气微香，味辛、微苦。 温补脾肾，助阳化饮。用于脾肾阳虚、痰饮阻肺所致的咳嗽、气促发喘、咯吐白痰、畏寒肢冷、腰痠背冷、腹胀食少。
【用法与用量】	口服。一次 14 丸，一日 2 次，儿童酌减。
【注意】	孕妇禁服。心脏病、高血压患者慎用。
【规格】	每丸重 0.18g。
【贮藏】	密封。

痰湿痰浊阻肺型痰多咳嗽支气管炎百日咳

【药名】	二陈丸
【处方】	陈皮 250g 半夏(制)250g 茯苓 150g 甘草 75g。
【性状】	本品为灰棕色至黄棕色的水丸，气微香，味甘、微辛。
【功能与主治】	燥湿化痰，理气和胃。用于痰湿停滞导致的咳嗽痰多、胸脘胀闷、恶心呕吐。
【用法与用量】	口服。一次 9~15g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	杏仁止咳合剂
-------------	---------------

【处方】	杏仁水 40ml 百部流浸膏 20ml 远志流浸膏 22.5ml 陈皮流浸膏 15ml 桔梗流浸膏 20ml 甘草流浸膏 15ml。
【性状】	本品为浅黄棕色至红棕色的液体；气香，味甜、苦涩。
【功能与主治】	化痰止咳。用于痰浊阻肺，咳嗽痰多；急、慢性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 15ml，一日 3~4 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	复方满山红糖浆
【处方】	满山红 200g 百部 100g 罂粟壳 50g 桔梗 100g 远志 100g。
【性状】	本品为棕褐色的黏稠液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	止咳，祛痰，平喘。用于痰浊阻肺引起的咳嗽，痰多，喘息；急、慢性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5~10ml，一日 3 次。
【注意】	本品含罂粟壳不宜长期服用。
【规格】	每瓶装 100ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	桔梗冬花片
【处方】	桔梗 300g 款冬花 37g 制远志 63g 甘草 20g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味微甜。
【功能与主治】	止咳祛痰。用于痰浊阻肺所致的咳嗽痰多，支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 6~8 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	蛇胆陈皮片
【处方】	蛇胆汁 26g 陈皮 156g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的片或薄膜衣片，薄膜衣片除去包衣后显棕黄色至棕褐色；气微香，味甘、辛、微苦。
【功能与主治】	理气化痰，祛风和胃。用于痰浊阻肺，胃失和降，咳嗽、呕逆。
【用法与用量】	口服。一次 2~4 片或 1~2 片（薄膜衣片），一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 素片每片重 0.22g；(2) 素片每片重 0.32g。(3) 薄膜衣片每片重 0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	蛇胆陈皮散
【处方】	蛇胆汁 100g 陈皮(蒸) 600g。
【性状】	本品为黄棕色至红棕色的粉末；气微香，味甘、微辛、微苦。

【功能与主治】	理气化痰，祛风和胃。用于痰浊阻肺，胃失和降，咳嗽、呕逆。
【用法与用量】	口服。一次 0.3~0.6g，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 (1)0.3g；(2)0.6g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	蛇胆陈皮胶囊
【处方】	蛇胆汁 49g 陈皮(蒸)295g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至红棕色的粉末；气微香，味甘、辛、微苦。
【功能与主治】	理气化痰，祛风和胃。用于痰浊阻肺，胃失和降，咳嗽、呕逆。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 粒，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	橘红化痰丸
【处方】	化橘红 75g 川贝母 75g 罌粟壳 75g 白矾 75g 锦灯笼 100g 炒苦杏仁 100g 五味子 75g 甘草 75g。
【性状】	本品为棕色的大蜜丸；味苦。
【功能与主治】	敛肺化痰，止咳平喘。用于肺气不敛，痰浊内阻，咳嗽，咯痰，喘促，胸膈满闷。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	不宜久服。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	橘红痰咳液
【处方】	化橘红 300g 蜜百部 30g 茯苓 30g 半夏(制)30g 白前 50g 甘草 10g 苦杏仁 100g 五味子 20g。
【性状】	本品为棕色的液体；气芳香，味甜、微苦。
【功能与主治】	理气化痰，润肺止咳。用于痰浊阻肺所致的咳嗽、气喘、痰多；感冒、支气管炎、咽喉炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 3 次。
【注意】	风热者忌用。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	鹭鸶咯丸
【处方】	麻黄 12g 石膏 60g 细辛 6g 炒芥子 12g 瓜蒌皮 60g 青黛 30g 天花粉 60g 苦杏仁 60g 甘草 12g 炒紫苏子 60g 炒牛蒡子 30g 射干 30g 蛤壳 60g 栀子(姜

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>炙) 60g 人工牛黄 5g。</p> <p>本品为黑绿色的大蜜丸；气微，味甜、苦。</p> <p>宣肺、化痰、止咳。用于痰浊阻肺所致的顿咳、咳嗽，症见咳嗽阵作、痰鸣气促、咽干声哑；百日咳见上述证候者。</p> <p>梨汤或温开水送服。一次 1 丸，一日 2 次。</p> <p>无。</p> <p>每丸重 1.5g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>止喘灵注射液</p> <p>麻黄，洋金花，苦杏仁，连翘。</p> <p>本品为浅黄色的澄明液体。</p> <p>宣肺平喘，祛痰止咳。用于痰浊阻肺、肺失宣降所致的哮喘、咳嗽、胸闷、痰多；支气管哮喘、喘息性支气管炎见上述证候者。</p> <p>肌注。一次 2ml，一日 2~3 次；七岁以下儿童酌减。1~2 周为一个疗程，或遵医嘱。</p> <p>青光眼患者禁用；严重高血压、冠心病、前列腺肥大、尿潴留患者在医生指导下使用。</p> <p>每支装 2ml。</p> <p>遮光、密闭。</p>
---	--

痰涎水饮停于胸膈型咳喘隐痛顽痰瘰疬痰核

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>控涎丸</p> <p>醋甘遂 300g 白芥子 300g 红大戟 300g。</p> <p>本品为棕褐色带有淡黄色斑点的糊丸；味微辛、辣。</p> <p>涤痰逐饮。用于痰涎水饮停于胸膈，胸胁隐痛，咳喘痛甚，痰不易出，瘰疬，痰核。</p> <p>用温开水或枣汤、米汤送服。一次 1~3g，一日 1~2 次。</p> <p>孕妇忌服；体虚者慎用。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---	--

寒痰犯肺型咳嗽咳痰色白急慢性支气管炎

【药名】	消咳喘糖浆
【处方】	满山红 200g。
【性状】	本品为红褐色的液体；气香，味甜、辛、苦。
【功能与主治】	止咳，祛痰，平喘。用于寒痰阻肺所致的咳嗽气喘、咯痰色白；慢性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 3 次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 (1) 50ml。(2) 100ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	十六味冬青丸
【处方】	本品系蒙古族验方：冬青叶 150g 石榴 25g 石膏 75g 肉桂 50g 豆蔻 50g 木香 50g 丁香 50g 甘草 50g 白葡萄干 125g 沉香 75g 拳参 75g 芫荽 50g 肉豆蔻 50g 红花 50g 广枣 50g 方海 50g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；气微香，味甘辛、微苦而涩。
【功能与主治】	宽胸顺气，止咳定喘。用于胸满腹胀，头昏浮肿，寒嗽痰喘。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	满山红油胶囊
【处方】	满山红油 50g。
【性状】	本品为黄棕色透明的胶丸，内容物为黄棕色油状液体，有特异香气。
【功能与主治】	止咳祛痰。用于寒痰犯肺所致的咳嗽、咳痰色白；急、慢性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 0.05~0.1g，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每丸含满山红油 0.05g。(2) 每丸含满山红油 0.1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	华山参片
【处方】	本品为华山参浸膏片。

【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味苦。
【功能与主治】	温肺平喘，止咳祛痰。用于寒痰停饮犯肺所致的气喘咳嗽、吐痰清稀；慢性气管炎、喘息性气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。常用量，一次1~2片，一日3次；极量，一次4片，一日3次。
【注意】	青光眼患者忌服，孕妇和前列腺极度肥大者慎用。
【规格】	0.12mg。
【贮藏】	密封。

痰热阻肺型咳嗽痰多胸满气短痰黄黏支气管炎百日咳

【药名】	止咳橘红口服液
【处方】	化橘红 66g 法半夏 33g 款冬花 22g 瓜蒌皮 44g 麦冬 44g 桔梗 33g 陈皮 44g 茯苓 44g 甘草 22g 紫菀 33g 知母 22g 地黄 44g 石膏 44g 炒紫苏子 33g 苦杏仁(去皮炒)44g。
【性状】	本品为棕黑色的液体；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	清肺，止咳，化痰。用于痰热阻肺引起的咳嗽痰多、胸满气短、咽干喉痒。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日2~3次；或遵医嘱。
【注意】	忌食辛辣油腻。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	止咳橘红丸
【处方】	化橘红 396g 法半夏 198g 陈皮 264g 茯苓 264g 甘草 132g 炒紫苏子 198g 炒苦杏仁 264g 紫菀 198g 款冬花 132g 麦冬 264g 瓜蒌皮 264g 知母 132g 桔梗 198g 地黄 264g 石膏 264g。
【性状】	本品为黄褐色至深棕褐色水蜜丸或大蜜丸；味微甘、苦。
【功能与主治】	清肺，止咳，化痰。用于痰热阻肺引起的咳嗽痰多、胸满气短、咽干喉痒。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次9g，大蜜丸一次2丸，一日2次。
【注意】	忌食辛辣油腻物。
【规格】	(1)水蜜丸每10粒重1g。(2)大蜜丸每丸重6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	止嗽化痰丸
【处方】	罂粟壳 625g 知母 125g 陈皮 125g 炙甘草 125g 石膏 250g 紫苏叶 125g 款冬

<p>【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>花(制)125g 玄参 125g 密蒙花 75g 五味子(制)75g 瓜蒌子 125g 木香 75g 桑叶 125g 桔梗 250g 前胡 125g 大黄(制)125g 川贝母 125g 苦杏仁 187.5g 葶苈子 125g 百部(制)125g 麦冬 125g 天冬 125g 枳壳(炒)125g 半夏(姜制)250g 马兜铃(制)125g。</p> <p>本品为黄褐色或褐色的水丸；气微，味微酸、苦。</p> <p>清肺化痰，止咳定喘。用于痰热阻肺，久嗽，咯血，痰喘气逆，喘息不眠。</p> <p>临睡前服用。一次 15 丸，一日 1 次。口服。</p> <p>风寒咳嗽者不宜服用。</p> <p>每 6~7 丸重 1g。</p> <p>密封。</p>
--	--

<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>羊胆丸</p> <p>羊胆干膏 53g 白及 200g 甘草 60g 百部 150g 浙贝母 100g。</p> <p>本品为灰黄色的水丸；气微腥，味甘、苦。</p> <p>止咳化痰，止血。用于痰火阻肺所致的咳嗽咯痰、痰中带血；百日咳见上述证候者。</p> <p>口服。一次 3g，一日 3 次。</p> <p>无。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
--	---

<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>灯台叶颗粒</p> <p>灯台叶 700g。</p> <p>本品为淡黄色至淡棕黄色颗粒；气芳香而清凉，味甜、苦。</p> <p>清热化痰止咳。用于痰热阻肺所致的咳嗽、咯痰；慢性支气管炎、百日咳见上述证候者。</p> <p>开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。</p> <p>孕妇慎服。</p> <p>每袋装 10g。</p> <p>密封。</p>
--	---

<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>芩暴红止咳口服液</p> <p>满山红 420g 暴马子皮 420g 黄芩 200g。</p> <p>本品为棕红色的澄清液体；味甜，微苦。</p> <p>清热化痰，止咳平喘。用于痰热壅肺所致的咳嗽、痰多；急性支气管炎及慢性支气管炎急性发作见上述证候者。</p> <p>口服。一次 10ml，一日 3 次，或遵医嘱。</p> <p>无。</p> <p>每支装 10ml。</p> <p>密封，避光，置阴凉处。</p>
--	---

【药名】	芩暴红止咳片
【处方】	满山红 1050g 暴马子皮 1050g 黄芩 500g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦、涩。
【功能与主治】	清热化痰，止咳平喘。用于痰热壅肺所致的咳嗽、痰多；急性支气管炎及慢性支气管炎急性发作见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重 0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	枇杷止咳胶囊
【处方】	枇杷叶 312g 罂粟壳 250g 百部 75g 白前 45g 桑白皮 30g 桔梗 29g 薄荷脑 0.8g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰褐色至黄褐色的粉末；气芳香，味凉、微苦涩。
【功能与主治】	止咳化痰。用于痰热蕴肺所致的咳嗽、咯痰；支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	枇杷止咳颗粒
【处方】	枇杷叶 228g 罂粟壳 167g 百部 50g 白前 30g 桑白皮 20g 桔梗 19g 薄荷脑 0.53g。
【性状】	本品为浅黄色至黄棕色的颗粒；气芳香，味甜。
【功能与主治】	止咳化痰。用于痰热蕴肺所致的咳嗽、咯痰；支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 3g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	枇杷止咳软胶囊
【处方】	枇杷叶 342g 百部 75g 罂粟壳 250g 白前 45g 桑白皮 30g 桔梗 28.5g 薄荷脑 0.8g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为棕褐色的液体；气微香，味凉、微苦涩。
【功能与主治】	止咳化痰。用于痰热蕴肺所致的咳嗽、咯痰；支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.55g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金贝痰咳清颗粒
-------------	----------------

【处方】	浙贝母，金银花，前胡，炒苦杏仁，桑白皮，桔梗，射干，麻黄，川芎，甘草。
【性状】	本品为黄棕色的颗粒；气微香，味甜、微苦。
【功能与主治】	清肺止咳，化痰平喘。用于痰热阻肺所致的咳嗽、痰黄黏稠、喘息；慢性支气管炎急性发作见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每袋装7g。
【贮藏】	密封。

【药名】	治咳川贝枇杷滴丸
【处方】	枇杷叶 226.7g 桔梗 20g 水半夏 66.7g 川贝母 23.3g 薄荷脑 0.5g。
【性状】	本品为包衣滴丸，除去包衣后显棕色至深棕色；气香，味微苦，有清凉感。
【功能与主治】	清热化痰止咳。用于感冒、支气管炎属痰热阻肺证，症见咳嗽、痰黏或黄。
【用法与用量】	口服或含服。一次3~6丸，一日3次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重30mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	治咳川贝枇杷露
【处方】	枇杷叶 68g 桔梗 6g 水半夏 20g 川贝母流浸膏 7ml 薄荷脑 0.15g。
【性状】	本品为棕红色的澄清液体；气香、味甜、有清凉感。
【功能与主治】	清热化痰止咳。用于感冒、支气管炎属痰热阻肺证，症见咳嗽、痰黏或黄。
【用法与用量】	口服。一次10~20ml，一日3次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	(1)每瓶装150ml。(2)每瓶装180ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	咳喘宁口服液
【处方】	麻黄 134g 石膏 67g 苦杏仁 133g 桔梗 67g 百部 67g 罂粟壳 67g 甘草 133g。
【性状】	本品为棕红色的液体；气微香，味微苦。
【功能与主治】	宣通肺气，止咳平喘。用于痰热阻肺所致的咳嗽频作、咯痰色黄、喘促胸闷。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日2次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装10ml。
【贮藏】	密闭。

【药名】	咳喘顺丸
【处方】	紫苏子 120g 茯苓 150g 苦杏仁 90g 款冬花 120g 前胡 120g 陈皮 50g 瓜蒌仁 180g 鱼腥草 300g 半夏(制) 100g 桑白皮 150g 紫菀 120g 甘草 100g。

【性状】	本品为黑色的包衣浓缩水蜜丸，除去包衣后显深褐色，味微苦。
【功能与主治】	宣肺化痰，止咳平喘。用于痰浊壅肺、肺气失宣所致的咳嗽、气喘、痰多、胸闷；慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5g，一日3次，7天为一个疗程。
【注意】	无。
【规格】	每1g相当于饮片1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方鲜竹沥液
【处方】	鲜竹沥 400ml 鱼腥草 150g 生半夏 25g 生姜 25g 枇杷叶 150g 桔梗 75g 薄荷素油 1ml。
【性状】	本品为黄棕色至棕色的液体；气香，味甜。
【功能与主治】	清热化痰，止咳。用于痰热咳嗽，痰黄黏稠。
【用法与用量】	口服。一次20ml，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装(1)10ml(2)20ml(3)30ml(4)100ml(5)120ml(6)20ml(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	清气化痰丸
【处方】	酒黄芩 100g 半夏(制) 150g 陈皮 100g 枳实 100g 瓜蒌仁霜 100g 胆南星 150g 苦杏仁 100g 茯苓 100g。
【性状】	本品为灰黄色的水丸；气微，味苦。
【功能与主治】	清肺化痰。用于痰热阻肺所致的咳嗽痰多、痰黄稠黏、胸腹满闷。
【用法与用量】	口服。一次6~9g，一日2次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	清肺抑火丸
【处方】	黄芩 140g 栀子 80g 知母 60g 浙贝母 90g 黄柏 40g 苦参 60g 桔梗 80g 前胡 40g 天花粉 80g 大黄 120g。
【性状】	本品为淡黄色至黄褐色的水丸，或为棕褐色的大蜜丸；气微，味苦。
【功能与主治】	清肺止咳，化痰通便。用于痰热阻肺所致的咳嗽、痰黄稠黏、口干咽痛、大便干燥。
【用法与用量】	口服。水丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日2~3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清肺消炎丸
【处方】	麻黄，地龙，葶苈子，炒苦杏仁，石膏，牛蒡子，人工牛黄，羚羊角。

【性状】	本品为棕褐色的水蜜丸；气腥，味微辛、苦。
【功能与主治】	清肺化痰，止咳平喘。用于痰热阻肺，咳嗽气喘，胸胁胀痛，吐痰黄稠；上呼吸道感染、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作及肺部感染见上述证候者。
【用法与用量】	口服。周岁以内一次 10 丸，一至三岁一次 20 丸，三至六岁一次 30 丸，六至十二岁一次 40 丸，十二岁以上及成人一次 60 丸，一日 3 次。
【注意】	风寒表证引起的咳嗽、心功能不全者慎用。
【规格】	每 60 丸重 8g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清热镇咳糖浆
【处方】	葶苈子 26g 矮地茶 26g 鱼腥草 44g 荆芥 35g 知母 26g 前胡 35g 板栗壳 44g 浮海石 44g。
【性状】	本品为褐色至深褐色的黏稠液体；味甜。
【功能与主治】	清热、镇咳、祛痰。用于痰热蕴肺所致的咳嗽痰黄；感冒、咽炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 15~20ml 一日 3 次。
【注意】	不宜久服。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	贝羚胶囊
【处方】	川贝母，猪去氧胆酸，沉香，煅青礞石(飞)，羚羊角，人工麝香，人工天竺黄(飞)，硼砂(炒)。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕黄色的粉末和颗粒；气特异，味微苦。
【功能与主治】	清热化痰，止咳平喘。用于痰热阻肺，气喘咳嗽；小儿肺炎、喘息性支气管炎及成人慢性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 0.6g，一日 3 次；小儿一次 0.15~0.6g，周岁以内酌减，一日 2 次。
【注意】	大便溏稀者不宜使用。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	橘红丸
【处方】	陈皮 50g 茯苓 50g 桔梗 37.5g 炒紫苏子 37.5g 款冬花 25g 浙贝母 50g 麦冬 50g 化橘红 75g 半夏(制) 37.5g 甘草 25g 苦杏仁 50g 紫菀 37.5g 瓜蒌皮 50g 地黄 50g 石膏 50g。
【性状】	本品为棕褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气微香，味甜、微苦。
【功能与主治】	清肺，化痰，止咳。用于痰热咳嗽，痰多，色黄黏稠，胸闷口干。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 7.2g，小蜜丸一次 12g，大蜜丸一次 2 丸（每丸重 6g）或 4 丸（每丸重 3g），一日 2 次。
【注意】	无。

【规格】	水蜜丸每 100 丸重 10g；大蜜丸每丸重 (1) 3g。(2) 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	橘红片
【处方】	化橘红 174.4g 法半夏 87.2g 甘草 58.1g 苦杏仁 116.3g 紫菀 87.2g 瓜蒌皮 116.3g 地黄 116.3g 石膏 116.3g 陈皮 116.3g 茯苓 116.3g 桔梗 87.2g 炒紫苏子 87.2g 款冬花 58.1g 浙贝母 116.3g 麦冬 116.3g。
【性状】	本品为浅黄棕色至黄褐色的片；气香，味微甘、苦。
【功能与主治】	清肺，化痰，止咳。用于痰热咳嗽，痰多，色黄黏稠，胸闷口干。
【用法与用量】	口服。一次 6 片，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每片重 0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	橘红胶囊
【处方】	化橘红 166.7g 法半夏 83g 甘草 55.5g 苦杏仁 111g 紫菀 83g 瓜蒌皮 111g 地黄 111g 石膏 111g 陈皮 111g 茯苓 111g 桔梗 83g 炒紫苏子 83g 款冬花 55.5g 浙贝母 111g 麦冬 111g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的粉末和颗粒；味苦，微甜。
【功能与主治】	清肺，化痰，止咳。用于痰热咳嗽，痰多，色黄黏稠，胸闷口干。
【用法与用量】	口服。一次 5 粒，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	橘红颗粒
【处方】	化橘红 70.8g 法半夏 35.4g 甘草 23.6g 苦杏仁 47.2g 紫菀 35.4g 瓜蒌皮 47.2g 地黄 47.2g 石膏 47.2g 陈皮 47.2g 茯苓 47.2g 桔梗 35.4g 炒紫苏子 35.4g 款冬花 23.6g 浙贝母 47.2g 麦冬 47.2g。
【性状】	本品为棕黄色至深棕色的颗粒；味甜。
【功能与主治】	清肺，化痰，止咳。用于痰热咳嗽，痰多，色黄黏稠，胸闷口干。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 11g。
【贮藏】	密封。

肝火犯肺型头晕耳鸣咳嗽吐衄痰多黄稠口渴心烦

【药名】	黛蛤散
【处方】	青黛 30g 蛤壳 300g。
【性状】	本品为灰蓝色的粉末；味淡。
【功能与主治】	清肝利肺，降逆除烦。用于肝火犯肺所致的头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 1 次，随处方入煎剂。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，防潮。

外感风寒型咳嗽痰多清稀头痛鼻塞支气管炎哮喘

【药名】	止咳宝片
【处方】	紫苑，桔梗，百部，陈皮，荆芥，甘草，前胡，橘红，枳壳，五味子，干姜，罂粟，氯化铵，薄荷素油。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后，显棕黑色；味微苦、咸。
【功能与主治】	宣肺祛痰，止咳平喘。用于外感风寒所致的咳嗽、痰多清稀、咳甚而喘；慢性支气管炎、上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 片，一日 3 次；或遵医嘱。7 日为一疗程，可以连续服用三至五个疗程。
【注意】	(1) 孕妇、婴儿及哺乳期妇女忌服。(2) 肺热、肺燥之干咳及咳痰带血者慎用。(3) 服药期间不宜再受风寒，并禁食冷物、辣椒及各种酒类。
【规格】	每片重 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	风寒咳嗽颗粒
【处方】	陈皮 100g 法半夏 150g 苦杏仁 100g 紫苏叶 100g 桑白皮 100g 生姜 150g 青皮 100g 麻黄 100g 五味子 100g 炙甘草 100g。
【性状】	本品为浅褐色的颗粒；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	宣肺散寒，祛痰止咳。用于外感风寒、肺气不宣所致的咳嗽，症见头痛鼻

【用法与用量】	塞、痰多咳嗽、胸闷气喘。 开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	阴虚干咳者慎用。
【规格】	每袋装5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	风寒咳嗽丸
【处方】	陈皮100g 青皮100g 麻黄100g 五味子100g 炙甘草100g 法半夏150g 苦杏仁100g 紫苏叶100g 桑白皮100g 生姜150g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的水丸；味微苦。
【功能与主治】	宣肺散寒，祛痰止咳。用于外感风寒、肺气不宣所致的咳嗽，症见头痛鼻塞、痰多咳嗽、胸闷气喘。
【用法与用量】	口服，一次6~9克，一日2次。
【注意】	阴虚干咳者慎用。
【规格】	每袋装6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	通宣理肺丸
【处方】	紫苏叶144g 前胡96g 桔梗96g 苦杏仁72g 麻黄96g 甘草72g 陈皮96g 半夏(制)72g 茯苓96g 枳壳(炒)96g 黄芩96g。
【性状】	本品为黑棕色至黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；味微甜、略苦。
【功能与主治】	解表散寒，宣肺止咳。用于风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次7g，大蜜丸一次2丸，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)水蜜丸每100丸重10g；(2)大蜜丸每丸重6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	通宣理肺片
【处方】	紫苏叶180g 桔梗120g 麻黄120g 陈皮120g 茯苓120g 黄芩120g 前胡120g 苦杏仁90g 甘草90g 半夏(制)90g 麸炒枳壳120g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显灰棕色至棕褐色；气香，味微苦。
【功能与主治】	解表散寒，宣肺止咳。用于风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣每片重0.3g；(2)糖衣片(片心重0.29g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	通宣理肺胶囊
【处方】	紫苏叶343g 桔梗229g 麻黄229g 陈皮229g 茯苓229g 黄芩229g 前胡229g

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>苦杏仁 171g 甘草 171g 姜半夏 171g 枳壳(炒)229 黄芩 229g。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为混有白色粉末的棕色粉末；味苦。</p> <p>解表散寒，宣肺止嗽。用于风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。</p> <p>口服。一次 2 粒，一日 2~3 次。</p> <p>无。</p> <p>每粒装 0.36g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>通宣理肺颗粒</p> <p>紫苏叶 144g 前胡 96g 桔梗 96g 苦杏仁 72g 麻黄 96g 甘草 72g 陈皮 96g 半夏(制)72g 茯苓 96g 枳壳(炒)96g 黄芩 96g。</p> <p>本品为黄棕色的颗粒；气香，味甜、苦或气香、味微苦(无蔗糖)。</p> <p>解表散寒，宣肺止嗽。用于风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。</p> <p>开水冲服。一次 1 袋，一日 2 次。</p> <p>高血压、癫痫、中风、心律不齐患者慎用。</p> <p>(1) 每袋装 9g；(2) 每袋装 3g(无蔗糖)。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>远志酊</p> <p>本品为远志流浸膏经加工制成的酊剂。</p> <p>本品为棕色的液体。</p> <p>祛痰药。用于咳痰不爽。</p> <p>口服。一次 2~5ml，一日 6~15ml。</p> <p>无。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>杏苏止咳颗粒</p> <p>苦杏仁 63g 陈皮 47g 紫苏叶 63g 前胡 63g 桔梗 47g 甘草 16g。</p> <p>本品为浅黄棕色至黄棕色的颗粒；气芳香，味甜、微苦。</p> <p>宣肺散寒，止咳祛痰。用于风寒感冒咳嗽，气逆。</p> <p>开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次；小儿酌减。</p> <p>无。</p> <p>每袋装 12g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p>	<p>杏苏止咳糖浆</p> <p>苦杏仁 63g 陈皮 47g 紫苏叶 63g 前胡 63g 桔梗 47g 甘草 16g。</p> <p>本品为浅棕黄色至棕黄色的黏稠液体；气芳香，味甜。</p>
-------------------------------------	--

【功能与主治】	宣肺散寒，止咳祛痰。用于风寒感冒咳嗽，气逆。
【用法与用量】	口服。一次10~15ml，一日3次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	复方川贝精片
【处方】	麻黄浸膏适量(相当于盐酸麻黄碱和盐酸伪麻碱的总量2.1g)川贝母25g 陈皮94g桔梗94g五味子53g甘草浸膏15g法半夏75g远志53g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；味苦、微辛。
【功能与主治】	宣肺化痰，止咳平喘。用于风寒咳嗽、痰喘引起的咳嗽气喘、胸闷、痰多；急、慢性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3~6片，一日3次。小儿酌减。
【注意】	高血压、心脏病患者及孕妇慎用。
【规格】	薄膜衣片每片重0.26g。
【贮藏】	密封。

【药名】	宣肺止咳合剂
【处方】	荆芥50g前胡50g桔梗50g蜜百部50g蜜紫菀50g陈皮42g鱼腥草75g薄荷42g蜜罌粟壳50g蜜甘草42g。
【性状】	本品为红棕色至棕褐色的液体；气芳香，味微甜。
【功能与主治】	疏风宣肺，止咳化痰。用于咳嗽属风邪犯肺证，症见咳嗽、咽痒、鼻塞流涕、恶寒发热、咯痰。
【用法与用量】	口服。一次20ml，一日3次，
【注意】	无。
【规格】	(1)每支装20ml；(2)每瓶装100ml；(3)每瓶装120ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	桂龙咳喘宁胶囊
【处方】	桂枝，龙骨，白芍，生姜，大枣，炙甘草，牡蛎，黄连，法半夏，瓜蒌皮，炒苦杏仁。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕色的粉末；气芳香，味微苦而甜。
【功能与主治】	止咳化痰，降气平喘。用于外感风寒、痰湿阻肺引起的咳嗽、气喘、痰涎壅盛；急慢性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次。
【注意】	服药期间忌烟、酒、猪肉及生冷食物。
【规格】	每粒装0.5g(相当于饮片1.67g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	桂龙咳喘宁颗粒
【处方】	桂枝，龙骨，白芍，生姜，大枣，炙甘草，牡蛎，黄连，法半夏，瓜蒌皮，

【性状】	炒苦杏仁。
【功能与主治】	本品为浅黄棕色的颗粒；气香，味甜。 止咳化痰，降气平喘。用于外感风寒、痰湿阻肺引起的咳嗽、气喘、痰涎壅盛；急慢性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	用药期间忌烟、酒、猪肉及生冷食物。
【规格】	每袋装6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	三拗片
【处方】	麻黄 833g 苦杏仁 833g 甘草 833g 生姜 500g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显褐色至棕褐色；气香，味微苦。
【功能与主治】	宣肺解表。用于风寒袭肺证，症见咳嗽声重，咳嗽痰多，痰白清稀；急性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每片重0.5g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	镇咳宁糖浆
【处方】	甘草流浸膏 40ml 桔梗 80g 盐酸麻黄碱 0.8g 桑白皮 20g。
【性状】	本品为深褐色的黏稠液体；气芳香，味甜。
【功能与主治】	止咳，平喘，祛痰。用于风寒束肺所致的咳嗽、气喘、咯痰；支气管炎、支气管哮喘见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5~10ml，一日3次。
【注意】	在医生指导下用药；冠心病心绞痛和甲状腺功能亢进患者慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

外感风热型咳嗽发热恶寒咽痛急慢性支气管炎

【药名】	急支糖浆
【处方】	鱼腥草，金荞麦，四季青，麻黄，紫菀，前胡，枳壳，甘草。
【性状】	本品为棕黑色的黏稠液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热化痰，宣肺止咳。用于外感风热所致的咳嗽，症见发热、恶寒、胸膈满闷、咳嗽咽痛；急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次20~30ml，一日3~4次；儿童周岁以内一次5ml，一至三岁一次7ml，三至七岁一次10ml，七岁以上一次15ml，一日3~4次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每瓶装100ml。(2)每瓶装200ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	百咳静糖浆
【处方】	陈皮96g 前胡48g 清半夏48g 蜜百部72g 桑白皮48g 蜜麻黄48g 炒紫苏子48g 桔梗48g 麦冬48g 炒苦杏仁48g 黄芩96g 黄柏96g 甘草48g 炒葶苈子48g 炒天南星32g 瓜蒌子(炒)48g。
【性状】	本品为黑褐色的黏稠液体；气香，味微苦涩。
【功能与主治】	清热化痰，止咳平喘。用于外感风热所致的咳嗽、咯痰；感冒，急、慢性支气管炎，百日咳见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一至二岁一次5ml，三至五岁一次10ml，成人一次20~25ml，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每支装10ml；(2)每瓶装60ml；(3)每瓶装100ml。(4)每瓶装120ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	川贝止咳露(川贝枇杷露)
【处方】	川贝母5g 枇杷叶130.9g 百部23.4g 前胡14.1g 桔梗9.1g 桑白皮9.4g 薄荷脑0.16g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的液体；气芳香，味甜、凉、苦。
【功能与主治】	止咳祛痰。用于风热咳嗽，痰多上气或燥咳。
【用法与用量】	口服。一次15ml，一日3次；小儿减半。
【注意】	无。
【规格】	(1)每瓶装100ml；(2)每瓶装120ml；(3)每瓶装150ml。

【贮藏】	密封，置阴凉处。
-------------	----------

【药名】	川贝枇杷糖浆
【处方】	川贝母流浸膏 45ml 桔梗 45g 枇杷叶 300g 薄荷脑 0.34g。
【性状】	本品为棕红色的黏稠液体；气香，味甜、微苦、凉。
【功能与主治】	清热宣肺，化痰止咳。用于风热犯肺、痰热内阻所致的咳嗽痰黄或咯痰不爽、咽喉肿痛、胸闷胀痛；感冒、支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	止嗽定喘口服液
【处方】	麻黄 1000g 甘草 1000g 苦杏仁 1000g 石膏 1000g。
【性状】	本品为棕黄色的液体；气微香，味甜、微酸、涩。
【功能与主治】	辛凉宣泄，清肺平喘。用于表寒里热，身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷，急性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 2~3 次，儿童酌减。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

支气管哮喘急性发作期热哮痰瘀伏肺证痰鸣如吼

【药名】	蠲哮片
【处方】	葶苈子，青皮，陈皮，黄荆子，槟榔，大黄，生姜。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显褐色；气清香，味苦。
【功能与主治】	泻肺除壅，涤痰祛瘀，利气平喘。用于支气管哮喘急性发作期热哮痰瘀伏肺证，症见气粗痰涌、痰鸣如吼、咳呛阵作、痰黄稠厚。
【用法与用量】	口服。一次 8 片，一日 3 次，饭后服用。7 天为一疗程。
【注意】	(1) 孕妇及久病体虚、脾胃虚弱便溏者禁用。(2) 服药后如出现大便偏稀、轻度腹痛，属正常现象，可继续用药或减少用量。
【规格】	每片重 0.3g。
【贮藏】	密封。

小儿咳嗽百日咳支气管炎感冒咳嗽高热惊风

【药名】	小儿止咳糖浆
【处方】	甘草流浸膏 150ml 桔梗流浸膏 30ml 氯化铵 10g 橙皮甙 20ml。

【性状】	本品为红棕色的半透明黏稠液体；味甜。
【功能与主治】	祛痰，镇咳。用于小儿感冒引起的咳嗽。
【用法与用量】	口服。二至五岁一次 5ml，五岁以上一次 5~10ml，二岁以下酌减，一日 3~4 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 60ml；(2) 每瓶装 100ml；(3) 每瓶装 120ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿止嗽糖浆
【处方】	玄参 14g 麦冬 14g 胆南星 14g 杏仁水 12ml 焦槟榔 10g 桔梗 10g 竹茹 10g 桑白皮 10g 天花粉 10g 川贝母 10g 瓜蒌子 10g 甘草 10g 炒紫苏子 7g 知母 7g 紫苏叶油 0.02ml。
【性状】	本品为深棕色的澄清液体；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	润肺清热，止嗽化痰。用于小儿痰热内蕴所致的发热、咳嗽、黄痰、咳吐不爽、口干舌燥、腹满便秘、久嗽痰盛。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 2 次；周岁以内酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 10ml；(2) 每瓶装 120ml。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	小儿百部止咳糖浆
【处方】	蜜百部 100g 苦杏仁 50g 桔梗 50g 桑白皮 50g 麦冬 25g 知母 25g 黄芩 100g 陈皮 100g 甘草 25g 制天南星 25g 枳壳(炒) 50g。
【性状】	本品为棕褐色的黏稠液体；味甜。
【功能与主治】	清肺，止咳、化痰。用于小儿痰热蕴肺所致的咳嗽、顿咳，症见咳嗽、痰多、痰黄黏稠、咯吐不爽，或痰咳不已、痰稠难出；百日咳见上述证候者。
【用法与用量】	口服。二岁以上一次 10ml，二岁以内一次 5ml，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 10ml；(2) 每瓶装 100ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿至宝丸
【处方】	紫苏叶 50g 广藿香 50g 薄荷 50g 羌活 50g 陈皮 50g 制白附子 50g 胆南星 50g 炒芥子 30g 川贝母 50g 槟榔 50g 炒山楂 50g 茯苓 200g 六神曲(炒) 200g 炒麦芽 50g 琥珀 30g 冰片 4g 天麻 50g 钩藤 50g 僵蚕(炒) 50g 蝉蜕 50g 全蝎 50g 人工牛黄 6g 雄黄 50g 滑石 50g 朱砂 10g。
【性状】	本品为橙黄色至棕黄色的大蜜丸；气微香，味微苦，有辛凉感。
【功能与主治】	疏风镇惊，化痰导滞。用于小儿风寒感冒，停食停乳，发热鼻塞，咳嗽痰多，呕吐泄泻。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 1.5g。

【贮藏】	密封。
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>小儿金丹片</p> <p>朱砂 80g 橘红 40g 川贝母 40g 胆南星 30g 前胡 30g 玄参 30g 清半夏 30g 大青叶 30g 木通 30g 桔梗 30g 荆芥穗 30g 羌活 30g 西河柳 30g 地黄 30g 枳壳(炒) 30g 赤芍 30g 钩藤 30g 葛根 20g 牛蒡子 20g 天麻 20g 甘草 20g 防风 20g 冰片 10g 水牛角浓缩粉 10g 羚羊角粉 5g 薄荷脑 0.1g。</p> <p>本品为暗红色的片；气辛，味苦。</p> <p>祛风化痰，清热解毒。用于外感风热，痰火内盛所致的感冒，症见发热、头痛、咳嗽、气喘、咽喉肿痛、呕吐，及高热惊风。</p> <p>口服。周岁一次 0.6g，周岁以下酌减，一日 3 次。</p> <p>无。</p> <p>每片重(1)0.2g；(2)0.3g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>小儿肺咳颗粒</p> <p>人参 20g 茯苓 20g 白术 8g 陈皮 20g 鸡内金 20g 酒大黄 12g 鳖甲 20g 地骨皮 23g 北沙参 39g 炙甘草 12g 青蒿 29g 麦冬 39g 桂枝 8g 干姜 8g 淡附片 8g 瓜蒌 29g 款冬花 20g 紫菀 20g 桑白皮 23g 胆南星 8g 黄芪 20g 枸杞子 20g。</p> <p>本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜。</p> <p>健脾益肺，止咳平喘。用于肺脾不足，痰湿内壅所致咳嗽或痰多稠黄，咳吐不爽，气短，喘促，动辄汗出，食少纳呆，周身乏力，舌红苔厚；小儿支气管炎见以上证候者。</p> <p>开水冲服。周岁以内一次 2g，一至四岁一次 3g，五至八岁一次 6g，一日 3 次。</p> <p>高热咳嗽慎用。</p> <p>每袋装(1)2g；(2)3g；(3)6g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>小儿肺热平胶囊</p> <p>人工牛黄 3.3g 地龙 55g 珍珠 3.3g 拳参 44g 牛胆粉 11g 甘草 11g 平贝母 66g 人工麝香 0.22g 射干 55g 朱砂 0.44g 黄连 44g 黄芩 88g 羚羊角 0.44g 北寒水石 55g 冰片 0.44g 新疆紫草 33g 柴胡 66g。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为黄色至黄棕色的粉末；气辛，味苦。</p> <p>清热化痰，止咳平喘，镇惊开窍。用于小儿痰热壅肺所致喘嗽，症见喘咳、吐痰黄稠、壮热烦渴、神昏抽搐、舌红苔黄腻。</p> <p>口服。六个月以内小儿一次服 0.125g，七至十二个月一次服 0.25g，一至二岁一次服 0.375g，二至三岁一次服 0.5g，三岁以上一次服 0.75~1.0g，一日 3~4 次。</p> <p>本品不宜久服；肝肾功能不全者慎用。</p> <p>每粒装 0.25g。</p> <p>密封。</p>

【药名】	小儿肺热咳喘口服液
【处方】	麻黄 50g 苦杏仁 100g 石膏 400g 甘草 50g 金银花 167g 连翘 167g 知母 167g 黄芩 167g 板蓝根 167g 麦冬 167g 鱼腥草 167g。
【性状】	本品为棕红色的液体；味苦、微甜。
【功能与主治】	清热解毒，宣肺化痰。用于热邪犯于肺卫所致发热、汗出、微恶风寒、咳嗽、痰黄，或兼喘息、口干而渴。
【用法与用量】	口服。一至三岁一次 10ml，一日 3 次；四至七岁一次 10ml，一日 4 次；八至十二岁一次 20ml，一日 3 次，或遵医嘱。
【注意】	大剂量服用，可能有轻度胃肠不适反应。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿咳喘颗粒
【处方】	麻黄 90g 川贝母 90g 苦杏仁(炒)150g 黄芩 150g 天竺黄 150g 紫苏子(炒)180g 僵蚕(炒)180g 山楂(炒)180g 莱菔子(炒)180g 石膏 300g 鱼腥草 360g 细辛 15g 茶叶 15g 甘草 90g 桔梗 150g。
【性状】	本品为黄棕色至棕色的颗粒；气微凉，味甜、微苦。
【功能与主治】	清热宣肺，化痰止咳，降逆平喘。用于小儿痰热壅肺所致的咳嗽、发热、痰多、气喘。
【用法与用量】	温开水冲服。周岁以内一次 2~3g，一至五岁，一次 3~6g，六岁以上，一次 9~12g，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿清肺止咳片
【处方】	紫苏叶 15g 菊花 30g 葛根 45g 川贝母 45g 炒苦杏仁 45g 枇杷叶 60g 炒紫苏子 15g 蜜桑白皮 45g 前胡 45g 射干 30g 栀子(姜炙)45g 黄芩 45g 知母 45g 板蓝根 45g 人工牛黄 15g 冰片 8g。
【性状】	本品为浅棕黄色至棕色的片；或为薄膜衣片，除去包衣后显浅棕黄色至棕色；气香，味微苦。
【功能与主治】	清热解表，止咳化痰。用于小儿外感风热、内闭肺火所致的身热咳嗽、气促痰多、烦躁口渴、大便干燥。
【用法与用量】	口服。周岁以内一次 1~2 片，一至三岁一次 2~3 片，三岁以上一次 3~5 片，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)素片每片重 0.15g；(2)素片每片重 0.2g；(3)薄膜衣片每片重 0.26g；(4)薄膜衣片每片重 0.21g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿清肺化痰口服液
【处方】	麻黄 90g 黄芩 225g 石膏 675g 葶苈子 279g 前胡 225g 炒紫苏子 225g 炒苦杏仁 225g 竹茹 225g。
【性状】	本品为黄棕色至棕红色的液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热化痰，止咳平喘。用于小儿风热犯肺所致的咳嗽，症见呼吸气促、咳嗽痰喘、喉中作响。
【用法与用量】	口服。周岁以内一次 3ml，一至五岁一次 10ml，五岁以上一次 15~20ml，一日 2~3 次，用时摇匀。
【注意】	脾虚泄泻者慎用。注：葶苈子为播娘蒿的干燥成熟种子。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿清热止咳合剂(小儿清热止咳口服液)
【处方】	麻黄 90g 炒苦杏仁 120g 石膏 270g 甘草 90g 黄芩 180g 板蓝根 180g 北豆根 90g。
【性状】	本品为棕黄色的液体，久置有少量沉淀；味甘、微苦。
【功能与主治】	清热宣肺，平喘，利咽。用于小儿外感风热所致的感冒，症见发热恶寒、咳嗽痰黄、气促喘息、口干音哑、咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服。一至二岁一次 3~5ml，三至五岁一次 5~10ml，六至十四岁一次 10~15ml，一日 3 次。用时摇匀。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每支装 10ml；(2) 每瓶装 100ml；(3) 每瓶装 120ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	金振口服液
【处方】	山羊角 94.5g 平贝母 47.25g 大黄 31.50g 黄芩 15.75g 青礞石 15.75g 石膏 23.62g 人工牛黄 9.45g 甘草 31.50g。
【性状】	本品为棕黄色至棕红色的液体；气芳香，味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，祛痰止咳。用于小儿痰热蕴肺所致的发热、咳嗽、咳吐黄痰、咳吐不爽、舌质红、苔黄腻；小儿急性支气管炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。六个月至一岁，一次 5ml，一日 3 次；二至三岁，一次 10ml，一日 2 次；四至七岁，一次 10ml，一日 3 次；八至十四岁，一次 15ml，一日 3 次。疗程 5~7 天，或遵医嘱。
【注意】	(1) 偶见用药后便溏，停药后即可复常。(2) 风寒咳嗽或体虚久咳者忌服。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	宝咳宁颗粒
【处方】	紫苏叶 30g 前胡 60g 麻黄 30g 制天南星 60g 炒苦杏仁 60g 青黛 21g 麸炒枳壳 60g 甘草 15g 桑叶 30g 浙贝母 30g 桔梗 30g 陈皮 30g 黄芩 60g 天花粉 60g 炒山楂 45g 人工牛黄 3g。

【性状】	本品为灰绿色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解表，止嗽化痰。用于小儿外感风寒、内热停食引起的头痛身烧、咳嗽痰盛、气促作喘、咽喉肿痛、烦躁不安。
【用法与用量】	开水冲服。一次半袋，一日2次；周岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每袋装5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	儿童清肺丸
【处方】	麻黄 10g 炒苦杏仁 20g 石膏 40g 甘草 10g 蜜桑白皮 30g 瓜蒌皮 30g 黄芩 40g 板蓝根 40g 橘红 30g 法半夏 30g 炒紫苏子 20g 葶苈子 10g 浙贝母 40g 紫苏叶 20g 细辛 8g 薄荷 30g 蜜枇杷叶 40g 白前 30g 前胡 20g 石菖蒲 30g 天花粉 30g 煅青礞石 10g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸或大蜜丸；味苦、辛辣。
【功能与主治】	清肺，解表，化痰，止嗽。用于小儿风寒外束、肺经痰热所致的面赤身热、咳嗽气促、痰多黏稠、咽痛声哑。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次1袋，大蜜丸一次1丸，一日2次；三岁以下一次半袋或半丸。
【注意】	无。
【规格】	(1)水蜜丸每袋装1.7g；(2)大蜜丸每丸重3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	解肌宁嗽丸
【处方】	紫苏叶 48g 前胡 80g 葛根 80g 苦杏仁 80g 桔梗 80g 半夏(制)80g 陈皮 80g 浙贝母 80g 天花粉 80g 枳壳 80g 茯苓 64g 木香 24g 玄参 80g 甘草 64g。
【性状】	本品为黑绿色或棕褐色的大蜜丸；味微苦、辛。
【功能与主治】	解表宣肺，止咳化痰。用于外感风寒、痰浊阻肺所致的小儿感冒发热、咳嗽痰多。
【用法与用量】	口服。小儿周岁一次半丸，二至三岁一次1丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重3g。
【贮藏】	密封。

小儿肺炎咳嗽高热烦躁

【药名】	九味石灰华散
【处方】	本品为藏族验方：石灰华 100g 红花 80g 牛黄 4g 红景天 80g 榜嘎 100g 甘草(去皮)80g 高山辣根菜 80g 檀香 100g 洪连 100g。
【性状】	本品为淡黄色的粉末，气香，味甘、微苦。
【功能与主治】	清热，解毒，止咳，安神。用于小儿肺炎，高热烦躁，咳嗽。
【用法与用量】	口服。一次0.6~0.9g，一日2次；三岁以下小儿酌减。

【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，防潮。

鼻炎鼻塞流涕鼻窦炎过敏性鼻炎

【药名】	千柏鼻炎片
【处方】	千里光 2424g 卷柏 404g 羌活 16g 决明子 242g 麻黄 81g 川芎 8g 白芷 8g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色至棕黑色；味苦。
【功能与主治】	清热解毒，活血祛风，宣肺通窍。用于风热犯肺、内郁化火、凝滞气血所致的鼻塞、鼻痒气热、流涕黄稠，或持续鼻塞、嗅觉迟钝；急慢性鼻炎、急慢性鼻窦炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重 0.44g。
【贮藏】	密封。

【药名】	千柏鼻炎胶囊
【处方】	千里光 4848g 卷柏 808g 羌活 32g 决明子 484g 麻黄 162g 川芎 16g 白芷 16g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色至棕黑色的粉末和颗粒；气微香，味苦。
【功能与主治】	清热解毒，活血祛风，宣肺通窍。用于风热犯肺、内郁化火、凝滞气血所致的鼻塞、鼻痒气热、流涕黄稠，或持续鼻塞、嗅觉迟钝；急慢性鼻炎、急慢性鼻窦炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次，15 天为一个疗程。症状减轻后，减量维持或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	利鼻片
【处方】	黄芩 100g 辛夷 100g 白芷 100g 蒲公英 500g 苍耳子 150g 薄荷 75g 细辛 25g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦、微辛。
【功能与主治】	清热解毒，祛风开窍。用于风热蕴肺所致的伤风鼻塞、鼻渊、鼻流清涕或浊涕。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用；忌食辛辣食物。
【规格】	片心重 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	辛夷鼻炎丸
【处方】	辛夷 42g 薄荷 433g 紫苏叶 317g 甘草 215g 广藿香 433g 苍耳子 1111g 鹤不食草 209g 板蓝根 650g 山白芷 433g 防风 313g 鱼腥草 150g 菊花 433g 三叉苦 433g。
【性状】	本品为黑色的浓缩水丸，除去包衣后，显棕褐色。气芳香，味甘凉、微苦。
【功能与主治】	祛风宣窍，清热解毒。用于风热上攻、热毒蕴肺所致的鼻塞、鼻流清涕或浊涕、发热、头痛；慢性鼻炎、过敏性鼻炎、神经性头痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3g，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每 10 丸重 0.75g。
【贮藏】	密封。

【药名】	通窍鼻炎片
【处方】	炒苍耳子 200g 防风 150g 黄芪 250g 白芷 150g 辛夷 150g 炒白术 150g 薄荷 50g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；味微苦、辛凉。
【功能与主治】	散风固表，宣肺通窍。用于风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻流清涕或浊涕、前额头痛；慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5~7 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重 0.3g(相当于饮片 1.1g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	通窍鼻炎胶囊
【处方】	炒苍耳子 300g 防风 225g 黄芪 375g 白芷 225g 辛夷 225g 炒白术 225g 薄荷 75g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕色的粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	散风固表，宣肺通窍。用于风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻流清涕或浊涕、前额头痛；慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4~5 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	通窍鼻炎颗粒
【处方】	炒苍耳子 600g 防风 450g 黄芪 750g 白芷 450g 辛夷 450g 炒白术 450g 薄荷 150g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒，气微香，味微苦。
【功能与主治】	散风固表，宣肺通窍。用于风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻流清涕或浊涕、前额头痛；慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。

【用法与用量】	开水冲服，一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	鼻炎片
【处方】	苍耳子，防风，野菊花，桔梗，知母，甘草，麻黄，辛夷，连翘，五味子，白芷，荆芥，黄柏，细辛。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色；气香，味苦。
【功能与主治】	祛风宣肺，清热解毒。用于急、慢性鼻炎风热蕴肺证，症见鼻塞、流涕、发热、头痛。
【用法与用量】	口服。一次3~4片（糖衣片）或一次2片（薄膜衣片），一日3次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	鼻炎通喷雾剂(鼻炎滴剂)
【处方】	盐酸麻黄碱5g 黄芩苷20g 山银花300g 辛夷油2ml 冰片1g。
【性状】	本品喷雾剂，药液为黄棕色至棕褐色的澄清液体。
【功能与主治】	散风清热，宣肺通窍。用于风热蕴肺所致的鼻塞，鼻流清涕或浊涕，发热，头痛；急、慢性鼻炎见上述证候者。
【用法与用量】	喷入鼻腔内，一次1~2揆；一日2~4次。1个月为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	(1)每瓶装10ml；(2)每瓶装15ml(每1ml含黄芩苷20mg，盐酸麻黄碱5mg)。
【贮藏】	遮光，密闭。

【药名】	鼻炎康片
【处方】	广藿香，鹅不食草，野菊花，黄芩，薄荷油，苍耳子，麻黄，当归，猪胆粉，马来酸氯苯那敏。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显浅褐色至棕褐色；味微甘而苦涩，有凉感。
【功能与主治】	清热解毒，宣肺通窍，消肿止痛。用于风邪蕴肺所致的急、慢性鼻炎，过敏性鼻炎。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日3次
【注意】	孕妇及高血压患者慎用，用药期间不宜驾驶机动车辆、管理机器及高空作业等。忌食辛辣食物，不宜过量、久服。
【规格】	每片重0.37g(含马来酸氯苯那敏1mg)。
【贮藏】	密封。

【药名】	鼻渊通窍颗粒
【处方】	辛夷20g 麻黄40g 薄荷20g 黄芩40g 野菊花40g 地黄60g 茯苓80g 炒苍耳子60g 白芷60g 藁本10g 连翘40g 天花粉40g 丹参40g 甘草10g。

【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味甜、微苦。
【功能与主治】	疏风清热，宣肺通窍。用于急鼻渊（急性鼻窦炎）属外邪犯肺证，症见前额或颧骨部压痛，鼻塞时作，流涕黏白或黏黄，或头痛，或发热，苔薄黄或白，脉浮。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	偶见腹泻。
【规格】	每袋装15g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	鼻渊舒口服液
【处方】	苍耳子，辛夷，薄荷，白芷，黄芩，栀子，柴胡，细辛，川芎，黄芪，川木通，桔梗，茯苓。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的液体，具有特异香气，味甜、微苦。
【功能与主治】	疏风清热，祛湿通窍。用于鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日2~3次，7天为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	鼻渊舒胶囊
【处方】	苍耳子，辛夷，薄荷，白芷，黄芩，栀子，柴胡，细辛，川芎，黄芪，川木通，桔梗，茯苓。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；味苦。
【功能与主治】	疏风清热，祛湿通窍。用于鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次，7天为一疗程或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	鼻窦炎口服液
【处方】	辛夷，荆芥，薄荷，桔梗，竹叶柴胡，苍耳子，白芷，川芎，黄芩，栀子，茯苓，川木通，黄芪，龙胆草。
【性状】	本品为深棕黄色至深棕褐色的液体；气芳香，味苦。
【功能与主治】	疏散风热，清热利湿，宣通鼻窍。用于风热犯肺、湿热内蕴所致的鼻塞不通、流黄稠涕；急慢性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日3次；20天为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封，遮光，置阴凉处。

【药名】	藿胆丸
-------------	------------

【处方】	广藿香叶 4000g 猪胆粉 315g。
【性状】	本品为黑色的包衣水丸，除去包衣后显灰棕色至棕褐色；气特异，味苦。
【功能与主治】	芳香化浊，清热通窍。用于湿浊内蕴、胆经郁火所致的鼻塞、流清涕或浊涕、前额头痛。
【用法与用量】	口服。一次 3~6g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	藿胆片
【处方】	广藿香叶提取物 62.5g 猪胆粉 93.75g。
【性状】	本品为糖衣片；除去糖衣后显淡褐色；具有引湿性，气芳香，味苦。
【功能与主治】	芳香化浊，清热通窍。用于湿浊内蕴、胆经郁火所致的鼻塞、流清涕或浊涕、前额头痛。
【用法与用量】	口服。一次 3~5 片，一日 2~3 次；儿童酌减或饭后服用，遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	片心重 0.2g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	芩芷鼻炎糖浆
【处方】	黄芩 156g 麻黄 72g 辛夷 156g 薄荷 73g 白芷 156g 苍耳子 156g 鹤不食草 156g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的黏稠液体；气香，味甜而后苦。
【功能与主治】	清热解毒，消肿通窍。用于急性鼻炎。
【用法与用量】	口服。一次 20ml，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 150ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	鼻炎灵片
【处方】	炒苍耳子 310g 辛夷 230g 白芷 46g 细辛 46g 黄芩 46g 川贝母 62g 淡豆豉 62g 薄荷脑 4.9g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显灰褐色；气香，味辛。
【功能与主治】	通窍消肿，祛风退热。用于慢性鼻窦炎、鼻炎及鼻塞头痛，浊涕臭气，嗅觉失灵。
【用法与用量】	饭后温开水送服。一次 2~4 片，一日 3 次，2 周为一疗程。
【注意】	服药期间，忌辛辣食物。
【规格】	(1)糖衣片（片心重 0.3g）；(2)薄膜衣片每片重 0.3g；(3)薄膜衣片每片重 0.31g。
【贮藏】	密封。

【药名】	鼻渊丸
【处方】	苍耳子 672g 辛夷 126g 金银花 42g 茜草 42g 野菊花 42g。
【性状】	本品为黑褐色的浓缩水蜜丸；气微香，味辛、微苦、涩。
【功能与主治】	祛风宣肺，清热解毒，通窍止痛。用于鼻塞鼻渊，通气不畅，流涕黄浊，嗅觉不灵，头痛，眉棱骨痛。
【用法与用量】	口服。一次 12 丸，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每 10 丸重 2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	鼻渊片
【处方】	苍耳子 672g 辛夷 126g 金银花 42g 茜草 42g 野菊花 42g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显褐色；气微香，味微苦、辛、涩。
【功能与主治】	祛风宣肺，清热解毒，通窍止痛。用于鼻塞鼻渊，通气不畅，流涕黄浊，嗅觉不灵，头痛，眉棱骨痛。
【用法与用量】	口服。一次 6~8 片〔规格（1）〕或一次 3~4 片〔规格（2）〕，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	（1）糖衣片（片心重 0.32g）；（2）薄膜衣片每片重 0.515g。
【贮藏】	密封。

【药名】	辛苓片
【处方】	细辛 333g 荆芥 333g 白芷 333g 黄芪 333g 桂枝 333g 黄芩 333g 防风 333g 苍耳子 333g 白术 333g 石菖蒲 333g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显黄棕色至棕褐色，味微苦。
【功能与主治】	益气固表，祛风通窍。用于肺气不足、风邪外袭所致的鼻痒、喷嚏、流清涕、易感冒；过敏性鼻炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 片，一日 3 次。
【注意】	儿童及老年人慎用，孕妇、婴幼儿及肾功能不全禁用。
【规格】	每片重 0.8g。
【贮藏】	密封。

【药名】	辛苓颗粒
【处方】	细辛 200g 黄芩 200g 荆芥 200g 防风 200g 白芷 200g 苍耳子 200g 黄芪 200g 白术 200g 桂枝 200g 石菖蒲 200g。
【性状】	本品为灰黄色至棕黄色的颗粒，味甜、微苦；或为棕黄色至棕褐色的颗粒，味微甜、微苦（无蔗糖）。
【功能与主治】	益气固表，祛风通窍。用于肺气不足、风邪外袭所致的鼻痒、喷嚏、流清涕，易感冒；过敏性鼻炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。20 天为一疗程。
【注意】	儿童及老年人慎用，孕妇、婴幼儿及肾功能不全禁用。
【规格】	（1）每袋装 20g；（2）每袋装 5g（无蔗糖）。

【贮藏】

密封。

中医对于身体平衡的研究和诊断

中医认为，人体产生疾病和治疗疾病恢复健康的过程，就是身体平衡被打破和身体平衡被修复的一系列复杂的过程，这一过程包含下面的内容：

病机

病机，即疾病发生、发展变化及转归的机理，在临床上又称“病理”。其着重研究疾病发生和人体产生病理反应的全过程及其发展规律。任何疾病的发生、发展变化及其转归，与患病机体的正气强弱（即现代医学所称的免疫功能，中医称之为卫气）和致病邪气的性质、感邪的轻重、邪气所伤部位等均密切相关。当致病邪气作用于人体，由于卫气的存在，机体的正气必然奋起抗邪，引起邪正斗争。因此邪正斗争就成了为疾病发生全过程的基本矛盾。在疾病产生的过程中，邪正之间的斗争必然导致双方力量的盛衰变化，从而造成人体阴阳的平衡状态失调，或气血津液的生理功能和相互关系失常，或脏腑经络机能的紊乱，产生一系列复杂的病理变化，从而表现在人体的衰弱和健康的交替变化中。

发病原理

发病即指疾病的发生（包括疾病复发）。人体健康是与疾病状态相对而言的，身体正常的情况下，机体内部各脏腑组织器官的生理活动和气血阴阳处于相对平衡的状态，即阴阳平衡，而且人体与自然界保持协调统一的状态，这是维持人体正常生理活动的基础，如此人体就处于健康和谐的良好状态。人体在一定的长期或者短期的外因或者内因的致病因素作用下，正气与致病邪气之间的斗争，使人体的某些平衡协调状态遭到破坏，出现诸如脏腑、经络等组织器官的功能活动或者形态结构的表现异常，或者气、血、津液、精的耗损与代谢失常，表现出一定的临床症状，并不同程度地影响正常的生活与劳动能力或者不适感甚至疼痛感，便产生了疾病。

❖ 发病的基本原理

疾病发生的因素虽然十分复杂，但是分析其大致原因，不外乎人体本身的正气和致病邪气两个方面。正气，简称“正”，与邪气相对而言，泛指人体的各种物质结构（脏腑、经络、精气血津液等）的正常运行状态的必须要素，是产生生理机能、抗病能力和康复能力的物质基础。正气是随着人体的生长发育，以及人体在不断适应自然的过程中逐渐完善起来的，具有防御、消除各种有害因素，使人体免受病邪伤害，而一旦受到损害则能促使其康复的能力。邪气，简称“邪”，泛指各种致病因素，包括六淫、疫疢邪气、七情内伤、劳逸损伤及各种病理产物（如痰饮、水湿、瘀血、结石、宿食）等。这些因素都具有损伤

人体的正气，破坏脏腑组织器官的功能活动及形态结构或者削弱人体机能运行正常的特征。因此疾病的发生，是在一定条件下正是邪正斗争的具体反映。

❖ 基本病机

基本病机是指机体在致病因素作用下所产生的基本病理反应，是疾病发生后病变本质变化的一般规律，也是其他各种病机的基础。基本病机主要包括邪正盛衰、阴阳失调、气血津液失常，身体不适以及“内生五邪”和各种疼痛等等。

❖ 邪正盛衰

邪正盛衰是指在疾病发生的过程中，致病邪气与机体抗病能力之间相互斗争所发生的盛衰变化。邪正斗争的消长盛衰，不仅关系到疾病的发展与转归，同时还决定着疾病的虚实病理变化，同时也决定着病人的生死攸关。因此从一定意义上说，任何疾病的发展演变过程，也就是邪正斗争及其盛衰变化的具体过程。

❖ 阴阳失调

阴阳失调即指身体的阴阳消长失去平衡协调的病理状态。是指在疾病过程中，由于各种致病因素的影响及邪正之间的斗争，导致机体阴阳的相对平衡状态遭到破坏，常常表现以寒、热为主要特征的病理变化。阴阳失调是对脏腑经络、气血营卫等功能失调，以及表里出入、上下升降失常等病机的概括。阴阳失调的病理变化，表面上看虽甚为复杂，但从总体上来说，主要是阴阳的消长异常和阴阳的互根关系失调，不外乎阴阳偏胜、阴阳偏衰、阴阳互损、阴阳格拒、阴阳转化，以及阴阳亡失等几个方面。

内生五邪病机

“内生五邪”，也称“内生五气”或者称为“五气病理”，是指在疾病的发展变化的过程中，由于脏腑阴阳失调，气、血、津液代谢异常所产生的类似风、寒、湿、燥、热(火)五种外邪致病特征的病理变化。由于病起于内，所以分别称为“内风”、“内寒”、“内湿”、“内燥”、“内热(或内火)”。“内生五邪”不是致病邪气，而是脏腑阴阳失调和身体失去平衡的状态，气、血、津液失常所形成的综合性病机变化。

精气血津液关系失常

精、气、血、津液的失常是指在疾病发生和进行的过程中，由于邪正斗争的盛衰，或脏腑功能的失调，导致精、气、血、津液的不足、运行失常以及关系失调的病理变化。

人体精、气、血、津液的充足和运行协调，是脏腑、经络、官窍等一切组织器官进行生理活动的基本的物质基础。如果因为某些致病因素的影响，导致精、气、血、津液的失常或关系失调，必然会影响到机体的各种生理功能，导致疾病的发生。但是精、气、血、津液又必须依赖于脏腑功能活动而不断化生和维持其正常运行，因此脏腑生理功能异常也会影响到精、气、血、津液代谢失调从而导致一系列病理变化。所以精、气、血、津液失常的病机，不仅是脏腑、经络等组织器官各种病理变化的基础，也是分析多种临床疾病的

病机的基础。

精、气、血、津液之间有着密切的联系。其中的任何一方失常，都可能对其他三者产生明显的影响，从而导致其关系失调，临床常见精气亏损、精血两虚、气滞血瘀、气血两虚、气不摄血、气随血脱、血随气逆、津停气阻、气随津脱、津血两伤、津亏血瘀、血瘀水停等病理，都表明了精、气、血、津液之间的紧密联系和息息相关，相互依赖和相互影响。

❖ **精气亏损：**精可化气，气能生精。肾主藏精，元气藏于肾，肾精亏损，可致元气化生不足，气虚日久，生化无力，又可加重肾精的亏损。因此久病或年老体弱者，均可因精亏伤气或气伤损精而致精气两亏发生病变。精气两虚可表现为生长、发育迟缓，生殖机能障碍以及身体虚弱，抗邪无力、形成多病的衰弱体质。

❖ **精血两虚：**精血两虚是指精亏与血虚同时存在的病理状态。肾藏精，肝藏血，精血同源互化，以维持其动态平衡。若久病伤及肝肾精血，可致精血两亏，肝肾不足而发生病变。精血两虚病变常表现为眩晕、耳鸣、神倦健忘、头发稀疏脱落、腰膝痠软，或男子精少不育，阳痿早泄。或女子月经失调、经少不孕等。

❖ **气滞血瘀：**气滞血瘀是指气滞和血瘀同时存在的病理状态。气的运行阻滞，可以导致血液运行的障碍，而血液瘀滞又必将进一步加重气滞。所以说气滞则血瘀，血瘀则气亦滞。两者可同时形成，相互影响颇深，亦可因气滞病变的进一步发展所导致。由于肝主疏泄而藏血，肝的疏泄在气机调畅中起着关键的作用，关系到全身气血的运行，因而气滞血瘀多与肝的功能异常密切相关。由于心主血脉而行血，肺朝百脉，主司一身之气，所以心、肺两脏的功能失调，也可形成气滞血瘀之病变。

❖ **气血两虚：**气血两虚是气虚与血虚同时存在的病理状态。多因久病消耗，渐致气血两伤；或先有失血，气随血脱；或者先因气虚，导致血液生化无源而日渐衰少等。由于气虚而无力推动、固摄、温煦作用，加之血液亏虚，失于充养，故气血两虚常见症状有面色淡白无华、少气懒言、疲乏无力、自汗、形体消瘦等。

❖ **气不摄血：**气不摄血是指因气的不足，导致固摄血液的功能减弱，血不循经，逸出脉外，导致各种出血的病理状态，是出血的病机之一。气不摄血而出血的病变，往往因出血而气亦随之耗伤，气愈虚而血亦虚，病情进一步发展可形成气血两虚。由于脾主统血，若脾气亏虚，统血无力，则易致血不循常道而导致外逸，甚至中气不举，血随气陷于下。气不摄血的病变多与脾气亏虚有关，所以临床诊治多与脾的治疗相关。

❖ **气随血脱：**气随血脱是指在大量出血的同时，气也随着血液的流失而耗损的病理状态。气随血脱是以大量出血为前提的，如外伤出血、妇女崩漏、产后大失血等。由于血为气母，血能载气，大量出血，则气无所依附，气也随之耗散而亡失。气随血脱病变的发

展，轻则气血两虚，重则气血并脱，导致严重生命危险。

❖ **血随气逆**：血随气逆是指气机上逆的同时，血亦因之而冲逆于上的病理状态。由于气为血之帅，气能行血，血随气而行。所以当气逆时，血亦随之上逆为病。血随气逆，是以气机上逆为前提，而且大都是气逆较甚者。脏腑之中，肝为藏血之脏，肝气主升、主动而为刚脏，若肝阳亢旺，气机上逆，则易导致血随气逆而涌盛于上，出现吐血、昏厥等。因此血随气逆的病变，以肝病最为多见，临床治疗也多于肝脏相关。

❖ **津停气阻**：津停气阻是指水液停蓄与气机阻滞局时存在的病理状态。主要是指津液代谢障碍，水湿痰饮内停，导致气机运行阻滞；或因气的升降出入运动失调，气机不行，影响津液代谢；或水停而加重气机阻滞所形成的病理变化。其病理表现因津气阻滞部位不同而异，如痰饮阻肺，则肺气壅滞，宣降不利，可见胸满咳嗽、痰多、喘促不能平卧等病症；水湿停留中焦，则阻遏脾胃气机，导致清气不升，浊气不降，可见脘腹胀满、暖气食少症；水饮泛滥四肢，则可阻滞经脉气机，而见肢体沉重、胀痛不适等症。

❖ **气随津脱**：气随津脱是指因津液丢失太多，气无所附，气随津液外泄而耗伤，乃至亡失的病理状态。多由高热伤津，或大汗出，或严重吐泻、多尿等，耗伤津液，气随津脱所致。如暑热邪气致病，迫使津液外泄而大汗出，不仅表现有口渴饮水、尿少而黄、大便干结等津伤症状，而且常伴有疲乏无力、少气懒言等耗气的表现。清·尤在泾《金匱要略心典·痰饮篇》就说：“吐下之余，定无完气。”由于津能载气，所以凡在吐下等大量丢失津液的同时，必然导致不同程度伤气的表现，轻者津气两虚，重者津气两脱，这也是津和气关系紧密的一种表现。

❖ **津血两伤**：津血两伤是指津液和血同时出现亏损不足的病理状态。由于津血同源，津液是血液的重要组成部分，所以津伤可致血亏，失血可致津少。如高热大汗、大吐、大泻等大量耗伤津液的同时，可导致不同程度的血液亏少，形成津枯血燥病变，常表现有心烦、肌肤甲错、皮肤瘙痒、手足蠕动等症。若大量出血，可导致津液严重脱失。《灵枢·营卫生会》就说：“夺血者无汗，夺汗者无血。”汉·张机《伤寒论·辨太阳病脉证并治第一》也说“衄家，不可发汗”、“亡血家，不可发汗”。

❖ **津亏血瘀**：津亏血瘀是指因津液亏损而导致血液运行瘀滞不畅的病理状态。由于津液是血液的重要组成部分，因此津液充足则血行滑利。如因高热、大面积烧烫伤，或大吐、大泻、大汗出等，引起津液大量耗伤，则可导致血量减少，血液浓稠而运行涩滞不畅，可在津液耗损的基础上，发生血瘀病变。其临床表现除津液不足的症状外，还可见到面唇紫暗、皮肤紫斑、舌体紫暗，或有瘀点、瘀斑等血瘀表现。清·周学海《读医随笔·卷三》说：“夫血犹舟也，津液水也，医者于此，当知增水行舟之意。”又说：“津液为火灼竭，则血行愈滞。”说明了高热灼津可以导致血行迟滞的病理变化。

❖ **血瘀水停：**血瘀水停是指血液瘀滞与津液停蓄同时并见的病理状态。由于气、血、水三者的运行密切相关，因此其病理变化不仅有气滞血瘀、水停气阻，而且血液运行与水液输布的失常，在病理上亦相互影响。如血瘀日久，气机不行，可致津液输布代谢障碍，水液停蓄；反之若水液代谢严重受阻，痰湿内生，水饮停滞，则气机不畅，亦可影响血液运行而致血瘀。无论是血瘀导致水停，还是水停导致血瘀，大都同时存在不同程度的气机阻滞。而且气、血、水三者之间互为因果，可以形成病理上的恶性循环。

总而言之，邪正盛衰决定疾病的虚实变化及转归，阴阳失调所形成的寒热虚实病理，精、气、血、津液的亏损及其运行失常所产生的一系列病理上的改变，是任何疾病在发生过程中所表现出的基本病机，无论是外感疾病，还是内伤杂病，都是在不同的致病因素作用下邪正之间的相互斗争，破坏了某些脏腑组织的正常的生理功能，以及脏腑组织之间的平衡协调关系，导致阴阳、精、气、血、津液失调所形成的各种不同的病理变化。

身体亏虚诸病

肝肾亏虚型须发早白遗精早泄晕眩耳鸣

【药名】	二至丸
【处方】	酒女贞子 500g 墨旱莲 500g。
【性状】	本品为黑褐色的浓缩水蜜丸；气微，味甘而苦。
【功能与主治】	补益肝肾，滋阴止血。用于肝肾阴虚，眩晕耳鸣，咽干鼻燥，腰膝酸痛，月经量多。
【用法与用量】	口服。一次 9g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	归芍地黄丸
【处方】	当归 40g 酒白芍 40g 熟地黄 160g 酒萸肉 80g 牡丹皮 60g 山药 80g 茯苓 60g 泽泻 60g。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜、微酸。
【功能与主治】	滋肝肾，补阴血，清虚热。用于肝肾两亏，阴虚血少，头晕目眩，耳鸣咽干，午后潮热，腰腿痠痛，足跟疼痛。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	首乌丸
【处方】	制何首乌 360g 熟地黄 20g 酒牛膝 40g 桑椹 182g 酒女贞子 40g 墨旱莲 235g 桑叶(制) 40g 黑芝麻 16g 菟丝子(酒蒸) 80g 金樱子 259g 盐补骨脂 40g 豨莶草(制) 80g 金银花(制) 20g。
【性状】	本品为黑色的浓缩水蜜丸；味甜、微苦。
【功能与主治】	补肝肾，强筋骨，乌须发。用于肝肾两虚，头晕目花，耳鸣，腰痠肢麻，须发早白；亦用于高脂血症。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2 次。

【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	活力苏口服液
【处方】	制何首乌，淫羊藿，黄精(制)，枸杞子，黄芪，丹参。
【性状】	本品为棕黄色至棕色的液体；味甜、微涩。
【功能与主治】	益气补血，滋养肝肾。用于年老体弱，精神萎靡，失眠健忘，眼花耳聋，脱发或头发早白属气血不足，肝肾亏虚者。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日1次，睡前服用。3个月为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封。

肝肾不足型腰膝酸软遗精早泄头眩耳鸣须发早白

【药名】	健步丸
【处方】	盐黄柏40g 盐知母20g 熟地黄20g 当归10g 酒白芍15g 牛膝35g 豹骨(制)10g 醋龟甲40g 陈皮(盐炙)7.5g 干姜5g 锁阳10g 羊肉320g。
【性状】	本品为棕褐色至深褐色的糊丸；气微腥，味微苦。
【功能与主治】	补肝肾，强筋骨。用于肝肾不足，腰膝酸软，下肢痿弱，步履艰难。
【用法与用量】	口服。一次9g，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	七宝美髯颗粒
【处方】	制何首乌128g 当归32g 补骨脂(黑芝麻炒)16g 枸杞子(酒蒸)32g 菟丝子

【性状】	(炒)32g 茯苓 32g 牛膝(酒蒸)32g。
【功能与主治】	本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦、涩。
【用法与用量】	滋补肝肾。用于肝肾不足，须发早白，遗精早泄，头眩耳鸣，腰酸背痛。
【注意】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【规格】	无。
【贮藏】	每袋装8g。
	密封。

肝郁脾虚型郁闷胸胀头晕目眩食少经乱

【药名】	逍遥丸
【处方】	柴胡100g 白芍100g 茯苓100g 当归100g 炒白术100g 炙甘草80g 薄荷20g。
【性状】	本品为棕褐色的小蜜丸或大蜜丸，味甜。
【功能与主治】	疏肝健脾，养血调经。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)小蜜丸每100丸重20g。(2)大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	逍遥丸(水丸)
【处方】	柴胡100g 白芍100g 茯苓100g 当归100g 炒白术100g 炙甘草80g 薄荷20g。
【性状】	本品为黄棕色至棕色的水丸，或为黑棕色的水丸；味甜。
【功能与主治】	疏肝健脾，养血调经。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。
【用法与用量】	口服，一次6~9g，一日1~2次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	逍遥丸(浓缩丸)
【处方】	柴胡100g 白芍100g 茯苓100g 当归100g 炒白术100g 炙甘草80g 薄荷20g。
【性状】	本品为亮黑色的浓缩丸；气微，味甜、辛而后苦。
【功能与主治】	疏肝健脾，养血调经。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。
【用法与用量】	口服。一次8丸，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每8丸相当于饮片3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	逍遥片
【处方】	柴胡 357.5g 白芍 357.5g 茯苓 357.5g 薄荷 71.5g 当归 357.5g 炒白术 357.5g 炙甘草 286g 生姜 357.5g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；气香，味微苦。
【功能与主治】	疏肝健脾，养血调经。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。
【用法与用量】	口服，一次4片，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每片重0.35g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	逍遥胶囊
【处方】	柴胡 286g 白芍 286g 茯苓 286g 薄荷 57.2g 当归 286g 炒白术 286g 炙甘草 228.8g 生姜 286g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气香，味微苦。
【功能与主治】	疏肝健脾，养血调经。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。
【用法与用量】	口服；一次5粒〔规格(1)〕，一次4粒〔规格(2)〕，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装(1)0.4g。(2)0.34g。
【贮藏】	密封。

【药名】	逍遥颗粒
【处方】	柴胡 143g 当归 143g 白芍 143g 炒白术 143g 茯苓 143g 炙甘草 114.4g 薄荷 28.6g 生姜 143g。
【性状】	本品为浅黄色至黄棕色的颗粒；气微香，味甜或味淡。
【功能与主治】	疏肝健脾，养血调经。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装15g。(2)每袋装4g。(3)每袋装5g。(4)每袋装6g。(5)每袋装8g。
【贮藏】	密封。

肾精肾阴亏虚型阳痿遗精早泄头晕耳鸣无力

【药名】	苁蓉益肾颗粒
【处方】	五味子(酒制)360g 茯苓 180g 盐车前子 450g 酒苁蓉 360g 菟丝子(酒炒)360g 制巴戟天 540g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味酸、微苦。
【功能与主治】	补肾填精。用于肾气不足，腰膝痠软，记忆减退，头晕耳鸣，四肢无力。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	三宝胶囊
【处方】	人参 20g 鹿茸 20g 当归 40g 山药 60g 醋龟甲 20g 砂仁(炒)10g 山茱萸 20g 灵芝 20g 熟地黄 60g 丹参 100g 五味子 20g 菟丝子(炒)30g 肉苁蓉 30g 何首乌 40g 菊花 20g 牡丹皮 20g 赤芍 20g 杜仲 40g 麦冬 10g 泽泻 20g 玄参 20g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为深棕色的粉末；气微，味微酸、甜。
【功能与主治】	益肾填精，养心安神。用于肾精亏虚、心血不足所致的腰酸腿软、阳痿遗精、头晕眼花、耳鸣耳聋、心悸失眠、食欲不振。
【用法与用量】	口服。一次3~5粒，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	五子衍宗丸
【处方】	枸杞子 400g 覆盆子 200g 菟丝子(炒)400g 五味子(蒸)50g 盐车前子 100g。
【性状】	本品为棕褐色的水蜜丸、棕黑色的小蜜丸或大蜜丸，味甜、酸、微苦。
【功能与主治】	补肾益精。用于肾虚精亏所致的阳痿不育、遗精早泄、腰痛、尿后余沥。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	五子衍宗片
-------------	--------------

【处方】	枸杞子 275g 菟丝子(炒)275g 覆盆子 135g 五味子(蒸)35g 盐车前子 68g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色至褐色；味酸。
【功能与主治】	补肾益精。用于肾虚精亏所致的阳痿不育、遗精早泄、腰痛、尿后余沥。
【用法与用量】	口服。一次 6 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	糖衣片，片心重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	六味地黄丸
【处方】	熟地黄 160g 酒萸肉 80g 牡丹皮 60g 山药 80g 茯苓 60g 泽泻 60g。
【性状】	本品为棕黑色的水丸、水蜜丸、棕褐色至黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜而酸。
【功能与主治】	滋阴补肾。用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。
【用法与用量】	口服。水丸一次 5g，水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 大蜜丸每丸重 9g；(2) 水丸每袋装 5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	六味地黄丸(浓缩丸)
【处方】	熟地黄 120g 酒萸肉 60g 牡丹皮 45g 山药 60g 茯苓 45g 泽泻 45g。
【性状】	本品为棕褐色或壳黑色的浓缩丸；味微甜、酸、略苦。
【功能与主治】	滋阴补肾。用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。
【用法与用量】	口服。一次 8 丸，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每 8 丸重 1.44g(每 8 丸相当于饮片 3g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	六味地黄软胶囊
【处方】	熟地黄 480g 酒萸肉 240g 牡丹皮 180g 山药 240g 茯苓 180g 泽泻 180g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为棕褐色的膏状物；味甜、微酸。
【功能与主治】	滋阴补肾。用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.38g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	六味地黄胶囊
-------------	---------------

【处方】	熟地黄 1408g 酒萸肉 704g 牡丹皮 528g 山药 704g 茯苓 528g 泽泻 528g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕色至棕色的粉末和颗粒；味苦、微酸。
【功能与主治】	滋阴补肾。用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。
【用法与用量】	口服。一次 1 粒〔规格(1)〕或一次 2 粒〔规格(2)〕，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每粒装 0.3g；(2) 每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	六味地黄颗粒
【处方】	熟地黄 320g 酒萸肉 160g 牡丹皮 120g 山药 160g 茯苓 120g 泽泻 120g。
【性状】	本品为棕褐色的颗粒；味微甜、酸、微苦，有特异香气。
【功能与主治】	滋阴补肾。用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 5g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	古汉养生精口服液
【处方】	人参，炙黄芪，金樱子，枸杞子，女贞子(制)，菟丝子，淫羊藿，白芍，炙甘草，炒麦芽，黄精(制)。
【性状】	本品为棕红色的澄清液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	补气，滋肾，益精。用于气阴亏虚、肾精不足所致的头晕、心悸、目眩、耳鸣、健忘、失眠、阳痿遗精、疲乏无力；脑动脉硬化、冠心病、前列腺增生、更年期综合征、病后体虚见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	古汉养生精片
【处方】	人参，炙黄芪，金樱子，枸杞子，女贞子(制)，菟丝子，淫羊藿，白芍，炙甘草，炒麦芽，黄精(制)。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色至黑褐色；味微苦。
【功能与主治】	补气，滋肾，益精。用于气阴亏虚、肾精不足所致的头晕、心悸、目眩、耳鸣、健忘、失眠、阳痿遗精、疲乏无力；脑动脉硬化、冠心病、前列腺增生、更年期综合征、病后体虚见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次 4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每片重 0.41g。
【贮藏】	密封。

【药名】	古汉养生精颗粒
【处方】	人参，炙黄芪，金樱子，枸杞子，女贞子(制)，菟丝子，淫羊藿，白芍，炙甘草，炒麦芽，黄精(制)。
【性状】	本品为棕黄色至深棕色的颗粒；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	补气，滋肾，益精。用于气阴亏虚、肾精不足所致的头晕、心悸、目眩、耳鸣、健忘、失眠、阳痿遗精、疲乏无力；脑动脉硬化、冠心病、前列腺增生、更年期综合征、病后体虚见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次10~20g，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装10g；(2)每袋装15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	龟鹿二仙膏
【处方】	龟甲250g 党参47g 鹿角250g 枸杞子94g。
【性状】	本品为红棕色稠厚的半流体；味甜。
【功能与主治】	温肾益精，补气养血。用于肾虚精亏所致的腰膝痠软、遗精、阳痿。
【用法与用量】	口服。一次15~20g，一日3次。
【注意】	脾胃虚弱者慎用。
【规格】	每瓶装200g。
【贮藏】	密封。

【药名】	青娥丸
【处方】	盐杜仲480g 盐补骨脂240g 核桃仁(炒)150g 大蒜120g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸或大蜜丸，气微香，味苦、甘而辛。
【功能与主治】	补肾强腰。用于肾虚腰痛，起坐不利，膝软乏力。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6~9g，大蜜丸一次1丸，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	强肾片
【处方】	鹿茸，山茱萸，枸杞子，补骨脂，桑椹，山药，熟地黄，丹参，牡丹皮，益母草，茯苓，泽泻，盐杜仲，人参茎叶总皂苷。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显褐色至深褐色；味甜、微苦。
【功能与主治】	补肾填精，益气壮阳。用于阴阳两虚所致的肾虚水肿、腰痛、遗精、阳痿、早泄、夜尿频数；慢性肾炎和久治不愈的肾盂肾炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4~6片〔规格(1)、(3)〕或一次2~3片〔规格(2)〕，一日3次，小儿酌减。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.31g；(2)薄膜衣片每片重0.63g；(3)糖衣片(片心

【贮藏】	重 0.30g)。 密封。
-------------	------------------

肾虚精亏气血两虚型心悸气短酸软乏力

【药名】	补肾益脑丸
【处方】	鹿茸(去毛)4g 红参 94g 茯苓 91g 麸炒山药 91g 熟地黄 194g 当归 91g 川芎 70g 盐补骨脂 70g 牛膝 70g 枸杞子 72g 玄参 70g 麦冬 91g 五味子 70g 炒酸枣仁 91g 远志 91g 朱砂 24g。
【性状】	本品为棕褐色的浓缩水丸；味甘、微酸。
【功能与主治】	补肾生精，益气养血。用于肾虚精亏、气血两虚所致的心悸、气短、失眠、健忘、遗精、盗汗、腰腿酸软、耳鸣耳聋。
【用法与用量】	口服。一次 8~12 丸，一日 2 次。
【注意】	感冒发热者忌用；孕妇忌服。
【规格】	每 10 丸重 2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	补肾益脑片
【处方】	鹿茸(去毛)6g 红参 39g 茯苓 38g 山药(炒)38g 熟地黄 81g 当归 38g 川芎 29g 盐补骨脂 29g 牛膝 29g 枸杞子 30g 玄参 29g 麦冬 38g 五味子 29g 炒酸枣仁 38g 远志(蜜炙)38g 朱砂 10g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味甘、微酸。
【功能与主治】	补肾生精，益气养血。用于肾虚精亏、气血两虚所致的心悸、气短、失眠、健忘、遗精、盗汗、腰腿酸软、耳鸣耳聋。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片，一日 2 次。
【注意】	感冒发烧者忌用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

肾阳不足亏虚型疲乏精冷畏冷酸软眩晕阳痿早泄

【药名】	右归丸
【处方】	熟地黄 240g 肉桂 60g 酒萸肉 90g 鹿角胶 120g 当归 90g 炮附片 60g 山药 120g 菟丝子 120g 枸杞子 120g 盐杜仲 120g。
【性状】	本品为黑色的小蜜丸或大蜜丸；味甜、微苦。
【功能与主治】	温补肾阳，填精止遗。用于肾阳不足，命门火衰，腰膝痠冷，精神不振，

<p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>怯寒畏冷，阳痿遗精，大便溏薄，尿频而清。</p> <p>口服。小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日3次。</p> <p>无。</p> <p>(1)小蜜丸每10丸重1.8g；(2)大蜜丸每丸重9g。</p> <p>密封。</p>
--	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>龟鹿补肾丸</p> <p>盐菟丝子51g 续断(盐蒸)43g 狗脊(盐蒸)64g 制何首乌64g 陈皮(蒸)21g 熟地黄64g 金樱子(蒸)51g 山药(炒)43g 淫羊藿(蒸)43g 锁阳(蒸)51g 酸枣仁(炒)43g 炙甘草21g 鹿角胶(炒)9g 龟甲胶(炒)13g 炙黄芪43g 覆盆子(蒸)85g。</p> <p>本品为棕黑色至黑色的水蜜丸或大蜜丸；味微甘、微甜。</p> <p>补肾壮阳，益气血，壮筋骨。用于肾阳虚所致的身体虚弱、精神疲乏、腰腿疲软、头晕目眩、精冷、性欲减退、小便夜多、健忘、失眠。</p> <p>口服。水蜜丸一次4.5~9g，大蜜丸一次6~12g，一日2次。</p> <p>无。</p> <p>(1)大蜜丸每丸重6g；(2)大蜜丸每丸重12g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>龟龄集</p> <p>本品为红参、鹿茸、海马、枸杞子、丁香、穿山甲、雀脑、牛膝、锁阳、熟地黄、补骨脂、菟丝子、杜仲、石燕、肉苁蓉、甘草、天冬、淫羊藿、大青盐、砂仁等药味经加工制成的胶囊。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的粉末；气特异，味咸。</p> <p>强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱，记忆减退，夜梦精溢，腰腿腿软，气虚咳嗽，五更溏泻，食欲不振。</p> <p>口服。一次0.6g，一日1次，早饭前2小时用淡盐水送服。</p> <p>忌生冷、刺激性食物；孕妇禁用；伤风感冒时停药。</p> <p>每粒装0.3g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p>	<p>肾宝合剂</p> <p>蛇床子28g 川芎28.3g 菟丝子66g 补骨脂28.5g 茯苓30g 红参20g 小茴香14.4g 五味子36g 金樱子94.6g 白术14.2g 当归46.8g 覆盆子32.9g 制何首乌74.4g 车前子16.5g 熟地黄94g 枸杞子66g 山药46.3g 淫羊藿94.6g 胡芦巴94g 黄芪51.4g 肉苁蓉47.3g 炙甘草14.2g。</p> <p>本品为棕红色至棕褐色的液体；味甜、微苦。</p> <p>温补肾阳，固精益气。用于肾阳亏虚、精气不足所致的阳痿遗精、腰腿酸痛、精神不振、夜尿频多、畏寒怕冷、月经过多，白带清稀。</p> <p>口服。一次10~20ml，一日3次。</p> <p>感冒发热期停药。</p> <p>(1)每支装10ml；(2)每瓶装100ml；(3)每瓶装150ml；(4)每瓶装200ml。</p>
--	--

【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>肾宝糖浆</p> <p>蛇床子 28g 茯苓 30g 金樱子 94.6g 制何首乌 74.4g 山药 46.3g 肉苁蓉 47.3g 补骨脂 28.5g 五味子 36g 覆盆子 32.9g 枸杞子 66g 黄芪 51.4g 菟丝子 66g 小茴香 14.4g 当归 46.8g 熟地黄 94g 胡芦巴 94g 川芎 28.3g 红参 20g 白术 14.2g 车前子 16.5g 淫羊藿 94.6g 炙甘草 14.2g。</p> <p>本品为棕褐色的黏稠液体；味甜、微苦。</p> <p>温补肾阳，固精益气。用于肾阳亏虚、精气不足所致的阳痿遗精、腰腿酸痛、精神不振、夜尿频多、畏寒怕冷、月经过多，白带清稀。</p> <p>口服。一次 10~20ml，一日 3 次。</p> <p>感冒发热期停药。</p> <p>(1) 每支装 10ml；(2) 每瓶装 100ml；(3) 每瓶装 150ml；(4) 每瓶装 200ml。</p> <p>密封，置阴凉干燥处。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>蚕蛾公补片</p> <p>雄蚕蛾(制) 156.25g 人参 15.625g 熟地黄 75g 当归 56.25g 盐补骨脂 56.25g 蛇床子 37.5g 炒白术 75g 枸杞子 56.25g 盐菟丝子 37.5g 仙茅 37.5g 肉苁蓉 37.5g 淫羊藿 37.5g。</p> <p>本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；气香，味苦。</p> <p>补肾壮阳，养血，填精，用于肾阳虚损，阳痿早泄，性功能衰退。</p> <p>口服。一次 3~6 片，一日 3 次。</p> <p>无。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>桂附地黄丸</p> <p>肉桂 20g 附子(制) 20g 熟地黄 160g 酒萸肉 80g 牡丹皮 60g 山药 80g 茯苓 60g 泽泻 60g。</p> <p>本品为黑棕色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜而带酸、辛。</p> <p>温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝痠冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。</p> <p>口服，水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。</p> <p>无。</p> <p>大蜜丸每丸重 9g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p>	<p>桂附地黄胶囊</p> <p>肉桂 22.22g 熟地黄 177.77g 牡丹皮 66.66g 茯苓 66.66g 附子(制) 22.22g 酒萸肉 88.88g 山药 88.88g 泽泻 66.66g。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕色的颗粒和粉末，气芳香，味微苦。</p>

【功能与主治】	温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝痠冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。
【用法与用量】	口服。一次7粒，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.34g。
【贮藏】	密封。

【药名】	益肾灵颗粒
【处方】	枸杞子200g 附子(制)20g 车前子(炒)100g 覆盆子200g 桑椹200g 韭菜子(炒)100g 金樱子200g 女贞子300g 芡实(炒)300g 补骨脂(炒)200g 五味子50g 沙苑子250g 淫羊藿150g。
【性状】	本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	温阳补肾。用于肾气亏虚、阳气不足所致的阳痿、早泄、遗精或弱精症。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装20g；(2)每袋装8g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	蛤蚧补肾胶囊
【处方】	蛤蚧13g 麻雀(干)50g 黄芪60g 枸杞子80g 党参100g 熟地黄120g 杜仲120g 茯苓100g 胡芦巴60g 淫羊藿80g 当归80g 牛膝80g 锁阳80g 肉苁蓉70g 续断80g 山药100g 菟丝子80g 狗鞭40g 鹿茸3.6g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄棕色至棕褐色的粉末；味微苦。
【功能与主治】	壮阳益肾，填精补血。用于身体虚弱，真元不足，小便频数。
【用法与用量】	口服。一次3~4粒，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	锁阳固精丸
【处方】	锁阳20g 制巴戟天30g 菟丝子20g 八角茴香25g 芡实(炒)20g 莲须25g 龙骨(煅)20g 熟地黄56g 牡丹皮11g 茯苓11g 知母4g 牛膝20g 肉苁蓉(蒸)25g 补骨脂(蒸)25g 杜仲(炭)25g 韭菜子20g 莲子20g 煅牡蛎20g 鹿角霜20g 山茱萸(制)17g 山药56g 泽泻11g 黄柏4g 大青盐25g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气微，味苦。
【功能与主治】	温肾固精。用于肾阳不足所致的腰膝酸软、头晕耳鸣、遗精早泄。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6g，小蜜丸一次大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)水蜜丸每100丸重10g；(2)小蜜丸每100丸重20g；(3)大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	强阳保肾丸
【处方】	炙淫羊藿 36g 酒肉苁蓉 36g 盐补骨脂 48g 沙苑子 36g 覆盆子 48g 麸炒芡实 60g 盐小茴香 30g 阳起石（煨，酒淬）36g 盐胡芦巴 48g 醋五味子 42g 蛇床子 36g 韭菜子 42g 肉桂 24g 茯苓 36g 制远志 36g。
【性状】	本品为粉红色光亮的包衣水丸，除去包衣后显灰黑色；味微苦。
【功能与主治】	补肾助阳。用于肾阳不足所致的腰酸腿软、精神倦怠、阳痿遗精。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每 100 丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	添精补肾膏
【处方】	党参 45g 淫羊藿 45g 茯苓 45g 酒肉苁蓉 45g 当归 45g 盐杜仲 45g 锁阳（酒蒸）45g 龟甲胶 45g 制远志 45g 炙黄芪 45g 狗脊 45g 熟地黄 60g 巴戟天（酒制）45g 枸杞子 45g 川牛膝 45g 鹿角胶 30g。
【性状】	本品为棕褐色稠厚的半流体，味甜、微苦。
【功能与主治】	温肾助阳，补益精血。用于肾阳亏虚、精血不足所致的腰膝痠软、精神萎靡、畏寒怕冷、阳痿遗精。
【用法与用量】	冲服或炖服。一次 9g，或遵医嘱。
【注意】	伤风感冒忌服。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

脾气虚型体弱乏力气短心悸虚脱自汗浮肿

【药名】	十一味参芪片
【处方】	人参（去芦），黄芪，天麻，当归，熟地黄，泽泻，决明子，菟丝子，鹿角，枸杞子，细辛。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；气芳香，味微苦。
【功能与主治】	补脾益气。用于脾气虚所致的体弱、四肢无力。

【用法与用量】	口服。一次4片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣每片重0.3g；(2)糖衣片片心重0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	十一味参芪胶囊
【处方】	人参(去芦)36g 黄芪107g 当归142g 天麻71g 熟地黄142g 泽泻106g 决明子142g 鹿角35g 菟丝子106g 细辛4g 枸杞子106g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰棕色至棕褐色的粉末，气芳香，味微苦。
【功能与主治】	补脾益气，用于脾气虚所致的体弱、四肢无力。
【用法与用量】	口服。一次5粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.33g。
【贮藏】	密封。

【药名】	参芪十一味颗粒
【处方】	人参(去芦)90g 黄芪268g 当归356g 天麻178g 熟地黄356g 泽泻266g 决明子356g 鹿角88g 菟丝子266g 细辛10g 枸杞子266g。
【性状】	本品为棕褐色的颗粒；气芳香，味微苦。
【功能与主治】	补脾益气。用于脾气虚所致的体弱、四肢无力。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	黄芪颗粒
【处方】	黄芪1000g。
【性状】	本品为淡黄色至棕黄色的颗粒；味甜或味微甜、苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	补气固表，利尿，托毒排脓，生肌。用于气短心悸，虚脱，自汗，体虚浮肿，久泻，脱肛，子宫脱垂，痈疽难溃，疮口久不愈合。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装15g。(2)每袋装10g。(3)每袋装4g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

脾肾亏虚阳虚型酸软畏寒尿频乏力腰膝酸痛

【药名】	全鹿丸
【处方】	全鹿干 80g 锁阳(酒炒) 40g 党参 40g 地黄 40g 牛膝 40g 熟地黄 40g 楮实子 40g 菟丝子 40g 山药 40g 盐补骨脂 40g 枸杞子(盐水炒) 40g 川芎(酒炒) 40g 肉苁蓉 40g 酒当归 40g 巴戟天 40g 炙甘草 40g 天冬 40g 五味子(蒸) 40g 麦冬 40g 炒白术 40g 覆盆子 40g 盐杜仲 40g 芡实 40g 花椒 20 茯苓 40g 炙黄芪 40g 盐续断 40g 胡芦巴(酒炒) 40g 陈皮 40g 小茴香(酒炒) 20g 青盐 20g 沉香 20g。
【性状】	本品为棕褐色至棕黑色的水蜜丸或大蜜丸；气香，味甜、微咸。
【功能与主治】	补肾填精，健脾益气。用于脾肾两亏所致的老年腰膝痠软、神疲乏力、畏寒肢冷、尿次频数、崩漏带下。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g〔规格(1)〕，一次 2 丸〔规格(2)〕，一次 1 丸〔规格(3)〕，一日 2 次。
【注意】	阴虚火旺者禁用。
【规格】	(1) 水蜜丸每 40 丸重 3g；(2) 大蜜丸每丸重 6g；(3) 大蜜丸每丸重 12.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	补益地黄丸
【处方】	熟地黄 160g 盐车前子 50g 菟丝子 50g 诃子(去核) 20g 麸炒枳壳 50g 地骨皮 30g 牛膝 160g 茯苓 30g。
【性状】	本品为黑褐色的大蜜丸；味甜、微涩。
【功能与主治】	滋阴补气，益肾填精。用于脾肾两虚，腰痛脚重，四肢浮肿，行步艰难，疲乏无力。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	刺五加片
【处方】	刺五加浸膏 150g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味微苦、涩。
【功能与主治】	益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚，体虚乏力，食欲不振，腰膝酸痛，失眠多梦。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 片，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重(1) 0.25g；(2) 0.31g，糖衣片(片心重 0.25g)。

【贮藏】	密封。
-------------	-----

【药名】	刺五加胶囊
【处方】	刺五加浸膏 150g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕灰色至棕褐色的粉末；味微苦、涩。
【功能与主治】	益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚，体虚乏力，食欲不振，腰膝酸痛，失眠多梦。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	刺五加颗粒
【处方】	刺五加浸膏 50g。
【性状】	本品为淡棕黄色的颗粒；具特殊香气，味甜。
【功能与主治】	益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚，体虚乏力，食欲不振，腰膝酸痛，失眠多梦。
【用法与用量】	开水冲服。一次 10g，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 10g；(2) 每瓶装 100g。
【贮藏】	密封。

气血两虚型体弱乏力气短心悸经多面色苍白萎黄

【药名】	十全大补丸
【处方】	党参 80g 炒白术 80g 茯苓 80g 炙甘草 40g 当归 120g 川芎 40g 酒白芍 80g 熟地黄 120g 炙黄芪 80g 肉桂 20g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气香，味甘而微辛。
【功能与主治】	温补气血。用于气血两虚，面色苍白，气短心悸，头晕自汗，体倦乏力，四肢不温，月经量多。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2~3 次。

【注意】	无。
【规格】	(1)小蜜丸每100粒重20g；(2)大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	八珍丸
【处方】	党参100g 炒白术100g 茯苓100g 甘草50g 当归150g 白芍100g 川芎75g 熟地黄150g。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸或黑褐色至黑色的大蜜丸；味甜、微苦。
【功能与主治】	补气益血。用于气血两虚，面色萎黄，食欲不振，四肢乏力，月经过多，
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	八珍颗粒
【处方】	党参60g 炒白术60g 茯苓60g 炙甘草30g 当归90g 炒白芍60g 川芎45g 熟地黄90g。
【性状】	本品为浅棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味甜、微苦。
【功能与主治】	补气益血。用于气血两虚，面色萎黄，食欲不振，四肢乏力，月经过多。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装8g；(2)每袋装3.5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	人参养荣丸
【处方】	人参100g 土白术100g 茯苓75g 炙甘草100g 当归100g 熟地黄75g 白芍(麸炒)100g 炙黄芪100g 陈皮100g 制远志50g 肉桂100g 五味子(酒蒸)75g。
【性状】	本品为棕褐色的水蜜丸或大蜜丸，味甘、微辛。
【功能与主治】	补气血。用于心脾不足，气血两亏，形瘦神疲，食少便溏，病后虚弱。
【用法与用量】	口服，水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日1~2次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	山东阿胶膏
【处方】	阿胶，党参，白术，黄芪，枸杞子，白芍，甘草。
【性状】	本品为棕褐色稠厚的半流体；味甜。
【功能与主治】	补益气血，润燥。用于气血两虚所致的虚劳咳嗽、吐血、妇女崩漏、胎动不安。
【用法与用量】	开水冲服，一次20~25g，一日3次。
【注意】	无。

【规格】	每瓶装(1)80g；(2)200g；(3)300g；(4)400g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	乌鸡白凤丸
【处方】	乌鸡(去毛爪肠)640g 醋鳖甲 64g 桑螵蛸 48g 黄芪 32g 白芍 128g 天冬 64g 地黄 256g 川芎 64g 丹参 128g 芡实(炒)64g 鹿角胶 128g 煅牡蛎 48g 人参 128g 当归 144g 醋香附 128g 甘草 32g 熟地黄 256g 银柴胡 26g 山药 128g 鹿角霜 48g。
【性状】	本品为黑褐色至黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味甜、微苦。
【功能与主治】	补气养血，调经止带。用于气血两虚，身体瘦弱，腰膝酸软，月经不调，崩漏带下。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乌鸡白凤片
【处方】	乌鸡 540g(去毛爪肠) 醋鳖甲 54g 桑螵蛸 40g 黄芪 27g 白芍 108g 天冬 54g 地黄 216g 川芎 54g 丹参 108g 鹿角胶 108g 煅牡蛎 40g 人参 108g 当归 122g 醋香附 108g 甘草 27g 熟地黄 216g 银柴胡 22g 山药 108g 芡实(炒) 54g 鹿角霜 40g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕色；味甜、微苦。
【功能与主治】	补气养血，调经止带。用于气血两虚，身体瘦弱，腰膝酸软，月经不调，崩漏带下。
【用法与用量】	口服，一次2片，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每片重0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乌鸡白凤颗粒
【处方】	乌鸡(去毛爪肠)594g 醋鳖甲 59g 桑螵蛸 45g 黄芪 30g 白芍 119g 天冬 59g 地黄 238g 川芎 59g 丹参 119g 芡实(炒)59g 鹿角胶 119g 煅牡蛎 45g 人参 119g 当归 134g 醋香附 119g 甘草 30g 熟地黄 238g 银柴胡 24g 山药 119g 鹿角霜 45g。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒；味甘、微苦。
【功能与主治】	补气养血，调经止带。用于气血两虚，身体瘦弱，腰膝酸软，月经不调，崩漏带下。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	当归补血口服液
【处方】	当归 132g 黄芪 330g。
【性状】	本品为棕黄色至黄棕色的液体；气香，味甜、微辛。
【功能与主治】	补养气血。用于气血两虚证。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	阿胶补血口服液
【处方】	阿胶 62.5g 熟地黄 125g 党参 125g 黄芪 62.5g 枸杞子 62.5g 白术 62.5g。
【性状】	本品为深棕色的液体；味微甜。
【功能与主治】	补益气血，滋阴润肺。用于气血两虚所致的久病体弱、目昏、虚劳咳嗽。
【用法与用量】	口服。一次 20ml，早晚各一次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每支装(1)10ml；(2)20ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	阿胶补血膏
【处方】	阿胶 50g 熟地黄 100g 党参 100g 黄芪 50g 枸杞子 50g 白术 50g。
【性状】	本品为棕褐色的黏稠液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	补益气血，滋阴润肺。用于气血两虚所致的久病体弱、目昏、虚劳咳嗽。
【用法与用量】	口服。一次 20g，早晚各一次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装(1)100g；(2)200g；(3)300g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方阿胶浆
【处方】	阿胶，红参，熟地黄，党参，山楂。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的液体；味甜。
【功能与主治】	补气养血。用于气血两虚，头晕目眩，心悸失眠，食欲不振及白细胞减少症和贫血。
【用法与用量】	口服。一次 20ml，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每瓶装 20ml；(2)每瓶装 200ml；(3)每瓶装 250ml；(4)每瓶装 20ml(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	驴胶补血颗粒
【处方】	阿胶 108g 黄芪 90g 党参 90g 熟地黄 60g 白术 45g 当归 30g。
【性状】	本品为浅黄棕色至棕色的颗粒和粉末；味甜。

【功能与主治】	补血，益气，调经。用于久病气血两虚所致的体虚乏力、面黄肌瘦、头晕目眩、月经过少、闭经。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装20g；(2)每袋装8g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	参芪口服液
【处方】	党参187.5g 黄芪187.5g。
【性状】	本品为黄棕色至淡红棕色的澄清液体；味甜。
【功能与主治】	补气扶正。用于体弱气虚，四肢无力。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	参茸固本片
【处方】	当归45g 酒白芍37.5g 山茱萸60g 枸杞子45g 鹿茸血0.75g 熟地黄120g 鹿茸(去毛)2.5g 红参15g 山药(炒)60g 茯苓60g 杜仲(炭)45g 牡丹皮24g 盐泽泻18g 五味子22.5g 菟丝子(酒制)60g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色至褐色；味微苦。
【功能与主治】	补气养血。用于气血两亏所致的四肢倦怠、面色无华、耳鸣目眩。
【用法与用量】	口服。一次5~6片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

气血不足脾胃虚弱型心悸气短乏力面色萎黄盗汗失眠

【药名】	升气养元糖浆
【处方】	党参125g 黄芪125g 龙眼肉50g。
【性状】	本品为棕褐色的液体；味甜。
【功能与主治】	益气，健脾，养血。用于气血不足、脾虚弱所致的面色萎黄、四肢乏力。
【用法与用量】	口服。一次20ml，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	1)每瓶装20ml；(2)每瓶装250ml。

【贮藏】	密封，置阴凉处。
-------------	----------

【药名】	阿胶三宝膏
【处方】	阿胶 90g 大枣 300g 黄芪 300g。
【性状】	本品为暗棕红色的黏稠液体；味甜。
【功能与主治】	补气血，健脾胃。用于气血两亏、脾胃虚弱所致的心悸、气短、崩漏、浮肿、食少。
【用法与用量】	开水冲服。一次 10g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	养心定悸口服液
【处方】	地黄 400g 麦冬 200g 红参 67g 大枣 200g 阿胶 67g 黑芝麻 167g 桂枝 100g 生姜 100g 炙甘草 133g。
【性状】	本品为深棕色的液体；气香，味甜。
【功能与主治】	养血益气，复脉定悸。用于气虚血少，心悸气短，心律不齐，盗汗失眠，咽干舌燥，大便干结。
【用法与用量】	口服。一次 20ml，一日 2 次。
【注意】	腹胀便溏、食少苔腻者忌服。
【规格】	(1) 每支装 10ml；(2) 每支装 20ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	养心定悸膏
【处方】	地黄 120g 麦冬 60g 红参 20g 大枣 60g 阿胶 20g 黑芝麻 50g 桂枝 30g 生姜 30g 炙甘草 40g。
【性状】	本品为棕褐色的黏稠液体；气香，味甜。
【功能与主治】	养血益气，复脉定悸。用于气虚血少，心悸气短，心律不齐，盗汗失眠，咽干舌燥，大便干结。
【用法与用量】	口服。一次 15~20g，一日 2 次。
【注意】	腹胀便溏、食少苔腻者忌服。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	益气养血口服液
【处方】	人参 8.3g 黄芪 83.4g 党参 75g 麦冬 50g 当归 33.3g 炒白术 33.3g 地黄 33.3g 制何首乌 30g 五味子 25g 陈皮 33.3g 地骨皮 25g 鹿茸 1.7g 淫羊藿 50g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	益气养血。用于气血不足所致的气短心悸、面色不华、体虚乏力。
【用法与用量】	口服。一次 15~20ml，一日 3 次。
【注意】	无。

【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	补肾养血丸
【处方】	何首乌 80g 当归 20g 黑豆 40g 牛膝(盐制) 20g 茯苓 20g 英丝子 20g 盐补骨脂 10g 枸杞子 20g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸或黑色的水蜜丸，气微香，味甜、苦涩。
【功能与主治】	补肝肾，益精血。用于身体虚弱，血气不足，遗精，须发早白。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 水蜜丸每 100 丸重 7.2g；(2) 大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

气阴两亏肾不纳气型心悸气短脉微自汗遗精盗汗

【药名】	生脉饮
【处方】	红参 100g 麦冬 200g 五味子 100g。
【性状】	本品为黄棕色至红棕色的澄清液体；气香，味酸甜、微苦。
【功能与主治】	益气复脉，养阴生津。用于气阴两亏，心悸气短，脉微自汗。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	生脉胶囊
【处方】	红参 330g 麦冬 660g 五味子 330g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气香，味酸、甜、微苦。
【功能与主治】	益气复脉，养阴生津。用于气阴两亏，心悸气短，脉微自汗。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每粒装 0.3g；(2) 每粒装 0.35g。

【贮藏】	密封，置阴凉处。
【药名】	七味都气丸
【处方】	醋五味子 150g 山茱萸(制)200g 茯苓 150g 牡丹皮 150g 熟地黄 400g 山药 200g 泽泻 150g。
【性状】	本品为黑褐色的水蜜丸；气微香，味甘、微酸。
【功能与主治】	补肾纳气，涩精止遗。用于肾不纳气所致的喘促、胸闷、久咳、气短、咽干、遗精、盗汗、小便频数。
【用法与用量】	口服。一次 9g，一日 2 次。
【注意】	外感咳嗽、气喘者忌服。
【规格】	每 40 丸重 3g。
【贮藏】	密封。

表虚气虚不固型多汗倦怠乏力恶风面色发白

【药名】	玉屏风口服液
【处方】	黄芪 600g 防风 200g 白术(炒)200g。
【性状】	本品为棕红色至棕褐色的液体；味甜、微苦、涩。
【功能与主治】	益气，固表，止汗。用于表虚不固，自汗恶风，面色㿔白，或体虚易感风邪者。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	玉屏风胶囊
【处方】	黄芪 3000g 防风 1000g 炒白术 1000g。
【性状】	本品为胶囊剂，内容物为黄棕色的颗粒和粉末；味苦、微甜。
【功能与主治】	益气，固表，止汗。用于表虚不固，自汗恶风，面色㿔白，或体虚易感风邪者。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.5g。

【贮藏】	密封。
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>玉屏风袋泡茶</p> <p>黄芪 1000g 防风 333g 白术(炒)333g。</p> <p>本品为袋泡茶，内容物为黄棕色至棕褐色颗粒和粗粉；气香，味微甜、微苦、微涩。</p> <p>益气，固表，止汗。用于表虚不固，自汗恶风，面色㿔白，或体虚易感风邪者。</p> <p>开水浸泡 15 分钟后饮服。一次 2 袋，一日 2~3 次。</p> <p>无。</p> <p>每袋装 3g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>玉屏风颗粒</p> <p>黄芪 600g 防风 200g 白术(炒)200g。</p> <p>本品为浅黄色至棕红色的颗粒；味涩而后甘。</p> <p>益气，固表，止汗。用于表虚不固，自汗恶风，面色㿔白，或体虚易感风邪者。</p> <p>开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。</p> <p>无。</p> <p>每袋装 5g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>复芪止汗颗粒</p> <p>黄芪 330g 党参 400g 麻黄根 160g 炒白术 160g 煅牡蛎 500g 五味子(蒸) 80g。</p> <p>本品为黄棕色的颗粒；味甜。</p> <p>益气，固表，敛汗。用于气虚不固，多汗，倦怠，乏力。</p> <p>开水冲服。儿童五岁以下一次 1 袋，一日 2 次；五至十二岁一次 1 袋，一日 3 次；成人一次 2 袋，一日 2 次。</p> <p>佝偻病、结核病、甲状腺功能亢进、更年期综合征等患者，服用本品同时应作病因治疗。</p> <p>每袋装 20g。</p> <p>密封。</p>

阳虚欲脱冷汗自出四肢厥逆下利清谷脉微欲绝

【药名】	四逆汤
【处方】	淡附片 300g 干姜 200g 炙甘草 300g。
【性状】	本品为棕黄色的液体；气香，味甜、辛。
【功能与主治】	温中祛寒，回阳救逆。用于阳虚欲脱，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

心脾两虚型失眠乏力多梦头昏晕食欲不振崩漏便血

【药名】	归脾丸
【处方】	党参 80g 炒白术 160g 炙黄芪 80g 炙甘草 40g 茯苓 160g 制远志 160g 炒酸枣仁 80g 龙眼肉 160g 当归 160g 木香 40g 大枣(去核)40g。
【性状】	本品为棕褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气微，味甘而后微苦、辛。
【功能与主治】	益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力；食欲不振，崩漏便血。
【用法与用量】	用温开水或生姜汤送服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	归脾丸(浓缩丸)
【处方】	党参 80g 炒白术 160g 炙黄芪 80g 炙甘草 40g 茯苓 160g 制远志 160g 炒酸枣仁 80g 龙眼肉 160g 当归 160g 木香 40g 大枣(去核)40g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的浓缩水丸；气微，味甘而后微苦、辛。
【功能与主治】	益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，食欲不振，崩漏便血。
【用法与用量】	口服。一次 8~10 丸，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每 8 丸相当于饮片 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	归脾合剂
【处方】	党参 68g 炙黄芪 68g 茯苓 136g 炒酸枣仁 68g 当归 136g 炒白术 136g 炙甘草 34g 制远志 136g 龙眼肉 136g 木香 34g 大枣(去核)34g 生姜 17g。
【性状】	本品为红棕色至棕黑色的液体；气芳香，味微甘、微苦。
【功能与主治】	益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，食欲不振，崩漏便血。
【用法与用量】	口服，一次 10~20ml，一日 3 次；用时摇匀。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每支装 10ml；(2) 每瓶装 100ml；(3) 每瓶装 120ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	归脾颗粒
【处方】	党参 140g 炒白术 280g 炙黄芪 140g 炙甘草 70g 茯苓 280g 制远志 280g 炒酸枣仁 140g 龙眼肉 280g 当归 280g 木香 70g 大枣(去核)70g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒，气香，味甘、微苦。
【功能与主治】	益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，食欲不振，崩漏便血。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 3g。
【贮藏】	密封。

心肾亏虚型记忆减退晕眩失眠酸软认知障碍

【药名】	健脑丸
【处方】	当归 25g 肉苁蓉(盐炙)20g 山药 20g 天竺黄 10g 龙齿(煅)10g 琥珀 10g 五味子(酒蒸)15g 天麻 5g 柏子仁(炒)4g 丹参 5g 益智仁(盐炒)15g 人参 5g 远志(甘草水炙)10g 菊花 5g 九节菖蒲 10g 胆南星 10g 枸杞子 20g 赭石 1.5g 酸枣仁(炒)40g。
【性状】	本品为暗红色的包衣水丸，除去包衣后显棕褐色；气微，味微酸。
【功能与主治】	补肾健脑，养血安神。用于心肾亏虚所致的记忆减退、头晕目眩、心悸失眠、腰膝酸软；老年轻度认知障碍见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5 丸，一日 2~3 次，饭后服。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每 10 丸重 1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	健脑胶囊
【处方】	当归 33.3g 天竺黄 13.3g 肉苁蓉(盐制) 26.7g 龙齿(煅) 13.3g 山药 26.7g 琥珀 13.3g 五味子(酒制) 20g 天麻 6.7g 柏子仁(炒) 5.3g 丹参 6.7g 益智仁(盐炒) 20g 人参 6.7g 制远志 13.3g 菊花 6.7g 九节菖蒲 13.3g 赭石 10g 胆南星 13.3g 炒酸枣仁 53.3g 枸杞子 26.7g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的颗粒和粉末；气微，味微酸。
【功能与主治】	补肾健脑，养血安神。用于心肾亏虚所致的记忆减退、头晕目眩、心悸失眠、腰膝痠软；老年轻度认知障碍见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

肺肾两虚阴亏型气喘咳血浮肿眩晕耳鸣腰膝酸软

【药名】	百令胶囊
【处方】	本品为发酵冬虫夏草菌粉 [Cs-C-Q80 中华被毛孢 <i>Hirsutella sinensis</i> Liu, Guo, Yu-et Zeng (1989) 经液体深层发酵所得菌丝体的干燥粉末] 制成的胶囊。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰色至灰黄色粉末；气微腥，味微咸。
【功能与主治】	补肺肾，益精气。用于肺肾两虚引起的咳嗽、气喘、咯血、腰背酸痛、面目虚浮、夜尿清长；慢性支气管炎、慢性肾功能不全的辅助治疗。
【用法与用量】	口服。一次 5~15 粒 [规格(1)] 或 2~6 粒 [规格(2)]，一日 3 次。慢性肾功能不全：一次 10 粒 [规格(1)] 或一次 4 粒 [规格(2)]，一日 3 次；8 周为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每粒装 0.2g；(2) 每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	麦味地黄丸
【处方】	麦冬 60g 熟地黄 160g 牡丹皮 60g 茯苓 60g 五味子 40g 酒萸肉 80g 山药 80g 泽泻 60g。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味微甜而酸。
【功能与主治】	滋肾养肺。用于肺肾阴亏，潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝痠软，消渴。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

中医对于血液循环系统的研究和诊断

中医对于血液的基本概念，血液是运行于脉中、循环流注全身的富有营养和滋润作用的红色液体，是构成人体和维持人体生命活动的重要基本物质之一。脉是血液运行的管道，故又称之为“血府”，有约束血液运行的作用。血液在脉中循环于全身，内至脏腑，外达肢节，为生命活动提供营养，发挥濡养和滋润的作用。在某些外部或者内部的因素的作用下，血液不能在脉内循行而逸出脉外则形成出血，即离经之血。由于离经之血离开了脉道，失去了其发挥作用的条件，所以也就丧失了应有的生理功能，同时会造成各种出血症状。

血的生成：

营气和津液是生成血的最基本的物质。《黄帝内经》认为营气和津液来源于饮食水谷，中焦脾胃在消化活动中，将其中的水谷精微分别转化为人体所需的水谷精气和津液，水谷精气中的精专部分就是营气。营气和津液进入脉内，经肺的气化和心阳的温煦便化生为血液。正如《灵枢·营卫生会》所说的：（中焦）“此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身，莫贵于此，故独得行于经隧，命曰营气。”

《灵枢·痲疽》也说：“中焦出气如露，上注溪谷，而渗孙脉，津液和调，变化而赤为血。”。文中所指的“中焦出气如露”，即指中焦脾胃化生的、如雾露状的营气和津液，可从细小的血脉渗入，成为化生血液的原料。

精和血之间还存在着资生和转化的相互关系，因此肾中所藏之精也是生血的物质基础。张介宾说：“血即精之属也”（《景岳全书》）。血液的生成过程与脏腑的功能活动密切相关。营气和津液是血液化生的主要物质基础，而营气和津液都是由脾胃消化饮食吸收水谷精微所产生的。因此脾胃是气血生化之源。脾胃运化功能的强健与否，饮食水谷营养的充足与否，均直接影响着血液的化生。

心肺的生理功能在血液的生成过程中也同样起着重要作用。脾胃运化水谷精微所化生的营气和津液，由脾向上输于心肺，与肺吸入的清气相结合濡润，贯注心脉，在心阳的温煦作用下变化成为红色的血液。

肝在生血过程中所发生的作用可从三方面认识：一是肝能疏泄气机，影响脾胃运化，促进血液生成所需的营气和津液的充分化生；二是肝有贮藏血液和调节血流量的功能，必要时可以调济充足的血流量来营养与血液生成有关的脏腑，使诸脏腑在生血的过程中功能正常和活跃；三是配合肾精化血。因此《素问·六节藏象论》有说：肝脏能“生血气”。清·张璐《张氏医通·诸血门》也指出，肾脏藏“精不泄，归精于肝而化清血”。

肾对血液生成的作用主要体现在两个方面：一是通过肾精生骨髓，骨髓生血。肾中精气充足，则血液化生有源；二是肾精所化生的元气对全身各脏腑功能均有激发和推动作用，

间接促进了血液的生成。肾精充足，元气旺盛，则血液因之而充盈。

所以中医认为，血液生成的基本条件在于物质基础和相关脏腑的综合作用这两个主要的方面。在物质基础方面是以营气、津液为主，同时还与肺吸入的清气及肾精有密切的关系；在相关脏腑中以脾胃最为重要，还与心、肺、肝、肾有着密不可分的联系。由此可见，血液的生成是脏腑整体功能活动的综合体现。

血液的主要功能：

血液是生命活动的主要物质之一，对人体有濡养和运载各种营养物质的作用，同时也是精神活动的主要物质基础。

濡养作用：血液具有营养和濡润全身的生理功能。血液由水谷精微所化生，在血脉中循环，如环无端，运行不息，内至脏腑，外达皮肉筋骨，不断地对全身各脏腑等组织器官发挥着营养作用，以维持其生理活动。血液中有大量的津液，所谓血液的濡润作用，是指血液对于脏腑组织、皮毛孔窍、关节筋肉产生的滋濡滑润作用。

《难经·二十二难》说：“血主濡之。”即是对血液的营养和滋润作用的简要概括。血液的营养和滋润作用正常，表现为面色红润，肌肉丰满、壮实，皮肤、毛发、孔窍润泽，感觉敏锐，肢体运动灵活自如，关节滑利等。如果血液的生成不足或持久地过度耗损，或血液的营养和滋润作用减弱，均可引起全身或局部产生血虚的病理变化，临床则可见头昏目花、面色不华或萎黄、眵白、毛发指甲干枯、肌肤干燥、孔窍干涩、口干舌燥、肢体关节屈伸不利或肢端麻木、尿少便干等临床表现。

运载作用：血液的运载作用包括三方面内容：一是吸入体内的清气与脾转输至肺的水谷精微，在肺的气化作用下渗注于肺脉之中，由血液将两者运载于全身，以发挥其营养作用。此即血能藏气、寓气、载气。正如清·周学海《读医随笔·气能生血血能载气》所说：“血藏气者，气之性情慄悍滑疾，行而不止，散而不聚者也。若无以藏之，不竞行而竞散乎？惟血之质为气所恋，因以血为气之室，而相裹结不散矣。”弥散飘逸的气，必须依附于有形之血才能在体内输布；二是脏腑组织代谢后所产生的浊气浊物，必须通过血液的运载才能到达于肺和肾，在肺中进行清浊交换，呼出体外；在肾中滤去废浊，聚于膀胱而后排出体外。因此血液的运载作用失常，人身之气的新陈代谢就会受到影响，甚至危及生命。三是运载传递体内各种信息。

血是精神活动的基本物质基础：神是人体生命活动外在表现的总称。神不仅是脏腑生理功能的综合反映，而且对脏腑生理活动起着主宰和调节作用，神之功能的正常发挥离不开血液对脏腑的充分濡养作用，因此血是神的主要物质基础，故《灵枢·营卫生会》上说：“血者，神气也。”《素问·八正神明论》也说：“血气者，人之神，不可不谨养。”人的精力充沛、神志清晰、思维敏捷、情志活动正常等，均有赖于血气的充盛，血脉的调和

与畅利。正如《灵枢·平人绝谷》中所说：“血脉和利，精神乃居。”机体的感觉灵敏，肢体活动自如也必须依赖于血液的营养和滋润作用，故《素问·五藏生成》说：“肝受血而能视，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能摄。”因此不论何种原因所形成的血虚、血热或血行失常，均可以出现精神衰退、健忘、多梦、失眠、烦躁、感觉和肢体运动失常，甚则可见神志恍惚、惊悸不安，以及谐狂、昏迷等多种病症。

血的运行：

血液的正常运行，受着多种因素的影响，是多个脏腑功能共同作用的结果。血液的循环依赖于气的推动和固摄作用的协调平衡，这是维持血液正常循行的基本条件。气的推动作用则能促使血液运行不息，保持一定的流速；气的固摄作用能使其在脉管中运行而不至逸出脉外。气对血的推动、固摄作用是通过各脏腑的生理活动实现的。心为血液循行的动力，脉为血之府，是血液循行的通道，血在心气的推动下在脉中环周不休，生命不止，运行不息。

心脏、脉管和血液构成了一个相对独立的系统。全身的血液，依赖心气的推动，通过经脉而输送到全身，发挥其濡养作用。心气的推动正常与否，在血液循环中起着十分重要的主导作用，所以《素问·痿论》说：“心主身之血脉。”肺主呼吸，朝百脉而调节着全身的气机，辅助心脏推动和调节血液的运行。脾统摄血液，五脏六腑之血全赖脾气的约束，脾气健旺，气血旺盛，则气之固摄作用健全，血液就不会逸出脉外。肝具有贮藏血液和调节血流量的功能，既可防失血，又可根据人体的动静，调节脉管中的血流量，使脉中循环血量维持一定的水平；肝又能疏泄气机，有利于血液的畅行。

此外脉道是否通利，血的或寒或热等因素，亦直接影响着血液的运行，如《素问·调经论》说：“血气者，喜温而恶寒，寒则泣（通“涩”）不能流，温则消而去之。”

总之，血液的正常运行必须具备三个条件：其一，血液充盈，寒温适度；其二，脉管系统通畅完好；其三，心、肺、肝、脾等脏功能正常，特别是心脏的作用尤为重要。

血的失常

血的失常主要包括两个方面：一是血的不足，濡养作用减退，称为“血虚”；二是血的运行失常，如血液运行迟缓而致血瘀；血液运行加速而迫疾；血液妄行，逸出脉外而出血等。

血不足：血不足又称血虚，是指血液不足，血的濡养功能减退的病理变化。由于心主血脉，肝主藏血，故血不足的病变以心、肝两脏最为多见。虽然形成血不足病变的原因甚多，但常见的有三个方面：一是大出血等导致失血过多，新血未能及时生成补充；二是化源不足，如脾胃虚弱，运化无力，血液生化减少，或肾精亏损，精髓不充，精不化血等；三是久病不愈，日渐消耗营血等。

由于全身各脏腑组织器官，都依赖于血液的濡养，而且血能载气，血少则血中之气亦虚，血液又是神志活动的重要物质基础。所以在血虚时，血脉空虚，濡养作用减退，就会

出现全身或局部的失荣失养，功能活动逐渐衰退，神志活动衰惫等一派虚弱表现，如面色、唇、指甲淡白无华，头晕健忘、神疲乏力、形体消瘦、心悸、失眠、手足麻木、两目干涩、视物昏花等。

血液运行失常：血液运行失常是指在疾病产生和发展的过程中，由于某些致病邪气的影响，或者脏腑功能失调，导致血液运行瘀滞不畅，或血液运行加速，甚至血液妄行，逸出脉外而出血的病理变化。人体血液的正常运行，依赖于心、肝、脾、肺等脏腑以及气的推动、温煦和固摄作用的共同配合。因此在某些致病因素的影响下，导致上述脏腑及气的功能失调，均可引起血液的运行失常。血液的运行失常，主要包括血瘀、血行迫疾及出血等。

血瘀：血瘀是指血液运行迟缓或瘀滞不畅的病理状态。导致血瘀病变的因素甚多，最常见的有气滞而血行受阻；气虚而推动无力，血行迟缓；寒邪入血，血寒而凝滞不通；邪热入血，煎熬津血，血液黏稠而不行；痰浊等阻闭脉络，气血瘀阻不通，以及“久病入络”等，这些因素都会影响血液正常运行而瘀滞。

血瘀与瘀血的概念不同。血瘀是指血液运行瘀滞不畅的病理，而瘀血则是血液运行失常的病理产物，又可成为继发性致病因素。血瘀病理可以出现在任何局部，也可是全身性的。血液瘀滞于脏腑、经络等某一局部，不通则痛，可出现局部疼痛，固定不移，甚至形成癥积肿块等。如果全身血行不畅，则可出现面、唇、舌、爪甲、皮肤青紫色暗等症。由于气、血、津液的运行密切相关，血瘀病理形成之后，又可阻滞气机，甚至影响津液的输布，导致水液停蓄，形成气滞、血瘀、水停的病理状态。

血行迫疾：血行迫疾是指在某些致病因素的作用下，血液被迫运行加速，失于宁静的病理变化。血行迫疾的形成多是外感阳热邪气，或情志郁结化火，或痰湿等阴邪郁久化热，热入血分所致；也可因脏腑的阳气亢旺，如肝阳上亢，血气躁动等所致。血液的正常运行，虽然要依赖阳气的温煦以促进其运动，但是仍以宁静勿躁为本。由于某些因素导致阳气亢旺，血液失于宁静而躁，必然会引起血行迫急，甚至损伤脉络，迫血妄行。同时因血液与神志关系十分密切，血躁则神亦躁，易致神志不宁。所以血行迫疾，常表现为面赤舌红、脉数、心烦，甚至出血、神志昏迷等病症。

出血：出血是指在疾病的发生和发展过程中，血液运行不循常道，逸出脉外的病理变化。导致出血的原因颇多，常见的有外感阳热邪气入血，迫使血液妄行和损伤脉络；气虚固摄无力，血液不循常道而外逸；各种外伤，破损脉络；脏腑阳气亢旺，气血冲逆；或瘀血阻滞，以致脉络破损等。导致出血的病变，不外乎火热迫血妄行、气虚不能摄血和脉络损伤几个方面。出血，主要有吐血、咳血、便血、尿血、月经过多，以及鼻衄、齿衄、肌衄等。由于导致出血的原因不同，其出血的表现亦各异。火热迫血妄行，或外伤破损脉络者，其出血较急，且颜色鲜红、血量较多；气虚固摄无力的出血，其病程较长，且出血色淡、量少，大多表现在人体的下部；瘀血阻滞，脉络破损的出血，多是血色紫暗或有血块

等。

血液系统诸病

吐血咳血便血胃及十二指肠出血支气管出血崩漏

【药名】	三七片
【处方】	三七 500g。
【性状】	本品为灰黄色至棕黄色的片；或为薄膜衣片，除去包衣后显灰黄色至棕黄色；味苦而微甜。
【功能与主治】	散瘀止血，消肿止痛。用于咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。
【用法与用量】	口服。小片：一次 4~12 片，大片：一次 2~6 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每片含三七 (1) 0.25g (小片)，(2) 0.5g (大片)。
【贮藏】	密封。

【药名】	三七血伤宁胶囊
【处方】	三七，重楼，制草乌，大叶紫珠，山药，黑紫藜芦，冰片。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅灰黄色至棕黄色的颗粒和粉末；气香，味辛、微苦。保险子为朱红色的薄膜衣水丸，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；气微，味苦。
【功能与主治】	止血镇痛，祛瘀生新。用于瘀血阻滞、血不归经所致的咯血、吐血、月经过多、痛经、闭经、外伤出血、痔疮出血；胃及十二指肠溃疡出血、支气管扩张出血、肺结核咯血、功能性子宫出血。
【用法与用量】	用温开水送服。一次 1 粒 (重症者 2 粒)，一日 3 次，每隔 4 小时服一次，初服者若无副作用，可如法连服多次；小儿二至五岁一次 1/10 粒，五岁以上一次 1/5 粒。跌打损伤较重者，可先用黄酒送服 1 丸保险子。瘀血肿痛者，用酒调和药粉，外擦患处；如外伤皮肤破损或外伤出血，只需内服。
【注意】	伤及其他病症患者忌服保险子；服药期间忌食蚕豆、鱼类和酸冷食物；孕妇禁用。
【规格】	每粒装 0.4g；每 100 丸保险子重 4g；每 10 粒胶囊配装 1 丸保险子。
【贮藏】	密封。

【药名】	致康胶囊
【处方】	大黄 65g 黄连 50g 三七 50g 白芷 31g 阿胶 50g 龙骨 (煅) 44g 白及 44g 醋没药 31g 海螵蛸 44g 茜草 50g 龙血竭 12g 甘草 11g 珍珠 4g 冰片 4g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅灰棕色至棕褐色的颗粒及粉末；气微香，味辛

【功能与主治】	凉，微苦。 清热凉血止血，化瘀生肌定痛。用于创伤性出血，崩漏、呕血及便血等。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇禁服；过敏体质者慎用。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密闭，置阴凉干燥处。

原发性及继发性血小板减少性紫癜齿衄

【药名】	血美安胶囊
【处方】	猪蹄甲109g 地黄60g 赤芍50g 牡丹皮50g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄褐色至棕褐色的粉末；气香、微腥，味微甜。
【功能与主治】	清热养阴，凉血活血。用于原发性血小板减少性紫癜血热伤阴挟瘀证，症见皮肤紫癜、齿衄、鼻衄、妇女月经过多、口渴、烦热、盗汗。
【用法与用量】	口服。一次6粒，一日3次，小儿酌减。或遵医嘱。
【注意】	孕妇禁用；虚寒者慎用。
【规格】	每粒装0.27g。
【贮藏】	密封。

【药名】	血康口服液
【处方】	本品为肿节风浸膏制成的口服液。
【性状】	本品为红棕色的澄清液体；味苦、涩、微甜。
【功能与主治】	活血化瘀，消肿散结，凉血止血。用于血热妄行，皮肤紫斑；原发性及继发性血小板减少性紫癜。
【用法与用量】	口服。一次10~20ml，一日3~4次；小儿酌减；可连服一个月。
【注意】	服药后个别患者如有轻度恶心、嗜睡现象，继续服药后可自行消失。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	固本统血颗粒
【处方】	锁阳，菟丝子，肉桂，巴戟天，黄芪，山药，附子，枸杞子，党参，淫羊藿。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气芳香，味甘、微苦。
【功能与主治】	温肾健脾，填精益气。用于阳气虚损、血失固摄所致的紫斑，症见畏寒肢冷，腰痠乏力，尿清便溏，皮下紫斑，其色淡暗。亦可用于轻型原发性血小板减少性紫癜见上述证候者。
【用法与用量】	饭前开水冲服。一次1袋，一日2次。1个月为一疗程。

【注意】	孕妇慎用；高血压患者慎用。
【规格】	每袋装 20g。
【贮藏】	密封。

胃肠消化道出血十二指肠溃疡出血

【药名】	止血定痛片
【处方】	三七 129g 海螵蛸 86g 煅花蕊石 129g 甘草 86g。
【性状】	本品为灰黄色的片；味淡而后甘甜。
【功能与主治】	散瘀，止血，止痛。用于十二指肠溃疡疼痛、胃酸过多、出血属血瘀证者。
【用法与用量】	口服。一次 6 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每片重 0.43g。
【贮藏】	密封。

【药名】	止血复脉合剂
【处方】	阿胶，川芎，附片(黑顺片)，大黄。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的液体；味微苦、微甘。
【功能与主治】	止血祛瘀，滋阴复脉。用于上消化道出血量多，症见烦躁或神志淡漠、肢冷、汗出、脉弱无力。可作为失血性休克的辅助治疗药物。
【用法与用量】	口服。一次 20~40ml，一日 3~4 次，或遵医嘱。治疗失血性休克，开始 2 小时内服 180ml，第 3~12 时和 12~24 小时分别服 90~180ml，第二至第七天可根据病情恢复情况，每天给药 90~180ml，分数次口服或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 20ml。(2) 每瓶装 200ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	紫地宁血散
【处方】	大叶紫珠，地稔。
【性状】	本品为黄棕色的粉末；味辛、苦、微涩。
【功能与主治】	清热凉血，收敛止血。用于胃中积热所致的吐血、便血；胃及十二指肠溃疡出血见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 8g，一日 3~4 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	裸花紫珠片
【处方】	裸花紫珠干浸膏 500g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕黑色；味湿、微苦。

【功能与主治】	清热解毒，收敛止血。用于血热毒盛所致的呼吸道、消化道出血及细菌感染性炎症。
【用法与用量】	口服。一次2片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每片含干浸膏0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	裸花紫珠胶囊
【处方】	裸花紫珠干浸膏200g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为深棕色至棕黑色的颗粒和粉末；味涩、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，收敛止血。用于血热毒盛所致的呼吸道、消化道出血及细菌感染性炎症。
【用法与用量】	口服。一次3~5粒〔规格(1)〕、一次2~3粒〔规格(2)〕，一日3~4次或一次3粒〔规格(3)〕，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每粒装0.3g(含干浸膏0.2g)。(2)每粒装0.4g(含干浸膏0.3g)。(3)每粒装0.33g(含干浸膏0.33g)。
【贮藏】	密封。

血热型咯血衄血尿血便血崩漏血小板减少紫癜

【药名】	槐角丸
【处方】	槐角(清炒)200g 地榆炭100g 黄芩100g 麸炒枳壳100g 当归100g 防风100g。
【性状】	本品为黑褐色至黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味苦、涩。
【功能与主治】	清肠疏风，凉血止血。用于血热所致的肠风便血、痔疮肿痛。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	止红肠辟丸
【处方】	地黄(炭)96g 黄芩96g 栀子84g 槐花64g 荆芥穗64g 黄连24g 升麻5g 当归96g 地榆炭84g 白芍72g 阿胶64g 侧柏炭64g 乌梅10g。
【性状】	本品为黑色的大蜜丸；味苦。
【功能与主治】	清热凉血，养血止血。用于血热所致的肠风便血、痔疮下血。
【用法与用量】	口服。小丸一次6丸，大丸一次1丸，一日2次。

【注意】	无。
【规格】	(1)每丸重 1.5g; (2)每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	荷叶丸
【处方】	荷叶 320g 藕节 64g 大蓟炭 48g 小蓟炭 48g 知母 64g 黄芩炭 64g 地黄(炭) 96g 棕榈炭 96g 栀子(焦) 64g 茅根炭 96g。
【性状】	本品为黑色的大蜜丸; 气微, 味甘、后微苦。
【功能与主治】	凉血止血。用于血热所致的咯血、衄血、尿血、便血、崩漏。
【用法与用量】	口服, 一次 1 丸, 一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	断血流片
【处方】	断血流 4500g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片, 除去包衣后显棕褐色; 味苦、微涩。
【功能与主治】	凉血止血。用于血热妄行所致的月经过多、崩漏、吐血、衄血、咯血、尿血、便血、血色鲜红或紫红; 功能失调性子宫出血、子宫肌瘤出血及多种出血症、单纯性紫癜、原发性血小板减少性紫癜见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3~6 片, 一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	断血流胶囊
【处方】	断血流 4500g。
【性状】	本品为硬胶囊, 内容物为棕褐色的粉末; 味苦、微涩。
【功能与主治】	凉血止血。用于血热妄行所致的月经过多、崩漏、吐血、衄血、咯血、尿血、便血、血色鲜红或紫红; 功能失调性子宫出血、子宫肌瘤出血及多种出血症、单纯性紫癜、原发性血小板减少性紫癜见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3~6 粒, 一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	断血流颗粒
【处方】	断血流 1200g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒, 味甜、微苦。
【功能与主治】	凉血止血。用于血热妄行所致的月经过多、崩漏、吐血、衄血、咯血、尿血、便血、血色鲜红或紫红; 功能失调性子宫出血、子宫肌瘤出血及多种

【用法与用量】	出血症、单纯性紫癜、原发性血小板减少性紫癜见上述证候者。
【注意】	口服。一次1袋，一日3次。
【规格】	无。
【贮藏】	每袋装(1)10g；(2)6.5g。
	密封。

【药名】	维血宁合剂
【处方】	虎杖，炒白芍，仙鹤草，地黄，鸡血藤，熟地黄，墨旱莲，太子参。
【性状】	本品为棕褐色的液体；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	滋阴养血，清热凉血。用于阴虚血热所致的出血；血小板减少症见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次25~30ml，一日3次，小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)每瓶装25ml。(2)每瓶装150ml。(3)每瓶装180ml。(4)每瓶装250ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	维血宁颗粒
【处方】	虎杖，炒白芍，仙鹤草，地黄，鸡血藤，熟地黄，墨旱莲，太子参。
【性状】	本品为浅黄棕色至黄棕色的颗粒，味甜、微苦或味微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	滋阴养血，清热凉血。用于阴虚血热所致的出血；血小板减少症见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装20g；(2)每袋装8g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

血瘀气滞型胸闷刺痛瘀斑高脂血症

【药名】	降脂通络软胶囊
【处方】	姜黄提取物(以姜黄素类化合物计)50g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为含有少量悬浮固体的橙黄色至橙红色的油状液体；气微，味淡。
【功能与主治】	活血行气，降脂祛浊。用于高脂血症属血瘀气滞证者，症见胸胁胀痛、心前区刺痛、胸闷、舌尖边有瘀点或瘀斑、脉弦或涩。
【用法与用量】	口服。一次2粒，一日3次，饭后服用；或遵医嘱。
【注意】	偶有腹胀、腹泻。

【规格】	每粒含姜黄素类化合物 50mg。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

痰浊阻滞型头昏胸闷便秘高脂血症

【药名】	血脂宁丸
【处方】	决明子，山楂，荷叶，制何首乌。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；味甜、酸。
【功能与主治】	化浊降脂，润肠通便。用于痰浊阻滞型高脂血症，症见头昏胸闷、大便干燥。
【用法与用量】	口服。一次 2 丸，一日 2~3 次。
【注意】	严重胃溃疡、胃酸分泌多者禁用或慎用。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	血脂灵片
【处方】	泽泻，决明子，山楂，制何首乌。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；味微苦。
【功能与主治】	化浊降脂，润肠通便。用于痰浊阻滞型高脂血症，症见头昏胸闷、大便干燥。
【用法与用量】	口服。一次 4~5 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每片重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	血脂康片
【处方】	本品为红曲经加工制成的片剂。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显紫红色；气微酸，味淡。
【功能与主治】	化浊降脂，活血化痰，健脾消食。用于痰阻血瘀所致的高脂血症，症见气短、乏力、头晕、头痛、胸闷、腹胀、食少纳呆；也可用于高脂血症及动脉粥样硬化所致的其他的心脑血管疾病的辅助治疗。
【用法与用量】	口服。一次 2 片，一日 2 次，早晚饭后服用；轻、中度患者一日 2 片，晚饭后服用，或遵医嘱。
【注意】	(1) 用药期间应定期检查血脂、血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶；有肝病史者服用本品尤其要注意肝功能的监测。(2) 在本品治疗过程中，如发生血清氨基转移酶增高达到正常高限 3 倍，或血清肌酸磷酸激酶显著增高时，应停用本品。(3) 孕妇及哺乳期妇女慎用。(4) 饮食宜清淡。(5) 儿童用药的安全性和有效性尚未确定。(6) 对本品过敏者禁用。(7) 活动性肝炎或无法解释的血清氨基酸转移酶升高者禁用。(8) 一般耐受性良好，大部分副作用轻微而短暂。(9) 本品常见不良反应为胃肠道不适，如胃痛、腹

<p>【规格】 【贮藏】</p>	<p>胀、胃部灼热等。(10)偶可引起血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶可逆性升高。(11)罕见乏力、口干、头晕、头痛、肌痛、皮疹、胆囊疼痛、浮肿、结膜充血和泌尿道刺激症状。</p> <p>每片重 0.4g。 密封。</p>
------------------------------------	---

<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>血脂康胶囊</p> <p>红曲。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为紫红色的颗粒和粉末；气微酸，味淡。</p> <p>化痰降脂，活血化瘀，健脾消食。用于痰阻血瘀所致的高脂血症，症见气短、乏力、头晕、头痛、胸闷、腹胀、食少纳呆；也可用于高脂血症及动脉粥样硬化所致的其他的心脑血管疾病的辅助治疗。</p> <p>口服。一次 2 粒，一日 2 次，早晚饭后服用；轻、中度患者一日 2 粒，晚饭后服用，或遵医嘱。</p> <p>(1) 用药期间应定期检查血脂、血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶；有肝病史者服用本品尤其要注意肝功能的监测。(2) 在本品治疗过程中，如发生血清氨基转移酶增高达到正常高限 3 倍，或血清肌酸磷酸激酶显著增高时，应停用本品。(3) 孕妇及哺乳期妇女慎用。(4) 饮食宜清淡。(5) 儿童用药的安全性和有效性尚未确定。(6) 对本品过敏者禁用。(7) 活动性肝炎或无法解释的血清氨基酸转移酶升高者禁用。(8) 一般耐受性良好，大部分副作用轻微而短暂。(9) 本品常见不良反应为胃肠道不适，如胃痛、腹胀、胃部灼热等。(10) 偶可引起血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶可逆性升高。(11) 罕见乏力、口干、头晕、头痛、肌痛、皮疹、胆囊疼痛、浮肿、结膜充血和泌尿道刺激症状。</p> <p>每粒装 0.3g。 密封。</p>
---	--

<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>荷丹片</p> <p>荷叶，丹参，山楂，番泻叶，盐补骨脂。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色，味微苦。</p> <p>化痰降浊，活血化瘀，用于高脂血症属痰浊挟瘀证候者。</p> <p>口服。糖衣片一次 5 片，薄膜衣片一次 2 片，一日 3 次。饭前服用，8 周为一疗程，或遵医嘱。</p> <p>偶见腹泻、恶心、口干。脾胃虚寒、便溏者忌服。孕妇禁服。</p> <p>薄膜衣片每片重 0.73g。 密封。</p>
---	---

气滞血瘀型高脂血症

【药名】	丹香清脂颗粒
【处方】	丹参，川芎，桃仁，降香，三棱，莪术，枳壳，酒大黄。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒，味甜、苦。
【功能与主治】	活血化瘀，行气通络，用于高脂血症属气滞血瘀证者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装10g。
【贮藏】	密封。

脾肾两虚痰浊血瘀型高脂血症

【药名】	桑葛降脂丸
【处方】	桑寄生，葛根，山药，黄芪，山楂，丹参，红花，泽泻，茵陈，蒲公英。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的浓缩水丸；气微，味微苦。
【功能与主治】	补肾健脾，通下化痰，清热利湿。用于脾肾两虚、痰浊血瘀型高脂血症。
【用法与用量】	口服。一次4g，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	脾虚便溏者慎用；孕妇禁用。
【规格】	每30丸重1g。
【贮藏】	密封。

脾肾不足型慢性白细胞减少症

【药名】	补白颗粒
【处方】	补骨脂100g 白扁豆165g 淫羊藿100g 丹参100g 柴胡100g 黑豆335g 赤小豆335g 苦参100g。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	健脾温肾。用于慢性白细胞减少症属脾肾不足者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装15g。

【贮藏】	密封。
-------------	-----

瘀浊内阻气血不足型动脉硬化高脂血症

【药名】	脂脉康胶囊(降脂灵胶囊)
【处方】	普洱茶 100g 刺五加 100g 山楂 100g 莱菔子 50g 荷叶 50g 葛根 50g 菊花 50g 黄芪 50g 黄精 50g 何首乌 100g 茺蔚子 50g 杜仲 50g 大黄(酒制) 30g 三七 50g 槐花 100g 桑寄生 50g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的粉末；味微苦、涩。
【功能与主治】	消食，降脂，通血脉，益气血。用于瘀浊内阻、气血不足所致的动脉硬化症、高脂血症。
【用法与用量】	口服；一次 5 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

瘀血阻滞型脉管炎硬皮病动脉硬化

【药名】	脉管复康片
【处方】	丹参 526.24g 鸡血藤 526.24g 郁金 210.50g 乳香 84.2g 没药 84.2g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；气微香，味甘、微苦。
【功能与主治】	活血化瘀、通经活络。用于瘀血阻滞，脉络不通引起的脉管炎、硬皮病、动脉硬化性下肢血管闭塞症，对冠心病、脑血栓后遗症属上述证候者也有

【用法与用量】	一定治疗作用。
【注意】	口服。一次8片〔规格(1)〕或一次4片〔规格(2)〕，一日3次。
【规格】	经期减量，孕妇及肺结核患者遵医嘱服用。
【贮藏】	(1)糖衣片(片心重0.3g，相当于饮片0.7g)；(2)薄膜衣片每片重0.6g(相当于饮片1.4g)。
	密封。

肝肾不足型头昏须发早白头晕目眩高脂血症

【药名】	降脂灵片
【处方】	制何首乌 222g 枸杞子 222g 黄精 296g 山楂 148g 决明子 44g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显棕色至棕褐色；味微酸、涩。
【功能与主治】	补肝益肾，养血明目。用于肝肾不足型高脂血症，症见头晕、目眩、须发早白。
【用法与用量】	口服。一次5片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.31g；(2)糖衣片片心重0.30g。
【贮藏】	密封。

【药名】	降脂灵颗粒
【处方】	制何首乌 369.8g 枸杞子 369.8g 黄精 493.1g 山楂 246.6g 决明子 73.3g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；气香，味酸、微苦。
【功能与主治】	补肝益肾，养血明目，用于肝肾不足型高脂血症，症见头晕、目眩、须发早白。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装3g。
【贮藏】	密封。

肝肾阴虚挟瘀型头晕耳鸣胸闷便秘高脂血症

【药名】	脂康颗粒
-------------	-------------

【处方】	决明子 462g 枸杞子 462g 桑椹 462g 红花 154g 山楂 462g。
【性状】	本品为棕黄色或棕褐色的颗粒；气微，味酸，微甜、微苦。
【功能与主治】	滋阴清肝，活血通络。用于肝肾阴虚挟瘀之高血脂症，症见头晕或胀或痛，耳鸣眼花，腰膝酸软，手足心热，胸闷，口干，大便干结。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 2 次。
【注意】	(1) 妇女妊娠期、月经过多忌用；(2) 禁烟酒及高脂饮食。
【规格】	每袋装 8g。
【贮藏】	密封。

缺铁性贫血再生障碍性贫血

【药名】	再造生血片
【处方】	菟丝子(酒制)，红参，鸡血藤，阿胶，当归，女贞子，黄芪，益母草，熟地黄，白芍，制何首，淫羊藿，黄精(酒制)，鹿茸(去毛)，党参，麦冬，仙鹤草，白术(炒)，补骨脂(盐制)，枸杞子，墨旱莲。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；气微，味微苦、涩。
【功能与主治】	补肝益肾，补气养血。用于肝肾不足、气血两虚所致的血虚虚劳，症见心悸气短、头晕目眩、倦怠乏力、腰膝酸软、面色苍白、唇甲色淡或伴出血；再生障碍性贫血、缺铁性贫血见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重 0.38g。
【贮藏】	密封。

【药名】	生血宝合剂
【处方】	制何首乌 344g 女贞子 430.7g 桑椹 430.7g 墨旱莲 430.7g 白芍 344g 黄芪 344g 狗脊 344g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的液体；气微香，味甜、微苦。
【功能与主治】	滋补肝肾，益气生血。用于肝肾不足、气血两虚所致的神疲乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣、心悸、气短、失眠、咽干、纳差食少；放、化疗所致的白细胞减少，缺铁性贫血见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次 15ml，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 100ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	生血宝颗粒
【处方】	制何首乌，女贞子，桑椹，墨旱莲，白芍，黄芪，狗脊。
【性状】	本品为灰褐色的颗粒；气微香，味甜，微苦。
【功能与主治】	滋补肝肾，益气生血。用于肝肾不足、气血两虚所致的神疲乏力、腰膝酸

<p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>软、头晕耳鸣、心悸、气短、失眠、咽干、纳差食少；放、化疗所致的白细胞减少，缺铁性贫血见上述证候者。</p> <p>开水冲服。一次 8g，一日 2~3 次。</p> <p>无。</p> <p>(1) 每袋装 8g。(2) 每袋装 4g。</p> <p>密封，置阴凉处。</p>
--	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>复方皂矾丸</p> <p>皂矾，西洋参，海马，肉桂，大枣(去核)，核桃仁。</p> <p>本品为棕黑色至黑褐色的小蜜丸；气特异，味甜、微苦、微涩。</p> <p>温肾健髓，益气养阴，生血止血。用于再生障碍性贫血，白细胞减少症，血小板减少症，骨髓增生异常综合征及放疗和化疗引起的骨髓损伤、白细胞减少属肾阳不足、气血两虚证者。</p> <p>口服。一次 7~9 丸，一日 3 次，饭后即服。</p> <p>忌茶水。</p> <p>每丸重 0.2g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>健脾生血片</p> <p>党参，茯苓，炒白术，甘草，黄芪，山药，炒鸡内金，醋龟甲，山麦冬，醋南五味子，龙骨，煅牡蛎，大枣，硫酸亚铁。</p> <p>本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至灰褐色；气微腥，味酸、涩、微苦。</p> <p>健脾和胃，养血安神。用于脾胃虚弱及心脾两虚所致的血虚证，症见面色萎黄或晄白、食少纳呆、脘腹胀闷、大便不调、烦躁多汗、倦怠乏力、舌胖色淡、苔薄白、脉细弱；缺铁性贫血见上述证候者。</p> <p>饭后口服。周岁以内一次 0.5 片，一至三岁一次 1 片，三至五岁一次 1.5 片，五至十二岁一次 2 片，成人一次 3 片，一日 3 次；或遵医嘱，4 周为一疗程。</p> <p>忌茶；勿与含鞣酸类药物合用；用药期间，部分患儿可出现牙齿颜色变黑，停药后可逐渐消失。少数患儿服药后，可见短暂性食欲下降、恶心、呕吐、轻度腹泻，多可自行缓解。</p> <p>每片重 0.6g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p>	<p>健脾生血颗粒</p> <p>党参 45g 炒白术 27g 黄芪 22.5g 茯苓 45g 甘草 13.5g 山药 54g 炒鸡内金 22.5g 醋龟甲 13.5g 山麦冬 45g 龙骨 13.5g 大枣 22.5g 醋南五味子 27g 煅牡蛎 13.5g 硫酸亚铁 (FeSO₄·7H₂O) 20g。</p> <p>本品为灰黄色至棕色的颗粒；气微，味甜、微腥酸。</p> <p>健脾和胃，养血安神。用于脾胃虚弱及心脾两虚所致的血虚证，症见面色萎黄或晄白、食少纳呆、脘腹胀闷、大便不调、烦躁多汗、倦怠乏力、舌</p>
--	---

【用法与用量】	<p>胖色淡、苔薄白、脉细弱；缺铁性贫血见上述证候者。</p> <p>饭后用开水冲服。周岁以内一次 2.5g(半袋)，一至三岁一次 5g(1 袋)，三至五岁一次 7.5g(1.5 袋)，五至十二岁一次 10g(2 袋)，成人一次 15g(3 袋)，一日 3 次或遵医嘱。</p>
【注意】	<p>忌茶；勿与含鞣酸类药物合用；用药期间，部分患儿可出现牙齿颜色变黑，停药后可逐渐消失。少数患儿服药后，可见短暂性食欲下降、恶心、呕吐、轻度腹泻，多可自行缓解。</p>
【规格】	每袋装 5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	益气维血颗粒
【处方】	猪血提取物 130g 黄芪 100g 大枣 100g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；气香，味甜。
【功能与主治】	补血益气，用于气血两虚所致的面色萎黄或苍白、眩晕、神疲乏力、少气懒言、自汗、唇舌色淡、脉细弱；缺铁性贫血见上述证候者。
【用法与用量】	口服。成人一次 10g，一日 3 次童一次 10g，一日 2 次；三岁以下儿童一次 5g，一日 2 次；或遵医嘱。
【注意】	偶见恶心、呕吐、腹泻、便秘，可自行缓解或停药后症状消失。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	遮光，密封。

【药名】	益血生胶囊
【处方】	<p>阿胶 21g 龟甲胶 21g 鹿角胶 21g 鹿血 21g 牛髓 36g 紫河车 14g 鹿茸 4g 茯苓 36g 黄芪(蜜制)29g 白芍 29g 当归 21g 党参 21g 熟地黄 21g 白术(麸炒)21g 制何首乌 14g 大枣 14g 炒山楂 21g 炒麦芽 21g 炒鸡内金 14g 知母(盐制)7g 大黄(酒制)7g 花生衣 4g。</p>
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色颗粒状粉末；气腥，味微咸。
【功能与主治】	健脾补肾，生血填精。用于脾肾两虚，精血不足所致的面色无华、眩晕气短、体倦乏力、腰膝痠软；缺铁性贫血、慢性再生障碍性贫血见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次，儿童酌减。
【注意】	虚热者慎用。
【规格】	每粒装 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	新血宝胶囊
【处方】	鸡血藤，黄芪，大枣，当归，白术，陈皮，硫酸亚铁。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气香，味微苦、甘，有铁腥味。
【功能与主治】	补血益气，健脾和胃。用于缺铁性贫血所致的气血两虚证。
【用法与用量】	饭后服，忌与茶、咖啡及含鞣酸类药物合用。
【注意】	无。

【规格】	每粒装 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	升血颗粒
【处方】	皂矾，山楂，大枣，黄芪，新阿胶。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒；味甜、微酸。
【功能与主治】	补气养血。用于气血两虚所致的面色淡白、眩晕、心悸、神疲乏力、气短；缺铁性贫血见上述证候者。
【用法与用量】	口服。小儿周岁内一次 5g，一至三岁一次 10g，三岁以上及成人一次 15g，一日 3 次。
【注意】	禁用茶水冲服。
【规格】	每袋装 (1) 5g；(2) 10g；(3) 15g。
【贮藏】	密封。

中医对于泌尿系统的研究和诊断

肾位居腰脊两旁，左右各一，故《素问·脉要精微论》说：“腰者，肾之府。”肾的形态在《类经图翼》中有所描述：“肾有两枚，形如豇豆，相并而曲，附于脊之两旁，相去各一寸五分，外有黄脂包裹，各有带两条。”肾的主要功能包括主管生长发育与生殖，主管一身阴阳，主管水液代谢，主管纳气。肾的功能是肾精、肾气、肾阴、肾阳共同作用的结果。但肾的精、气、阴、阳又各具特殊作用，因而在不同的功能中所发挥的作用各有侧重。肾的系统联系是在体合骨，生髓通脑，其华在发，开窍于耳及二阴，在液为唾，在志为恐。肾在五行中属水，为阴中之太阴(或阴中之阴)，有闭藏的生理特征，通于冬气。通过经脉的络属而与膀胱构成表里关系。肾藏有先天之精，为构成人体胚胎的原始物质，是脏腑阴阳之根，故称为“先天之本”。

肾的主要生理

主藏精：肾主藏精，是指肾具有封藏精气的功能。肾主管生长发育与生殖的功能，是在“肾藏精”的基础上产生的。肾精包括“先天之精”和“后天之精”。先天之精禀受于父母，与生俱来，是构成人体胚胎的原始物质，具有繁衍后代的功能，此即《灵枢·本神》所谓“生之来，谓之精”之意。后天之精是指人体出生后，由脾胃从食物中摄取的营养成分和脏腑代谢化生的精微物质，具有培补先天之精和促进人体生长发育的功能。所以《素问·上古天真论》说：“肾受五脏六腑之精而藏之”。先天之精和后天之精关系密切，二者相互依存，相互促进。先天之精为生命之本原，发育成胎儿，依赖“后天之精”不断培育和充养，才能日渐充盛，充分发挥其生理效应；出生之后，后天之精又不断供养先天之精，使之逐渐充盛，促进人体不断地生长发育。“后天之精”又赖“先天之精”的活力资助，方能不断地摄入和化生。肾中的“先天之精”和“后天之精”是融为一体，无法分开的。肾对精的闭藏，主要依赖于肾气的封藏摄纳，也是气的固摄作用的体现。肾对先后天之精的闭藏使精藏之于肾，促进肾精的不断充盈，防止其从体内无故流失，为精在体内充分发挥生理效应创造了必要的条件。

肾中所藏之精的生理效应有：

主管生长发育：肾具有主管生长发育与生殖的功能。早在《黄帝内经》中就有详细记载，如《素问·上古天真论》说：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七，肾气平均，故真牙生而长极……七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。丈夫八岁，肾气实，发长齿更；

二八，肾气盛，天癸至，精气溢泄，阴阳和，故能有子；三八，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极……八八，天癸竭，精少，肾藏衰，形体皆极，则齿发去。”机体的生、长、壮、老、已的自然规律与肾中精气的盛衰密切相关。人体自幼年开始，肾精气逐渐充盛则形体和智力同步发育，表现为齿更发长；进入青壮年，肾中精气已达充盛状态，则形体智力发育健壮，表现为真牙生长、体壮结实、骨髓强健、机智敏捷等；待到老年期，肾精逐渐衰减，则形体智力亦渐衰老，表现为骨骼活动不灵、发白齿松、腰弯背驼、反应迟钝，甚或健忘呆滞等老态龙钟之象。说明机体的齿、骨、发的生长状态是反映肾中精气的外候，是判断机体生长发育状况和衰老程度的客观标志。若肾中精气亏虚，必然影响人体的生长发育。小儿则表现为生长发育不良，可见身材矮小，或五迟（立、行、齿、发、语迟）、五软（头项、口、手、足、肌肉软），或头发稀疏、智力低下、动作缓慢；成人则表现为未老先衰，可见形体衰老、智力减退、牙齿松动易落、须发早白易脱、腰膝疲软、精神萎靡或健忘恍惚、耳鸣耳聋、足痿无力、反应迟钝等。肾主管生长发育的理论，对养生保健具有重要意义，保养肾中精气，是中医学防止早衰、延年益寿的核心内容。

主管生殖繁衍：人体进入青春期，随着肾中精气的不断充盈，便产生了一种促进和维持生殖机能的精微物质——天癸，于是生殖器官发育成熟，女子则月经按时来潮，男子则能排泄精液，从而具备了生殖能力。此后由中年进入老年，肾中精气渐衰，天癸的生成随之减少，甚至耗竭，生殖机能也随之下降直至消失，生殖器官日趋萎缩，女子则绝经，男子则阳事难举，从而丧失生殖能力。说明肾中精气通过化生天癸而对生殖功能发挥着决定性的作用，若肾中精气亏虚，天癸化生减少，青少年则见生殖器官发育不良、性成熟迟缓；中年人则会导致生殖机能减退，表现为男性精少不育和女性不孕或小产滑胎等病症。因此中医在治疗生殖障碍性疾病时，往往从补肾着手。

推动和调节脏腑气化：脏腑气化是指脏腑之气的升降出入运动所产生的各种变化，包括各脏腑形体官窍的功能，以及机体精气血津液各自的新陈代谢及其能量的相互转化。肾精、肾气及其分化的肾阴、肾阳在脏腑气化过程中发挥着重要的推动和调控作用。肾精，即肾脏所藏之精；肾气，即肾精所化之气，两者关系密切，即肾精弥散而为无形的肾气，肾气，聚合而成有形的肾精。肾精和肾气合称为肾中精气，产生了肾阴和肾阳两种不同的生理效应，凡是对人体脏腑组织具有滋润和濡养作用者称为肾阴；凡是对人体脏腑组织具有温煦和推动作用者称为肾阳。肾阴为全身诸阴之本，肾阳为全身诸阳之根，在人体阴精和阳气中居于主宰地位，所以肾阴又称元阴、真阴、真水和命门之水；肾阳又称元阳、真阳、真火和命门之火。故将肾喻为“阴阳之根”、“水火之宅”，五脏六腑之阴精，非肾阴而不能滋生；五脏六腑之阳气，非肾阳而不能温养，故肾阴、肾阳为五脏六腑阴阳之根本。肾阴、肾阳在各脏腑形体官窍功能的正常发挥，以及精气血津液各自的新陈代谢及其能量的相互转化过程中发挥着重要的推动和调节作用。

如果肾阴和肾阳任何一方偏衰，都会导致整体阴阳的不平衡。若肾阴虚则全身之阴皆虚，阴不制阳，阳偏亢则各脏腑组织生理功能虚性亢奋，代谢机能相对亢盛，产热增加，

因而出现一派虚热之象。若肾阳虚则全身之阳皆虚，阳不制阴，阴偏盛则各脏腑组织生理功能相对减弱，代谢机能相对降低，产热减少，因而出现一派虚寒之象。肾阴和肾阳调节全身阴阳，共同维持人体阴阳的动态平衡，使机体处于健康状态。肾阴肾阳相互制约，相互依存，相互为用，因此当肾阴虚到一定程度时可伤及肾阳，肾阳虚亦可累及肾阴，形成阴阳互损的病理状态。究其本质，是因为肾阴、肾阳均是以肾精气为基础。

主水液：所谓肾主管水液代谢是指肾中阳气具有主持和调节人体水液代谢平衡的功能，又称为“肾主水液”。人体的水液代谢，包括水液的生成、输布和排泄，是由多个脏腑参与的复杂过程，其中肾阳的动能最为重要，在此过程之中肾阳的作用表现有三：一是能温煦和推动参与水液代谢的肺、脾、三焦、膀胱等内脏，使其发挥各自的生理功能；二是能将各脏腑组织利用后归于肾的水液，经肾阳的蒸腾气化作用再升清降浊，将大量的浊中之清者，吸收输布周身重新被利用，少量的浊中之浊者经肾阳气化为尿液下输膀胱；三是控制膀胱的开合，排出尿液，维持机体水液代谢的平衡。若肾阳不足，则气化、推动和固摄作用失常，引起水液代谢障碍，一方面可造成水液停聚，出现痰饮、水肿等病症；另一方面可致膀胱开合失度，出现小便清长，或遗尿、尿失禁或小便余沥，或出现尿少、尿闭、水肿等病症。

主纳气：气，指肺吸入的自然界清气。所谓肾主管纳气是指肾具有摄纳肺所吸入的清气以防止呼吸表浅，协助肺完成呼吸的功能。人体的呼吸运动虽为肺所主管，但必须依赖肾对清气的摄纳，才能使呼吸保持一定的深度，维持体内外气体正常的交换。正如清·林珮琴《类证治裁·喘证论治》说：“肺为气之主，肾为气之根，肺主出气，肾主纳气，阴阳相交，呼吸乃和。”所以正常的呼吸运动虽由肺所主，还需肾的配合才得以完成。肾纳气的功能，实质上是肾主藏精作用在呼吸运动中的体现。肾中精气充沛，摄纳有力，则纳气正常，助肺吸气，使清气下达于肾，表现为呼吸具有深度，均匀平稳，和调通畅。若肾中精气不足，摄纳无力，则肺气上浮而不能下行，吸入清气不得归藏于肾，就会出现久病咳喘、吸气困难、呼多吸少、动辄喘息益甚等肾不纳气的病症。因此临床对慢性咳喘的病人，常采取“发作时治肺，缓解时治肾”的治疗原则，从而提高这类疾病的远期疗效。

肾的系统联系

肾在体合骨，其华在发：骨骼依赖于骨髓的充养，骨髓为肾精所化生。所谓肾在体合骨，又称肾主骨，是指肾精具有促进骨骼的生长发育和修复的功能。肾精旺盛，骨髓充盈，骨有所养，则骨骼健壮坚实，肢体强劲有力。若肾精不足，骨髓空虚，骨失所养，则会出现小儿骨骼发育障碍，成年人骨骼软弱无力和老年人骨质疏松易折，皆可根据中医学肾主骨的理论，施以补肾药物治疗。

“齿为骨之余”，是指牙齿为外露的骨骼。牙齿是人体最坚硬的器官，具有磨碎食物和辅助发音的功能。齿与骨同出一源，均赖肾精充养而生长发育，所以牙齿的生长和脱落与肾中精气的盛衰密切相关。肾中精气充盛则齿有所养，表现为牙齿坚固整齐。肾中精气

不足则齿失所养，表现为小儿牙齿生长迟缓或稀疏畸形，青壮年牙齿易于松动或早落等。由于手足阳明经亦进入齿中，因此牙齿的某些病变还与手足阳明经以及肠胃的功能失调有关。头发有赖于血液的营养，故称“发为血之余”。由于头发的生机又根源于肾，而肾精能化血，精血旺盛，则头发得养。所谓肾其华在发是指肾中精气的盛衰可显露于头发，即发为肾之外候。肾精充足，精血充盈，发有所养，在幼年期可见头发生长旺盛；青壮年期可见头发茂密乌黑而有光泽；老年人肾精渐亏，精血渐衰，则可见头发花白，或失去光泽。肾精不足，精血亏虚，则发失所养，小儿可出现头发生长迟缓，或稀疏枯黄；成人可见头发干枯无华，或头发早白，或头发秃顶脱落。对于上述病症，每多从肾论治。

肾开窍于耳及二阴：耳是听觉器官，为人体五官之一。人的听觉属脑的功能，脑为髓之海，髓又由肾精所化生，故耳的听觉与肾精密切相关，《灵枢·脉度》说：“肾气通于耳，肾和则耳能闻五音矣。”肾中精气旺盛，髓海充盈，耳有所养则听觉灵敏。肾中精气亏损，髓海失充，耳失所养则听力减退，或见耳鸣耳聋。除肾脏外，耳与其他脏腑也有联系，如少阳经循行于耳，对于耳窍的某些实性病证，则多责之于肝胆。心寄窍于耳，如心血不足，心神不安以及肝血不足，肝风内动等，均可见耳鸣等病症。

二阴，即前阴和后阴。前阴是指男女外生殖器和尿道口的总称，是人体排尿、男子排精和女子排出月经及分娩胎儿的器官，为人体九窍之一。后阴，即肛门，又称魄门、谷道，是排出粪便的器官，亦为人体九窍之一。粪便的排泄虽是大肠传导的功能，但与肾中阴阳关系密切。肾中精气充盛，则大肠得到肾阳温煦、推动和肾阴滋润、濡养，表现为大肠排泄粪便正常。肾中精气不足，若肾阳虚衰，温煦无权，肠寒气滞，传导不利，表现为排便艰涩，即为冷秘；若肾气不固，封藏无力，表现为久泄滑脱或五更泄泻；如若肾阴不足，肠失滋润，传导不利，表现为大便秘结，故《景岳全书·泄泻》说：“盖肾为胃关，开窍于二阴，所以二便之开闭，皆肾脏之所主。”

肾在液为唾：唾为五液之一，与涎同为口津，是唾液中质地较稠厚者。肾的经脉上挟舌根通舌下，肾精所化之唾液，故肾在液为唾。唾具有溶润食物，以利吞咽和保护滋润口腔的作用。唾液分泌正常则表明肾的阴精充足，表现为口腔润泽，吞咽流利。如若阴精不足，则会导致唾少咽干；肾虚水泛，则多唾清冷。反之多唾或久唾，亦会耗损肾精。所以气功家们常以舌抵上腭，待唾液溢满口腔后，缓缓咽之以养肾精，强体防病，并将此法称为“饮玉浆”。

肾在志为恐：恐，是情志活动上的恐惧、害怕之意。所谓肾在志为恐是指情志活动中的恐惧心理与肾精关系密切。如果肾精充足，当外界在刺激人体时，人体就能够产生相应的心理调节来应对。如果肾精不足，稍微受到些许刺激，则表现为恐惧不宁、手足无措的状态，甚至两腿无力而软瘫等。反之过度惊恐则会损伤肾脏，也可能导致遗精、滑胎或二便失禁等肾气不固的病症。

膀胱

膀胱，民间俗称“尿脬”，又称净腑、尿胞，位居小腹，为囊性器官，上有输尿管与肾相通，下与尿道相连，开口于前阴。其大小、形状随尿液的充盈程度的改变而改变。膀胱通过经脉的络属与肾构成表里关系，其五行属性为水，阴阳属性为阳。膀胱的主要功能是贮尿和排尿。尿液为身体中的津液所化，在肾的气化作用下生成的尿液即身体津液之浊液，下输至膀胱，尿液在膀胱内贮留到一定容量时即从尿道排出体外，故《素问·灵兰秘典论》说：“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。”肾的气化和固摄功能来控制膀胱的贮尿、排尿功能。贮藏尿液赖肾气的固摄；排泄尿液赖肾阳的气化以及推动。

肾气旺盛，固摄有权，则气化正常，推动有力，则膀胱开合有度，表现为贮尿、排尿正常。若肾气不固，则膀胱不约，可见遗尿、尿频，或尿失禁，或者小便余沥不禁等病症；若气化失司，推动无力，则膀胱不利，可见尿少、水肿，或尿闭等病症。临床上多从肾治疗膀胱的病变。

泌尿系统诸病

湿热下注型热淋短赤浮肿肾盂肾炎膀胱炎尿路感染

【药名】	三金片
【处方】	金樱根，菝葜，羊开口，金沙藤，积雪草。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至黑褐色；味酸、涩、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，利湿通淋，益肾，用于下焦湿热所致的热淋、小便短赤、淋沥涩痛、尿急频数；急慢性肾盂肾炎、膀胱炎、尿路感染见上述证候者。
【用法与用量】	口服。小片一次5片，大片一次3片，一日3~4次。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣小片每片重0.18g(相当于饮片2.1g)；(2)薄膜衣大片每片重0.29g(相当于饮片3.5g)；(3)糖衣小片片心重0.17g(相当于饮片2.1g)；(4)糖衣大片片心重0.28g(相当于饮片3.5g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	分清五淋丸
【处方】	木通80g 盐车前子40g 黄芩80g 茯苓40g 猪苓40g 黄柏40g 大黄120g 扁蓄40g 瞿麦40g 知母40g 泽泻40g 栀子40g 甘草20g 滑石80g。
【性状】	本品为白色至灰白色光亮的水丸，丸芯为黄棕色至深棕色；味甘、苦。
【功能与主治】	清热泻火，利尿通淋。用于湿热下注所致的淋证，症见小便黄赤、尿频尿急、尿道灼热涩痛。
【用法与用量】	口服。一次6g，一日2~3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	复方石韦片
【处方】	石韦569g 黄芪569g 苦参569g 扁蓄569g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	清热燥湿，利尿通淋。用于下焦湿热所致的热淋，症见小便不利、尿频、尿急、尿痛、下肢浮肿；急性肾小球肾炎、肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎见

<p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>上述证候者。</p> <p>口服。一次5片，一日3次，15天为一疗程，可连服两个疗程。</p> <p>无。</p> <p>(1)薄膜衣片每片重0.4g；(2)糖衣片(片心重0.4g)。</p> <p>密封。</p>
--	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>八正合剂</p> <p>瞿麦118g 车前子(炒)118g 扁蓄118g 大黄118g 滑石118g 川木通118g 梔子118g 甘草118g 灯心草59g。</p> <p>本品为棕褐色的液体；味苦、微甜。</p> <p>清热，利尿，通淋。用于湿热下注，小便短赤，淋漓涩痛，口燥咽干。</p> <p>口服一次15~20ml，一日3次，用时摇匀。</p> <p>无。</p> <p>(1)每瓶装100ml；(2)每瓶装120ml；(3)每瓶装200ml。</p> <p>密封，置阴凉处。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>三味蒺藜散</p> <p>本品系蒙古族验方：蒺藜250g 冬葵果150g 方海150g。</p> <p>本品为灰黄色的粉末；气微腥，味苦、微咸。</p> <p>清湿热，利尿，用于湿热下注，小便热痛。</p> <p>水煎服，一次3~4.5g，一日2~3次。</p> <p>无。</p> <p>每袋装(1)3g；(2)15g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>热淋清颗粒</p> <p>头花蓼1250g。</p> <p>本品为灰褐色至深褐色的颗粒；气香，味微涩(无蔗糖)；或味甜、微涩。</p> <p>清热泻火，利尿通淋。用于下焦湿热所致热淋，症见尿频、尿急、尿痛；尿路感染、肾盂肾炎见上述证候者。</p> <p>开水冲服。一次1~2袋，一日3次。</p> <p>无。</p> <p>(1)每袋装4g(无蔗糖)；(2)每袋装8g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p>	<p>尿感宁颗粒</p> <p>海金沙藤167g 连钱草167g 凤尾草167g 葎草167g 紫花地丁167g。</p> <p>本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦或味苦、微甜(无蔗糖)。</p> <p>清热解毒，利尿通淋。用于膀胱湿热所致淋症，症见尿频、尿急、尿道涩痛、尿色偏黄、小便淋漓不尽等；急慢性尿路感染见上述证候者。</p> <p>开水冲服。一次1袋，一日3~4次。</p>
---	---

【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装 15g；(2)每袋装 5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	清淋颗粒
【处方】	瞿麦 111g 木通 111g 滑石 111g 大黄 111g 扁蓄 111g 盐车前子 111g 栀子 111g 炙甘草 111g。
【性状】	本品为黄褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热泻火，利水通淋。用于膀胱湿热所致的淋症、癃闭，症见尿频涩痛、淋漓不畅、小腹胀满、口干咽燥。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋。一日 2 次，小儿酌减。
【注意】	孕妇忌服，体质虚弱者不宜服。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	癃清片
【处方】	泽泻，车前子，败酱草，金银花，牡丹皮，白花蛇舌草，赤芍，仙鹤草，黄连黄柏。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色，气芳香，味微苦。
【功能与主治】	清热解毒，凉血通淋。用于下焦湿热所致的热淋，症见尿频、尿急、尿痛、腰痛、小腹坠胀；亦用于慢性前列腺炎湿热蕴结兼瘀血证，症见小便频急，尿后余沥不尽，尿道灼热，会阴少腹腰骶部疼痛或不适等。
【用法与用量】	口服。一次 6 片，一日 2 次；重症一次 8 片，一日 3 次。
【注意】	体虚胃寒者不宜。
【规格】	每片重 0.6g。
【贮藏】	密封。

气滞血瘀湿热下注型肾结石尿结石肾盂肾炎

【药名】	石淋通片
【处方】	广金钱草 3125g。
【性状】	本品为棕褐色的片或糖衣片或薄膜衣片；包衣片除去包衣后显棕褐色，味苦、涩。
【功能与主治】	清热利尿，通淋排石。用于湿热下注所致的热淋、石淋，症见尿频、尿急、尿痛、或尿有砂石；尿路结石、肾盂肾炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每片含干浸膏 0.12g。
【贮藏】	密封。

【药名】	泌石通胶囊
【处方】	榭叶干浸膏，滑石粉。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕灰色粉末，手捻有滑腻感；味苦、涩。
【功能与主治】	清热利湿，行气化瘀。用于气滞血瘀型及湿热下注型肾结石或输尿管结石，适用于结石在 1.0cm 以下者。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次。
【注意】	出现胃脘不适、头眩、血压升高者应停药；孕妇慎用。
【规格】	每粒装 0.45g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	荡石胶囊
【处方】	苘麻子 125g 石韦 100g 海浮石 125g 蛤壳 125g 茯苓 240g 小蓟 125g 玄明粉 83g 牛膝 125g 甘草 50g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色的颗粒；气微香，味微咸。
【功能与主治】	清热利尿，通淋排石。用于肾结石，输尿管、膀胱等泌尿系统结石。
【用法与用量】	口服。一次 6 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金钱草片
【处方】	金钱草 2000g。
【性状】	本品为褐色的片或薄膜衣片，薄膜衣片除去包衣后显褐色；味微苦、涩。
【功能与主治】	清热利湿，利尿通淋。用于湿热下注所致小便频数短涩，淋漓疼痛，尿色赤黄，腰腹疼痛，甚至尿挟砂石。
【用法与用量】	口服。一次4~8片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)素片每片重0.3g；(2)薄膜衣片每片重0.32g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方金钱草颗粒
【处方】	广金钱草 218g 车前草 109g 光石韦 109g 玉米须 54.5g。
【性状】	规格(1)：本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气香，味甜。规格(2)：本品为棕色至棕褐色的颗粒；气香，味微甜。
【功能与主治】	清热利湿，通淋排石。用于湿热下注所致的热淋、石淋，症见尿频、尿急、尿痛、腰痛；泌尿系结石、尿路感染见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1~2袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装10g；(2)每袋装3g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	排石颗粒
【处方】	连钱草，木通，石韦，滑石，苘麻子，盐车前子，徐长卿，忍冬藤，瞿麦，甘草。
【性状】	本品为浅黄色至棕褐色的颗粒或混悬性颗粒(无蔗糖)；气微，味甜、略苦或味微甜、苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	清热利水，通淋排石。用于下焦湿热所致的石淋，症见腰腹疼痛、排尿不畅或伴有血尿；泌尿系结石见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装20g；(2)每袋装5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

水湿内停型小便胀满水肿腹胀渴不思饮

【药名】	五苓胶囊
【处方】	泽泻 937.5g 茯苓 562.5g 猪苓 562.5g 肉桂 375g 麸炒白术 562.5g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰色至灰褐色的粉末；具吸湿性；气香，味微辛。
【功能与主治】	温阳化气，利湿行水。用于膀胱化气不利，水湿内聚引起的小便不利，水肿腹胀，呕逆泄泻，渴不思饮。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.45g。
【贮藏】	密封。

【药名】	五苓散
【处方】	茯苓 180g 泽泻 300g 猪苓 180g 肉桂 120g 炒白术 180g。
【性状】	本品为淡黄色的粉末；气微香，味微辛。
【功能与主治】	温阳化气，利湿行水。用于阳不化气、水湿内停所致的水肿，症见小便不利、水肿腹胀、呕逆泄泻、渴不思饮。
【用法与用量】	口服。一次6~9g，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装6g；(2)每袋装9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	济生肾气丸
【处方】	熟地黄 160g 山茱萸(制) 80g 牡丹皮 60g 山药 80g 茯苓 120g 泽泻 60g 肉桂 20g 附子(制) 20g 牛膝 40g 车前子 40g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；味酸而微甘、苦。
【功能与主治】	温肾化气，利水消肿。用于肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿、腰膝痠重、小便不利、痰饮咳喘。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g。大蜜丸一次1丸，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

急慢性肾炎四肢浮肿头晕耳鸣蛋白尿血尿

【药名】	肾炎四味片
【处方】	细梗胡枝子 2083g 黄芩 375g 石韦 500g 黄芪 500g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；气微，味微苦。
【功能与主治】	清热利尿，补气健脾。用于湿热内蕴兼气虚所致的水肿，症见浮肿、腰痛、乏力、小便不利；慢性肾炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 8 片〔规格(1)、(3)〕或一次 4 片〔规格(2)〕，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每片重 0.36g；(2) 每片重 0.70g；(3) 糖衣片片心重 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	肾炎消肿片
【处方】	桂枝 129g 陈皮 129g 苍术 129g 姜皮 129g 关黄柏 129g 冬瓜皮 129g 泽泻 129g 香加皮 129g 茯苓 128g 大腹皮 129g 椒目 86g 益母草 129g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显褐色或深褐色；味苦。
【功能与主治】	健脾渗湿，通阳利水。用于脾虚气滞、水湿内停所致的水肿，症见肢体浮肿、晨起面肿甚、按之凹陷、身体重倦、尿少、脘腹胀满、舌苔白腻、脉沉缓；急、慢性肾炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4~5 片〔规格(1)、(3)〕或一次 3 片〔规格(2)〕，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁服。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.34g；(2) 薄膜衣片每片重 0.56g；(3) 糖衣片(片心重 0.32g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	肾炎舒片
【处方】	苍术，茯苓，白茅根，防己，人参(去芦)，黄精，菟丝子，枸杞子，金银花，蒲公英。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味微甜后苦。
【功能与主治】	益肾健脾，利水消肿。用于脾肾阳虚、水湿内停所致的水肿，症见浮肿、腰痛、乏力、怕冷、夜尿多；慢性肾炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 6 片，一日 3 次。小儿酌减。

【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重 0.27g；(2)糖衣片(片心重 0.25g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	肾炎解热片
【处方】	白茅根，连翘，荆芥，炒苦杏仁，陈皮，大腹皮，盐泽泻，茯苓，桂枝，车前子(炒)，赤小豆，石膏，蒲公英。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显深棕色；味甘、微苦。
【功能与主治】	疏风解热，宣肺利水。用于风热犯肺所致的水肿，症见发热恶寒、头面浮肿、咽喉干痛、肢体痠痛、小便短赤、舌苔薄黄、脉浮数；急性肾炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4~5 片〔规格(1)、(3)〕，一次 3 片〔规格(2)〕，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重 0.34g；(2)薄膜衣片每片重 0.56g；(3)糖衣片(片心重 0.32g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	肾炎康复片
【处方】	西洋参，人参，地黄，盐杜仲，山药，白花蛇舌草，黑豆，土茯苓，益母草，丹参，泽泻，白茅根，桔梗。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色；味甘、淡。
【功能与主治】	益气养阴，健脾补肾，清解余毒。用于气阴两虚，脾肾不足，水湿内停所致的水肿，症见神疲乏力，腰膝酸软，面目、四肢浮肿，头晕耳鸣；慢性肾炎、蛋白尿、血尿见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 8 片〔规格(1)〕或一次 5 片〔规格(2)〕，一日 3 次；小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	孕妇禁服；急性肾炎水肿不宜。
【规格】	(1)糖衣片(片心重 0.3g)；(2)薄膜衣片每片重 0.48g。
【贮藏】	密封。

【药名】	肾复康胶囊
【处方】	土茯苓 366g 槐花 93g 白茅根 366g 益母草 93g 广藿香 28g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末或粉末和颗粒；气香，味微酸、微苦。
【功能与主治】	清热利尿，益肾化浊。用于热淋涩痛，急性肾炎水肿，慢性肾炎急性发作。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	肾康宁片
-------------	-------------

【处方】	黄芪 360g 茯苓 300g 益母草 450g 锁阳 300g 丹参 300g 泽泻 180g 淡附片 180g 山药 50g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；味微苦。
【功能与主治】	补脾温肾，渗湿活血。用于脾肾阳虚、血瘀湿阻所致的水肿，症见浮肿、乏力、腰膝冷痛；慢性肾炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.31g；(2) 薄膜衣片每片重 0.33g；(3) 糖衣片(片心重 0.3g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	肾康宁胶囊
【处方】	黄芪 360g 丹参 300g 茯苓 300g 泽泻 180g 益母草 450g 淡附片 180g 锁阳 300g 山药 50g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的颗粒和粉末；味微苦。
【功能与主治】	补脾温肾，渗湿活血。用于脾肾阳虚、血瘀湿阻所致的水肿，症见浮肿、乏力、腰膝冷痛；慢性肾炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5 粒〔规格(1)〕或一次 4 粒〔规格(2)〕，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每粒装 0.35g；(2) 每粒装 0.45g。
【贮藏】	密封。

【药名】	肾康宁颗粒
【处方】	黄芪 360g 丹参 300g 茯苓 300g 泽泻 180g 益母草 450g 淡附片 180g 锁阳 300g 山药 50g。
【性状】	本品为淡棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	补脾温肾，渗湿活血。用于脾肾阳虚、血瘀湿阻所致的水肿，症见浮肿、乏力、腰膝冷痛；慢性肾炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 5g。
【贮藏】	密封。

肾不化气清浊不分型白浊小便频数

【药名】	萆薢分清丸
-------------	--------------

【处方】	粉萆薢 320g 石菖蒲 60g 甘草 160g 乌药 80g 盐益智仁 40g。
【性状】	本品为白色光亮的水丸，除去包衣后呈灰棕色；味甜、微苦。
【功能与主治】	分清化浊，温肾利湿。用于肾不化气、清浊不分所致的白浊、小便频数。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2 次。
【注意】	忌食油腻、茶、醋及辛辣刺激性物。
【规格】	每 20 丸重 1g。
【贮藏】	密闭，防潮。

肾虚型小便频数夜间遗尿

【药名】	缩泉丸
【处方】	山药 300g 益智仁（盐炒） 300g 乌药 300g。
【性状】	本品为淡棕色的水丸；味微咸。
【功能与主治】	补肾缩尿。用于肾虚所致的小便频数、夜间遗尿。
【用法与用量】	口服。一次 3~6g，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每 20 粒重 1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	缩泉胶囊
【处方】	山药 343g 益智仁 343g 乌药 343g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒及粉末；气香，味微苦。
【功能与主治】	补肾缩尿。用于肾虚所致的小便频数、夜间遗尿。
【用法与用量】	口服。成人一次 6 粒，五岁以上儿童一次 3 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

脾胃气虚浊瘀内阻升降失调型慢性肾功能不全

【药名】	肾衰宁胶囊
【处方】	太子参 250g 黄连 100g 法半夏 250g 陈皮 100g 茯苓 200g 大黄 400g 丹参 700g 牛膝 200g 红花 100g 甘草 100g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末或细小颗粒；气微香，味苦。
【功能与主治】	益气健脾，活血化瘀，通腑泄浊。用于脾胃气虚、浊瘀内阻、升降失调所

【用法与用量】	致的面色萎黄、腰痛倦怠、恶心呕吐、食欲不振、小便不利、大便黏滞；慢性肾功能不全见上述证候者。
【注意】	口服。一次4~6粒，一日3~4次；小儿酌减。
【规格】	孕妇禁用。
【贮藏】	每粒装0.35g。
	密封，防潮。

中医对于糖尿病的研究和诊断

消渴是以多饮、多食、多尿、乏力、消瘦，或尿有甜味为主要临床表现的一种慢性疾病。在世界医学史中，中医学对本病的认识最早，且论述甚详。消渴之名，首见于《素问·奇病论》，根据病机以及症状的不同，《内经》还有消瘴、肺消、膈消、消中等等名称的记载，认为五脏虚弱，过食肥甘，情志失调是引起消渴的原因，而内热是其主要病机。汉·张仲景《金匱要略》有专篇讨论，并最早提出治疗该病的方药，主方有白虎加人参汤、肾气丸等。隋·巢元方《诸病源候论·消渴候》论述其并发症说：“其病变多发痈疽。”《外台秘要·消中消渴肾消》引《古今录验》说：“渴而饮水多，小便数……甜者，皆是消渴病也。”又说：“每发即小便至甜”，“焦枯消瘦”，对消渴的临床特点作了明确的论述。刘河间也对其并发症作了进一步论述，《宣明论方·消渴总论》说：消渴一证“可变为雀目或内障”。元·张子和《儒门事亲·三消论》说：“夫消渴者，多变聋盲、疮癩、痲痺之类”，“或蒸热虚汗，肺痿劳嗽”。明·戴思恭《证治要诀》明确提出上、中、下之分类。《证治准绳·消瘴》在前人论述的基础上，对三消的临床分类作了规范，“渴而多饮为上消（经谓膈消），消谷善饥为中消（经谓消中），渴而便数有膏为下消（经谓肾消）”。明清及其之后，对消渴的治疗原则及方药，有了更为广泛深入的研究。根据消渴病的临床特征，主要是指西医学的糖尿病。它如尿崩症等，如具有多尿、烦渴的临床特点，与消渴病有某些相似之处者，亦可参考辨证论治。

病因病机

消渴病的病因比较复杂，禀赋不足、饮食失节、情志失调、劳欲过度等原因均可导致消渴。消渴病变的脏腑主要在肺、胃、肾，其病机主要在于阴津亏损，燥热偏胜，而以阴虚为本，燥热为标，两者互为因果。

禀赋不足

早在春秋战国时代，即已认识到先天禀赋不足，是引起消渴病的重要内在因素。《灵枢·五变》说：“五脏皆柔弱者，善病消瘴。”其中尤以阴虚体质最易罹患。

饮食失节

长期过食肥甘，醇酒厚味，辛辣香燥，损伤脾胃，致脾胃运化失职，积热内蕴，化燥

伤津，消谷耗液，发为消渴。早在《素问·奇病论》即说：“此肥美之所发也，此人必数食甘美而多肥也，肥者令人内热，甘者令人中满，故其气上满，转为消渴。”

情志失调

长期过度的精神刺激，如郁怒伤肝，肝气郁结，或劳心竭虑，营谋强思等，以致郁久化火，火热内燔，消灼肺胃阴津而发为消渴。正如《临证指南医案·三消》说：“心境愁郁，内火自燃，乃消证大病。”

劳欲过度

房事不节，劳欲过度，肾精亏损，虚火内生，则火因水竭益烈，水因火烈而益干，终致肾虚肺燥胃热俱现，发为消渴。如《外台秘要·消渴消中》说：“房室过度，致令肾气虚耗故也，下焦生热，热则肾燥，肾燥则渴。”

病机

消渴的病机主要在于阴津亏损，燥热偏胜，而以阴虚为本，燥热为标。两者互为因果，阴愈虚则燥热愈盛，燥热愈盛则阴愈虚。病变的脏腑主要在肺、胃、肾，其中尤以肾为关键。三脏之中，虽有所偏重，但往往又互相影响。肺主气，为水之上源，敷布津液。肺受燥热所伤，则津液不能敷布而直趋下行，随小便排出体外，故小便频数量多；肺不布津则口渴多饮。正如《医学纲目·消瘵门》所说：“盖肺藏气，肺无病则气能管摄津液之精微，而津液之精微者收养筋骨血脉，余者为溲。肺病则津液无气管摄，而精微者亦随溲下，故饮一溲二。”

胃主腐熟水谷，脾主运化，为胃行其津液。脾胃受燥热所伤，胃火炽盛，脾阴不足，则口渴多饮，多食善饥；脾气虚不能转输水谷精微，则水谷精微下流注入小便，故小便味甘；水谷精微不能濡养肌肉，故形体日渐消瘦。

肾为先天之本，主藏精而寓元阴元阳。肾阴亏虚则虚火内生，上燔心肺则烦渴多饮，中灼脾胃则胃热消谷。肾失濡养，开阖固摄失权，则水谷精微直趋下泄，随小便而排出体外，故尿多味甜。

消渴病虽有在肺、胃、肾的不同，但常常互相影响。如肺燥津伤，津液失于敷布，则脾胃不得濡养，肾精不得滋助；脾胃燥热偏盛，上可灼伤肺津，下可耗伤肾阴；肾阴不足则阴虚火旺，亦可上灼肺胃，终致肺燥胃热肾虚，故“三多”之症常可相互并见。故《临证指南医案·三消》邹滋九按语说：“三消一证，虽有上、中、下之分，其实不越阴亏阳亢，津涸热淫而已”。

消渴病日久，则易发生以下两种病变：一是阴损及阳，阴阳俱虚，消渴虽以阴虚为本，燥热为标，但由于阴阳互根，阳生阴长，若病程日久，阴伤气耗，阴损及阳，则致阴阳俱

虚，其中以肾阳虚及脾阳虚较为多见。严重者可因阴液极度耗损，虚阳浮越，而见烦躁、头痛、呕恶、呼吸深快等症，甚则出现昏迷、肢厥、脉细欲绝等阴竭阳亡危象。二是病久入络，血脉瘀滞。消渴病是一种病及多个脏腑的疾病，影响气血的正常运行，且阴虚内热，耗伤津液，亦使血行不畅而致血脉瘀滞。血瘀是消渴病的重要病机之一，且消渴病多种并发症的发生也与血瘀密切相关。

消渴病常病及多个脏腑，病变影响广泛，未及时医治以及病情严重的患者，常可并发多种病证。如肺失滋养，日久可并发肺癆；肾阴亏损，肝失濡养，肝肾精血不能上承于耳目，则可并发白内障、雀目、耳聋；燥热内结，营阴被灼，脉络瘀阻，蕴毒成脓，则发为疮疖痈疽；阴虚燥热，炼液成痰，以及血脉瘀滞，痰瘀阻络，脑脉闭阻或血溢脉外，发为中风偏瘫；阴损及阳，脾肾衰败，水湿潴留，泛滥肌肤，则发为水肿。

诊断依据

口渴多饮、多食易饥、尿频量多、形体消瘦或尿有甜味等具有特征性的临床症状，是诊断消渴病的主要依据。

有的患者“三多”症状不著，但若于中年之后发病，且嗜食膏粱厚味、醇酒炙博，以及病久并发眩晕、肺癆、胸痹心痛、中风、雀目、疮痍等病证者，应考虑消渴的可能性。

由于本病的发生与禀赋不足有较为密切的关系，故消渴病的家族史可供诊断参考。

病证鉴别

消渴与口渴症

口渴症是指口渴饮水的一个临床症状，可出现于多种疾病过程中，尤以外感热病为多见。但这类口渴各随其所患病证的不同而出现相应的临床症状，不伴多食、多尿、尿甜、瘦削等消渴的特点。

消渴与瘰病

瘰病中气郁化火、阴虚火旺的类型，以情绪激动，多食易饥，形体日渐消瘦，心悸，眼突，颈部一侧或两侧肿大为特征。其中的多食易饥、消瘦，类似消渴病的中消，但眼球突出，颈前瘰肿有形则与消渴有别，且无消渴病的多饮、多尿、尿甜等症。

糖尿病诸病

气阴两虚口渴喜饮型糖尿病

【药名】	十味消渴胶囊(参芪消渴胶囊)
【处方】	天花粉，乌梅肉，枇杷叶，麦冬，五味子，瓜蒌，人参，黄芪，粉葛，檀香。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至深褐色的颗粒和粉末，气香，味酸。
【功能与主治】	益气养阴，生津止渴。用于消渴病气阴两虚证，症见口渴喜饮、自汗盗汗、倦怠乏力、五心烦热；2型糖尿病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次6粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.44g。
【贮藏】	密封。

【药名】	五黄养阴颗粒
【处方】	黄连 277g 红芪 833g 地黄 833g 姜黄 833g 黄芩 555g。
【性状】	本品为棕褐色的颗粒；味微甜，微苦。
【功能与主治】	燥湿化痰、益气养阴。用于消渴病属痰湿内滞、气阴两虚证，症见口渴喜饮，多食善饥，尿频尿多，头身困重，呕恶痰涎，倦怠乏力，气短懒言，自汗盗汗，心悸失眠，形体肥胖，咽燥口干，心烦畏热，溲赤便秘。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	芪蛭降糖胶囊
【处方】	黄芪，地黄，黄精，水蛭。
【性状】	本品为胶囊剂，内容物为棕褐色粉末和颗粒；味腥、微涩。
【功能与主治】	益气养阴，活血化瘀。用于气阴两虚兼血瘀所致的消渴病，症见口渴多饮、多尿易饥、倦怠乏力、自汗盗汗、面色晦暗、肢体麻木；11型糖尿病见上

<p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>述证候者。</p> <p>口服，一次5粒，一日3次。3个月为一疗程。</p> <p>孕妇禁服；有凝血机制障碍、出血倾向者慎服。</p> <p>每粒装0.5g。</p> <p>密封。</p>
--	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>降糖甲片</p> <p>黄芪428.4g 酒黄精428.4g 地黄428.4g 太子参428.4g 天花粉428.4g。</p> <p>本品为肠溶薄膜衣片，除去包衣后显棕色；气微香，味甘苦。</p> <p>补中益气，养阴生津。用于气阴两虚型消渴症(非胰岛素依赖型糖尿病)。</p> <p>口服。一次6片，一日3次。</p> <p>无。</p> <p>每片重0.31g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>参精止渴丸</p> <p>红参，黄芪，黄精，茯苓，白术，葛根，五味子，黄连，大黄，甘草。</p> <p>本品为黑色有光泽的水丸，除去包衣后显棕黄色；气香，味微苦。</p> <p>益气养阴，生津止渴。用于气阴两亏、内热津伤所致的消渴，症见少气乏力、口干多饮、易饥、形体消瘦；2型糖尿病见上述证候者。</p> <p>口服。一次10g，一日2~3次。</p> <p>无。</p> <p>每100丸重7g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>津力达颗粒</p> <p>人参184.5g 黄精244.5g 麸炒苍术122.2g 苦参100g 麦冬244.5g 地黄184.5g 制何首乌149g 山茱萸244.5g 茯苓149g 佩兰100g 黄连100g 知母122.2g 炙淫羊藿100g 丹参160g 粉葛244.5g 荔枝核244.5g 地骨皮149g。</p> <p>本品为浅黄色至棕黄色的颗粒；气微香，味微苦。</p> <p>益气养阴，健脾运津。用于2型糖尿病气阴两虚证，症见：口渴多饮，消谷易饥，尿多，形体渐瘦，倦怠乏力，自汗盗汗，五心烦热，便秘等。</p> <p>开水冲服。一次1袋，一日3次。8周为一疗程，或遵医嘱。对已经使用西药患者，可合并使用本品，并根据血糖情况，酌情调整西药用量。</p> <p>忌食肥甘厚味、油腻食物。孕妇慎用。</p> <p>每袋装9g。</p> <p>密封，防潮，置阴凉干燥处。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p>	<p>消渴丸</p> <p>葛根，黄芪，玉米须，山药，地黄，天花粉，南五味子，格列本脲。</p> <p>本品为黑色的包衣浓缩水丸；味甘、酸、微涩。</p>
--	--

【功能与主治】	滋肾养阴，益气生津。用于气阴两虚所致的消渴病，症见多饮、多尿、多食、消瘦、体倦乏力、眠差、腰痛型糖尿病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5~10丸，一日2~3次。饭前用温开水送服。或遵医嘱。
【注意】	本品含格列本脲，严格按处方药使用，并注意监测血糖。
【规格】	每10丸重2.5g(含格列本脲2.5mg)。
【贮藏】	密封。

【药名】	消渴平片
【处方】	人参15g 黄连15g 天花粉375g 天冬38g 黄芪375g 丹参112g 枸杞子90g 沙苑子112g 葛根112g 知母75g 五倍子38g 五味子38g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；气香，味苦。
【功能与主治】	益气养阴，清热泻火。用于阴虚燥热，气阴两虚所致的消渴病，症见口渴喜饮、多食、多尿、消瘦、气短、乏力、手足心热；2型糖尿病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次6~8片；一日3次，或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)每片重0.34g；(2)每片重0.55g。
【贮藏】	密封。

【药名】	消渴灵片
【处方】	地黄208g 麦冬104g 黄芪104g 茯苓18g 五味子16g 牡丹皮16g 黄连10g 红参10g 天花粉104g 石膏52g 枸杞子104g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的片，或为薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味苦、甘。
【功能与主治】	益气养阴，清热泻火，生津止渴。用于气阴两虚所致的消渴病，症见多饮、多食、多尿、消瘦、气短乏力；2型轻型、中型糖尿病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次8片，一日3次。
【注意】	孕妇忌服，忌食辛辣。
【规格】	(1)素片每片重0.36g；(2)薄膜衣片每片重0.37g。
【贮藏】	密封。

【药名】	渴乐宁胶囊
【处方】	黄芪，黄精(酒炙)，地黄，太子参，天花粉。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的粉末；气微香，味甘、苦。
【功能与主治】	益气养阴，生津止渴。用于气阴两虚所致的消渴病，症见口渴多饮、五心烦热、乏力多汗、心慌气短；2型糖尿病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次，3个月为一个疗程。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.45g。
【贮藏】	密封。

【药名】	糖尿乐胶囊
【处方】	天花粉 208.6g 黄芪 52g 地黄 52g 知母 31.3g 茯苓 21g 五味子 15.6g 山药 208.6g 红参 31.3g 枸杞子 31.3g 天冬 15.6g 山茱萸 21g 葛根 21g 炒鸡内金 21g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色粉末，味辛，微苦。
【功能与主治】	益气养阴，生津止渴。用于气阴两虚所致的消渴病，症见多食、多饮、多尿、消瘦、四肢无力。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 粒，一日 3 次。
【注意】	严忌含糖食物，烟酒。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	糖脉康片
【处方】	黄芪 240g 地黄 260g 赤芍 260g 丹参 240g 牛膝 150g 麦冬 150g 葛根 150g 桑叶 150g 黄连 50g 黄精 150g 淫羊藿 200g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；气微香，味微甜、微涩、微苦。
【功能与主治】	养阴清热，活血化瘀，益气固肾。用于糖尿病气阴两虚兼血瘀所致的倦怠乏力、气短懒言、自汗、盗汗、五心烦热、口渴喜饮、胸中闷痛、肢体麻木或刺痛、便秘、舌质红少津、舌体胖大、苔薄或花剥、或舌黯有瘀斑、脉弦细或细数，或沉涩等症及 2 型糖尿病并发症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎服或遵医嘱。
【规格】	每片重 0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	糖脉康胶囊
【处方】	黄芪 200g 地黄 216.7g 赤芍 216.7g 丹参 200g 牛膝 125g 麦冬 125g 葛根 125g 桑叶 125g 黄连 41.7g 黄精 125g 淫羊藿 166.7g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	养阴清热，活血化瘀，益气固肾。用于糖尿病气阴两虚兼血瘀所致的倦怠乏力、气短懒言、自汗、盗汗、五心烦热、口渴喜饮、胸中闷痛、肢体麻木或刺痛、便秘、舌质红少津、舌体胖大、苔薄或花剥、或舌黯有瘀斑、脉弦细或细数，或沉涩等症及 2 型糖尿病并发症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 6 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎服或遵医嘱。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	糖脉康颗粒
【处方】	本品系由黄芪、地黄、赤芍、丹参、葛根、桑叶、淫羊藿等味药加工制成

【性状】	的颗粒。
【功能与主治】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味微苦。 养阴清热，活血化瘀，益气固肾。用于糖尿病气阴两虚兼血瘀所致的倦怠乏力、气短懒言、自汗、盗汗、五心烦热、口渴喜饮、胸中闷痛、肢体麻木或刺痛、便秘、舌质红少津、舌体胖大、苔薄或花剥、或舌黯有瘀斑、脉弦细或细数，或沉涩等症及2型糖尿病并发症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	孕妇慎服或遵医嘱。
【规格】	每袋装5g。
【贮藏】	密封。

气虚内热口渴喜饮易饥型糖尿病

【药名】	金芪降糖片
【处方】	黄连，黄芪，金银花。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	清热益气。用于消渴病气虚内热证，症见口渴喜饮，易饥多食，气短乏力。轻、中型2型糖尿病见上述证候者。
【用法与用量】	饭前半小时服用。一次2~3片，一日3次，疗程3个月或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每片重0.56g。
【贮藏】	密封。

气阴不足口渴多饮善饥型糖尿病

【药名】	玉泉胶囊
【处方】	天花粉 200g 葛根 200g 麦冬 133g 人参 133g 茯苓 133g 乌梅 133g 黄芪 133g 甘草 133g 地黄 133g 五味子 133g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容为棕黄色至棕褐色的颗粒及粉末；味酸甜、苦。
【功能与主治】	养阴益气，生津止渴，清热除烦。主治气阴不足，口渴多饮，消食善饥；糖尿病属上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5 粒，一日 4 次。
【注意】	孕妇忌服。定期复查血糖。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	玉泉颗粒
【处方】	天花粉 200g 葛根 200g 麦冬 133g 人参 133g 茯苓 133g 乌梅 133g 黄芪 133g 甘草 133g 地黄 133g 五味子 133g。
【性状】	本品为棕黄色或棕褐色的颗粒；味酸甜、微苦。
【功能与主治】	养阴益气，生津止渴，清热除烦。主治气阴不足，口渴多饮，消食善饥；糖尿病属上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 4 次。
【注意】	孕妇忌服。定期复查血糖。
【规格】	每袋装 5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	养阴降糖片
【处方】	黄芪 250g 党参 110g 葛根 145g 枸杞子 110g 玄参 145g 玉竹 110g 地黄 180g 知母 110g 牡丹皮 110g 川芎 145g 虎杖 180g 五味子 70g。
【性状】	本品为薄膜衣片或糖衣片，除去包衣后显棕黄色至棕黑色；味苦。
【功能与主治】	养阴益气，清热活血。用于气阴不足、内热消渴，症见烦热口渴、多食多饮、倦怠乏力；2 型糖尿病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 8 片〔规格(1)、(2)〕或一次 4 片〔规格(3)〕，一日 3 次。

【注意】	无。
【规格】	(1)糖衣片(片心重 0.33g); (2)薄膜衣片每片重 0.36g; (3)薄膜衣片每片重 0.72g。
【贮藏】	密封。

心神不宁诸病

气血瘀阻型失眠健忘胸痛心悸

【药名】	七叶神安片
【处方】	三七叶总皂苷 50g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅黄色至棕黄色；味苦、甜。
【功能与主治】	益气安神，活血止痛。用于心气不足、心血瘀阻所致的心悸、失眠、胸痛、胸闷。
【用法与用量】	口服。一次 50~100mg，一日 3 次，饭后服或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每片含三七叶总皂苷(1)50mg; (2)100mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	七味广枣丸
【处方】	本品系蒙古族验方：广枣 450g 肉豆蔻 75g 丁香 75g 木香 75g 枫香脂 75g 沉香 75g 牛心粉 75g。
【性状】	本品为红色的包衣大蜜丸，除去包衣后显棕褐色；气香，味甘、苦、辛、微酸。
【功能与主治】	养心益气，安神。用于胸闷疼痛，心悸气短，心神不安，失眠健忘。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	十五味沉香丸
【处方】	本品系藏族验方：沉香 100g 藏木香 150g 檀香 50g 紫檀香 150g 红花 100g 肉豆蔻 25g 高山辣根菜 150g 悬钩子茎(去皮、心)200g 宽筋藤(去皮)100g 干姜 50g 石灰华 100g 广枣 50g 诃子(去核)150g 毛诃子(去核)80g 余甘子 100g。
【性状】	本品为黄褐色、棕红色至棕褐色的水丸；气香，味苦。

【功能与主治】	调和气血，止咳，安神。用于气血郁滞，胸痛，干咳气短，失眠。
【用法与用量】	研碎后开水送服。一次3~4丸，一日2次。
【注意】	肾病患者慎服。
【规格】	每丸重0.5g。
【贮藏】	密封。

热病攻心虚火内扰型神昏心悸失眠高热惊厥

【药名】	八味沉香散
【处方】	本品系藏族验方：沉香200g 肉豆蔻100g 广枣100g 石灰华100g 乳香100g 木香100g 诃子(煨)100g 木棉花100g。
【性状】	本品为黄褐色的粉末；气芳香，味咸、涩、微苦。
【功能与主治】	清心热，养心，安神，开窍。用于热病攻心，神昏谵语；冠心病，心绞痛。
【用法与用量】	口服。一次0.9~1.5g，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	八味清心沉香散
【处方】	本品系蒙古族验方：沉香180g 广枣180g 檀香90g 紫檀香90g 红花90g 肉豆蔻60g 天竺黄60g 北沙参60g。
【性状】	本品为浅棕红色的粉末；气香，味微酸、苦。
【功能与主治】	清心肺，理气，镇静安神。用于心肺火盛，胸闷不舒，胸胁闷痛，心悸气短。
【用法与用量】	口服。一次3g，一日1~2次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装15g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	万氏牛黄清心丸
【处方】	牛黄10g 朱砂60g 黄连200g 栀子120g 郁金80g 黄芩120g。
【性状】	本品为红棕色至棕褐色的大蜜丸；气特异，味甜、微涩、苦。
【功能与主治】	清热解毒，镇惊安神。用于热入心包、热盛动风证，症见高热烦躁、神昏谵语及小儿高热惊厥。
【用法与用量】	口服。一次2丸〔规格(1)〕或一次1丸〔规格(2)〕，一日2~3次。
【注意】	孕妇慎用。

【规格】	(1)每丸重 1.5g；(2)每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	安神补心丸
【处方】	丹参 300g 五味子(蒸)50g 石菖蒲 100g 安神膏 560g。
【性状】	本品为棕褐色的浓缩水丸；或为包糖衣的浓缩水丸，除去糖衣后显棕褐色；味涩、微酸。
【功能与主治】	养心安神。用于心血不足、虚火内扰所致的心悸失眠、头晕耳鸣。
【用法与用量】	口服。一次 15 丸，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每 15 丸重 2g。
【贮藏】	密封。

【药名】	安神补心颗粒
【处方】	丹参 508g 五味子(蒸)254g 石菖蒲 170g 安神膏 949g。
【性状】	本品为棕褐色的颗粒；气微香，味微苦、酸。
【功能与主治】	养心安神。用于心血不足、虚火内扰所致的心悸失眠、头晕耳鸣。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每袋装 1.5g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

肝肾阴血不足型头昏耳鸣心悸健忘失眠

【药名】	宁神补心片
【处方】	丹参 111.5g 地黄 75g 酒女贞子 150g 熟地黄 112.5g 墨旱莲 112.5g 煅珍珠母 750g 石菖蒲 37.5g 首乌藤 187.5g 合欢皮 112.5g 五味子 56.25g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味微酸而涩。
【功能与主治】	养血安神，滋补肝肾。用于肝肾阴血不足所致的头昏、耳鸣、心悸、健忘、失眠。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)糖衣片，片心重 0.25g。(2)薄膜衣片，每片重 0.26g。
【贮藏】	密封。

阴血不足型心悸健忘失眠多梦烦热盗汗

【药名】	安神胶囊
【处方】	炒酸枣仁 40g 知母 112g 制何首乌 32g 丹参 130g 川芎 47g 麦冬 92g 五味子 97g 茯苓 97g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒；气清香，味淡。
【功能与主治】	补血滋阴，养心安神。用于阴血不足，失眠多梦，心悸不宁，五心烦热，盗汗耳鸣。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.25g。
【贮藏】	密封。

心脾两虚型心悸健忘失眠体虚食少气短自汗

【药名】	刺五加脑灵合剂(刺五加脑灵液)
【处方】	刺五加浸膏 25g 五味子流浸膏 25ml。
【性状】	本品为棕黄色至棕红色的液体；味甘、酸。
【功能与主治】	脾补肾，宁心安神。用于心脾两虚、脾肾不足所致的心神不宁、失眠多梦、健忘、倦怠乏力、食欲不振。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 10ml。(2) 每瓶装 100ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	北芪五加片
【处方】	黄芪 1112g 刺五加浸膏 50g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色；味微苦。
【功能与主治】	益气健脾，宁心安神。用于心脾两虚、心神不宁所致的失眠多梦、体虚乏力、食欲不振。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.3g。(2) 薄膜衣片每片重 0.5g。(3) 糖衣片片心重 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	参芪五味子片
【处方】	南五味子 180g 党参 60g 黄芪 120g 炒酸枣仁 30g。
【性状】	本品为深棕色的片或糖衣片，糖衣片除去糖衣后显深棕色；味微苦。
【功能与主治】	健脾益气，宁心安神。用于气血不足、心脾两虚所致的失眠、多梦、健忘、

【用法与用量】	乏力、心悸、气短、自汗。 口服。一次3~5片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	素片每片重0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	参芪五味子胶囊
【处方】	南五味子 180g 党参 60g 黄芪 120g 炒酸枣仁 30g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的颗粒或粉末；气微，味微苦。
【功能与主治】	健脾益气，宁心安神。用于气血不足、心脾两虚所致的失眠、多梦、健忘、乏力、心悸、气短、自汗。
【用法与用量】	口服。一次3~5粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装(1)0.2g。(2)0.21g。(3)0.25g。
【贮藏】	密封。

心气虚寒型心悸健忘失眠多梦

【药名】	柏子养心丸
【处方】	柏子仁 25g 党参 25g 炙黄芪 100g 川芎 100g 当归 100g 茯苓 200g 制远志 25g 酸枣仁 25g 肉桂 25g 醋五味子 25g 半夏曲 100g 炙甘草 10g 朱砂 30g。
【性状】	本品为棕色的水蜜丸、棕色至棕褐色的小蜜丸或大蜜丸；味先甜而后苦、微麻。
【功能与主治】	补气，养血，安神。用于心气虚寒，心悸易惊，失眠多梦，健忘。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	柏子养心片
【处方】	柏子仁 32g 党参 32g 炙黄芪 128g 川芎 128g 当归 128g 茯苓 256g 制远志 32g 酸枣仁 32g 肉桂 32g 醋五味子 32g 半夏曲 128g 炙甘草 13g 朱砂 38g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显红棕色；味苦、微麻。
【功能与主治】	补气、养血，安神。用于心气虚寒，心悸易惊，失眠多梦，健忘。
【用法与用量】	口服。一次3~4片，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	片心重0.3g。
【贮藏】	密封。

心神失养型精神忧郁易惊不寐烦躁

【药名】	脑乐静
【处方】	甘草浸膏 35.4g 大枣 125g 小麦 416g。
【性状】	本品为淡棕色的黏稠液体；气微，味甜。
【功能与主治】	养心安神。用于心神失养所致的精神忧郁、易惊不寐、烦躁。
【用法与用量】	口服。一次 30ml，一日 3 次；小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

心阴不足型心悸健忘失眠眩晕耳鸣腰膝酸软

【药名】	天王补心丸
【处方】	丹参 25g 当归 50g 石菖蒲 25g 党参 25g 茯苓 25g 五味子 50g 麦冬 50g 天冬 50g 地黄 200g 玄参 25g 制远志 25g 炒酸枣仁 50g 柏子仁 50g 桔梗 25g 甘草 25g 朱砂 10g。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸、褐黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味甜、微苦。
【功能与主治】	滋阴养血，补心安神。用于心阴不足，心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	天王补心丸(浓缩丸)
【处方】	丹参 25g 当归 50g 石菖蒲 25g 党参 25g 茯苓 25g 五味子 50g 麦冬 50g 天冬 50g 地黄 200g 玄参 25g 制远志 25g 炒酸枣仁 50g 柏子仁 50g 桔梗 25g 甘草 25g 朱砂 10g。
【性状】	本品为棕色至棕黑色的浓缩水丸；气微香，味甘、苦。
【功能与主治】	滋阴养血，补心安神。用于心阴不足，心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。
【用法与用量】	口服。一次 8 丸，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每 8 丸相当于饮片 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	安神宝颗粒
【处方】	炒酸枣仁，枸杞子，藤合欢。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒，或为棕色至棕褐色的颗粒(无蔗糖)；味甜、微酸。
【功能与主治】	补肾益精，养心安神。用于失眠健忘，眩晕耳鸣，腰膝酸软。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1~2 袋，一日 3 次。

【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 14g。(2) 每袋装 10g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

中医对于中风瘫痪的研究和诊断

中风是一种严重危害身体健康的疾病，以猝然昏仆，不省人事，半身不遂，口眼歪斜，语言不利为主症的病证。病轻者可无昏仆而仅见半身不遂及口眼歪斜等症状。由于本病发生突然，起病急骤，“如矢石之中的，若暴风之疾速。”临床见症不一，变化多端而迅疾，多有晕仆、抽搐，与自然界“风性善行而数变”的特征相似，故古代医家取类比象而名之为“中风”；又因其发病突然，亦称之为“卒中”。至于《伤寒论》所说之“中风”，乃外感病中的太阳表虚之证，同这里所述“中风”并非同一病症，故不可混淆。

《内经》里面并无中风的病名，但有关中风类似的病症却论述较为详细。在病名方面，依据症状表现和发病阶段不同而有不同的名称。如在卒中昏迷期间称为仆击、大厥、薄厥；半身不遂者则有偏枯、偏风、身偏不用、风痲等病名。在病因方面，认识到感受外邪，烦劳暴怒可以诱发本病。如《灵枢·刺节真邪》篇云：“虚邪偏客于身半，其入深，内居营卫，营卫稍衰则真气去，邪气独留，发为偏枯。”《素问·生气通天论》云：“阳气者，大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥。”《素问·调经论》云：“血之与气，并走于上，则为大厥，厥则暴死，气复返则生，不返则死。”此外，中医在诊疗过程中还认识到本病的发生与体质、饮食有密切的关系。如《素问·通评虚实论》曾经明确指出：“……仆击，偏枯……肥贵人则膏粱之疾也。”这些论述为后世临床的发展典定了一定的基础。

在《内经》理论指导下，历代医家对中风的病因病机和治法作了进一步的探讨和发挥。大体上可划分为两个阶段。在唐宋以前，以“外风”学说为主，多从“内虚邪中”立论。如《灵枢》所说“真气去，邪气独留”；东汉·张仲景认为“络脉空虚”，风邪入中是本病发生的主因，并以邪中深浅、病情轻重而分为中经中络、中脏中腑。在治疗上，主要以疏风散邪，扶助正气为法，《千金方》的小续命汤和《素问·病机气定保命集》的大秦芫汤，均为代表方。唐宋以后，特别是金元时期，突出以“内风”立论，是中风病因学说的一大转折。如张元素认为病因是热，他说：“风本生于热，以热为本，以风为标。”刘河间则主“心火暴盛”。林东垣认为属“正气自虚”。《医学发明·中风有三》说：“中风者，非外来风邪，乃本气自病也。凡人年逾四旬，多有此疾。”朱丹溪主张“湿痰生热”，

《丹溪心法·论中风》指出：“东南之人，多是湿土生痰，痰生热，热生风也”。元代王履提出“真中”、“类中”病名。《医经溯洄集·中风辨》指出：“因于风者，真中风也；因于火、因于气、因于湿者，类中风，而非中风也。”其后，明代张景岳认为本病与外风无关，而倡导“非风”之说，并提出“内伤积损”的论点。《景岳全书·非风》言：“非风一症，即时人所谓中风症也。此症多见卒倒，卒倒多由昏聩，本皆内伤积损颓败而使然，原非外感风寒所致”。同代医家李中梓将中风中脏腑明确分为闭、脱二证。至清代叶天士始明确以“内风”立论，《临证指南医案·中风》进一步阐明了“精血衰耗，水不涵木…肝阳偏亢，内风时起”的发病机理，并提出滋液息风，补阴潜阳，以及开闭、固脱等法。王清任指出中风半身不遂，偏身麻木是由于“气虚血瘀”所致，立补阳还五汤治疗偏瘫，至今仍为临床常用。近代医家张伯龙、张山雷等总结前人经验，进一步探讨发病机理，认识到本病的发生主要在于肝阳化风，气血并逆，直冲犯脑。至此对中风的病因病机和治法认识渐趋深化。

根据中风的临床表现特征，西医学中的急性脑血管疾病与之相近，包括缺血性中风和出血性中风，如短暂性脑缺血发作、局限性脑梗死、原发性脑出血和蛛网膜下腔出血等，均可由此对照而辨证施治。

病因

内伤积损

如果素体阴亏血虚，阳盛火旺，风火易炽，或者年老体衰，肝肾阴虚，肝阳偏亢，复因将息失宜，致使阴虚阳亢，气血上逆，上蒙神窍，而突发病。

劳欲过度

《素问·生气通天论》说：“阳气者，烦劳则张。”烦劳过度，耗气伤阴，易使阳气暴涨，引动风阳上旋，气血上逆，壅阻清窍；纵欲过度，房事不节，亦能引动心火，耗伤肾水，水不制火，则阳亢风动，从而致病。

饮食不节

嗜食肥甘厚味、辛香炙搏之物，或饮酒过度，致使脾失健运，聚湿生痰，痰湿生热，热极生风，终致风火痰热内盛，窜犯络脉，上阻清窍，而突然发病。此即《丹溪心法·论中风》所言：“湿土生痰，痰生热，热生风也。”

情志所伤

五志过极，心火暴甚，可引动内风而发卒中，其中以郁怒伤肝为多。平素长期忧郁恼怒，或者情志不畅，肝气不舒，气郁化火，则肝阳暴亢，引动心火，气血上冲于脑，神窍闭阻，遂致卒倒无知。或长期烦劳过度，精神紧张，虚火内燔，阴精暗耗，天长日久则导致肝肾阴虚，阳亢风动。除此外，素体阳盛，心肝火旺之青壮年，亦有遇忧郁而阳亢化风，

以致突然发病者。

气虚邪中

气血不足，脉络空虚，尤其在气候突变之际，风邪乘虚入中，而自身营气不足以抵御外邪，从而导致气血痹阻，或痰湿素盛，形盛气衰，外风引动内风，痰湿闭阻经络，而致喎僻不遂。

病机

中风的形成虽有上述各种原因，但其基本病机总属阴阳失调，气血逆乱。病位在心脑，与肝肾密切相关。《素问·脉要精微论》说：“头者，精明之府。”李时珍在《本草纲目》中亦指出脑为“元神之府”。“精明”、“元神”均指主宰精神意识思维活动功能而言，因此可以认为神明为心脑所主。病理基础则为肝肾阴虚。因肝肾之阴下虚，则肝阳易于上亢，复加饮食起居不当，情志刺激或感受外邪，气血上冲于脑，导致神窍闭阻，故致猝然昏仆，不省人事。病理因素主要为风、火、痰、气、瘀，其形或与脏腑功能失调有关。如肝脏阴虚，阳亢化火生风，或五志化火动风。脾失健运，痰浊内生，或火热炼液为痰。暴怒血菀于上，或气虚无力推动，皆可致瘀血停滞。四者之间可互相影响或兼见同病，如风火相扇，痰瘀互结等。严重时风阳痰火与气血阻于脑窍，横窜经络，出现昏仆、失语、喎僻不遂。

病理性质多属本虚标实。肝肾阴虚，气血衰少为致病之本，风、火、痰、气、瘀为发病之标，两者可互为因果。发病之初，邪气鸱张，风阳痰火炽盛，气血上营，故以标实为主；如病情剧变，在病邪的猛烈攻击下，正气急速溃败，则以正虚为主，甚则出现正气虚脱危及生命。后期因正气未复而邪气独留，可能会留后遗症。

由于病位浅深、病情轻重的不同，中风又有中经络和中脏腑之别。轻者中经络，重者中脏腑。若肝风夹痰，横窜经络，血脉疾阻，气血不能濡养机体，则见中经络之证，表现为半身不遂，口眼歪斜，不伴神志障碍；若风阳痰火蒙蔽神窍，气血逆乱，上冲于脑，则见中脏腑重证，络损血溢，瘀阻脑络，而致猝然昏倒，不省人事。因邪正虚实的不同，而有闭脱之分及由闭转脱的演变。闭证之中腑者，因肝阳暴亢或痰热腑实，风痰上扰，见喎僻不遂，神志欠清，大便不通；中脏者，风阳痰火内闭神窍，脑络瘀阻，则见昏仆，不省人事，肢体拘急等症。因于痰火瘀热者，为阳闭；因于痰浊瘀阻者为阴闭。若风阳痰火炽盛，进一步耗灼阴精，阴虚及阳，阴竭阳亡，阴阳离决，则出现脱证，表现为口开目合，手撒肢冷，气息微弱等虚脱症状。由此可见，中风的发生，病机虽然复杂，但归纳起来不外虚（阴虚、血虚）、火（肝火、心火）、风（肝风、外风）、瘀（风痰、湿痰）、气（气逆、气滞）、血（血瘀）六端。

恢复期因气血失调，血脉不畅而后遗经络形证。中脏腑者病情危重，但经积极抢救治疗，往往可使病人脱离危险，神志渐趋清醒，但因肝脏阴虚，气血亏损未复，风、火、痰、

瘀之邪留滞经络，气血运行不畅，而仍留有半身不遂，口歪或不语等后遗症，一般恢复较难。

病证鉴别

中风与口僻

口僻俗称吊线风，主要症状是口眼歪斜，但常伴耳后疼痛，口角流涎，言语不清，而无半身不遂或神志障碍等表现，多因正气不足，风邪入脉络，气血痹阻所致，不同年龄均可罹患。

中风与厥证

厥证也有突然昏仆、不省人事之表现，一般而言，厥证神昏时间短暂，发作时常伴有四肢逆冷，移时多可自行苏醒，醒后无半身不遂、口眼喎斜、言语不利等表现。

中风与痉证

痉证以四肢抽搐、项背强直，甚至角弓反张为主症，发病时也可伴有神昏，需与中风病证区别开来鉴定。但痉证之神昏多出现在抽搐之后，而中风患者多在起病时即有神昏，而后可以出现抽搐。痉证抽搐时间长，中风抽搐时间短。痉证患者无半身不遂、口眼喎斜等症状。

中风与痿证

痿证可以有肢体瘫痪，活动无力等类似中风之表现；中风后半身不遂日久不能恢复者，亦可见肌肉瘦削，筋脉弛缓，两者应予以区别。但痿证一般起病缓慢，以双下肢瘫痪或四肢瘫痪，或肌肉萎缩，筋惕肉瞤为多见；而中风的肢体瘫痪多起病急骤，且以偏瘫不遂为主。痿证起病时无神昏，中风则常有不同程度的神昏。

中风与癇证

癇证发作时起病急骤，突然昏仆倒地，与中风相似。但癇证为阵发性神志异常的疾病，卒发仆地时常口中作声，如猪羊啼叫，四肢频抽而口吐白沫；中风则仆地无声，一般无四肢抽搐及口吐涎沫的表现。癇证之神昏多为时短暂，移时可自行苏醒，醒后一如常人，但可再发；中风患者昏仆倒地，其神昏症状严重，持续时间长，难以自行苏醒，需及时治疗方可逐渐清醒。中风多伴有半身不遂、口眼喎斜等症，亦与癇证不同。

预防保护

关于中风的预防问题，在古代医学中也早有论述。如朱丹溪提出：“眩晕者，中风之渐也。”元·罗天益在《卫生宝鉴·中风门》也提到：“凡人初觉大指、次指麻木不仁或不用者，三年中有中风之疾也。”明·李用粹在《证治汇补·预防中风》中也强调：“平人手指麻木，不时肢晕，乃中风先兆，须预防之。宜慎起居，节饮食，远房帷，调情志。”

以上论述均表明，应识别中风先兆，及时处理，以预防中风发生。平时在饮食上宜食清淡易消化之物，忌肥甘厚腻、动风、辛辣刺激之品，并禁烟酒，要保持心情舒畅，做到起居有常，饮食有节，避免疲劳，以防止卒中和复中。

既病之后，应加强护理。逾中脏腑昏迷时，须密切观察病情变化，注意面色、呼吸、汗出等变化，以防向闭脱转化。加强口腔护理，及时清除痰涎，喂服或鼻饲中药时应少量多次频服。恢复期要加强偏瘫肢体的被动活动，进行各种功能锻炼，并配合针灸、推拿、理疗、按摩等。偏瘫严重者，要防止患肢受压而发生变形。语言不利者，宜加强语言训练。长期卧床者，保护局部皮肤，防止发生褥疮。

痉证

痉证是以项背强直，四肢抽搐，甚至口噤、角弓反张为主要临床表现的一种病证，古亦称为“瘛”。

《内经》对痉证的病因以外邪立论为主，如《素问·至真要大论》认为：“诸瘛项强，皆属于湿”，“诸暴强直，皆属于风”《灵枢·经筋》也说：“经筋之病，寒则反折筋急。”《素问·骨空论》又说：“督脉为病，脊强反折。”《素问·气厥论》载有“柔瘛”之病名，由“肺移热于肾，传为柔瘛”。《金匱要略》在继承《内经》理论的基础上，明确了外感表实无汗为刚症，表虚有汗为柔瘛，并认为表证过汗，风寒误下，疮家误汗以及产后血虚，汗出中风等误治、失治也可以致瘛，其有关伤亡津液而致瘛的认识，不仅是对《内经》理论的发挥，同时也丰富了对内伤致瘛的认识。巢元方《诸病源候论·风瘛候》描述瘛证的症：状为“口噤不开，背强而直，如发病状”。朱丹溪《医学明理·瘛门论》指出：“方书皆谓感受风湿而致，多用风药；予细详之，恐仍未备，当作气血内虚，外物干之所致。”认为瘛证也可由于气血亏虚所致，切不可作风治而专用“风药”。张景岳《景岳全书·瘛证》说，“凡属阴虚血少之辈，不能养营筋脉，以致搐挛僵仆者，皆是此证。如中风之有此者，必以年力衰残，阴之败也；产妇之有此者，必以去血过多，冲任竭也；疮家之有此者，必以血随脓出，营气涸也……凡此之类，总属阴虚之证。”强调阴虚精血亏损致瘛。清代，随着温病学说的发展，对瘛证的认识日趋完善。

华岫云在《临证指南医案·肝风》按语中，首先阐述了瘛证和肝脏的关系，他认为病因为：“肝为风木之脏，因有相火内寄，体阴用阳，其性刚，主动主升……倘精液有亏，肝阴不足，血燥生热，热则风阳上升，窍络阻塞，头目不清，眩晕跌仆，甚则瘛痲厥矣”。清·吴鞠通则进一步将瘛证总体概括为虚、实、寒、热四大纲领，他在《温病条辨·瘛有寒热虚实四大纲论》中说：“六淫致病，实证也；产后亡血，病久致瘛，风家误下，温病误汗，疮家发汗者，虚瘛也。风寒、风湿致瘛者，寒证也；风温、风热、风暑、燥火致瘛者，热瘛也。”王清任《医林改错》提出了气虚血瘀可以致瘛的观点。

中医学里尚有“瘛痲”一证，瘛，即抽搐。清·张璐《张氏医通·瘛痲》说：“瘛者，筋脉拘急也；痲者，筋脉弛纵也，俗谓之抽。”吴鞠通《温病条辨·瘛病瘛痲总论》中有描述：“瘛者，强直之谓，后人所谓角弓反张，古人所谓瘛也。瘛者，蠕动引缩之谓，后

人所谓抽掣、搐搐，古人所谓瘈也。”可见瘈痲既可为痉证的定状之一，也可单独出现而为病。”

现代西医学中各种原因引起的热性惊厥以及某些中枢神经系统病变，如流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎、中毒性脑病、脑脓肿、脑寄生虫病、脑血管疾病等出现痉证表现，均可对应分析而辨证施治。

病因

感受外邪

外感风、寒、湿邪，壅阻脉络，以致气血运行不利，筋脉失养，拘挛抽搐而成痉；外感温热之邪，或寒邪郁而化热，邪热消灼津液，筋脉失于濡养；或热病邪入营血、引动肝风，扰乱神明，而引发为痉证。

久病过劳

久病不愈，必然导致气血耗伤，气虚血行不通畅，瘀血内阻，导致血虚而不能濡养筋脉；久病脏腑功能调节异常，或脾虚不化水湿，或肝火灼伤津液，或肺热蒸灼津液等，皆能产生痰浊，而痰浊阻滞经脉，筋脉失养而致痉症。又或先天禀赋不足，操劳过度，情志不畅，久之致肝肾阴虚，阴不制阳，水不涵木，肝阳上亢，阳亢化风而致痉症。

误治或失治

其他病症的错误治疗也会导致痉症。误用或过用汗、吐、下法，如表证过汗及产后失血，风寒误下，疮家误汗等，导致阴精耗散；汗证、血证、体虚等病证失治，伤精损液，导致津伤液脱，亡血失精，筋脉失养，均可致痉证发生。

沿疗原则

痉证治疗原则为急则治其标，缓则治其本。治标应舒筋解痉。感受风、寒、湿、热之邪而致痉者，祛风散寒，清热祛湿，择而用之。肝经热盛者，治以清肝潜阳，息风镇痉；阳明热盛者，治以清泄胃热，存阴止痉；心营热盛者，治以清心凉血，开窍止痉；瘀血内阻而致痉者，治以活血化瘀，通窍止痉；痰浊阻滞而致痉者，治以祛风豁痰，息风镇痉。治本以养血滋阴为主，舒筋止痉为主。津伤血少在痉证的发病中具有重要作用，所以滋养营阴是痉证的重要治疗方法。此外，各个证候之间，有时可以错杂出现，例如热邪中夹痰浊，气血亏虚又感外邪等，应明辨虚实，标本兼顾，有常有变，灵活运用。

本证预后由于病因不同，差异甚大。一般而言，危重者多，如救治不当，可以危及生命，或留有后遗症如头痛、痴呆、癔证诸疾。

痿证

痿证是指肢体筋脉弛缓，软弱无力，不能随意运动，或伴有肌肉萎缩的一种病证。临床以下肢痿弱较为常见，亦称“痿躄”。“痿”是指机体痿弱不用，“躄”是指下肢软弱无力，不能步履之意。

《内经》对本病论述颇详，阐述了痿证的病因病机、病证分类及治疗原则。《素问·痿

论》指出本病的主要病机是“肺热叶焦”，肺燥不能输精于五脏，因而五体失养，肢体痿软。还将病证分为皮、脉、筋、骨、肉五痿，以示病情的浅深轻重以及与五脏的关系。在发病原因上，《素问·痿论》指出了“热伤五脏”、“思想无穷”、“焦虑太过”、“有渐于湿”及远行劳倦、房劳太过等，同时《素问·生气通天论》又指出：“因于湿，首如裹，湿热不攘，大筋软短，小筋弛长，软短为拘，弛长为痿。”认为湿热也是痿证成因之一。在治疗上，《素问·痿论》提出“治痿者独取阳明”的基本原则。

隋唐至北宋时，将痿列入风门，较少进行专题讨论。直到金元张子和《儒门事亲·风痺痿厥近世差互说》把风、痺、厥与痿证进行了鉴别，强调“痿病无寒”，认为痿证的病机是“由肾水不能胜心火，心火上铄肺金。肺金受火制，六叶皆焦，皮毛虚弱，急而薄者，则生痿躄”。其临床表现“四末之疾，动而或痉者为风，不仁或痛者为痺，弱而不用者为痿，逆而寒热者为厥，此其状未尝同也”。朱丹溪承张子和之说，力纠“风痿混合”之弊，提出了“泻南方，补北方”的治疗原则，“泻南方则肺金清而东方不实……补北方则心火降而西方不虚”，在具体辨证方面又有湿热、湿痰、气虚、瘀血之别，对后世影响颇深。

明清以后对痿证的辨证论治日趋完善。《景岳全书·痿论》指出，痿证实际上并非尽是明虚火旺，认为“元气败伤则精虚不能灌溉，血虚不能营养者，亦不少矣，若概从火论，则恐真阳衰败，及土衰水涸者有不能堪，故当酌寒热之浅深，审虚实之缓急，以实施治疗，庶得治痿之全。”《临证指南医案·痿》邹滋九指出本病为“肝肾肺胃四经之病”。

根据本病的临床表现，西医学中多发性神经炎、运动神经元疾病、脊髓病变、重症肌无力、周期性麻痹等表现为肢体痿软无力，不能随意运动者，均可对应分析病症而辨证施治。

病因

感受温毒

温热毒邪内侵，或病后余邪未尽，低热不解，或温病高热持续不退，皆令内热潘灼，伤津耗气，肺热叶焦，津伤失布，不能润泽五脏，五体失养而痿弱不用。

湿热浸淫

久处湿地或涉水冒雨，感受外来湿邪，湿热浸淫经脉，营卫运行受阻，或郁遏生热，或痰热内停，蕴湿积热，导致湿热相蒸，浸淫筋脉，气血运行不畅，致筋脉失于滋养而成痿。正如《素问·痿论》所言：“有深于湿，以水为事，若有所留，居处相湿，肌肉濡渍，痺而不仁，发为肉痿。”

饮食毒物所伤

如果脾胃本来就虚弱或者饮食不节，劳倦思虑过度，或久病致虚，中气受损，脾胃受纳、运化、输布水谷精微的功能失常，气血津液生化之源不足，无以濡养五脏，以致筋骨肌肉失养；脾胃虚弱，不能运化水湿，聚湿成痰，痰湿内停，客于经脉；或饮食不节，过食肥甘，嗜酒辛辣，损伤脾胃，运化失职，湿热内生，均可导致痿症。此外，服用或接触

毒性药物，损伤气血经脉，经气运行不利，脉道失畅，亦可致病。

久病房劳

先天不足，或久病体虚，或房劳太过，伤及肝肾，精损难复；或劳役太过而伤肾，耗损阴精，肾水亏虚，筋脉失于灌溉濡养，亦可致病。

跌仆瘀阻

跌打损伤，瘀血阻络，新血不生，经气运行不利，脑失神明之用，发为痿证；或产后恶露未尽，瘀血流注于腰膝，以致气血瘀阻不畅，脉道不利，四肢失其濡润滋养，从而致痿症。

治疗原则

痿证的治疗，需要分辨病因来区别治疗。虚证宜扶正补虚为主，肝肾亏虚者，宜滋养肝肾；脾胃虚弱者，宜益气健脾。实证宜祛邪和络，肺热伤津者，宜清热润燥；湿热浸淫者，宜清热利湿；瘀阻脉络者，宜活血行瘀。虚实兼夹者，又当兼顾之。《内经》提出“治痿者独取阳明”，是指从补脾胃、清胃火、祛湿热以滋养五脏的一种重要措施。

中风瘫痪昏迷诸病

风痰瘀血痹阻脉络型中风口眼歪斜半身不遂昏迷

【药名】	十香返生丸
【处方】	沉香 30g 丁香 30g 檀香 30g 土木香 30g 醋香附 30g 降香 30g 广藿香 30g 乳香(醋炙) 30g 天麻 30g 僵蚕(麸炒) 30g 郁金 30g 莲子心 30g 瓜蒌子(蜜炙) 30g 煅金礞石 30g 河子肉 30g 甘草 60g 苏合香 30g 安息香 30g 人工麝香 15g 冰片 7.5g 朱砂 30g 琥珀 30g 牛黄 15g。
【性状】	本品为深棕色的大蜜丸；气芳香，味甘、苦。
【功能与主治】	开窍化痰，镇静安神。用于中风痰迷心窍引起的言语不清、神志昏迷、痰涎壅盛、牙关紧闭。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2 次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	天丹通络片
【处方】	川芎 330g 丹参 330g 天麻 330g 石菖蒲 220g 黄芪 400g 豨莶草 330g 水蛭 110g 槐花 220g 人工牛黄 11g 牛膝 220g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显黄棕色至棕褐色；味苦、微涩。

【功能与主治】	活血通络，熄风化痰。用于中风中经络，风痰瘀血痹阻脉络证，症见半身不遂、偏身麻木、口眼歪斜、语言蹇涩；脑梗死急性期、恢复早期见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5片，一日3次。
【注意】	脑出血患者急性期禁用。忌食生冷、辛辣、油腻食物。
【规格】	每片重0.415g。
【贮藏】	密封。

【药名】	天丹通络胶囊
【处方】	川芎 330g 稀莪草 330g 丹参 330g 水蛭 110g 天麻 330g 槐花 220g 石菖蒲 220g 人工牛黄 11g 黄 400g 牛膝 220g。
【性状】	本品为胶囊剂，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；味苦、微涩。
【功能与主治】	活血通络，熄风化痰。用于中风中经络，风痰瘀血痹阻脉络证，症见半身不遂、偏身麻木、口眼歪斜、语言蹇涩；脑梗死急性期、恢复早期见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5粒，一日3次。
【注意】	脑出血患者急性期禁用。忌食生冷、辛辣、油腻食物。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	麝香脑脉康胶囊
【处方】	山羊角 240g 水牛角浓缩粉 50g 桃仁 50g 丹参 150g 穿山甲 25g 莱菔子 30g 天麻 100g 大黄 20g 三七 60g 地龙 140g 川芎 100g 人工麝香 0.02g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄色至棕黄色的粉末；气微香，味淡，微涩。
【功能与主治】	具有平肝熄风，化痰通络，豁痰开窍的功效。用于风痰瘀血、痹阻脉络证的缺血性中风中经络（脑梗塞恢复期）。症见半身不遂，偏身麻木，口舌歪斜，语言蹇涩。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次。15天为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.51g。
【贮藏】	密封。

【药名】	中风回春丸
【处方】	酒当归 30g 红花 10g 酒川芎 30g 桃仁 30g 丹参 100g 忍冬藤 100g 地龙(炒) 90g 伸筋草 60g 蜈蚣 5g 全蝎 10g 炒僵蚕 30g 金钱白花蛇 6g 鸡血藤 100g 络石藤 60g 土鳖虫(炒) 30g 川牛膝 100g 炒茺蔚子 30g 威灵仙(酒制) 30g 木瓜 50g。
【性状】	本品为棕色至红棕色的包衣浓缩水丸，除去包衣后显黑褐色；味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，舒筋通络，用于痰瘀阻络所致的中风，症见半身不遂、肢体麻木、言语蹇涩、口舌歪斜。
【用法与用量】	用温开水送服。一次1.2~1.8g，一日3次，或遵医嘱。
【注意】	脑出血急性期患者忌服。

【规格】	(1) 每瓶装 16g; (2) 每袋装 1.8g。
【贮藏】	密封。

【药名】	中风回春片
【处方】	酒当归 30g 红花 10g 川芎(酒制) 30g 桃仁 30g 丹参 100g 忍冬藤 100g 地龙(炒) 90g 伸筋草 60g 蜈蚣 5g 全蝎 10g 炒僵蚕 30g 金钱白花蛇 6g 鸡血藤 100g 络石藤 60g 土鳖虫(炒) 30g 川牛膝 100g 炒充蔚子 30g 威灵仙(酒制) 30g 木瓜 50g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，舒筋通络。用于痰瘀阻络所致的中风，症见半身不遂、肢体麻木、言语蹇涩、口舌歪斜。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	脑出血急性期患者忌服。
【规格】	(1) 薄膜衣片，每片重 0.3g; (2) 糖衣片，片心重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	再造丸
【处方】	蕲蛇肉 20g 地龙 5g 醋山甲 10g 人工麝香 5g 全蝎 15g 炒僵蚕 10g 豹骨(油炙) 10g 水牛角浓缩粉 15g 人工牛黄 2.5g 朱砂 10g 防风 20g 白芷 20g 葛根 15g 肉桂 20g 附子(附片) 10g 桑寄生 20g 威灵仙(酒炒) 15g 当归 10g 片姜黄 2.5g 三七 5g 没药(制) 10g 黄芪 20g 茯苓 10g 天竺黄 10g 熟地黄 20g 黄连 20g 化橘红 40g 沉香 10g 广藿香 20g 冰片 2.5g 豆蔻 10g 醋香附 10g 建曲 40g 醋龟甲 10g 天麻 20g 羌活 20g 川芎 20g 麻黄 20g 细辛 10g 油松节 10g 骨碎补(炒) 10g 粉萆薢 20g 赤芍 10g 血竭 7.5g 乳香(制) 10g 人参 20g 炒白术 18g 甘草 20g 制何首乌 20g 玄参 20g 大黄 20g 醋青皮 10g 檀香 5g 母丁香 10g 乌药 10g 草豆蔻 20g 两头尖(醋制) 20g 红曲 5g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味微甘、苦。
【功能与主治】	祛风化痰，活血通络。用于风痰阻络所致的中风，症见半身不遂，口舌歪斜、手足麻木、疼痛痉挛、言语蹇涩。
【用法与用量】	口服，一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	华佗再造丸
【处方】	本品为川芎、吴茱萸、冰片等药味经加工制成的浓缩水蜜丸。
【性状】	本品为黑色的浓缩水蜜丸；气香，味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，化痰通络，行气止痛。用于痰瘀阻络之中风恢复期和后遗症，症见半身不遂、拘挛麻木、口眼歪斜、言语不清。
【用法与用量】	口服，一次 4~8g，一日 2~3 次；重症一次 8~16g；或遵医嘱。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	无。

【贮藏】	密封。
【药名】	苏合香丸
【处方】	苏合香 50g 冰片 50g 人工麝香 75g 沉香 100g 香附 100g 乳香(制) 100g 白木 100g 朱砂 100g 安息香 100g 水牛角浓缩粉 200g 檀香 100g 丁香 100g 木香 100g 荜茇 100g 诃子肉 100g。
【性状】	本品为赭红色的水蜜丸或赭色的大蜜丸；气芳香，味微苦、辛。
【功能与主治】	芳香开窍，行气止痛。用于痰迷心窍所致的痰厥昏迷、中风偏瘫、肢体不利，以及中暑、心胃气痛。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 1~2 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	(1) 水蜜丸每丸重 2.4g；(2) 大蜜丸每丸重 3g。
【贮藏】	密封。
【药名】	脑栓通胶囊
【处方】	蒲黄 890g 赤芍 635g 郁金 510g 天麻 255g 漏芦 380g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的粉末和颗粒；气微，味微苦。
【功能与主治】	活血通络，祛风化痰。用于风痰瘀血痹阻经络引起的缺血性中风中经络急性期和恢复期。症见半身不遂，口舌歪斜，语言不利或失语，偏身麻木，气短乏力或眩晕耳鸣，舌质黯淡或暗红，苔薄白或白腻，脉沉细或弦细、弦滑。脑梗塞见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次，4 周为一疗程。
【注意】	(1) 少数患者服药后可出现胃脘部嘈杂不适感，便秘等。(2) 产妇慎用。(3) 孕妇禁用。
【规格】	每粒装 0.4g。
【贮藏】	密封。
【药名】	豨莶通栓丸
【处方】	豨莶草(蜜酒炙) 400g 胆南星 160g 清半夏 160g 酒当归 160g 天麻 120g 秦艽 120g 川芎 120g 三七 120g 桃仁 80g 水蛭 120g 红花 120g 冰片 8g 人工麝香 8g。
【性状】	本品为棕黑色的大蜜丸；气芳香，味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，祛风化痰，舒筋活络，醒脑开窍。用于缺血性中风风痰痹阻经络引起的中经络，症见半身不遂、偏身麻木、口舌歪斜、语言蹇涩。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 3 次。
【注意】	服用本品后，极个别病例可能出现嗜睡，面部发热，头痛等症状，继续用药可逐渐消失。孕妇及出血性中风(脑溢血)急性期禁用。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封，置干燥处。
【药名】	豨莶通栓胶囊

【处方】	稀莖草(蜜酒炙)400g 胆南星 160g 清半夏 160g 酒当归 160g 天麻 120g 秦艽 120g 川芎 120g 三七 120g 桃仁 80g 水蛭 120g 红花 120g 冰片 8g 人工麝香 8g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气芳香，味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，祛风化痰，舒筋活络，醒脑开窍。用于缺血性中风风痰痹阻经络引起的中经络，症见半身不遂、偏身麻木、口舌歪斜、语言蹇涩。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次，4周为一疗程。
【注意】	服用本品后，极个别病例可能出现嗜睡，面部发热，头痛等症状，继续用药可逐渐消失。孕妇及出血性中风(脑溢血)急性期禁用。
【规格】	每粒装0.37g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	醒脑再造胶囊
【处方】	黄芪 162.2g 石菖蒲 40.5g 三七 27g 当归 33.8g 粉防己 27g 炒桃仁 27g 天麻 27g 炒槐花 27g 胆南星 27g 玄参 27g 连翘 27g 川芎 27g 全蝎(去钩)6.8g 决明子 27g 制白附子 13.5g 木香 13.5g 猪牙皂 13.5g 淫羊藿 94.6g 红参 33.8g 地龙 27g 红花 27g 赤芍 27g 石决明 27g 仙鹤草 27g 炒白术 27g 葛根 27g 黄连 27g 泽泻 27g 枸杞子 27g 制何首乌 40.5g 沉香 13.5g 细辛 13.5g 炒僵蚕 6.8g 冰片 13.5g 珍珠(豆腐制) 20.3g 大黄 13.5g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄褐色至黑褐色的颗粒和粉末；气香，味甜、苦凉。
【功能与主治】	化痰醒脑，祛风活络。用于风痰闭阻清窍所致的神志不清、言语蹇涩、口角流涎、筋骨痠痛、手足拘挛、半身不遂；脑血栓恢复期及后遗症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一1次4粒，一日2次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每粒装0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	二十五味珍珠丸
【处方】	珍珠，珍珠母，肉豆蔻，石灰华，红花，草果，丁香，降香，豆蔻，诃子，檀香，余甘子，沉香，肉桂，毛诃子，螃蟹，木香，冬葵果，葶苈，志达萨增，金礞石，体外培育牛黄，香早芹，西红花，黑种草子，人工麝香，水牛角浓缩粉。
【性状】	品为黄棕带微红色的水丸；气香，味苦、辛。
【功能与主治】	安神开窍。用于中风；半身不遂，口眼歪斜，昏迷不醒，神志紊乱，谵语发狂等。
【用法与用量】	开水泡服，一次1g，一日1~2次
【注意】	无。
【规格】	(1)每4丸重1g；(2)每丸重1g。
【贮藏】	密封。

风邪中络型口眼歪斜肌肉麻木筋骨疼痛

【药名】	复方牵正膏
【处方】	白附子，地龙，全蝎，僵蚕，川芎，白芷，当归，赤芍，防风，生姜，樟脑，冰片，薄荷脑，麝香草酚。
【性状】	本品为浅棕色的片状橡胶膏；气芳香。
【功能与主治】	祛风活血，舒经活络。用于风邪中络，口眼歪斜，肌肉麻木，筋骨疼痛。
【用法与用量】	外用，贴敷于患侧相关穴位。贴敷前，将相关穴位处用温水洗净或酒精消毒。
【注意】	使用过程中如有皮肤过敏，可暂停用药；贴敷期间应防受风寒；开放性创伤忌用。
【规格】	(1)4cm X 6.5cm；(2)6.5cm X 10cm。
【贮藏】	密封。

痰浊阻窍型气闭昏厥牙关紧闭不省人事

【药名】	通关散
【处方】	猪牙皂 500g 鹅不食草 250g 细辛 250g。
【性状】	本品为浅黄褐色的粉末；气香，味辛，有刺鼻感。
【功能与主治】	通关开窍。用于痰浊阻窍所致的气闭昏厥、牙关紧闭、不省人事。

【用法与用量】	每用少许，吹鼻取嚏。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每瓶装 1.5g。
【贮藏】	密闭。

瘀血阻络兼肾虚型半身不遂口舌歪斜语謇麻木酸软

【药名】	丹膝颗粒
【处方】	丹参 500g 天麻 100g 赤芍 400g 生地黄 400g 桑寄生 400g 决明子 200g 牛膝 400g 牡丹皮 334g 川芎 167g 淫羊藿 300g 栀子 200g 火麻仁 200g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甜、苦。
【功能与主治】	养阴平肝，熄风通络，清热除烦。用于中风病中经络恢复期瘀血阻络兼肾虚证，症见半身不遂，口舌歪斜，舌强语謇，偏身麻木，头晕目眩，腰膝酸软梗塞恢复期见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

瘀血阻络型中风偏瘫麻木口眼歪斜黑白脉病

【药名】	七十味珍珠丸
【处方】	本品系藏族验方：为由珍珠、檀香、降香、九眼石、西红花、牛黄、麝香等药味加工制成的丸剂。
【性状】	本品为黑色的水丸；气芳香，味甘、涩、苦。
【功能与主治】	安神，镇静，通经活络，调和气血，醒脑开窍。用于“黑白脉病”、“龙血”不调；中风、瘫痪、半身不遂、癫痫、脑溢血、脑震荡、心脏病、高血压及神经性障碍。
【用法与用量】	研碎后开水送服。重病人一日 1g，每隔 3~7 日服 1g。
【注意】	禁用陈旧、酸性食物。
【规格】	(1) 每 30 丸重 1g；(2) 每丸重 1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	豨红通络口服液
【处方】	酒豨莶草 600g 红花 50g 川牛膝 50g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的液体；气特异，味微酸。
【功能与主治】	祛风活血，通络止痛。用于瘀血阻络所致的中风病，症见偏瘫，肢体麻木，语言不利。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇禁用。

【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	灯盏花素片
【处方】	灯盏花素 20g。
【性状】	本品为淡黄色的片，或为薄膜衣片，除去包衣后显淡黄色；味淡或味微咸。
【功能与主治】	活血化瘀，通经活络。用于脑络瘀阻，中风偏瘫，心脉痹阻，胸痹心痛；中风后遗症及冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 片〔规格(1)、(2)〕一次 1 片〔规格(3)〕，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	(1) 不宜用于脑出血急性期或有出血倾向患者。 (2) 个别患者出现皮肤瘙痒，停药后自行消失。
【规格】	(1) 素片每片含灯盏花素 20mg；(2) 薄膜衣每片含灯盏花素 20mg；(3) 薄膜衣每片含灯盏花素 40mg。
【贮藏】	密闭，避光，置干燥处。

【药名】	注射用灯盏花素
【处方】	本品为灯盏花素加入适宜的赋形剂，经冷冻干燥制成的无菌制品。
【性状】	本品为淡黄色至黄色的疏松块状物。
【功能与主治】	活血化瘀，通络止痛。用于中风及其后遗症，冠心病，心绞痛。
【用法与用量】	肌肉注射，一次 5~10mg，一日 2 次，临用前，用注射用水 2ml 溶解后使用。静脉注射，一次 20~50mg，一日 1 次，用 250ml 生理盐水或 500ml 5% 或 10% 葡萄糖注射液溶解后使用。
【注意】	无。
【规格】	以野黄芩苷计(1) 10mg；(2) 20mg；(3) 25mg；(4) 50mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	夏天无片
【处方】	夏天无 600g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	活血通络，行气止痛。用于瘀血阻络、气行不畅所致的中风，症见半身不遂、偏身麻木，或跌扑损伤、气血瘀阻所致的肢体疼痛、肿胀麻木；风湿性关节炎、坐骨神经痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次 4~6 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

瘀血阻络型脑动脉硬化缺血性中风脑出血偏瘫口眼歪斜眩晕

【药名】	灯盏生脉胶囊
【处方】	灯盏细辛 3000g 人参 600g 五味子 600g 麦冬 1100g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰褐色至棕褐色的粉末；味微苦。
【功能与主治】	益气养阴，活血健脑。用于气阴两虚、瘀阻脑络引起的胸痹心痛，中风后遗症，症见痴呆、健忘、手足麻木症，冠心病心绞痛，缺血性心脑血管疾病，高脂血症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次，饭后 30 分钟服用。2 个月为一疗程，疗程可连续。巩固疗效或预防复发，一次 1 粒，一日 3 次。
【注意】	脑出血急性期禁用。
【规格】	每粒装 0.18g。
【贮藏】	密封。

【药名】	灯盏细辛注射液
【处方】	灯盏细辛 800g。
【性状】	本品为棕色的澄明液体。
【功能与主治】	活血祛瘀，通络止痛。用于瘀血阻滞，中风偏瘫，肢体麻木，口眼歪斜，言语蹇涩及胸痹心痛；缺血性中风、冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	肌内注射，一次 4ml，一日 2~3 次。穴位注射，每穴 0.5~1.0ml，多穴总量 6~10ml。静脉注射，一次 20~40ml，一日 1~2 次，用 0.9%氯化钠注射液 250~500ml 稀释后缓慢滴注。本品在酸性条件下，其酚酸类成分可能游离析出，故静脉滴注时不宜和其他酸性较强的药物配伍。如药液出现浑浊或沉淀，请勿继续使用。
【注意】	无。
【规格】	每支装 (1) 2ml；(2) 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	灯盏细辛颗粒(灯盏花颗粒)
【处方】	灯盏细辛 640g。
【性状】	本品为绿棕色至棕色的颗粒；气微香，味甜、苦、微涩；或气微香，味苦、涩(无蔗糖)。
【功能与主治】	活血化瘀，通经活络。用于脑络瘀阻，中风偏瘫，心脉痹阻，胸痹心痛，缺血性中风、冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 袋，一日 3 次。

【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装 5g; (2)每袋装 3g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	脑得生丸
【处方】	三七 78g 川芎 78g 红花 91g 葛根 261g 山楂(去核)157g。
【性状】	本品为褐色的大蜜丸; 气微香, 味微甜、酸。
【功能与主治】	活血化瘀, 通经活络。用于瘀血阻络所致的眩晕、中风, 症见肢体不用、言语不利及头晕目眩; 脑动脉硬化、缺血性中风及脑出血后遗症见上述证候者。
【用法与用量】	口服, 一次 1 丸, 一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	脑得生片
【处方】	三七 78g 川芎 78g 红花 91g 葛根 261g 山楂(去核)157g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片, 除去包衣后显淡棕黄色至棕褐色; 味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀, 通经活络。用于瘀血阻络所致的眩晕、中风, 症见肢体不用、言语不利及头晕目眩; 脑动脉硬化、缺血性中风及脑出血后后遗症见上述证候者。
【用法与用量】	口服, 一次 6 片, 一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重 0.35g。(2)薄膜衣片每片重 0.38g。(3)糖衣片(片心重 0.3g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	脑得生胶囊
【处方】	三七 117g 川芎 117g 红花 136g 葛根 392g 山楂(去核)235g。
【性状】	本品为硬胶囊, 内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末; 味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀, 通经活络。用于瘀血阻络所致的眩晕、中风, 症见肢体不用、言语不利及头晕目眩; 脑动脉硬化、缺血性中风及脑出血后后遗症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒〔规格(1)〕或一次 6 粒〔规格(2)〕, 一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每粒装 0.45g; (2)每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	脑得生颗粒
【处方】	三七 156g 川芎 156g 红花 182g 葛根 522g 山楂(去核)314g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒, 味微苦。

【功能与主治】	活血化瘀，通经活络。用于瘀血阻络所致的眩晕、中风，症见肢体不用、言语不利及头晕目眩；脑动脉硬化、缺血性中风及脑出血后遗症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	消栓通络片
【处方】	黄芪431g 泽泻144g 三七144g 槐花72g 桂枝144g 郁金144g 木香72g 冰片5.7g 山楂144g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显褐色；气香，味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，温经通络。用于瘀血阻络所致的中风，症见神情呆滞、言语蹇涩、手足发凉、肢体疼痛；缺血性中风及高脂血症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次6片，一日3次。
【注意】	禁食生冷、辛辣、动物油脂食物。
【规格】	薄膜衣片每片重0.38g。
【贮藏】	密封。

【药名】	消栓通络胶囊
【处方】	川芎287g 丹参215g 黄芪431g 泽泻144g 三七144g 槐花72g 桂枝144g 郁金144g 木香72g 冰片5.7g 山楂144g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气香，味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，温经通络。用于瘀血阻络所致的中风，症见神情呆滞、言语蹇涩、手足发凉、肢体疼痛；缺血性中风及高脂血症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次6粒，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	禁食生冷、辛辣、动物油脂食物。
【规格】	每粒装0.37g。
【贮藏】	密封。

【药名】	消栓通络颗粒
【处方】	川芎120g 丹参90g 黄芪180g 泽泻60g 三七60g 槐花30g 桂枝60g 郁金60g 木香30g 冰片2.4g 山楂60g。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒；气香，味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，温经通络。用于瘀血阻络所致的中风，症见神情呆滞、言语蹇涩、手足发凉、肢体疼痛；缺血性中风及高脂血症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	禁食生冷、辛辣、动物油脂食物。
【规格】	(1)每袋装6g(无蔗糖)；(2)每袋装12g。
【贮藏】	密封。

【药名】	培元通脑胶囊
【处方】	制何首乌 429g 熟地黄 286g 天冬 286g 醋龟甲 46g 鹿茸 23g 酒苁蓉 114g 肉桂 24g 赤芍 49g 全蝎 48g 烫水蛭 96g 地龙 49g 炒山楂 142g 茯苓 48g 炙甘草 29g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的粉末；气特异，味咸、辛。
【功能与主治】	益肾填精，息风通络。用于肾元亏虚，瘀血阻络证，症见半身不遂、口眼歪斜、言语蹇涩、半身麻木、眩晕耳鸣、腰膝酸软、脉沉细；缺血性中风中经络恢复期见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次。
【注意】	孕妇禁用，产妇慎用。忌辛辣、油腻，禁烟酒。个别患者服药后出现恶心，一般不影响继续服药。偶见嗜睡、乏力，继续服药能自行缓解。
【规格】	每粒装0.6g。
【贮藏】	密封。

气虚血瘀型中风脑血栓口舌歪斜麻木眩晕乏力

【药名】	脑安胶囊
【处方】	川芎，当归，红花，人参，冰片。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色颗粒状粉末；气清香，味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，益气通络。用于脑血栓形成急性期，恢复期属气虚血瘀证候者，症见急性起病、半身不遂、口舌歪斜、舌强语蹇、偏身麻木、气短乏力、口角流涎、手足肿胀、舌暗或有瘀斑、苔薄白。
【用法与用量】	口服。一次2粒，一日2次，4周为一疗程，或遵医嘱。
【注意】	出血性中风慎用。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	消栓口服液
【处方】	黄芪 2000g 当归 200g 赤芍 200g 地龙 100g 川芎 100g 桃仁 100g 红花 100g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的液体；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	补气活血通络。用于中风气虚血瘀证，症见半身不遂、口舌歪斜、言语蹇涩、气短乏力、面色㿔白；缺血性中风见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日3次。
【注意】	(1) 孕妇禁服。(2) 凡阴虚阳亢，风火上扰，痰浊蒙蔽者禁用。

【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	血栓心脉宁片
【处方】	川芎 500g 槐花 250g 丹参 500g 水蛭 125g 毛冬青 250g 人工牛黄 5g 人工麝香 1.25g 人参茎叶总皂苷 25g 冰片 2.5g 蟾酥 1.25g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕色；气微香，味微苦。
【功能与主治】	益气活血，开窍止痛。用于气虚血瘀所致的中风、胸痹，症见头晕目眩、半身不遂、胸闷心痛、心悸气短；缺血性中风恢复期、冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每片重 40g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	血栓心脉宁胶囊
【处方】	川芎，丹参，毛冬青，人工麝香，冰片，槐花，水蛭，人工牛黄，人参茎叶总皂苷，蟾酥。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；味辛、微苦。
【功能与主治】	益气活血，开窍止痛。用于气虚血瘀所致的中风、胸痹，症见头晕目眩、半身不遂、胸闷心痛、心悸气短；缺血性中风恢复期、冠心病心绞痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	消栓颗粒
【处方】	黄芪 5000g 当归 500g 赤芍 500g 地龙 250g 红花 250g 川芎 250g 桃仁 250g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气微酸，味苦。
【功能与主治】	补气活血通络。用于中风气虚血瘀证，症见半身不遂，口舌歪斜，言语蹇涩，气短乏力，面色苍白；缺血性中风见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	(1) 孕妇禁服。(2) 凡阴虚阳亢，风火上扰，痰浊蒙蔽者禁用。
【规格】	每袋装 4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	麝香抗栓胶囊
【处方】	人工麝香，羚羊角，全蝎，乌梢蛇，三七，僵蚕，水蛭（制），川芎，天麻，大黄，红花，胆南星，鸡血藤，赤芍，粉葛，地黄，黄芪，忍冬藤，当归，络石藤，地龙，豨莶草。

【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色的粉末；气辛，味甘。
【功能与主治】	通络活血，醒脑散瘀。用于中风气虚血瘀症，症见半身不遂、言语不清、头昏目眩。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每粒装0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	人参再造丸
【处方】	人参100g 酒蕲蛇100g 广藿香100g 檀香50g 母丁香50g 玄参100g 细辛50g 醋香附50g 地龙25g 熟地黄100g 三七25g 乳香(醋制)50g 青皮50g 豆蔻50g 防风100g 制何首乌100g 川芎100g 片姜黄12.5g 黄芪100g 甘草100g 黄连100g 茯苓50g 赤芍100g 大黄100g 桑寄生100g 葛根75g 麻黄100g 骨碎补(炒)50g 全蝎75g 豹骨(制)50g 炒僵蚕50g 附子(制)50g 琥珀25g 醋龟甲50g 粉萆薢100g 白术(麸炒)50g 沉香50g 天麻100g 肉桂100g 白芷100g 没药(醋制)50g 当归50g 草豆蔻100g 威灵仙75g 乌药50g 羌活100g 橘红200g 六神曲(麸炒)200g 朱砂20g 血竭15g 人工麝香5g 冰片5g 牛黄5g 天竺黄50g 胆南星50g 水牛角浓缩粉30g。
【性状】	本品为黑色的大蜜丸，味甜、微苦。
【功能与主治】	益气养血，祛风化痰，活血通络。用于气虚血瘀、风痰阻络所致的中风，症见口眼歪斜、半身不遂、手足麻木、疼痛、拘挛、言语不清。
【用法与用量】	口服。一次1丸，一日2次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重3g。
【贮藏】	密封。

气虚血瘀肝肾不足型中风不遂口舌歪斜麻木

【药名】	益脑宁片
【处方】	炙黄芪100g 麦芽100g 灵芝100g 墨旱莲70g 天麻30g 丹参70g 地龙30g 琥珀10g 党参100g 制何首乌100g 女贞子70g 槲寄生70g 钩藤40g 赤芍40g 山楂100g。

【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄褐色至棕褐色；味甘、微涩。益气补肾，活血通脉，用于气虚血瘀、肝肾不足所致的中风、胸痹，症见半身不遂、口舌歪斜、言语蹇涩、肢体麻木或胸痛、胸闷、憋气；中风后遗症、冠心病心绞痛及高血压病见上述证候者。
【功能与主治】	
【用法与用量】	
【注意】	
【规格】	
【贮藏】	口服。一次4~5片，一日3次。 孕妇慎用。 (1)薄膜衣片每片重0.37g；(2)糖衣片(片心重0.35g)。 密封。

【药名】	脑心痛胶囊
【处方】	黄芪66g 赤芍27g 丹参27g 当归27g 川芎27g 桃仁27g 红花13g 醋乳香13g 醋没药13g 鸡血藤20g 牛膝27g 桂枝20g 桑枝27g 地龙27g 全蝎13g 水蛭27g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为淡棕黄色至黄棕色的粉末；气特异，味微苦。
【功能与主治】	益气活血，化瘀通络。用于气虚血滞、脉络瘀阻所致中风中经络，半身不遂、肢体麻木、口眼歪斜、舌强语蹇及胸痹心痛、胸闷、心悸、气短；脑梗塞、冠心病心绞痛属上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒，一日3次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	脑脉泰胶囊
【处方】	红参，三七，当归，丹参，鸡血藤，红花，银杏叶，山楂，菊花，石决明，制何首乌，葛根，石菖蒲。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至褐色的粉末和颗粒；味微苦、涩。
【功能与主治】	益气活血，熄风豁痰。用于中风气虚血瘀，风痰瘀血闭阻脉络证，症见半身不遂、口舌歪斜、言语蹇涩、头晕目眩、半身麻木、气短乏力；缺血性中风恢复期及急性期轻症见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次2粒，一日3次。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

心脑血管栓塞型中风不遂口舌歪斜偏身麻木

【药名】	三七通舒胶囊
【处方】	三七三醇皂苷 100g。
【性状】	本品为肠溶胶囊，内容物为浅棕黄色的颗粒和粉末；无臭，味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，活络通脉，改善脑梗塞、脑缺血功能障碍，恢复缺血性脑代谢异常，抗血小板聚集，防止血栓形成，改善微循环，降低全血黏度，增加颈动脉血流量。主要用于心脑血管栓塞性疾病，主治中风、半身不遂、口舌歪斜、言语蹇涩、偏身麻木。
【用法与用量】	口服。一次1粒，一日3次。
【注意】	出血性中风在出血期间忌用，对出血后的瘀血症状要慎用。
【规格】	每粒装0.2g。
【贮藏】	遮光，密封，置阴凉干燥处。

【药名】	抗栓再造丸
【处方】	红参 100g 黄芪 596g 胆南星 199g 烫穿山甲 100g 人工牛黄 100g 冰片 59g 烫水蛭 199g 丹参 596g 大黄 199g 苏合香 40g 葛根 397g 当归 199g 何首乌 397g 桃仁 199g 红花 199g 天麻 20g 威灵仙 199g 甘草 199g 人工麝香 2.1g 三七 397g 地龙 199g 全蝎 59g 穿山龙 397g 牛膝 199g 乌梢蛇 100g 朱砂 199g 土鳖虫 199g 细辛 199g 草豆蔻 100g。
【性状】	本品为朱红色的浓缩水丸；气微芳香，味辛、苦。
【功能与主治】	活血化瘀，舒筋通络，息风镇痉。用于瘀血阻窍、脉络失养所致的中风，症见手足麻木、步履艰难、瘫痪、口眼歪斜、言语不清；中风恢复期及后遗症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	孕妇忌服；年老体弱者慎服。
【规格】	每袋装3g。
【贮藏】	密封。

热入心包型高热惊厥神昏谵语中风昏迷脑炎脑膜炎

【药名】	安宫牛黄丸
【处方】	牛黄 100g 麝香或人工麝香 25g 朱砂 100g 黄连 100g 栀子 100g 冰片 25g 水牛角浓缩粉 200g 珍珠 50g 雄黄 100g 黄芩 100g 郁金 100g。
【性状】	本品为黄橙色至红褐色的大蜜丸，或为包金衣的大蜜丸，除去金衣后显黄橙色至红褐色；气芳香浓郁，味微苦。
【功能与主治】	清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2 丸〔规格(1)〕或 1 次 1 丸〔规格(2)〕；小儿三岁以内一次 1/2 丸〔规格(1)〕或一次 1/4 丸〔规格(2)〕，四至六岁一次 1 丸〔规格(1)〕或一次 1/2 丸〔规格(2)〕，一日 1 次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1) 每丸重 1.5g；(2) 每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	安宫牛黄散
【处方】	牛黄 100g 人工麝香 25g 朱砂 100g 黄连 100g 栀子 100g 水牛角浓缩粉 200g 珍珠 50g 雄黄 100g 黄芩 100g 郁金 100g。
【性状】	本品为黄色至黄橙色的粉末；气芳香浓郁，味苦。
【功能与主治】	清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 1.6g，一日 1 次，小儿三岁以内一次 0.4g，四至六岁一次 0.8g，一日 1 次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每瓶装 1.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	安脑丸
【处方】	人工牛黄 15g 猪胆粉 200g 朱砂 55g 冰片 35g 水牛角浓缩粉 200g 珍珠 50g 黄芩 150g 黄连 150g 栀子 150g 雄黄 95g 郁金 150g 石膏 120g 煅赭石 65g 珍珠母 80g 薄荷脑 15g。
【性状】	本品为红棕色的小蜜丸或大蜜丸；气芳香，味苦、凉。
【功能与主治】	清热解毒，醒脑安神，豁痰开窍，镇惊熄风。用于高热神昏，烦躁谵语，抽搐惊厥，中风窍闭，头痛眩晕；高血压、脑中风见上述证候者。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 3~6g，大蜜丸一次 1~2 丸，一日 2 次；小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	按医嘱服用。

【规格】	(1)小蜜丸每11丸重3g；(2)大蜜丸每丸重3g。
【贮藏】	密封。

肝阳上亢肝风内动型眩晕项强痰涎言语不清麻木口眼歪斜

【药名】	清眩治瘫丸
【处方】	天麻 24g 酒蕲蛇 24g 僵蚕 24g 全蝎 12g 地龙 24g 铁丝威灵仙 28g 制白附子 24g 牛膝 36g 血竭 24g 川芎 36g 玄参 24g 葛根 28g 骨碎补 28g 郁金 24g 枳壳(炒) 72g 人参(去芦) 12g 麦冬 24g 黄连 24g 地黄 24g 法半夏 20g 山楂 36g 人工牛黄 10g 冰片 3g 决明子 36g 没药(醋炙) 24g 丹参 36g 赤芍 24g 桑寄生 36g 醋香附 36g 槐米 28g 沉香 12g 安息香 10g 炒白术 36g 茯苓 36g 黄芩 24g 泽泻 36g 黄芪 72g 水牛角浓缩粉 12g 珍珠 10g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；气芳香，味苦。
【功能与主治】	平肝息风，化痰通络。用于肝阳上亢、肝风内动所致的头目眩晕、项强头胀、胸中闷热、惊恐虚烦、痰涎壅盛、言语不清、肢体麻木、口眼歪斜、半身不遂。
【用法与用量】	用温开水或黄酒送服。一次1丸，一日2次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每丸重9g。
【贮藏】	密封。

中医对于女性诸病的研究和诊断

女子胞

女子胞，又称胞宫、胞脏、子宫、子脏，位居小腹部，在膀胱后，直肠之前，下口与阴道相连，是女性的生殖器官。

女子胞的主要功能

女子胞具有主持月经和孕育胎儿的功能。

主持月经：女子胞为女子月经发生的器官。生殖期妇女在多种因素的共同作用下，子宫会发生周期性变化，约一月左右周期性出血一次，称作“月经”或“月事”、“月信”、“经水”等，由于月事的出现和月亮每个月的圆缺相吻合，故中医认为这也是天人合一的一种具体体现。中医学认为当女子到了14岁左右，肾中精气旺盛，产生了天癸，子宫等生殖器官发育成熟，冲、任二脉气血通盛，月经按时来潮，并具备了生殖能力。这种生理状态一直持续到更年期。此后肾气渐衰，天癸竭绝，冲、任二脉之气血衰少，而出现月经紊乱，直至绝经。

孕育胎儿：女子在其受孕后，女子胞即成为孕育胎儿的场所。此时月经停止，大量气血输送到胞宫以养育胎儿，促进胎儿发育直至分娩。故清·唐宗海《中西汇通医经精义》说：“女子之胞，一名子宫，乃孕子之处。”

女子胞与脏腑经络的关系

女子的月经来潮及孕育胎儿，是一个由多因素参与的复杂生理过程，主要与下列脏腑经络有关：

肾中精气的作用：女子生殖器官及生殖机能的维持，全赖肾中精气的作用。青春期女子，在天癸的作用下生殖器官日渐发育成熟而有月经来潮，从而具备生殖能力；老年妇女肾中精气不充，天癸随之衰少，直至衰竭，从而由更年期进入绝经期，生殖机能随之丧失。可见肾中精气的盛衰直接影响天癸的产生与衰竭，对生殖器官的发育和生殖机能具有决定性作用。肾中精气不足导致生殖器官发育异常而患不孕症时，当用填补肾中之精气的治法。由肾中精气虚衰而引起的月经紊乱，可用填补肾精的方法治疗。

冲、任二脉的作用：冲脉和任脉，同起于胞中。冲脉与足少阴肾经并行又与足阳明胃经相通，能调节十二经气血，与月经来潮相关，故言“冲为血海”；任脉与足三阴经相会，调节全身阴经，为“阴脉之海”，主胎儿的孕育，故言“任主胞胎”。冲、任二脉气血旺盛，注入胞宫而发生月经。冲、任二脉气血衰少，则可出现月经不调或绝经，从而影响生殖机能，所以常把女性生殖功能障碍诊为“冲任不调”，并通过调理冲、任以治疗。

心肝脾三脏的作用：女子胞的功能还与心、肝、脾的关系密切。由于月经的来潮，胎儿的孕育，均依赖于血液，而心主血，肝藏血，脾生血统血，故当心、肝、脾功能失调时，均可引起子宫的机能异常，出现相应的病理变化。肝失疏泄，气机不利，可能会出现月经不调、痛经等症；若肝血亏虚或脾虚气血生化乏源，胞宫失养，可能出现经少、经闭、不孕等病症；若脾不统血或肝不藏血，可引起月经过多或崩漏等病症。因此治疗妇科经孕异常的病症，当分别从心、肝、脾辨证施治。

健康而成熟的女性，一般每月定期行经，月经周期通常在 28 天左右，行经 3-5 天。经量中等，经色鲜红，经血不稀不稠，无血块。

经期异常：主要分为先期、后期和不定期三类。

月经先期：月经周期常提前 7 天以上者，称月经先期。多因热盛迫血妄行，或气虚不能摄血所致。血热者兼量多、色红、质稠；气虚者兼量多、色淡、质稀。**月经后期：**月经周期常推迟 7 天以上者，称月经后期。多因寒凝气滞，血不畅行；或血液亏少，血海不充足；或痰郁血瘀，冲任受阻所致。**月经不定期：**即经期错乱，或前或后在 7 天以上而且无定期。其实者多因肝气郁滞，气机不调或瘀血内阻，气血不畅；其虚者多为脾肾虚损，气血不足，以致冲任失调。

经量异常：健康妇女每次月经血量约为 50~100ml，由于个体素质、年龄等的差异，可略有不同。若经量多少超过了生理范围，则属病理表现。

月经量多：月经周期不变，行经量却超过正常，或行经时间延长，量亦因而增多，为

月经量多。血热妄行，冲任受损；或气虚不能摄血；或瘀血阻络，络伤血溢等等均可能引起。**月经量少**：指月经周期如常，而经量减少，或行经时间缩短，经量少于正常者。多因阴精不足，血海空虚；或寒凝、血瘀、痰湿阻滞，血行不畅所致。**闭经**：在行经年龄而并未怀孕的情况下，停经超过3个月，称为闭经。其产生原因与月经量少基本相同，多责之于气虚血少、气滞血瘀、血寒凝滞等，只是程度更重。**崩漏**：不在行经期，却阴道内大量出血，或持续淋漓不断出血的，称为崩漏。多因阳热迫血妄行或气虚不能摄血所致。来势急，出血量多的称为“崩”；来势缓，出血量少的称为“漏”。

带下

正常情况下，妇女阴道内会分泌少量乳白色而无臭的黏液，这种分泌物称为带下。若分泌物过多，绵绵不绝，或带下的色、质及气味等发生异常改变，即为病理性带下。

如带下色白量多、质稀如涕无臭者，为白带，多属脾虚湿注或脾肾阳虚，寒湿下注之证；带下色黄、黏稠而臭秽者，为黄带，多为湿热下注而致；白带中夹有血液、微有臭味者，为赤白带，多是肝经郁热的表现。倘若带下颜色污秽似脓血、气味秽臭难闻、病程较长、时下不止者，常提示有恶性病变。

总之，凡带下色白而清稀、无臭，多属虚证、寒证；带下色黄或赤、稠黏臭秽，多属实证、热证。

胎产

胎产，是指已婚妇女妊娠及生育的情况。

妊娠病：妊娠2~3月，出现恶心呕吐较重，甚至食入即吐，称为妊娠恶阻，多因脾胃虚弱或肝胃不和，导致冲脉之气上冲，胃失和降而成。怀孕后阴道有少量出血，常伴有腰痠、腹痛、小腹坠胀者，多为先兆流产的症状，由肾虚、气血虚弱或跌仆伤胎所引起。妊娠中、后期出现头晕目眩，肢体浮肿者，应预防肝风内动所致的妊娠痫证的发生。

产后病：妊娠10月而分娩(28天为一个妊娠月)为足月正产。产时艰难，或流血过多，可致气血两虚。产后头晕眼花，不能坐起，或胸闷、呕恶、心烦，甚至神昏，甚至不省人事，称为血晕。其实者为血瘀气闭；其虚者为血虚气脱。产后出血持续20天以上仍淋漓不断者，称为恶露不绝。若恶露过多，色红质稠而有臭气，多属血热；如量少有块，小腹痛而拒按，多属血瘀。

女性诸病

瘀血内阻型痛经血瘀血块恶露腹痛子宫肌瘤难产

【药名】	化癥回生片
【处方】	益母草 112g 花椒(炭)14g 当归 28g 醋三棱 14g 川芎 14g 醋香附 14g 红花 14g 烫水蛭 14g 苏木 14g 两头尖 14g 降香 14g 人参 42g 高良姜 14g 姜黄 8.4g 没药(醋炙)14g 大黄 56g 盐小茴香 21g 五灵脂(醋炙)14g 鳖甲胶 112g 醋延胡索 14g 蒲黄炭 14g 干漆(煅)14g 炒苦杏仁 21g 人工麝香 14g 桃仁 21g 虻虫 14g 丁香 21g 白芍 28g 乳香(醋炙)14g 制吴茱萸 14g 阿魏 14g 醋艾炭 14g 紫苏子 14g 肉桂 14g 熟地黄 28g。
【性状】	本品为棕黄色片；气香，味微苦
【功能与主治】	消癥化瘀。用于瘀血内阻所致的癥积、妇女干血癆、产后血瘀、少腹疼痛拒按。
【用法与用量】	饭前温酒送服。一次5~6片，一日2次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方滇鸡血藤膏
【处方】	滇鸡血藤膏粉 218.75g 川牛膝 59.5g 续断 53g 红花 5g 黑豆 12.5g。

【性状】	本品为黑色的块状物；气糊香，味涩、微苦而后略甜。
【功能与主治】	活血养血，益肾。用于瘀血阻络、肾失所养所致的月经不调，症见经水后错、经量少、有血块，腰痠、小腹下坠、手足麻木、关节痠痛。
【用法与用量】	将膏研碎，用水、酒各半炖化服。一次6~10g，一日2次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每盒装200g。
【贮藏】	密封。

【药名】	十一味能消丸
【处方】	本品系藏族验方：藏木香30g 小叶莲50g 干姜40g 沙棘膏38g 诃子肉75g 蛇肉(制)25g 大黄90g 方海25g 北寒水石(制)100g 硝砂17g 碱花(制)125g。
【性状】	本品为黄棕色至黄褐色的水丸；气微，味咸、微苦、涩。
【功能与主治】	化瘀行血，通经催产。用于经闭，月经不调，难产，胎盘不下，产后瘀血腹痛。
【用法与用量】	研碎后开水送服。一次1~2丸，一日2次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重1g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	加味生化颗粒
【处方】	当归266g 桃仁266g 益母草266g 艾叶200g 炙甘草200g 荆芥200g 赤芍200g 川芎200g 炮姜200g 阿胶34g。
【性状】	本品为黄棕色的颗粒；气微，味甜、微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，温经止痛。用于瘀血不尽，冲任不固所致的产后恶露不绝，症见恶露不止、色紫暗或有血块、小腹冷痛。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	宫瘤清片
【处方】	熟大黄240g 水蛭200g 蒲黄160g 枳实180g 地黄240g 土鳖虫200g 桃仁180g 黄芩120g 牡蛎240g 白芍180g 甘草60g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕色至棕褐色；气微香，味微甜、略苦。
【功能与主治】	活血逐瘀，消癥破积。用于瘀血内停所致的妇女癥瘕，症见小腹胀痛、经色紫黯有块、经行不爽；子宫肌瘤见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3片，一日3次，或遵医嘱。
【注意】	经期停药，孕妇禁用。
【规格】	(1)每片重0.4g。(2)每片重0.37g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	宫瘤清胶囊
【处方】	熟大黄，土鳖虫，水蛭，桃仁，蒲黄，黄芩，枳实，牡蛎，地黄，白芍，甘草。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味微甜、微苦。
【功能与主治】	活血逐瘀，消癥破积。用于瘀血内停所致的妇女癥瘕，症见小腹胀痛、经色紫黯有块、经行不爽；子宫肌瘤见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	经期停药，孕妇禁用。
【规格】	每粒装0.37g。
【贮藏】	密封。

【药名】	大黄廔虫丸
【处方】	熟大黄300g 土鳖虫(炒)30g 水蛭(制)60g 虻虫(去翅足，炒)45g 蛭螬(炒)45g 干漆(煨)30g 桃仁120g 炒苦杏仁120g 黄芩60g 地黄300g 白芍120g 甘草90g。
【性状】	本品为红棕色至棕褐色的大蜜丸；气特异，味甜、微涩、苦。
【功能与主治】	活血破瘀，通经消癥。用于瘀血内停所致的癥瘕、闭经，症见腹部肿块、肌肤甲错、面色黯黑、潮热羸瘦、经闭不行。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次3g，小蜜丸一次3~6丸，大蜜丸一次1~2丸，一日1~2次。
【注意】	孕妇禁用；皮肤过敏者停药。
【规格】	大蜜丸每丸重3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	桂枝茯苓丸
【处方】	桂枝100g 茯苓100g 牡丹皮100g 赤芍100g 桃仁100g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；味甜。
【功能与主治】	活血，化瘀，消癥。用于妇人宿有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，产后恶露不尽。
【用法与用量】	口服。一次1丸，一日1~2次。
【注意】	孕妇忌用，或遵医嘱；经期停药；偶见药后胃脘不适、隐痛，停药后可自行消失。
【规格】	每丸重6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	桂枝茯苓片
【处方】	桂枝240g 茯苓240g 牡丹皮240g 桃仁240g 白芍240g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；气微香，味微苦，
【功能与主治】	活血，化瘀，消癥。用于妇人瘀血阻络所致癥块、经闭、痛经、产后恶露不尽；子宫肌瘤，慢性盆腔炎包块，痛经，子宫内膜异位症，卵巢囊肿见上述证候者。

【用法与用量】	口服。一次3片，一日3次。饭后服，经期停药。3个月为一疗程，或遵医嘱。
【注意】	孕妇忌用，或遵医嘱；经期停药；偶见药后胃脘不适、隐痛，停药后可自行消失。
【规格】	每片重0.32g。
【贮藏】	密封。

【药名】	桂枝茯苓胶囊
【处方】	桂枝 240g 茯苓 240g 牡丹皮 240g 桃仁 240g 白芍 240g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	活血，化瘀，消癥。用于妇人瘀血阻络所致癥块、经闭、痛经、产后恶露不尽；子宫肌瘤，慢性盆腔炎包块，痛经，子宫内膜异位症，卵巢囊肿见上述证候者；也可用于女性乳腺囊性增生病属瘀血阻络证，症见乳房疼痛、乳房肿块、胸胁胀闷；或用于前列腺增生属瘀阻膀胱证，症见小便不爽、尿细如线、或点滴而下、小腹胀痛者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次。饭后服。前列腺增生疗程8周，其余适应症疗程12周，或遵医嘱。
【注意】	孕妇忌服，或遵医嘱；经期停药；偶见药后胃脘不适、隐痛，停药后可自行消失，
【规格】	每粒装0.31g。
【贮藏】	密封。

【药名】	益母草口服液
【处方】	益母草 500g。
【性状】	本品为棕红色的澄清液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少、淋漓不净、产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次10~20ml，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每支装10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	益母草片
【处方】	本品为益母草制成的浸膏片。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；味略苦。
【功能与主治】	活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少、淋漓不净、产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3~4片〔规格(1)、(2)〕，一日2~3次或一次1~2片〔规格(3)〕，一日3次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	(1)糖衣片(片心重0.25g)；(2)薄膜衣片每片重0.28g；(3)薄膜衣片每片重0.6g。

【贮藏】	密封。
【药名】	益母草胶囊
【处方】	益母草 2500g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕黄色至黄褐色的粉末；味苦。
【功能与主治】	活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少、淋漓不净、产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒，一日3次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每粒装0.36g(相当于饮片2.5g)。
【贮藏】	密封。
【药名】	益母草颗粒
【处方】	益母草 1350g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少、淋漓不净、产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	(1)每袋装15g；(2)每袋装5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。
【药名】	益母草膏
【处方】	本品为益母草经加工制成的煎膏。
【性状】	本品为棕黑色稠厚的半流体；气微，味苦、甜。
【功能与主治】	活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少、淋漓不净、产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次10g，一日1~2次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	(1)每瓶装125g；(2)每瓶装250g。
【贮藏】	密封。
【药名】	舒尔经颗粒
【处方】	当归，赤芍，醋延胡索，柴胡，桃仁，益母草，白芍，醋香附，陈皮，牡丹皮，牛膝。
【性状】	本品为浅棕黄色至棕黄色的颗粒；味苦、微甜。
【功能与主治】	活血疏肝，止痛调经。用于痛经；症见月经将至前便觉性情急躁、胸乳胀痛或乳房有块、小腹两侧或一侧胀痛、经初行不畅、色暗或有血块。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次，经前3日开始至月经行后2日止。
【注意】	忌辣及生冷，小腹冷痛者不宜服。
【规格】	每袋装10g。

【贮藏】	密封。
【药名】	鲜益母草胶囊
【处方】	鲜益母草。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为绿色的颗粒和粉末；气微，味苦。
【功能与主治】	活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少、淋漓不净、产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒，一日3次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

寒凝血瘀型痛经产后腹痛冷痛血块喜热拒按

【药名】	少腹逐瘀丸
【处方】	当归 300g 五灵脂(醋炒)200g 小茴香(盐炒)100g 没药(炒)100g 肉桂 100g 蒲黄 300g 赤芍 200g 延胡索(醋制)100g 川芎 100g 炮姜 20g。
【性状】	本品为棕黑色的大蜜丸；气芳香，味辛、苦。
【功能与主治】	温经活血，散寒止痛。用于寒凝血瘀所致的月经后期、痛经、产后腹痛，症见行经后错、行经小腹冷痛、经血紫暗、有血块、产后小腹疼痛喜热、拒按。
【用法与用量】	温黄酒或温开水送服。一次1丸，一日2~3次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	痛经丸
【处方】	当归 138g 川芎 69g 醋香附 138g 青皮 23g 延胡索 92g 肉桂 23g 菴蔚子 46g 益母草 551.7g 白芍 92g 熟地黄 184g 木香 23g 山楂(炭) 138g 炮姜 23g 丹参 138g 红花 46g 五灵脂(醋炒) 92g。
【性状】	本品为棕黑色的浓缩水丸，味苦。
【功能与主治】	温经活血，调经止痛。用于下焦寒凝血瘀所致的痛经、月经不调，症见经行错后、经量少有血块、行经小腹冷痛、喜暖。
【用法与用量】	口服。一次6~9g，一日1~2次，临经时服用。

【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每瓶装 60g。
【贮藏】	密封。

【药名】	艾附暖宫丸
【处方】	艾叶(炭)120g 醋香附 240g 制吴茱萸 80g 肉桂 20g 当归 120g 川芎 80g 白芍(酒炒)80g 地黄 40g 炙黄芪 80g 续断 60g。
【性状】	本品为深褐色至黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微，味甘而后苦、辛。
【功能与主治】	理气养血，暖宫调经。用于血虚气滞、下焦虚寒所致的月经不调、痛经，症见行经后错、经量少、有血块、小腹疼痛、经行小腹冷痛喜热、腰膝痠痛。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	痛经宝颗粒
【处方】	红花，当归，肉桂，三棱，莪术，丹参，五灵脂，木香，延胡索（醋制）。
【性状】	本品为黄色至棕黄色的颗粒，或为黄棕色至棕色的颗粒(无蔗糖)；气香，味甜、微苦，或味微甜、微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	温经化瘀，理气止痛。用于寒凝血滞血瘀，妇女痛经，少腹冷痛，月经不调，经色暗淡。
【用法与用量】	温开水冲服。一次 1 袋，一日 2 次，于月经前一周开始，持续至月经来三天后停药，连续服用 3 个月经周期。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 10g；(2) 每袋装 4g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

气虚血瘀型经闭经乱痛经血块恶露盆腔炎

【药名】	七制香附丸
【处方】	醋香附 550g 地黄 20g 茯苓 20g 当归 20g 熟地黄 20g 川芎 2g 炒白术 20g 白芍 20g 益母草 20g 艾叶(炭)10g 黄芩 10g 酒萸肉 10g 天冬 10g 阿胶 10g 炒酸枣仁 10g 砂仁 7.5g 醋延胡索 7.5g 艾叶 5g 粳米 5g 盐小茴香 5g 人参 5g 甘草 5g。
【性状】	本品为黄棕色至棕色的水丸；味咸、苦。
【功能与主治】	舒肝理气，养血调经。用于气滞血虚所致的痛经、月经量少、闭经，症见胸胁胀痛、经行量少、行经小腹胀痛、经前双乳胀痛、经水数月不行。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2 次。

【注意】	无。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密，防潮。

【药名】	止痛化癥片
【处方】	党参 75g 炒白术 45g 当归 75g 三棱 45g 芡实 75g 延胡索 75g 鱼腥草 150g 蜈蚣 1.8g 炙黄芪 150g 丹参 150g 鸡血藤 150g 莪术 45g 山药 75g 川楝子 45g 土鳖虫 75g 肉桂 15g 北败酱 150g 全蝎 75g 炮姜 22.5g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后，显棕褐色至褐色；气微香，味苦、微咸。
【功能与主治】	益气活血，散结止痛。用于气虚血瘀所致的月经不调、痛经、癥瘕，症见行经后错、经量少、有血块、经行小腹疼痛、腹有癥块；慢性盆腔炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片〔规格(1)(2)〕或一次 2~3 片〔规格(3)〕，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇忌用。
【规格】	(1) 每片重 0.3g；(2) 每片重 0.4g；(3) 每片重 0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	止痛化癥胶囊
【处方】	党参 75g 炒白术 45g 炙黄芪 150g 丹参 150g 当归 75g 三棱 45g 鸡血 150g 芡实 75g 延胡索 75g 鱼腥草 150g 蜈蚣 1.8g 土鳖虫 75g 肉桂 15g 莪术 45g 山药 75g 川楝子 45g 北败酱 150g 全蝎 75g 炮姜 22.5g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色或黑褐色颗粒；气微香，味苦、微咸。
【功能与主治】	益气活血，散结止痛。用于气虚血瘀所致的月经不调、痛经、癥瘕，症见行经后错、经量少、有血块、经行小腹疼痛、腹有癥块；慢性盆腔炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次 4~6 粒，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇忌用。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	妇科通经丸
【处方】	巴豆(制) 80g 醋香附 200g 大黄(醋炙) 160g 木香 225g 醋三棱 163g 黄芩 163g 醋鳖甲 163g 醋山甲 163g 干漆(炭) 160g 红花 225g 沉香 163g 醋莪术 163g 郁金 163g 艾叶(炭) 75g 硃砂(醋制) 100g。
【性状】	本品为朱红色的蜡丸，除去包衣后显黄褐色；气微，味微咸。
【功能与主治】	破瘀通经，软坚散结。用于气血瘀滞所致的闭经、痛经、癥瘕，症见经水日久不行、小腹疼痛、拒按、腹有癥块、胸闷、喜叹息。
【用法与用量】	每早空腹，小米汤或黄酒送服。一次 3g，一日 1 次。
【注意】	气血虚弱引起的经闭腹痛，便溏及孕妇忌服；服药期间，忌食生冷、辛辣食物及荞麦面等。
【规格】	每 10 丸重 1g。

【贮藏】	密封。
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>妇康宁片</p> <p>白芍 196g 当归 25g 醋艾炭 4g 党参 30g 香附 30g 三七 20g 麦冬 49g 益母草 147g。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显浅棕色至棕褐色；味微苦。</p> <p>养血理气，活血调经。用于血虚气滞所致的月经不调，症见月经周期后错、经水量少、有血块、经期腹痛。</p> <p>口服。一次 8 片，一日 2~3 次；或经前 4~5 天服用。</p> <p>孕妇慎用。</p> <p>(1) 薄膜衣片每片重 0.26g；(2) 糖衣片(片心重 0.25g)。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>产复康颗粒</p> <p>益母草，人参，何首乌，蒲黄，醋香附，白术，当归，黄芪，桃仁，熟地黄，昆布，黑木耳。</p> <p>本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦，或味微苦(无蔗糖)。</p> <p>补气养血，祛瘀生新。用于气虚血瘀所致的产后恶露不绝，症见产后出血过多、淋漓不断、神疲乏力，腰腿痠软。</p> <p>开水冲服。一次 20g〔规格(1)、(2)〕或 5g〔规格(3)〕，一日 3 次；5~7 日为一疗程；产褥期可长期服用。</p> <p>无。</p> <p>(1) 每袋装 20g；(2) 每袋装 10g；(3) 每袋装 5g(无蔗糖)。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>调经止痛片</p> <p>当归 320g 党参 213g 川芎 80g 香附(炒)80g 益母草 213g 泽兰 80g 大红花 213g。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显浅棕色至棕褐色；味甜、微麻涩。</p> <p>益气活血，调经止痛。用于气虚血瘀所致的月经不调、痛经、产后恶露不绝，症见经行后错、经水量少、有血块、行经小腹疼痛、产后恶露不净。</p> <p>口服。一次 6 片，一日 3 次。</p> <p>孕妇禁用。</p> <p>(1) 薄膜衣片每片重 0.35g。(2) 糖衣片(片心重 0.4g)。</p> <p>密封。</p>

气滞血瘀型经少经乱痛经恶露血块乳腺增生

【药名】	益母丸
【处方】	益母草 480g 当归 240g 川芎 120g 木香 45g。
【性状】	本品为棕褐色的小蜜丸或大蜜丸；气香，味苦、微甜。
【功能与主治】	行气活血，调经止痛。用于气滞血瘀所致的月经量少、错后、有血块、小腹疼痛、经行痛减、产后恶露不净。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 9g(45 丸)，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇及月经过多者禁用。
【规格】	小蜜丸每 100 丸重 20g；大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	调经丸
【处方】	当归 75g 酒白芍 75g 川芎 50g 熟地黄 100g 醋艾炭 50g 醋香附 200g 陈皮 50g 清半夏 50g 茯苓 59g 甘草 15g 炒白术 75g 制吴茱萸 25g 盐小茴香 25g 醋延胡索 25g 醋没药 25g 益母草 100g 牡丹皮 50g 续断 50g 酒黄芩 50g 麦冬 50g 阿胶 100g。
【性状】	本品为深褐色至黑色的水蜜丸或大蜜丸；气微，味苦、微甘辛。
【功能与主治】	理气活血，养血调经。用于气滞血瘀所致月经不调、痛经，症见月经延期、经期腹痛、经血量少、或有血块，或见经前乳胀、烦躁不安、崩漏带下。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇禁服。
【规格】	(1) 水蜜丸每 100 粒重 10g；(2) 大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	调经活血片
【处方】	木香 33.3g 川芎 33.3g 醋延胡索 33.3g 熟地黄 66.7g 红花 50g 白术 50g 醋香附 100g 泽兰 100g 当归 100g 赤芍 66.7g 乌药 50g 丹参 100g 制吴茱萸 16.7g 鸡血藤 100g 菟丝子 133.3g。
【性状】	本品为糖衣片，除去包衣后显棕色；气香，味苦。
【功能与主治】	养血活血，行气止痛。用于气滞血瘀兼血虚所致月经不调、痛经，症见经行错后、经水量少、行经小腹胀痛。
【用法与用量】	口服。一次 5 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁服。
【规格】	糖衣片(片心重 0.34g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	调经活血胶囊
【处方】	木香 33.3g 川芎 33.3g 醋延胡索 33.3g 熟地黄 66.7g 红花 50g 白术 50g 醋香附 100g 泽兰 100g 当归 100g 赤芍 66.7g 乌药 50g 丹参 100g 制吴茱萸 16.7g 鸡血藤 100g 菟丝子 133.3g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕色至棕色的颗粒和粉末；气香，味苦。
【功能与主治】	养血活血，行气止痛。用于气滞血瘀兼血虚所致月经不调、痛经，症见经行错后、经水量少、行经小腹胀痛。
【用法与用量】	口服。一次 5 粒〔规格(2)、(3)〕或一次 4 粒〔规格(1)〕，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁服。
【规格】	(1) 每粒装 0.38g(相当于饮片 1.292g)；(2) 每粒装 0.4g(相当于饮片 1.033g)；(3) 每粒装 0.41g(相当于饮片 1.033g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	得生丸
【处方】	益母草 600g 白芍 200g 木香 50g 当归 200g 柴胡 100g 川芎 50g。
【性状】	本品为黑棕色的大蜜丸；气微香，味苦。
【功能与主治】	养血化瘀，舒肝调经。用于气滞血瘀所致的月经不调、痛经，症见月经量少、有血块、经行后期或前后不定、经行小腹胀痛，或有瘀痕痞块。
【用法与用量】	口服，一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乳癖散结胶囊
【处方】	夏枯草 297g 僵蚕(麸炒) 119g 柴胡(醋制) 198g 玫瑰花 238g 当归(酒) 198g 牡蛎 297g 川芎(酒炙) 198g 鳖甲(醋制) 297g 赤芍(酒炒) 178g 莪术(醋制) 178g 延胡索(醋制) 178g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰褐色至棕褐色的颗粒和粉末；气微、味苦、微咸。
【功能与主治】	行气活血，软坚散结。用于气滞血瘀所致的乳腺增生病，症见乳房疼痛、乳房肿块、烦躁易怒、胸胁胀满。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次；45 天为一疗程，或遵医嘱。
【注意】	(1) 孕妇忌服。(2) 月经量过多者，经期慎服。(3) 偶见口干、恶心、便秘。一般不影响继续治疗，必要时对症处理。
【规格】	每粒装 0.53g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

气血两虚型经乱痛经淋漓不净肢体乏力

【药名】	八宝坤顺丸
【处方】	熟地黄 80g 地黄 80g 白芍 80g 当归 80g 川芎 80g 人参 40g 白术 80g 茯苓 80g 甘草 40g 益母草 40g 黄芩 80g 牛膝 40g 橘红 80g 沉香 40g 木香 16g 砂仁 40g 琥珀 40g。
【性状】	本品为黑褐色的大蜜丸，味微苦。
【功能与主治】	益气养血调经。用于气血两虚所致的月经不调、痛经，症见经期后错、经血量少、行经腹痛。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	八珍益母丸
【处方】	益母草 200g 党参 50g 炒白术 50g 茯苓 50g 甘草 25g 当归 100g 酒白芍 50g 川芎 50g 熟地黄 100g。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；微有香气，味甜而微苦。
【功能与主治】	益气养血，活血调经。用于气血两虚兼有血瘀所致的月经不调，症见月经周期错后、行经量少、淋漓不净、精神不振、肢体乏力。
【用法与用量】	口服，水蜜丸一次 6 g，小蜜丸一次 9 g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	八珍益母胶囊
【处方】	益母草 273g 党参 68g 炒白术 68g 茯苓 68g 甘草 34g 当归 137g 酒白芍 68g 川芎 68g 熟地黄 137g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为深棕色的颗粒和粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	益气养血，活血调经。用于气血两虚兼有血瘀所致的月经不调，症见月经周期错后、行经量少、淋漓不净、精神不振、肢体乏力。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次。
【注意】	无
【规格】	每粒装 0.28g。
【贮藏】	密封。

【药名】	女金丸
【处方】	当归 140g 白芍 70g 川芎 70g 熟地黄 70g 党参 55g 炒白术 70g 茯苓 70g 甘草 70g 肉桂 70g 益母草 200g 牡丹皮 70g 没药(制)70g 醋延胡索 70g 藁本 70g 白芷 70g 黄芩 70g 白薇 70g 醋香附 150g 砂仁 50g 陈皮 140g 煅赤石脂 70g 鹿角霜 150g 阿胶 70g。

【性状】	本品为棕褐色至黑棕色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；气芳香，味甜、微苦。
【功能与主治】	益气养血，理气活血，止痛。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调，症见月经提前、月经错后、月经量多、神疲乏力、经水淋漓不净、行经腹痛。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次5g，小蜜丸一次9g(45丸)，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	(1)对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。(2)孕妇慎用。(3)湿热蕴结者不宜使用。(4)忌食辛辣、生冷食物。(5)感冒时不宜服用。(6)平素月经正常突然出现月经过少或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊，治疗痛经，宜在经前3~5天开始服药，连服一周；服药后痛经不减轻或重度痛经者，应到医院诊治。
【规格】	(1)水蜜丸每10丸重2g；(2)小蜜丸每100丸重20g；(3)大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	女金胶囊
【处方】	当归89.6g 白芍44.8g 川芎44.8g 熟地黄44.8g 党参35.2g 麸炒白术44.8g 茯苓44.8g 甘草44.8g 肉桂44.8g 益母草128g 牡丹皮44.8g 醋没药44.8g 醋延胡索44.8g 藁本44.8g 白芷44.8g 黄芩44.8g 白薇44.8g 醋香附96g 砂仁32g 陈皮89.6g 煅赤石脂44.8g 鹿角霜96g 阿胶44.8g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的颗粒或粉末；气香，味微苦。
【功能与主治】	益气养血，理气活血，止痛。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调，症见月经提前、月经错后、月经量多、神疲乏力、经水淋漓不净、行经腹痛。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日2次。30天为一疗程。
【注意】	(1)对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。(2)孕妇慎用。(3)湿热蕴结者不宜使用。(4)忌食辛辣、生冷食物。(5)感冒时不宜服用。(6)平素月经正常突然出现月经过少或经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊，治疗痛经，宜在经前3~5天开始服药，连服一周；服药后痛经不减轻或重度痛经者，应到医院诊治。
【规格】	每粒装0.38g。
【贮藏】	密封。

【药名】	当归养血丸
【处方】	当归150 白芍(炒)150g 地黄400g 炙黄芪150g 阿胶150g 牡丹皮100g 香附(制)150g 茯苓150g 杜仲(炒)200g 白术(炒)200g。
【性状】	本品为暗棕色的水蜜丸；味甜、微苦。
【功能与主治】	益气养血调经。用于气血两虚所致的月经不调，症见月经提前、经血量少或量多、经期延长、肢体乏力。
【用法与用量】	口服。一次9g，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	无。

【贮藏】	密封。
【药名】	定坤丹
【处方】	本品为红参、鹿茸、西红花、三七、白芍、熟地黄、当归、白术、枸杞子、黄芩、香附、菟蔚子、川芎、鹿角霜、阿胶、延胡索等药味经加工制成的大蜜丸。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的大蜜丸；气微，味先甜而后苦、涩。
【功能与主治】	滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。
【用法与用量】	口服。一次半丸至1丸，一日2次。
【注意】	忌食生冷油腻及刺激性食物；伤风感冒时停用。
【规格】	每丸重10.8g。
【贮藏】	密封。

气血两亏型月经不调崩漏早产宫冷不孕

【药名】	参茸白凤丸
【处方】	人参8.2g 党参(炙)40g 熟地黄77.5g 酒白芍39g 延胡索(制)23g 酒续断30g 香附(制)31g 益母草(酒制)39g 桑寄生(蒸)21g 鹿茸(酒制)9.4g 酒当归39g 黄芪(酒制)39g 川芎(酒制)30g 胡芦巴(盐炙)30g 白术(制)30g 砂仁23g 酒黄芩30g 炙甘草30g。
【性状】	本品为棕褐色至黑色的水蜜丸或大蜜丸；气香，味微苦、甘。
【功能与主治】	益气补血，调经安胎。用于气血不足，月经不调，经期腹痛，经漏早产。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日1次。
【注意】	感冒发热者忌服；孕妇遵医嘱服用。
【规格】	大蜜丸每丸重9.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	天紫红女金胶囊
【处方】	炙黄芪53g 党参53g 山药(酒炒)53g 炙甘草13g 熟地黄53g 当归80g 阿胶(蛤粉制)53g 白术53g 茯苓40g 盐杜仲40g 川芎40g 陈皮27g 香附(醋盐炙)80g 肉桂27g 三七(熟)27g 砂仁(去壳盐炙)27g 桑寄生40g 益母草53g 盐小茴香13g 牛膝13g 木香13g 酒白芍53g 丁香7g 艾叶(醋炙)80g 盐益智仁27g 醋延胡索13g 肉苁蓉40g 酒续断40g 地榆(醋炙)53g 荆芥(醋炙)40g 酸枣仁(盐炙)53g 海螵蛸53g 麦冬27g 椿皮27g 酒黄芩53g 白薇13g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕红色的颗粒和粉末或粉末；气清香，味苦、微涩。
【功能与主治】	益气养血，补肾暖宫。用于气血两亏，肾虚宫冷，月经不调，崩漏带下，腰膝冷痛，宫冷不孕。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日2~3次。

【注意】	感冒发热者禁用。
【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	二十七味定坤丸
【处方】	西洋参 60g、白术 18g、茯苓 30g、熟地黄 30g、当归 24g、白芍 18g、川芎 18g、黄芪 24g、阿胶 18g、醋五味子 18g、鹿茸(去毛) 30g、肉桂 12g、艾叶(炒炭) 60g、杜仲(炒炭) 24g、续断 18g、佛手 12g、陈皮 18g、姜厚朴 6g、柴胡 18g、醋香附 12g、醋延胡索 18g、牡丹皮 18g、琥珀 12g、醋龟甲 18g、地黄 30g、麦冬 18g、黄芩 18g。
【性状】	本品为黑色的小蜜丸或大蜜丸；味苦、微甜。
【功能与主治】	补气养血，舒郁调经，用于冲任虚损，气血两亏，身体瘦弱，月经不调，经期紊乱，行经腹痛，崩漏不止，腰酸腿软。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 40 丸，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇忌服。注：艾叶(炒炭)取净艾叶，照炒炭法(通则 0213)炒至表面焦黑色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，晾干。
【规格】	(1)小蜜丸每 100 丸重 30g。(2)大蜜丸每丸重 12g。
【贮藏】	密封。

【药名】	培坤丸
【处方】	炙黄芪 48g、炙甘草 8g、北沙参 16g、酒当归 80g、川芎 16g、酒白芍 16g、杜仲炭 32g、盐胡芦巴 40g、龙眼肉 32g、制远志 4g、五味子(蒸) 8g、陈皮 32g、炒白术 48g、茯苓 32g、麦冬 32g、炒酸枣仁 32g、砂仁 9g、核桃仁 20g、醋艾炭 16g、山茱萸(制) 32g、熟地黄 64g。
【性状】	本品为黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味甜。
【功能与主治】	补气血，滋肝肾。用于妇女血亏，消化不良，月经不调，赤白带下，小腹冷痛，气血衰弱，久不受孕。
【用法与用量】	用黄酒或温开水送服。小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	抑郁气滞，内有湿者忌服。
【规格】	小蜜丸每 45 丸重 9g；大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

血虚气滞型经乱经痛赤白带下

【药名】	四制香附丸
【处方】	香附 400g 当归(炒)100g 炒白芍 100g 熟地黄 100g 川芎 100g 炒白术 75g 泽兰 75g 陈皮 75g 关黄柏 25g 炙甘草 25g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸；味苦、微甘。
【功能与主治】	理气和血，补血调经，用于血虚气滞，月经不调，胸腹胀痛。
【用法与用量】	口服。一次 9g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	四物合剂
【处方】	当归 250g 川芎 250g 白芍 250g 熟地黄 250g。
【性状】	本品为棕红色至棕褐色的液体；气芳香，味微苦、微甜。
【功能与主治】	养血调经。用于血虚所致的面色萎黄、头晕眼花、心悸气短及月经不调。
【用法与用量】	口服。一次 10~15ml，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每支装 10ml；(2) 每瓶装 100ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	四物益母丸
【处方】	熟地黄 400g 当归(酒炒)400g 川芎 100g 白芍(麸炒)100g 益母草 800g。
【性状】	本品为棕褐色至棕黑色的水蜜丸；气香，味微甜、苦涩。
【功能与主治】	补血，活血，调经。用于血虚血滞，月经不调。
【用法与用量】	口服。一次 9g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	四物颗粒
【处方】	当归 625g 川芎 625g 白芍 625g 熟地黄 625g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气芳香，味微苦、微甜。
【功能与主治】	养血调经。用于血虚所致的面色萎黄、头晕眼花、心悸气短及月经不调。
【用法与用量】	温开水冲服。一次 5g，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 5g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	当归调经颗粒
-------------	---------------

【处方】	当归 300g 熟地黄 20g 川芎 10g 白芍 20g 黄芪 20g 党参 20g 甘草 10g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气香，味甜、辛、微苦。
【功能与主治】	补血助气，调经。用于贫血衰弱，病后、产后血虚以及月经不调，痛经。
【用法与用量】	口服，一次 1 袋，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	调经养血丸
【处方】	当归 60g 炒白芍 30g 香附(制)100g 陈皮 10g 熟地黄 60g 川芎 30g 炙甘草 15g 大枣 80g 白术(炒)60g 续断 30g 砂仁 15g 酒黄芩 20g。
【性状】	本品为黑色的水蜜丸；气微香，味甘、微苦。
【功能与主治】	补血，理气，调经。用于血虚气滞，月经不调，腰酸腹胀，赤白带下。
【用法与用量】	口服。一次 9g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每 100 丸重 7.5g。
【贮藏】	密封。

阴虚血热型经多色黑赤白带下

【药名】	固经丸
【处方】	盐关黄柏 300g 酒黄芩 200g 麸炒椿皮 150g 醋香附 150g 炒白芍 300g 醋龟甲 400g。
【性状】	本品为黄色至黄棕色的水丸；味苦。
【功能与主治】	滋阴清热，固经止带。用于阴虚血热，月经先期，经血量多、色紫黑，赤白带下。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，防潮。

肝郁血虚型月经不调血块经期烦躁食欲不振

【药名】	妇科十味片
【处方】	醋香附 500g 当归 180g 白术 29g 大枣 100g 赤芍 15g 碳酸钙 65g 川芎 20g 醋延胡索 40g 甘草 14g 白芍 15g 熟地黄 60g。
【性状】	本品为黄褐色的片或薄膜衣片，薄膜衣片除去包衣后显黄褐色；气微香，味微苦。
【功能与主治】	养血舒肝，调经止痛。用于血虚肝郁所致月经不调、痛经、月经前后诸证，症见行经后错，经水量少、有血块，行经小腹疼痛，血块排出痛减，经前双乳胀痛、烦躁、食欲不振。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)素片每片重0.3g；(2)薄膜衣片每片重0.33g。
【贮藏】	密封。

【药名】	香附丸
【处方】	香附 300g 当归 200g 川芎 50g 炒白芍 100g 熟地黄 100g 炒白术 100g 砂仁 25g 陈皮 50g 黄芩 50g。
【性状】	本品为棕褐色的水蜜丸或大蜜丸；气香，味微甘、微苦辛。
【功能与主治】	舒肝健脾，养血调经。用于肝郁血虚、脾失健运所致的月经不调、月经前后诸症，症见行经前后不定期、经量或多或少、有血块，经前胸闷、心烦、双乳胀痛、食欲不振。
【用法与用量】	用黄酒或温开水送服。水蜜丸一次9~13g，大蜜丸一次1~2丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)水蜜丸每10丸重1g；(2)大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	香附丸(水丸)
【处方】	醋香附 300g 当归 200g 川芎 50g 炒白芍 100g 熟地黄 100g 炒白术 100g 砂仁 25g 陈皮 50g 黄芩 50g。
【性状】	本品为暗黄色至深褐色的水丸；气香，味苦辛。
【功能与主治】	舒肝健脾，养血调经。用于肝郁血虚、脾失健运所致的月经不调、月经前后诸症，症见行经前后不定期、经量或多或少、有血块，经前胸闷、心烦、双乳胀痛、食欲不振。
【用法与用量】	用黄酒或温开水送服。一次6~9g，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

肝郁脾肾虚弱型经乱痛经闭经崩漏晕眩腰酸膝酸软

【药名】	妇良片
【处方】	当归 75g 续断 75g 山药 75g 地榆炭 75g 煅牡蛎 75g 阿胶珠 75g 熟地黄 75g 白芍 75g 白术 75g 白芷 75g 海螵蛸 75g 血余炭 50g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；气微臭，味苦。
【功能与主治】	补血健脾，固经止带。用于血虚脾弱所致月经不调、带下病，症见月经过多、持续不断、崩漏色淡、经后少腹隐痛、头晕目眩、面色无华或带多清稀。
【用法与用量】	口服。一次 6 片，一日 3 次。
【注意】	带下腥臭、色红暴崩、紫色成块及经前、经期腹痛患者慎服。
【规格】	片心重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	妇科养坤丸
【处方】	熟地黄 119g 地黄 119g 当归(酒蒸) 119g 酒黄芩 119g 木香 119g 香附(酒醋制) 80g 蔓荆子(酒蒸) 119g 甘草 80g 川芎(酒) 60g 延胡索(酒醋制) 60g 郁金 60g 盐杜仲 80g 酒白芍 80g 砂仁 60g。
【性状】	本品为棕褐色的水蜜丸或大蜜丸；气香，味苦、微辛。
【功能与主治】	疏肝理气，养血活血。用于血虚肝郁所致的月经不调，闭经，痛经，经期头痛。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 7.5g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	水蜜丸每 100 丸重 10g；大蜜丸每丸重 11.3g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	妇科调经片
【处方】	当归 144g 醋香附 400g 白芍 12g 醋延胡索 32g 大枣 80g 川芎 16g 麸炒白术 23g 赤芍 12g 熟地黄 48g 甘草 11g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色或黑棕色；味苦、辛。
【功能与主治】	养血柔肝，理气调经。用于肝郁血虚所致的月经不调、经期前后不定、行经腹痛。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 4 次。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重 0.32g。
【贮藏】	密封。

【药名】	千金止带丸(大蜜丸)
【处方】	党参 50g 炒白术 50g 当归 100g 白芍 50g 川芎 100g 醋香附 200g 木香 50g 砂仁 50g 小茴香(盐炒) 50g 醋延胡索 50g 盐杜仲 50g 续断 50g 盐补骨脂 50g 鸡冠花 200g 青黛 50g 椿皮(炒) 200g 煅牡蛎 50g。

【性状】	本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味甜、涩、微苦。
【功能与主治】	健脾补肾，调经止带。用于脾肾两虚所致的月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块，或带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝痠软。
【用法与用量】	口服。一1次1丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重9g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	千金止带丸(水丸)
【处方】	党参 50g 炒白术 50g 当归 100g 白芍 50g 川芎 100g 醋香附 200g 木香 50g 砂仁 50g 小茴香(盐炒)50g 醋延胡索 50g 盐杜仲 50g 续断 50g 盐补骨脂 50g 鸡冠花 200g 青黛 50g 椿皮(炒)200g 煅牡蛎 50g。
【性状】	本品为灰黑色的水丸；气微香，味涩、微苦。
【功能与主治】	健脾补肾，调经止带。用于脾肾两虚所致的月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块，或带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝痠软。
【用法与用量】	口服。一次6~9g，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	妇宝颗粒
【处方】	地黄，盐续断，麦冬，酒白芍，甘草，莲房炭，忍冬藤，杜仲叶(盐炙)，炒川楝子，醋延胡索，侧柏叶(炒)，大血藤。
【性状】	本品为棕黄色至棕色的颗粒；味甜、微苦或味苦、微甜(无蔗糖)。
【功能与主治】	益肾和血，理气止痛。用于肾虚夹瘀所致的腰痠腿软、小腹胀痛、白带、经漏；慢性盆腔炎、附件炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次2袋，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装10g。(2)每袋装5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

肝肾不足肾虚气血虚弱型流产早产保胎胎漏胎动

【药名】	孕康合剂(孕康口服液)
【处方】	山药，续断，黄芪，当归，狗脊(去毛)，桑寄生，补骨脂，茯苓，阿胶，山茱萸，乌梅，砂仁，苈麻根，艾叶，菟丝子，杜仲(炒)，党参，白术(焦)，地黄，枸杞子，白芍，益智，黄芩。
【性状】	本品为棕褐色的液体，气微，味甜。
【功能与主治】	健脾固肾，养血安胎。用于肾虚型和气血虚弱型先兆流产和习惯性流产。
【用法与用量】	口服。早、中、晚空腹口服，一次20ml，一日3次。
【注意】	(1)服药期间，忌食辛辣刺激性食物，避免剧烈运动以及重体力劳动。(2)凡难免流产、异位妊娠、葡萄胎等非本品适用范围。
【规格】	(1)每瓶装10ml；(2)每瓶装20ml；(3)每瓶装100ml。
【贮藏】	遮光，密封，置阴凉处。

【药名】	孕康颗粒
【处方】	山药，续断，黄芪，当归，狗脊(去毛)，菟丝子，桑寄生，盐杜仲，补骨脂，党参，茯苓，炒白术，阿胶，地黄，山茱萸，枸杞子，乌梅，白芍，砂仁，益智，苈麻根，黄芩，艾叶。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒，味甜、微苦。
【功能与主治】	健脾固肾，养血安胎。用于肾虚型和气血虚弱型先兆流产和习惯性流产。
【用法与用量】	开水冲服。早、中、晚空腹口服，一次1袋，一日3次。
【注意】	(1)服药期间，忌食辛辣刺激性食物，避免剧烈运动以及重体力劳动。(2)凡难免流产、异位妊娠、葡萄胎等非本品适用范围。
【规格】	每袋装8g。
【贮藏】	避光，密封，置阴凉处。

【药名】	参茸保胎丸
【处方】	党参66g 龙眼肉20g 菟丝子(盐炙)33g 香附(醋制)41g 茯苓58g 山药50g 艾叶(醋制)41g 白术(炒)50g 黄芩66g 熟地黄41g 白芍41g 阿胶41g 炙甘草28g 当归50g 桑寄生41g 川芎(酒制)41g 羌活20g 续断41g 鹿茸20g 杜仲58g 川贝母20g 砂仁33g 化橘红41g。
【性状】	本品为深褐色的水蜜丸；味甜、微辛。
【功能与主治】	滋养肝肾，补血安胎。用于肝肾不足，营血亏虚，身体虚弱，腰膝痠痛，少腹坠胀，妊娠下血，胎动不安。
【用法与用量】	口服。一次15g，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	春血安胶囊
【处方】	熟地黄，盐车前子，茯苓，柴胡，牛膝，五味子(酒蒸)，肉桂，泽泻，三

【性状】	七，附片(黑顺片)，山药，黄连，牡丹皮。
【功能与主治】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至深棕色的颗粒和粉末；气辛，味微酸、微苦。
【用法与用量】	益肾固冲，调经止血。用于肝肾不足，冲任失调所致的月经失调、崩漏、痛经，症见经行错后、经水量多或淋漓不净、经行小腹冷痛、腰部疼痛；青春期功能失调性子宫出血、上节育环后出血见上述证候者。
【注意】	口服。一次4粒，一日3次；或遵医嘱。
【规格】	无。
【贮藏】	每粒装0.5g。
	密封。

【药名】	保胎丸
【处方】	熟地黄 125g 荆芥穗 50g 槲寄生 150g 黄芪 200g 醋艾炭 200g 平贝母 100g 菟丝子(酒炙) 200g 炒白术 200g 麸炒枳壳 150g 砂仁 125g 黄芩 100g 姜厚朴 50g 甘草 25g 川芎 150g 白芍 200g 羌活 25g 当归 200g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甘、微辛。
【功能与主治】	益气养血，补肾安胎。用于气血不足、肾气不固所致的胎漏、胎动不安，症见小腹坠痛，或见阴道少量出血，或屡经流产，伴神疲乏力、腰膝痠软。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)小蜜丸每100丸重20g；(2)大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

肝气郁结型乳癖乳房结节胀痛乳腺增生

【药名】	乳宁颗粒
【处方】	柴胡，当归，醋香附，丹参，炒白芍，王不留行，赤芍，炒白术，茯苓，青皮，陈皮，薄荷。
【性状】	本品为浅黄色至黄棕色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	疏肝养血，理气解郁。用于肝气郁结所致的乳癖，症见经前乳房胀痛、两胁胀痛、乳房结节、经前疼痛加重；乳腺增生见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次；20天为一疗程，或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎服。

【规格】	每袋装 15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乳块消片
【处方】	橘叶 825g 丹参 825g 皂角刺 550g 王不留行 550g 川楝子 550g 地龙 550g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦。
【功能与主治】	疏肝理气，活血化痰，消散乳块。用于肝气郁结，气滞血瘀，乳腺增生，乳房胀痛。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.36g。(2) 糖衣片片心重 0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乳块消胶囊
【处方】	橘叶 825g 丹参 825g 皂角刺 550g 王不留行 550g 川楝子 550g 地龙 550g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色颗粒，味苦。
【功能与主治】	疏肝理气，活血化痰，消散乳块。用于肝气郁结，气滞血瘀，乳腺增生，乳房胀痛。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乳核散结片
【处方】	柴胡，当归，黄芪，郁金，光慈菇，漏芦，昆布，海藻，淫羊藿，鹿衔草。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显棕褐色；味酸、辛涩
【功能与主治】	舒肝活血，祛痰软坚。用于肝郁气滞、痰瘀互结所致的乳癖，症见乳房肿块或结节、数目不等、大小不一、质软或中等硬、或乳房胀痛、经前疼痛加剧；乳腺增生病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1) 糖衣片(片心重 0.34g)。(2) 薄膜衣片每片重 0.36g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乳疾灵颗粒
【处方】	柴胡，醋香附，青皮，赤芍，丹参，炒王不留行，鸡血藤，牡蛎，海藻，昆布，淫羊藿，菟丝子。
【性状】	本品为棕黄色或棕褐色的颗粒；味苦、微甜。
【功能与主治】	舒肝活血，祛痰软坚。用于肝郁气滞、痰瘀互结所致的乳癖，症见乳房肿块或结节、数目不等、大小不一、质软或中等硬、或经前疼痛；乳腺增生病见上述证候者。

【用法与用量】	开水冲服。一次1~2袋，一日3次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每袋装14g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乳康丸
【处方】	牡蛎75g 乳香30g 瓜蒌75g 海藻60g 黄芪120g 没药30g 天冬60g 夏枯草75g 三棱30g 玄参60g 白术60g 浙贝母30g 莪术30g 丹参75g 炒鸡内金30g。
【性状】	本品为褐色或棕褐色浓缩水丸；或黑色包衣浓缩水丸；或薄膜衣浓缩水蜜丸，除去包衣后呈褐色或棕褐色；气微香，味苦、微辛。
【功能与主治】	舒肝活血，祛痰软坚。用于肝郁气滞、痰瘀互结所致的乳癖，症见乳房肿块或结节、数目不等、大小不一、质软或中等硬、或经前疼痛；乳腺增生病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次10~15丸〔规格(1)〕，一次6~9丸〔规格(2)〕，一日2次，饭后服用；20天为一个疗程，间隔5~7天继续第二个疗程，亦可连续用药。
【注意】	(1) 偶见患者服药后有轻度恶心、腹泻、月经期提前、量多及轻微药疹。一般停药后自愈。(2) 孕妇慎用(前三个月内禁用)，女性患者宜于月经来潮前10~15天开始服用。经期停用。
【规格】	(1) 每20丸重1g；(2) 每10丸重1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乳康胶囊
【处方】	牡蛎75g 乳香30g 瓜蒌75g 海藻60g 黄芪120g 没药30g 天冬60g 夏枯草75g 三棱30g 玄参60g 白术60g 浙贝母30g 莪术30g 丹参75g 炒鸡内金30g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；味苦、微辛。
【功能与主治】	舒肝活血，祛痰软坚。用于肝郁气滞、痰瘀互结所致的乳癖，症见乳房肿块或结节、数目不等、大小不一、质软或中等硬、或经前疼痛；乳腺增生病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2~3粒，一日2次，饭后服用。20天为一个疗程，间隔5~7天继续第二个疗程，亦可连续用药。
【注意】	(1) 偶见患者服药后有轻度恶心、腹泻、月经期提前、量多及轻微药疹。一般停药后自愈。(2) 孕妇慎服(前三个月内禁用)、女性患者宜于月经来潮前10~15天开始服用。经期停用。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乳增宁胶囊
【处方】	艾叶，淫羊藿，柴胡，川楝子，天冬，土贝母。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气微，味苦。
【功能与主治】	疏肝散结，调理冲任。用于冲任失调、气郁痰凝所致乳癖，症见乳房结节、一个或多个、大小形状不一、质柔软，或经前胀痛、或腰痠乏力、经少色

【用法与用量】	淡；乳腺增生病见上述证候者。
【注意】	口服。一次4粒，一日3次。
【规格】	孕妇慎用。
【贮藏】	每粒装0.5g。
	密封。

脾肾阳虚瘀血阻滞型月经不调冷痛血块久不受孕

【药名】	调经促孕丸
【处方】	鹿茸(去毛)5g 炙淫羊藿10g 仙茅10g 续断10g 桑寄生10g 菟丝子15g 枸杞子10g 覆盆子10g 山药30g 莲子(去芯)10g 茯苓15g 黄芪10g 白芍15g 炒酸枣仁10g 钩藤10g 丹参15g 赤芍15g 鸡血藤30g。
【性状】	本品为棕褐色的水蜜丸；味甘、微苦。
【功能与主治】	温肾健脾，活血调经。用于脾肾阳虚、瘀血阻滞所致的月经不调、闭经、痛经、不孕，症见月经后错、经水量少、有血块、行经小腹冷痛、经水日久不行、久不受孕、腰膝冷痛。
【用法与用量】	口服。一次5g(50丸)，一日2次。自月经周期第五天起连服20天；无周期者每月连服20天，连服三个月或遵医嘱。
【注意】	阴虚火旺、月经量过多者不宜服用。
【规格】	每100丸重10g。
【贮藏】	密封。

脾虚湿盛型带下量多色白质稀纳少腹胀便溏

【药名】	除湿白帶丸
【处方】	党参80g 炒白术100g 山药100g 白芍50g 芡实50g 车前子(炒)50g 当归30g 苍术30g 陈皮30g 白果仁50g 荆芥炭15g 柴胡12g 黄柏炭12g 茜草12g 海

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>蝶蛸 40g 煅牡蛎 40g。</p> <p>本品为灰褐色的水丸；气微，味淡。</p> <p>健脾益气，除湿止带。用于脾虚湿盛所致带下病，症见带下量多、色白质稀、纳少、腹胀、便溏。</p> <p>口服。一次 6~9 g，一日 2 次。</p> <p>无。</p> <p>每 20 丸重 1g。</p> <p>密封。</p>
---	--

湿热下注型带下病阴道盆腔炎症瘙痒宫颈糜烂

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>白带丸</p> <p>黄柏(酒炒) 150g 白芍 100g 醋香附 50g 椿皮 300g 当归 100g。</p> <p>本品为黄棕色至黑棕色的浓缩水丸；味苦。</p> <p>清热，除湿，止带。用于湿热下注所致的带下病，症见带下量多、色黄、有味。</p> <p>口服。一次 6g，一日 2 次。</p> <p>无。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>妇必舒阴道泡腾片</p> <p>苦参 120g 蛇床子 180g 大黄 120g 百部 120g 乌梅 120g 硼砂 90g 冰片 15g 白矾 15g 甘草 120。</p> <p>本品为灰褐色至褐色的片；气芳香。</p> <p>清热燥湿，杀虫止痒。主要用于妇女湿热下注证所致的白带增多、阴部瘙痒。</p> <p>临睡前洗净外阴和手，戴上一次性指套将本品塞入阴道深部。一次 2 片，一日 1 次，8 日为一疗程。</p> <p>无。</p> <p>每片重 0.8g。</p> <p>密封，遮光，置阴凉干燥处。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p>	<p>抗宫炎片</p> <p>广东紫珠干浸膏 167g 益母草干浸膏 44g 乌药干浸膏 39g。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味涩、微苦。</p> <p>清热，祛湿，化瘀止带。用于湿热下注所致的带下病，症见赤白带下、量多臭味；宫颈糜烂见上述证候者。</p> <p>口服。一次 6 片〔规格(1)〕或一次 3 片〔规格(2)〕，或一次 4 片〔规格(3)〕，一日 3 次。</p>
--	---

【注意】	孕妇禁服；偶见头晕及轻度消化道反应。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.26g(含干浸膏 0.25g)；(2) 薄膜衣片每片重 0.52g(含干浸膏 0.5g)；(3) 糖衣片(片心重 0.42g)(含干浸膏 0.375g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	抗宫炎胶囊
【处方】	广东紫珠干浸膏 334g 益母草干浸膏 88g 乌药干浸膏 78g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色颗粒和粉末；气微，味涩、微苦。
【功能与主治】	清热，祛湿，化瘀，止带。用于湿热下注所致的带下病，症见赤白带下、量多臭味；宫颈糜烂见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁服；偶见头晕及轻度消化道反应。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	抗宫炎颗粒
【处方】	广东紫珠 3306.6g 益母草 369.6g 乌药 421.2g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微，味甜、微涩、微苦。
【功能与主治】	清热，祛湿，化瘀，止带。用于湿热下注所致的带下病，症见赤白带下、量多臭味；宫颈糜烂见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	治糜康栓
【处方】	黄柏 500g 苦参 500g 儿茶 500g 枯矾 400g 冰片 100g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的鸭嘴形栓剂。
【功能与主治】	清热解毒，燥湿收敛。用于湿热下注所致带下病，症见带下量多、色黄质稠、有臭味，或有大便干燥；细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、宫颈糜烂见上述证候者。
【用法与用量】	每次 1 粒，隔一日 1 次，睡前清洗外阴部，将栓剂推入阴道深部，十日为一疗程。
【注意】	月经期停用。
【规格】	每粒重 3g。
【贮藏】	30℃以下密闭保存。

【药名】	复方杏香兔耳风颗粒
【处方】	杏香兔耳风 1389g 白术(漂) 556g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、苦或味微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	清热化湿，祛瘀生新。用于湿热下注所致的带下，症见带下量多、色黄，

【用法与用量】	小腹隐痛；宫颈糜烂、阴道炎、慢性盆腔炎见上述证候者。 开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装18g(含生药35g)；(2)每袋装9g(无蔗糖，含生药35g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	消糜栓
【处方】	人参茎叶皂苷25g 黄柏500g 枯矾400g 儿茶500g 紫草500g 苦参500g 冰片200g。
【性状】	本品为褐色至棕褐色的栓剂；气特异。
【功能与主治】	清热解毒，燥湿杀虫，祛腐生肌。用于湿热下注所致的带下病，症见带下量多、色黄、质稠、腥臭、阴部瘙痒；滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、非特异性阴道炎、宫颈糜烂见上述证候者。
【用法与用量】	阴道给药。一次1粒，一日1次。
【注意】	妊娠期忌用。
【规格】	每粒重3g。
【贮藏】	30℃以下密闭保存。

【药名】	康妇软膏
【处方】	白芷145g 花椒145g 冰片30g 蛇床子145g 土木香30g。
【性状】	本品为淡黄棕色的软膏；气清香。
【功能与主治】	祛风燥湿，杀虫止痒。用于湿热下注所致的阴痒、带下病，症见外阴红肿、瘙痒、带下量多、色黄；外阴炎、外阴溃疡、阴道炎见上述证候者。
【用法与用量】	外用。涂于洗净的患处，一日2~4次。
【注意】	无。
【规格】	每管装10g。
【贮藏】	密闭，避光。

湿热瘀阻型带下腹痛盆腔子宫炎宫颈炎附件炎带下病月经不调

【药名】	妇乐颗粒
-------------	-------------

【处方】	忍冬藤 1126g 甘草 113g 蒲公英 338g 赤芍 338g 醋延胡索 338g 大血藤 1126g 大青叶 338g 牡丹皮 338g 川楝子 338g 熟大黄 225g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热凉血，化瘀止痛。用于瘀热蕴结所致的带下病，症见带下量多、色黄，少腹疼痛；慢性盆腔炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 12g，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1) 每袋装 6g；(2) 每袋装 12g。
【贮藏】	密封。

【药名】	妇炎净胶囊
【处方】	苦玄参，当归，两面针，柿叶，五指毛桃，地胆草，鸡血藤，横经席，蕲蕈。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的粉末；气微香，味苦。
【功能与主治】	清热祛湿，调经止带。用于湿热蕴结所致的带下病、月经不调、痛经；慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒〔规格(2)〕或 4 粒〔规格(1)〕一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1) 每粒装 0.3g(相当于饮片 2.44g)；(2) 每粒 0.4g(相当于饮片 3.25g)
【贮藏】	密封。

【药名】	妇炎康片
【处方】	赤芍 60g 醋三棱 60g 醋莪术 60g 炒芡实 100g 苦参 60g 黄柏 60g 土茯苓 100g 炒川楝子 60g 醋延胡索 60g 当归 100g 醋香附 40g 丹参 100g 山药 120g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；气微，味微苦。
【功能与主治】	清热利湿，理气活血，散结消肿。用于湿热下注、毒瘀互阻所致带下病，症见带下量多、色黄、气臭，少腹痛，腰骶痛，口苦咽干；阴道炎、慢性盆腔炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 6 片〔规格(1)、(3)〕或一次 3 片〔规格(2)〕，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.25g；(2) 薄膜衣片每片重 0.52g；(3) 糖衣片(片心重 0.25g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	妇科千金片
【处方】	千斤拔，金樱根，穿心莲，功劳木，单面针，当归，鸡血藤，党参。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显灰褐色；味苦。
【功能与主治】	清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病、腹痛；症见带下量多、色黄质稠、臭秽，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 6 片，一日 3 次。
【注意】	无。

【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	妇科千金胶囊
【处方】	千斤拔，金樱根，穿心莲，功劳木，单面针，当归，鸡血藤，党参。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末和颗粒；气微；味苦。
【功能与主治】	清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病、腹痛；症见带下量多、色黄质稠、臭秽，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2粒，一日3次，14天为一疗程，温开水送服。
【注意】	孕妇禁用；忌食辛辣。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	花红片
【处方】	一点红，白花蛇舌草，鸡血藤，桃金娘根，白背叶根，地桃花，薏苡。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显灰褐色至棕褐色；味微苦、咸。
【功能与主治】	清热解毒，燥湿止带，祛瘀止痛。用于湿热瘀滞所致带下病、月经不调，症见带下量多、色黄质稠、小腹隐痛、腰骶酸痛、经行腹痛；慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4~5片，一日3次，7天为一疗程，必要时可连服2~3个疗程，每疗程之间停药3天。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣，片每片重0.29g；(2)糖衣片(片心重0.28g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	花红胶囊
【处方】	一点红1667g 白花蛇舌草1000g 鸡血藤1333g 桃金娘根1667g 白背叶根1000g 地桃花1667g 薏苡1000g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的颗粒和粉末；味微苦、咸。
【功能与主治】	清热解毒，燥湿止带，祛瘀止痛。用于湿热瘀滞所致带下病、月经不调，症见带下量多、色黄质稠、小腹隐痛、腰骶酸痛、经行腹痛；慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次，7天为一疗程，必要时可连服2~3个疗程，每疗程之间停药3天。
【注意】	孕妇禁用；妇女经期、哺乳期慎用。
【规格】	每粒装0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	花红颗粒
【处方】	一点红，白花蛇舌草，鸡血藤，桃金娘根，白背叶根，地桃花，薏苡。

【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、苦或味微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	清热解毒，燥湿止带，祛瘀止痛。用于湿热瘀滞所致带下病、月经不调，症见带下量多、色黄质稠、小腹隐痛、腰骶酸痛、经行腹痛；慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次，7天为一疗程，必要时可连服2~3个疗程，每疗程之间停药3天。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装10g；(2)每袋装2*5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	妇科止带片
【处方】	椿皮 363g 五味子 64g 黄柏 363g 龟甲 242g 茯苓 363g 阿胶 120g 山药 363g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的片，或为薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；气微，味苦、微酸腥。
【功能与主治】	清热燥湿，收敛止带。用于慢性宫颈炎，子宫内膜炎，阴道炎所致湿热型带下病。
【用法与用量】	口服。一次4~6片，一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)素片每片重0.35g；(2)薄膜衣片每片重0.36g；(3)薄膜衣片每片重0.4g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	保妇康栓
【处方】	莪术油 82g 冰片 75g。
【性状】	本品呈乳白色、乳黄色或棕黄色的子弹形。
【功能与主治】	行气破瘀，生肌止痛。用于湿热瘀滞所致的带下病，症见带下量多、色黄、时有阴部瘙痒；霉菌性阴道炎、老年性阴道炎、宫颈糜烂见上述证候者。
【用法与用量】	洗净外阴部，将栓剂塞入阴道深部；或在医生指导下用药。每晚1粒。
【注意】	孕妇禁用，哺乳期妇女在医生指导下用药。
【规格】	每粒重1.74g。
【贮藏】	密闭，避光，在30℃以下保存。

【药名】	宫宁颗粒
【处方】	茜草 195g 蒲黄 156g 三七 78g 地榆 390g 黄芩 117g 地黄 195g 仙鹤草 390g 海螵蛸 390g 党参 234g 白芍 195g 甘草 78g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味苦、微甜。
【功能与主治】	化瘀清热，固经止血。用于瘀热所致的月经过多、经期延长；放置宫内节育器后引起的子宫异常出血见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次，连服7天。月经过多者于经前2天或来经时开始服药，经期延长者于经期第3天开始服药。
【注意】	无。
【规格】	每袋装10g。

【贮藏】	密封。
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>安宫止血颗粒</p> <p>益母草 2184g 马齿苋 2184g。</p> <p>本品为浅棕褐色至浅褐色的颗粒，气微，味苦或味甜、苦。</p> <p>活血化瘀，清热止血。用于瘀热内蕴所致的恶露不净，症见恶露不止、小腹疼痛、口燥咽干；人工流产及产后子宫复位不全见上述证候者。</p> <p>温开水冲服。一次1袋，一日3次，7~10天为一疗程。</p> <p>孕妇忌用。</p> <p>每袋装(1)4g；(2)5g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>宫血宁胶囊</p> <p>重楼 2000g。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为浅黄棕色至灰棕色的粉末；味苦。</p> <p>凉血止血，清热除湿，化瘀止痛。用于崩漏下血，月经过多，产后或流产后宫缩不良出血及子宫功能性出血属血热妄行证者，以及慢性盆腔炎之湿热瘀结所致的少腹痛、腰骶痛、带下增多。</p> <p>月经过多或子宫出血期：口服，一次1~2粒，一日3次，血止停药。慢性盆腔炎：口服。一次2粒，一日3次，4周为一疗程。</p> <p>无。</p> <p>每粒装0.13g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>宫炎平片</p> <p>地稔 450g 当归 140g 柘木 140g 两面针 170g 五指毛桃 100g。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅棕褐色至棕黑色；气微，味苦、酸、涩。</p> <p>清热利湿，祛瘀止痛，收敛止带。用于湿热瘀阻所致带下病，症见小腹隐痛，经色紫暗、有块，带下色黄质稠；慢性盆腔炎见上述证候者。</p> <p>口服。一次3~4片，一日3次，</p> <p>无。</p> <p>(1)薄膜衣片每片重0.26g；(2)糖衣片(片心重0.25g)。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p>	<p>宫炎平滴丸</p> <p>地稔 90g 两面针 34g 当归 28g 五指毛桃 20g 穿破石 28g。</p> <p>本品为棕色至棕黑色的滴丸；味微苦。</p> <p>清热利湿，祛瘀止痛，收敛止带。用于湿热瘀阻所致带下病，症见小腹隐痛，经色紫暗、有块，带下色黄质稠；慢性盆腔炎见上述证候者。</p> <p>口服。一次15~20丸，一日3次。</p>

【注意】	无。
【规格】	每丸重 50mg。
【贮藏】	密封。

【药名】	康妇消炎栓
【处方】	苦参，紫花地丁，蒲公英，紫草(新疆紫草)，败酱草，穿心莲，猪胆粉，芦荟。
【性状】	本品为黑褐色的栓剂。
【功能与主治】	清热解毒，利湿散结，杀虫止痒。用于湿热、湿毒所致的带下病、阴痒，症见下腹胀痛或腰骶胀痛，带下量多，色黄，阴部瘙痒，或有低热，神疲乏力，便干或溏而不爽，小便黄；盆腔炎、附件炎、阴道炎见上述证候者。
【用法与用量】	直肠给药，一次 1 粒，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒重 2.8g。
【贮藏】	密封。

湿热瘀阻下焦型热淋尿频尿急尿痛尿赤浑浊

【药名】	妇科分清丸
【处方】	当归 200g 白芍 100g 川穹 150g 地黄 200g 栀子 100g 黄连 50g 石韦 50g 海金沙 25g 甘草 100g 木通 100g 滑石 150。
【性状】	本品为黄色的水丸；味苦。
【功能与主治】	清热利湿，活血止痛。用于湿热瘀阻下焦所致妇女热淋证，症见尿频、尿急、尿少涩痛、尿赤浑浊。
【用法与用量】	口服。一次 9g，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

痰瘀互结气滞型痛经经乱包块不孕子宫内膜异位症

【药名】	散结镇痛胶囊
【处方】	龙血竭 62g 三七 62g 浙贝母 100g 薏苡仁 176g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为红褐色的颗粒及粉末；气香，味甘、苦。
【功能与主治】	软坚散结，化瘀定痛。用于痰瘀互结兼气滞所致的继发性痛经、月经不调、盆腔包块、不孕；子宫内膜异位症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。于月经来潮第一天开始服药，连服 3 个月经

【注意】	周期为一疗程，或遵医嘱。
【规格】	无。
【贮藏】	每粒装 0.4g 密封，置阴凉处。

痰热互结型的乳癖乳痛增生乳腺增生乳腺炎

【药名】	乳癖消片
【处方】	鹿角，蒲公英，昆布，天花粉，鸡血藤，三七，赤芍，海藻，漏芦，木香，玄参，牡丹皮，夏枯草，连翘，红花。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色至棕黑色；气微，味苦、咸。
【功能与主治】	软坚散结，活血消痈，清热解毒。用于痰热互结所致的乳癖、乳痛，症见乳房结节、数目不等、大小形态不一、质地柔软，或产后乳房结块、红热疼痛；乳腺增生、乳腺炎早期见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5~6 片〔规格(1)(3)〕，一次 3 片〔规格(2)〕，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.34g；(2) 薄膜衣片每片重 0.67g；(3) 糖衣片(片心重 0.32g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	乳癖消胶囊
【处方】	鹿角，蒲公英，昆布，天花粉，鸡血藤，三七，赤芍，海藻，漏芦，木香，玄参，牡丹皮，夏枯草，连翘，红花。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰褐色至棕褐色的颗粒和粉末；气微，味苦、咸。
【功能与主治】	软坚散结，活血消痈，清热解毒。用于痰热互结所致的乳癖、乳痛，症见乳房结节、数目不等、大小形态不一、质地柔软，或产后乳房结块、红热疼痛；乳腺增生、乳腺炎早期见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5~6 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	每粒装 0.32g。
【贮藏】	密封。

【药名】	乳癖消颗粒
【处方】	蒲公英 44.5g 天花粉 17.8g 三七 44.5g 海藻 86.8g 木香 35.6g 牡丹皮 62.3g 连翘 17.8g 鹿角 66.8g 昆布 173.5g 鸡血藤 44.5g 赤芍 13.4g 漏芦 26.7g 玄参 44.5g 夏枯草 44.5g 红花 26.7g。
【性状】	本品为棕褐色至棕黑色的颗粒；气微，味微甜。
【功能与主治】	软坚散结，活血消痈，清热解毒。用于痰热互结所致的乳癖、乳痛，症见乳房结节、数目不等、大小形态不一、质地柔软，或产后乳房结块、红热疼痛；乳腺增生、乳腺炎早期见上述证候者。

【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	每袋装8g。
【贮藏】	密封。

产后气血亏损型乳少无乳乳汁不通

【药名】	通乳颗粒
【处方】	黄芪44.44g 通草44.44g 天花粉33.33g 漏芦44.44g 当归44.44g 白芍(酒炒)33.33g 柴胡33.33g 鹿角霜22.22g 熟地黄33.33g 瞿麦44.44g 路路通44.44g 党参44.44g 川芎33.33g 王不留行66.67g 穿山甲(烫)3.17g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜或味微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	益气养血，通络下乳。用于产后气血亏损，乳少，无乳，乳汁不通。
【用法与用量】	口服。一次30g或10g(无蔗糖)，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装15g；(2)每袋装30g；(3)每袋装5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

妇科炎症菌痢肠炎呼吸道及泌尿道感染外科感染眼结膜炎

【药名】	黄藤素片
【处方】	黄藤素300g。
【性状】	本品为素片或薄膜衣片，素片或薄膜衣片除去包衣后显黄色；味苦。
【功能与主治】	清热解毒。用于妇科炎症，菌痢，肠炎，呼吸道及泌尿道感染，外科感染，眼结膜炎。
【用法与用量】	口服。大片一次1片，小片2~4片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每片含黄藤素0.3g(大片)；(2)每片含黄藤素0.1g(小片)。
【贮藏】	密封。

更年期综合症神经官能症绝经前后诸证

【药名】	女珍颗粒
【处方】	女贞子 200g 墨旱莲 200g 地黄 200g 紫草 200g 炒酸枣仁 200g 柏子仁 166.7g 钩藤 200g 珍珠粉 16.7g 茯苓 200g 莲子心 50g。
【性状】	本品为棕褐色的颗粒；气芳香，味甘、微苦。
【功能与主治】	滋肾，宁心。用于更年期综合征属肝肾阴虚、心肝火旺证者，可改善烘热汗出，五心烦热，心悸，失眠。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	个别病例服药后出现 ALT 轻度升高，是否与受试药物有关尚无法判定；过敏体质或对本药过敏者慎用。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	加味道遥口服液
【处方】	柴胡 64g 白芍 64g 茯苓 64g 栀子(姜炙)96g 甘草 51g 当归 64g 白术(麸炒)64g 牡丹皮 96g 薄荷 13g 生姜 21g。
【性状】	本品为棕红色的液体；气特异，味苦、微甜。
【功能与主治】	舒肝清热，健脾养血。用于肝郁血虚、肝脾不和所致的两胁胀痛、头晕目眩、倦怠食少、月经不调、脐腹胀痛；更年期综合征见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 2 次。
【注意】	切忌气恼劳碌；忌食生冷油。注：〔规格(2)、(3)〕为合剂。
【规格】	(1)每支装 10ml；(2)每瓶装 100ml；(3)每瓶装 150ml。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	加味道遥丸
【处方】	柴胡 300g 当归 300g 白芍 300g 白术(麸炒)300g 茯苓 300g 甘草 240g 牡丹皮 450g 栀子(姜炙)450g 薄荷 60g。
【性状】	本品为黄棕色的水丸；味甜。
【功能与主治】	舒肝清热，健脾养血。用于肝郁血虚、肝脾不和所致的两胁胀痛、头晕目眩、倦怠食少、月经不调、脐腹胀痛；更年期综合征见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2 次。
【注意】	切忌气恼劳碌；忌食生冷油。
【规格】	每 100 丸重 6g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	妇宁康片
【处方】	人参 40.5g 当归 54.1g 赤芍 54.1g 知母 54.1g 牡丹皮 54.1g 远志 40.5g 菟丝子 81g 巴戟天 81g 狗脊 40.5g 枸杞子 51.1g 熟地黄 54.1g 山茱萸 54.1g 黄柏 40.5g 石菖蒲 27g 茯苓 54.1g 淫羊藿 81g 蛇床子 54.1g 五味子 40.5g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色至深棕色；味苦。
【功能与主治】	补肾助阳，调补冲任，益气养血，安神解郁。用于肝肾不足、冲任失调所致月经不调，阴道干燥，情志抑郁，心神不安；妇女更年期综合征见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次 4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.31g；(2) 糖衣片(片心重 0.3g)
【贮藏】	密封。

【药名】	更年安丸
【处方】	地黄 105g 麦冬 105g 玄参 105g 仙茅 210g 牡丹皮 69g 五味子 105g 泽泻 105g 熟地黄 105g 茯苓 210g 磁石 210g 珍珠母 210g 首乌藤 210g 制何首乌 105g 钩藤 210g 浮小麦 210g。
【性状】	本品为包衣浓缩水丸，除去包衣后显黑褐色；气微香，味微甜而后苦。
【功能与主治】	滋阴清热，除烦安神。用于肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见烦热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安；更年期综合征见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 1g。
【贮藏】	密封，置阴凉通风处。

【药名】	更年安片
【处方】	地黄，泽泻，麦冬，熟地黄，玄参，茯苓，仙茅，磁石，牡丹皮，珍珠母，五味子，首乌藤，制何首乌，浮小麦，钩藤。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黑灰色；味甘。
【功能与主治】	滋阴清热，除烦安神。用于肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见烦热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安；更年期综合征见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 6 片，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.31g；(2) 糖衣片片心重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	更年安胶囊
【处方】	地黄 35g 泽泻 35g 麦冬 35g 熟地黄 35g 玄参 35g 茯苓 70g 仙茅 70g 磁石 70g 牡丹皮 23g 珍珠母 70g 五味子 35g 首乌藤 70g 制何首乌 35g 浮小麦 70g 钩藤 70g。

【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黑褐色的颗粒；气微香，味微甜而后苦。
【功能与主治】	滋阴清热，除烦安神。用于肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见烦热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安；更年期综合征见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	灵莲花颗粒
【处方】	乌灵菌粉 250g 栀子 375g 女贞子 625g 墨旱莲 625g 百合 375g 玫瑰花 188g 益母草 625g 远志 188g。
【性状】	本品为棕褐色的颗粒；气微香，味甜、微苦。
【功能与主治】	养阴安神，交通心肾。用于围绝经期综合征属心肾不交者，症见烘热汗出，失眠，心烦不宁，心悸，多梦易惊，头晕耳鸣，腰膝酸痛，大便干燥，舌红苔薄，脉细弦。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	每袋装4g。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	坤宝丸
【处方】	酒女贞子 30g 覆盆子 20g 菟丝子 20g 枸杞子 20g 制何首乌 20g 龟甲 15g 地骨皮 30g 南沙参 30g 麦冬 20g 炒酸枣仁 10g 地黄 30g 白芍 60g 赤芍 30g 当归 20g 鸡血藤 60g 珍珠母 60g 石斛 30g 菊花 30g 墨旱莲 40g 桑叶 20g 白薇 30g 知母 30g 黄芩 30g。
【性状】	本品为深棕色的水蜜丸；味甘、微苦。
【功能与主治】	滋补肝肾，养血安神。用于肝肾阴虚所致绝经前后诸证，症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢痠楚；更年期综合征见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次50丸，一日2次；连续服用2个月或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每100丸重10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	解郁安神颗粒
【处方】	柴胡 80g 大枣 60g 石菖蒲 80g 姜半夏 60g 炒白术 60g 浮小麦 200g 制远志 80g 炙甘草 60g 炒栀子 80g 百合 200g 胆南星 80g 郁金 80g 龙齿 200g 炒酸枣仁 100g 茯苓 100g 当归 60g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；气微腥，味甜、微苦，或味苦、甜(无蔗糖)。
【功能与主治】	舒肝解郁，安神定志。用于情志不畅、肝郁气滞所致的失眠、心烦、焦虑、健忘；神经官能症、更年期综合征见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。

【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 5g; (2) 每袋装 2g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

中医对于男性诸病的研究和诊断

精室

精室，又称精官，是男性独有的生死命官。精室的主要功能就是贮藏精液，进行生育繁衍。清·唐宗海《中西汇通医经精义》说道：“女子之胞，男子名为精室，乃血气交会，化精成胎之所。”精室包括解剖学所说的睾丸、附睾、精囊腺和前列腺等。精室的功能属于肾所主，与督脉相关。肾精充足，肾气旺盛，督脉通盛，则精室功能调和，表现为生殖机能正常。如果肾精亏虚，肾气不足，督脉虚损，则精室功能失常，具体表现为遗精、早泄、不育等病疾。

阳痿

阳痿是指成年男子性交时，由于阴茎痿软不举，或举而不坚，或坚而不久，无法进行正常性生活的病证。但是对发热、过度劳累、情绪反常等因素造成的一时性的阴茎勃起障碍，不能视为病态。

阳痿病证首载于《内经》，《灵枢·邪气脏腑病形》篇称阳痿为“阴痿”，《素问·痿论》中又称“宗筋弛纵”和“筋痿”。该书认为虚劳与邪热是引起阳痿的主要原因。《素问·五常政大论》曰：“气大衰而不起不用。”《灵枢·经筋》指出：“热则筋弛纵不收，阴痿不用。”隋唐宋时代的医家对阳痿的发生，多认为由劳伤、肾虚所致。如《诸病源候论·虚劳阴痿候》认为：“劳伤于肾，肾虚不能荣于阴器，故萎弱也。”再如《重订济生方·虚损论治》又说：“五劳七伤，真阳衰怠……阳事不举。”因此，在治疗上亦以温肾壮阳为主。

明代对阳痿成因的认识更加深入，提出郁火、湿热、情志所伤亦可致阳痿。如《明医杂著·卷三》所言：“男子阴茎不起，古方多云命门火衰，精气虚冷，固有之矣。然亦有郁火甚而致痿者。”再又如《景岳全书·阳痿》认为：“亦有湿热炽盛，以至宗筋弛纵。”在治疗方面，张景岳提出对命门火衰所致阳痿者用右归丸、赞育丸、石刻安肾；血气薄弱者宜左归丸、斑龙丸、全鹿丸；思虑、惊恐导致脾肾亏损者必须培养心脾，充养真气；湿热者须清火以坚肾。清代《杂病源流犀烛·前阴后阴源流》中又称：“有矢志之人，抑郁伤肝，肝木不能疏达，亦致阴痿不起。”清代医家又主张对肝郁所致者用达郁汤，心火抑郁不开者运用启阳娱心丸。可见对阳痿的认识已经比较全面，对其治疗也已从审因论治的原则出发。

病因

禀赋不足，劳伤久病

先天不足或恣情纵欲，房事过度，或手淫、早婚，均可造成精气虚损，命门火衰而致阳事不举。此外久病劳伤，损及脾胃，气血化源不足，可致宗筋失养而成阳痿。诚如《类证治裁·阳痿》中所言：“阳之痿多由色欲竭精，或思虑劳神，或恐惧伤肾，或先天稟弱，或后天食少……而致阳痿者。”

七情失调

情志不遂，思欲过度，忧思郁怒，则肝失疏泄，宗筋所聚无能，乃成阳痿。或过思多虑，损伤心脾，气血不足，宗筋失养；或大惊卒恐，伤于心肾，气机逆乱，气血不达宗筋，不能作强，则阳事不举。此即《景岳全书·阳痿》所云：“凡思虑焦劳，忧郁太过者，多致阳痿”，“凡惊恐不释者，亦致阳痿”。

饮食不节

过食醇酒厚味，脾胃运化失常，聚湿生热，湿热下注肝肾，经络阻滞，气血不荣于宗筋，乃成阳痿。

外邪侵袭

久居湿地或湿热外侵，蕴结肝经，下注宗筋，或寒湿伤阳，阳为阴遏，发为阳痿。

病机

阳痿的原因虽然众多，但其基本病机多为肝、肾、心、脾受损，气血阴阳亏虚，经络失荣；或肝郁湿阻，经络失畅导致宗筋不用而成。肝主筋，足厥阴肝经绕阴器而行；肾藏精，主生殖，开窍于二阴；脾之经筋皆聚于阴器。宗筋作强有赖于肝、肾、脾精血之濡养。心乃君主之官，情欲萌动，阳事之举，必赖心火之先动。肾虚精亏，真阳衰微，则宗筋无以作强。肝失疏泄，气机阻滞，血不达宗筋，则宗筋不聚。脾失运化，气血生化乏源，宗筋失养。忧虑伤心，心血暗耗，则心难行君主之令，从而阴茎痿软而不举。故阳痿之病位在宗筋，病变脏腑主要在于肝、肾、心、脾。

阳痿的病理性质，有虚实之分，且多虚实相兼。肝郁不舒，湿热下注属实，多责之于肝；命门火衰，心脾两虚，惊恐伤肾属虚，多与心、脾、肾有关。若久病不愈，常可因实致虚。如湿热下注，湿阻阳气，可致脾肾阳虚之证；湿热灼伤阴精，或肝郁化火伤及肝肾，而成肝肾阴虚之证。此外，虚损之脏腑因功能失调，各种病理产物的产生，也可因虚致实。如脾虚痰湿内生，或久病入络夹瘀，可致脾虚夹湿夹痰、肾虚夹痰夹瘀之证。除此外，心、脾、肾虚损之阳痿，常因欲求不遂，抑郁不欢，久之大多兼夹肝郁不舒之实证，以至病情更加错综复杂。

本病之预后，视不同病机与病情轻重不同而异，大多预后良好。恣情纵欲或思虑过度而致命门火衰，气血亏损者，适当治疗与调养，精血自能恢复。对肝郁、惊恐、湿热而致气机不畅，气机逆乱，经络阻遏者，当各种病理因素去除后，病情亦可向愈。但对先天不足，天癸缺失，或久病痰瘀闭阻经络者，则预后大多不良。

治疗原则

实证者，肝郁宜疏通，湿热应清利；虚证者，命门火衰宜温补，结合养精，心脾血虚当调养气血，佐以湿补开郁；虚实夹杂者需标本兼顾。

遗精

遗精是指不因性生活而精液遗泄的病证。其中因梦而遗精的称“梦遗”，无梦而遗精，甚至清醒时精液流出的谓“滑精”。必须指出，凡成年未婚男子，或婚后夫妻分居，长期无性生活者，一月遗精1~2次属生理现象。如遗精次数过多，每周2次以上，或清醒时流精，并有头昏，精神萎靡，腰腿酸软，失眠等症，则属病态。

本病记载首见于《内经》，该书称遗精病为“精自下”，并对起病的具体原因、兼见证候，均有阐述。《灵枢·本神》篇指出：“心怵惕思虑则伤神，神伤则恐惧，流淫而不止。恐惧而不解则伤精，精伤骨酸痿厥，精时自下。”明确指出遗精与情志内伤有密切关系。汉代张仲景在《金匮要略》中称本病为“失精”，认为本病是由虚劳所致，对其证候亦有诸多探述。《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》中记载：“夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩，发落”，“梦失精，四肢酸痛，手足烦热，咽干口燥”。在治疗方面，所立桂枝牡蛎汤调和阴阳，潜镇摄纳，为心肾不交、失精遗泄之证初立楷模。

隋唐时期，巢元方和孙思邈分别称遗精为“尿精”、“梦泄精”及“梦泄”，并进一步认识到本病的病机由肾虚而致。如《诸病源候论·虚劳失精候》云：“肾气虚损，不能藏精，故精漏失。”又《诸病源候论·虚劳溢精见闻精出候》说：“肾气虚弱，故精溢也。见闻感触，则动肾气。肾藏精，今虚弱不能制于精，故因见闻而精溢出也。”巢氏之说为后世肾虚遗精的理论奠定了基础。宋代以后，随着对遗精认识的日渐深入，明确将遗精从虚劳肺虚门类分离，作为独立的病证。《普济本事方》正式提出遗精和梦遗的名称。在病机上除将梦遗归为下元虚惫外，还提出经络壅滞，欲动心邪，并分立补肾、清心、利湿诸治法。《济生方》更强调“心肾不交”在本病病机上占绝大多数。《济生方·白浊赤浊遗精论治》论及遗精白浊的病机时指出：“心火炎上而不息，肾水散漫而无归，上下不得交养”，因此在治法上主张：“肾病者当禁固之，心病者当安宁之”。

金元时期，朱丹溪除了将遗精分为梦遗精滑精外，还倡“相火”导致遗精理论，指出：“肝与肾皆有相火，每因心火动则相火亦动。”明·方隅继相火之说后，在《医林绳墨·梦遗精滑》中认为：“梦遗精滑，湿热之乘”，进一步充实了遗精的病机理论。在此基础上，后世医家在治疗上提出了滋阴降火、补脾化湿、清利湿热、益气升提治则，并认识到。不同脏器病损所致的遗精需分而治之。诚如《证治准绳·遗精》所说：“独肾泄，治其肾；由它脏而致肾之泄者，则两治之。在它脏自泄者治其本脏，必察其四属以求其治。”

根据本病临床表现，西医学中的神经衰弱、神经官能症、前列腺炎、精囊炎，或包皮

过长、包茎等疾患，造成以遗精为主要症状者，与本病都有类似，也可参考辨证施治。

病因

劳心太过

凡情志失调，劳神太过，则心阳独亢，心阴被灼，心火不能下交于肾，肾水不能上济于心，心肾不交，水亏火旺，扰动精室而遗精。诚如《折肱漫录·遗精》所云：“梦遗之证……大半起于心肾不交。”此外又有思虑太甚，损伤心脾，从而导致脾气下陷，气不摄精，产生遗精者。此即《景岳全书·遗精》中所言：“有因用心思索过度辄遗者，此中气有不足，心脾之虚陷也。”

欲念不遂

少年气盛，情动于中，或心有恋慕，所欲不遂，或壮夫久旷，思慕色欲，皆令心动神摇，君相火旺，扰动精室而遗精。清·尤怡《金匱翼·梦造滑精》说：“动于心者，神摇于上，则精遗于下也”，所指的就是这种情况。

饮食不节

醇酒厚味，损伤脾胃，湿热内生，蕴而生热，湿热扰动精室，或郁于肝胆，迫精下泄均可致遗精。正如《张氏医通·遗精》所谓：“脾胃湿热之人，及饮酒厚味太过，与酒客辈，痰火为殃，多致不梦而遗泄。”

恣情纵欲

青年早婚，房事过度，或少年无知，频犯手淫，或醉而入房，纵欲无度，日久肾虚精脱，或相火扰动精室，或肾不固精乃成遗精。如《证治要诀·遗精》所言：“有色欲过度，而滑泄不禁者。”

病机

遗精的基本病理变化总属肾失封藏，精关不固。其病位在肾，与心、肝、脾三脏密切相关。肾为封藏之本，受五脏六腑之精而藏之，正常情况下肾精不会外泄。如果肾脏自病，或其他因素影响肾之封藏功能，则精关不固，精液外泄，发生遗精。精之封藏虽在肾，但精之主宰则在心，心为君主之官，主神明，性欲之萌动，精液之蓄泄，无不听余于心，神安才可精固。若劳心过，心有欲念，以至君火摇于上，心失主宰，则精自遗。肝肾内寄相火，相火因肾精的涵育而守位听命，其系上属于心。若君火妄动，相火随之而应之，势必影响肾之封藏。故君相火旺，或心、肝、肾阴虚火旺，皆可扰动精室而成遗泄。脾司主运化，为气血生化之源，水谷入胃，脾气散精，下归于肾，则为肾中所藏精髓。若长久嗜醇酒厚味，脾胃湿热内生，下扰精室，则迫精外泄；抑或劳倦思虑，脾气下陷，气不摄精从而造成遗精。由上可知，遗精一病虽为肾病，但与心、肝、脾、肾相关，其病理因素不外乎湿与火。

遗精的病理性性质有虚实之别，且多虚实夹杂。因君相火旺、湿热下注，扰动精室，精关不固而遗者多属实；肾脏亏损，封藏失职，精关不固而泄者多属虚。初起时多因于火旺、湿热，以实证为主，久病则相火、湿热灼伤肾阴，而致肾阴亏虚，甚或阴损及阳而成阴阳两虚，肾阳衰惫等各种虚证。且在病理演变过程中往往出现阴虚火旺、阴虚湿热等虚实夹杂之证。

遗精病证虽病及多个脏器，但初起大多轻浅，若调理得当，多可痊愈。若是讳疾忌医，久病不治，或调治不当，日久肾精耗伤，阴阳俱虚，或命门火衰，下元衰惫，则会转变成早泄、阳痿、不育或虚劳等证。

早泄

早泄是指房事时过早射精而影响正常性交而言，是男子性机能障碍的常见病证，多与遗精、阳痿相伴出现。

早泄多由情志内伤，湿热侵袭，纵欲过度，久病体虚所致。但是其基本病机为肾失封藏，精关不固。病位在肾，并与心脾相关。病理性质虚多实少，虚实夹杂证候亦在临床常见。辨证应分清虚实，辨别病位。治疗原则，虚证者宜补脾肾为主，或滋阴降火，或温肾填精，或补益心脾，佐以固涩。实证者宜清热利湿，清心降火。慎用补涩，切忌用药苦寒太过，以防恋邪或伤及脾胃。

男性诸病

前列腺炎尿频尿急湿热淋症尿不尽腰膝痠软

【药名】	男康片
【处方】	白花蛇舌草，熟地黄，炙甘草，赤芍，肉苁蓉，蒲公英，鹿衔草，败酱草，黄柏，红花，鱼腥草，淫羊藿，覆盆子，白术，黄芪，菟丝子，紫花地丁，野菊花，当归。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味微酸。
【功能与主治】	益肾活血，清热解毒。用于肾虚血瘀、湿热蕴结所致的淋证，症见尿频、尿急、小腹胀满；慢性前列腺炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4~5片，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)糖衣片(片心重0.32g)；(2)薄膜衣片每片重0.33g。
【贮藏】	密封。

【药名】	灵泽片
【处方】	乌灵菌粉 250g 莪术 1000g 浙贝母 667g 泽泻 500g。
【性状】	本品为薄膜衣异形片；除去包衣后显浅棕色；气芳香，味微苦。
【功能与主治】	益肾活血，散结利水。用于轻中度良性前列腺增生肾虚血瘀湿阻证出现的尿频，排尿困难，尿线变细，淋漓不尽，腰膝酸软。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日3次。
【注意】	部分患者用药后出现口干、呃逆、恶心、胃胀、胃酸、胃痛、腹泻等。少数患者用药后出现ALT、AST升高。
【规格】	每片重0.58g。
【贮藏】	密封。

【药名】	前列欣胶囊
【处方】	炒桃仁，没药(炒)，丹参，赤芍，红花，泽兰，炒王不留行，皂角刺，败酱草，蒲公英，川楝子，白芷，石韦，枸杞子。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；气香，味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，清热利湿。用于瘀血凝聚、湿热下注所致的淋证，症见尿急、尿痛、排尿不畅、滴沥不净；慢性前列腺炎、前列腺增生见上述证候者。

【用法与用量】	口服。一次4~6粒，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	偶见胃脘不适者，一般不影响继续治疗。
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	前列通片
【处方】	广东王不留行400g 黄芪464g 车前子264g 两头尖336g 泽兰336g 八角茴香油1.7ml 关黄柏336g 蒲公英336g 琥珀75g 肉桂油0.88ml。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅褐色至褐色；气芳香，味微苦。
【功能与主治】	清利湿浊，化痰散结。用于热瘀蕴结下焦所致的轻、中度癃闭，症见排尿不畅、尿流变细、小便频数、可伴尿急、尿痛或腰痛；前列腺炎和前列腺增生见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次6片〔规格(1)、(2)〕或一次4片〔规格(3)〕，一日3次，30~45日为一疗程。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.34g；(2)糖衣片(片心重0.26g)；(3)糖衣片(片心重0.39g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	前列舒丸
【处方】	熟地黄，薏苡仁，冬瓜子，山茱萸，山药，牡丹皮，苍术，桃仁，泽泻，茯苓，桂枝，附子(制)，韭菜子，淫羊藿。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸或大蜜丸；气微，味甘、酸。
【功能与主治】	扶正固本，益肾利尿。用于肾虚所致的淋证，症见尿频、尿急、排尿滴沥不尽；慢性前列腺炎及前列腺增生症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6~12g，大蜜丸一次1~2丸，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	尿闭不通者不宜用本药。
【规格】	水蜜丸每10丸重1.3g，大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	野菊花栓
【处方】	野菊花10000g。
【性状】	本品为棕色至深棕色鱼雷形栓剂。
【功能与主治】	抗菌消炎。用于前列腺炎及慢性盆腔炎等疾病。
【用法与用量】	肛门给药。一次1粒，一日1~2次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每粒重2.4g。
【贮藏】	(1)基质为混合脂肪酸甘油酯的栓：密闭，在20℃以下保存。(2)基质为聚乙二醇的栓：密闭，在30℃以下保存。

【药名】	丹益片
-------------	------------

【处方】	丹参 900g 马鞭草 500g 黄柏 400g 王不留行 300g 益母草 600g 牛膝 300g 白头翁 300g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕褐色味微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，清热利湿。用于慢性非细菌性前列腺炎瘀血阻滞、湿热下注证，症见尿痛、尿频、尿急、尿道灼热、尿后滴沥，舌红苔黄或黄腻或舌质黯或有瘀点瘀斑，脉弦或涩或滑。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次。4 周为一疗程。
【注意】	个别患者出现轻度肝功能异常；少数患者出现轻度胃痛、腹泻等消化道不适症状。
【规格】	每片重 0.47g。
【贮藏】	密封。

【药名】	普乐安片
【处方】	油菜花粉 500g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显黄色或棕黄色；味甜、涩。
【功能与主治】	补肾固本。用于肾气不固所致腰膝痠软、排尿不畅、尿后余沥或失禁；慢性前列腺炎及前列腺增生症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 片，一日 3 次。1 个月为一疗程。
【注意】	无
【规格】	(1) 每片重 0.57g (含油菜花粉 0.5g)；(2) 每片重 0.64g (含油菜花粉 0.5g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	普乐安胶囊
【处方】	油菜花粉 350g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄色或棕黄色的颗粒；气微，味甜、涩。
【功能与主治】	补肾固本。用于肾气不固所致腰膝痠软、排尿不畅、尿后余沥或失禁；慢性前列腺炎及前列腺增生症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 粒，一日 3 次。1 个月为一疗程。
【注意】	无
【规格】	每粒装 0.375g。
【贮藏】	密封。

【药名】	癃闭舒胶囊
【处方】	补骨脂，益母草，金钱草，海金沙，琥珀，山慈菇。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕色的粉末；味微苦。
【功能与主治】	益肾活血，清热通淋。用于肾气不足、湿热瘀阻所致的癃闭，症见腰膝痠软、尿频、尿急、尿痛、尿线细，伴小腹拘急疼痛；前列腺增生症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	尿塞通片
【处方】	丹参 144g 泽兰 48g 桃仁 48g 红花 144g 赤芍 48g 白芷 96g 陈皮 96g 泽泻 144g 王不留行 144g 败酱 240g 川楝子 96g 盐小茴香 96g 盐关黄柏 144g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显深褐色；气香，味苦。
【功能与主治】	理气活血，通淋散结。用于气滞血瘀、下焦湿热所致的轻、中度癃闭，症见排尿不畅、尿流变细、尿频、尿急；前列腺增生见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4~6片，一日3次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	(1)薄膜衣每片重0.36g；(2)糖衣片(片心重0.35g)。
【贮藏】	密封。

寒凝气滞型寒疝睾丸坠胀疼痛

【药名】	茴香橘核丸
【处方】	盐小茴香 40g 八角茴香 40g 盐橘核 40g 荔枝核 80g 盐补骨脂 20g 肉桂 16g 川楝子 80g 醋延胡索 40g 醋莪术 20g 木香 20g 醋香附 40g 醋青皮 40g 昆布 40g 槟榔 40g 乳香(制) 20g 桃仁 16g 穿山甲(制) 20g。
【性状】	本品为黄褐色至棕褐色的水丸；气香，味微酸、辛、苦。
【功能与主治】	散寒行气，消肿止痛。用于寒凝气滞所致的寒疝，症见睾丸坠胀疼痛。
【用法与用量】	口服。一次6~9g，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每100丸重6g。
【贮藏】	密闭，防潮。

更多男性诸病用药请参考身体亏虚诸病和泌尿系统诸病、肾脏系统诸病章节。

中医对于感冒瘟疫中暑的研究和诊断

感冒是感受触冒风邪，邪犯卫表而导致的常见外感类疾病，临床表现以鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽、头痛、恶寒、发热、全身不适、脉浮为其主要特征。

本病四季均可发生，尤以春冬两季为多发。病情轻者多为感受当令之气，或称为伤风、冒风、冒寒；病情重者多为感受非时之邪，称为重伤风。在一个时期内广泛流行、病情类似者，称为时行感冒。

早在《内经》即已有外感风邪引起感冒的论述，如《素问·骨空论》说：“风者百病之始也……风传外人，令人振寒，汗出头痛，身重恶寒。”《素问·风论》也说：“风之伤人也，或为寒热。”汉代张仲景《伤寒论·辨太阳病脉证并治》篇论述太阳病时，以桂枝汤治表虚证，以麻黄汤治表实证，提示感冒风寒有轻重的不同，为感冒的辨证治疗奠定了基础。感冒病名出自北宋《仁斋直指方·诸风》篇。元·朱丹溪《丹溪心法·中寒二》提出：“伤风属肺者多，宜辛湿或辛凉之剂散之。”明确本病病位在肺，治疗应分辛温、辛凉两大法则。及至明清，多将感冒与伤风互称，并对虚人感冒有进一步的认识，提出扶正达邪的治疗原则。至于时行感冒，隋·巢元方《诸病源候论·时气病诸候》中即已提示其属“时行病”之类，具有较强的传染性。如所述：“时行病者，春时应暖而反寒，冬时应寒而反温，非其时而有其气。是以一岁之中，病无长少，率相近似者，此则时行之气也。”即与时行感冒密切相关。至清代，不少医家进一步强化了本病与感受时行之气的关系，林佩琴在《类证治裁·伤风》中明确提出了“时行感冒”之名。徐灵胎《医学源流论·伤风难治论》说：“凡人偶感风寒，头痛发热，咳嗽涕出，俗谓之伤风……乃时行之杂感也。”指出感冒乃属触冒时气所致。

凡普通感冒(伤风)、流行性感冒(时行感冒)及其他上呼吸道感染而表现感冒特征者，皆可参照进行辨证施治。

病因

感冒是由于六淫、时行病毒侵袭人体而致病。以风邪为主因，因风为六淫之首，流动于四时之中，故外感为病，常以风为先导。但在不同季节，每与当令之气相合伤人，而表现为不同证候，如秋冬寒冷之季，人体受到风与寒同时袭扰，则多表现为风寒证；而春夏温暖之时，风与热联袂侵袭，则多见风热证；夏秋之交，则以暑多夹湿常见，每又表现为风暑夹湿证候。但一般以风寒、风热为多见，夏令亦常夹暑湿之邪。至于梅雨季节之夹湿，秋季兼燥等，亦常见之。

若四时六气失常，非其时而有其气，伤人而致病者，一般较感受当令之气为重。而非时之气夹时行疫毒伤人，则病情重而多变，往往相互传染，造成广泛的流行，但不限于季节性。正如《诸病源候论·时气病诸候》所言：“夫时气病者，此皆因岁时不和，温凉失节，人感乖戾之气而生，病者多相染易。”

病机

外邪侵袭人体是否发病，关键在于卫气之强弱，同时与感邪的轻重有关。《灵枢·百病始生》曰：“风雨寒热不得虚，邪不能独伤人”。若卫外功能减弱，肺卫调节疏懈，外邪乘袭卫表，即可致病。如气候突变，冷热失常，六淫时邪猖獗，卫外之气失于调节应变，即每见本病的发生率升高。或因生活起居不当，寒温失调以及过度疲劳，以致腠理不密，营卫失和，外邪侵袭为病。若体质虚弱，卫表不固，稍有不慎，即易见虚体感邪。它如肺经素有痰热、痰湿，肺卫调节功能低下，则更易感受外邪，内外相引而发病。如素体阳虚者易受风寒，阴虚者易受风热、燥热，痰湿之体易受外湿。正如清·李用粹《证治汇补·伤风》篇说：“肺家素有痰热，复受风邪束缚，内火不得疏泄，谓之寒暄。此表里两因之实证也。有平昔元气虚弱，表疏腠松，略有不慎，即显风证者。此表里两因之虚证也。”

外邪侵犯肺卫的途径有二，或从口鼻而入，或从皮毛内侵。风性轻扬，为病多犯上焦。故《素问·太阴阳明论》篇说：“伤于风者，上先受之。”肺处胸中，位于上焦，主呼吸，气道为出入升降的通路，喉为其系，开窍于鼻，外合皮毛，职司卫外，为人身之藩篱。故外邪从口鼻、皮毛入侵，肺卫首当其冲，感邪之后，随即出现卫表不和及上焦肺系症状。因病邪在外、在表，故尤以卫表不和为主。

由于四时六气不同，以及体质的差异，临床常见风寒、风热、暑湿三证。若感受风寒湿邪，则皮毛闭塞，邪郁于肺，肺气失宣；感受风热暑燥，则皮毛疏泄不畅，邪热犯肺，肺失清肃。如感受时行病毒则病情多重，甚或变生它病。在病程中亦可见寒与热的转化或错杂。

一般而言，感冒预后良好，病程较短而易愈，少数可因感冒诱发其他宿疾而使病情恶化。对老年、婴幼儿、体弱易感者以及时感重症，必须加以重视，防止发生传变，或同时夹杂其他疾病。

病证鉴别

感冒与风温

本病与诸多温病早期症状相类似，尤其是风热感冒与风温初起颇为相似，但风温病势急骤，寒战发热甚至高热，汗出后热虽暂降，但脉数不静，身热旋即复起，咳嗽胸痛，头痛较剧，甚至出现神志昏迷、惊厥、谵妄等传变入里的证候。而感冒发热一般不高或不发热，病势轻，不传变，服解表药后，多能汗出热退，脉静身凉，病程短，预后良好。

普通感冒与时行感冒

普通感冒病情较轻，全身定状不重，少有传变。在气候变化时发病率可以升高，但无明显流行特点。若感冒一周以上不愈，发热不退或反见加重，应考虑感冒继发它病，传变入里。时行感冒病情较重，发病急，全身症状显著，可以发生传变，化热入里，继发或合并它病，具有广泛的传染性、流行性。

治疗原则

感冒的病位在卫表肺系，治疗应因势利导，从表而解，遵《素问·阴阳应象大论》“其在皮者，汗而发之”之义，采用解表达邪的治疗原则。风寒证治以辛温发汗；风热证治以辛凉清解；暑湿杂感者，又当清暑祛湿解表。

寒热

寒热是辨别疾病性质的两个纲领。寒证与热证反映机体阴阳的偏盛与偏衰，阴盛或阳虚的表现为寒证；阳盛或阴虚的表现则为热证。《素问·阴阳应象大论》说道：“阳胜则热，阴胜则寒。”，《素问·调经论》说：“阳虚则外寒，阴虚则内热。”即是此意。张景岳认为“寒热乃阴阳之化也。”

寒热辨证，不能孤立地根据个别症状作判断，而是通过四诊对其相适应的疾病本身所反映的各种症状、体征的概括。具体的来说明，热证是指一组具有热象的症状和体征；寒证是指一组具有寒象的症状和体征。例如：表寒证，发热，恶寒重，口淡不渴，舌苔薄白润，脉浮或者脉紧等一组寒象与体征，故应诊断为表寒证；表热证，恶寒，发热重，口微渴，舌边尖红赤，脉浮数等一组热象与体征，故应诊断为表热证。须注意，恶寒发热与寒证、热证不同。

寒热辨证，在治疗上有重要意义，《素问·至真要大论》说：“寒者热之”、“热者寒之”，这就是说，寒证要用热剂，热证要用寒剂，两者的治法迥不相同。同时有上热下寒，上寒下热，表寒里热，表热里寒之不同。

上热下寒：患者在同一时间内，上部表现为热，下部表现为寒的证候。如既见胸中烦热，频欲呕吐的上热证，又见腹痛喜暖，大便稀薄的下寒证，即属此类病证。

上寒下热：患者在同一时间内，上部表现为寒，下部表现为热的证候。例如，胃脘冷痛，呕吐清涎，同时又兼见尿频，尿痛，小便短赤。此为寒在胃而热在膀胱之证候。《景岳全书·传忠录》说：“寒在上者，为吞酸，为隔噎，为饮食不化，为噎腐胀啰”。“热在下者为腰足肿痛，为二便秘涩，或热痛遗精，或溲混便赤”。上热下寒，上寒下热病因多由寒热错杂，病理为阴阳之气不相协调，或为阴盛于上，阳盛于下；或阳盛于上，阴盛于下所致。

表寒里热：寒在表，热在里，是表里寒热错杂的一种表现。常见于本有内热，又外感

风寒：或外邪传里化热而表寒未解的病证。如恶寒发热，无汗，头痛身痛，气喘，烦躁、口渴，脉浮紧，这是寒在表而热在里的证候。

表热里寒：也是表里寒热错杂的一种表现。多见于素有里寒而复感风热；或表热证未解，误下以致脾胃阳气损伤的病证。如平素脾胃虚寒，又感风热，所以临床上既能见到发热，头痛，咳嗽，咽喉肿痛的表热证，同时又可见到大便溏泄，小便清白，四肢不温的里寒证。

寒与热同时并见，除了要分清表里上下经络脏腑之外，还要分清寒热孰多孰少和标本先后主次，这些鉴别十分重要，是用药的准绳。寒证，热证与表里互相关系，可形成多种证候，除上述表寒里热，表热里寒外，尚有表寒、表热、里寒、里热等证候。

表寒证

表寒证是寒邪侵袭肌表所表现的证候。（临床表现）恶寒重，发热轻，头身疼痛，无汗，苔薄白润，脉浮紧。

表热证

表热证是温热病邪侵犯肌表所表现的证候。（临床表现）发热，微恶风邪，头痛，口干微渴，或有汗，舌边尖红赤，脉浮数。

里寒证

里寒证是寒邪直中脏腑，或阳气虚衰所表现的证候。（临床表现）形寒肢冷，而色胱白，口淡不渴，或渴喜热饮，静而少言，小便清长，大便稀溏，舌质淡，苔白润，脉沉迟。

里热证

里热证多为外邪传里而化热，或者热邪直中脏腑致使里热炽盛所表现的证候。（临床表现）面红身热，口烦渴，喜饮冷水，烦躁多言，小便黄赤，大便干结，舌质红，苔黄，脉数。

当疾病发展到寒极或热极的时候，有时往往会出现与疾病的本质相反的一些假象，如“寒极似热”，“热极似寒”，即所谓真寒假热，真热假寒，这些假象常见于病人生死存亡的严重关头，如不细察，往往容易误诊而导致生命危险。

真寒假热：是内有真寒而外见假热的证候。其产生的机理，是由于阴寒内盛，格阳于外，阴阳寒热格拒而造成的，又称“阴盛格阳”。其临床表现往往是身热，面红，口渴，脉大，似属热证，但身热反欲盖衣被，口渴喜热饮，饮亦不多，脉大而无力，并且还可见到四肢厥冷，下利清谷，小便清长，舌淡苔白等一派寒象。

真热假寒：是内有真热而外见假寒的证候。其产生的机理，是由于阳热内盛，格阴于外，又称“阳盛格阴”，其内热愈盛则肢冷愈严重，即所谓“热深厥亦深”。其临床表现是手足逆冷，脉沉，似属寒症，但肢冷而身热不恶寒，反恶热，脉沉数而有力，更见烦渴喜冷饮，咽干，口臭，谵语，小便短赤，大便燥结或热痢下重，舌质红，苔黄而干等症。这种情况的手足厥冷、脉沉就是假寒的表面现象，而内热才是疾病的真正的本质。

辨别寒热之真假，除必须了解疾病的全过程外，还应该从以下两方面注意体察：假象的出现，多在四肢，皮肤和面色方面，而脏腑、气血、津液等方面的内在表现，是如实的反映了疾病的本质，故辨证时应以里证、舌象、脉象等作为诊断的依据。

假象毕竟和真象不同，如假热之面赤，是面色胱白而仅在颧颊上浅红娇嫩，时隐时现，而真热的面红却是满面通红；假寒常表现为四肢厥冷，而胸腹部却是大热，按之灼手，或周身寒冷而反不欲近衣被；真寒足身踧卧，欲得衣被。

关于寒热真假，前人已经有丰富的辨别经验，如《景岳全书·传忠录》提出的试寒热法：“假寒误服热药，假热误服寒药等证，但以冷水少试之。假热者必不喜水，即有喜者，或服后见呕，便当以温热药解之；假寒者必多喜水，或服后反而无所逆者，便当以寒凉药解之”。运用此法，也有助于诊断。

寒热转化

寒证转化为热证：病本寒证，后出现热证，热证出现寒证消失的证候。多因治疗不当，过服温燥药物；或失治，寒邪未能及时温散，而机能的阳气偏盛，寒邪从阳化热所致。如病开始出现恶寒重，发热轻，苔薄白润，脉浮紧之表寒证，由于误治，失治反而可能出现壮热，不恶寒，反恶热，心烦、口渴，舌红苔黄、脉数之里热证，这就是由寒证转化为热证的证候。

热证转化为寒证：病本热证，后出现寒证，寒证出现热证消失的证候。也就是因失治、误治，损伤阳气；或因邪气过盛，耗伤正气，正不胜邪，机能衰退或衰败所致。这种转化有突变者，比如高热病人，由于大汗不止，阳从汗泄，或吐泻过度，阳随津脱，从而出现体温骤降，四肢厥冷，面色苍白，脉微欲绝的虚寒证(亡阳)；又有病情迁延，日久不愈而渐变者，如热痢日久不愈，转化为虚寒痢，这都是由热证转化为寒证的候。

寒热证的互相转化，反映邪正盛衰情况，由寒证转化为热证，是人体正气尚盛，寒邪郁而化热；热证转化为寒证，多属邪盛正虚，正不胜邪，乃病症严重之兆。

暑邪

夏为暑气当令的季节，暑为夏季的主气，独见于夏令，具有明显的季节性。在夏至以后，立秋之前感受自然界中的火热外邪则为暑邪，故《素问·热论》说：“先夏至日者为病温，后夏至日者为病暑”暑邪纯属外邪，只有外感，而无内生，故无内暑之说。

暑邪致病，有伤暑、中暑及暑厥之别。起病缓慢，病情较轻者为伤暑；发病急骤，病情较重者为中暑；同时伴有神昏、肢冷、抽搐者为暑厥，是暑病中的危证。暑证又有阴阳之分：暑月受热，即为阳暑；暑月感寒，即为阴暑。盛夏之日，气温过高，或烈日曝晒过久，或工作场所闷热，则导致阳暑；暑热时节，过食生冷，或贪凉露宿，或冷浴过久，则导致阴暑。

暑邪的性质具有炎热、升散、挟湿的基本特性。

暑为盛夏火热之气，具有炎热之性，故为阳邪。升散，即上升发散。暑热之气上蒸，热：蒸气泄，而向外发散，故其性升散。因夏季气候炎热，而且多雨潮湿，暑蒸湿动，故暑邪每易兼夹湿邪。

暑邪的致病特点

❖ **表现阳热之象：**暑为火热之气，具有炎热之性，故暑邪伤人多表现出一派阳热之象，如出现壮热、心烦、面赤、烦躁、脉象洪大等症状。

❖ **上犯头目，扰及心神：**暑邪具有炎热、升散之性。升，即暑邪易于上犯头目，热扰心神。伤于暑邪，上犯头目，则头昏目眩；暑热之邪，扰动心神，则心烦意乱而不宁。

❖ **易于伤津耗气：**暑性升散。散，即暑邪为害，易于发散，故常伤津耗气。暑邪侵犯人体多直入气分，使腠理开泄，津液发散于体表，而致大汗出。汗出过多，一方面面耗伤津液，出现口渴善饮、唇干舌燥、尿少色黄等症；另一方面，在大量汗出的同时，往往气随津泄，而导致气虚。故伤于暑者，常常可以见到气短乏力、倦怠懒言；甚则出现突然昏倒、不省人事等气随津脱之危象。

❖ **多见暑湿夹杂：**暑多挟湿，故暑邪为病，多合湿邪而弥漫机体，见暑湿夹杂证候。临床除发热、烦渴等暑热表现外，常兼见四肢困倦、胸闷呕恶、大便溏泄不爽等湿阻症状。暑湿并存，一般以暑热为主，湿邪次之。暑多挟湿，但并非暑中必定有湿。

感冒中暑瘟疫诸病

外感病邪犯少阳证型少阳感冒寒热往来口苦咽干心烦喜呕

【药名】	少阳感冒颗粒
【处方】	柴胡 138g 人参 69g 半夏 206g 大枣 138g 黄芩 206g 甘草 138g 干姜 138g 青蒿 206g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气芳香，味甘、微苦。
【功能与主治】	解表散热，和解少阳。用于外感病邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 2 次，小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 8g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	小柴胡片
【处方】	柴胡 445g 黄芩 167g 甘草 167g 大枣 167g 姜半夏 222g 党参 167g 生姜 167g。
【性状】	本品为灰棕色至黑褐色的片；或为薄膜衣片，除去包衣后显灰棕色至黑褐色；气微，味甜、微苦。
【功能与主治】	解表散热，疏肝和胃。用于外感病，邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片，一日 3 次。
【注意】	风寒表证者不宜使用。
【规格】	每片重 0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小柴胡泡腾片
【处方】	柴胡 1550g 黄芩 575g 甘草 575g 大枣 575g 姜半夏 575g 党参 575g 生姜 575g。

【性状】	本品为浅棕色至黄棕色的片，表面有不均匀的深色斑点；味酸甜。
【功能与主治】	解表散热，疏肝和胃。用于外感病邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。
【用法与用量】	温开水冲溶后口服。一次1~2片，一日3次。
【注意】	风寒表证者不宜使用。
【规格】	每片重2.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小柴胡胶囊
【处方】	柴胡445g 姜半夏222g 黄芩167g 党参167g 甘草167g 生姜167g 大枣167g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰棕色至黑褐色的颗粒及粉末；气微，味甜、微苦。
【功能与主治】	解表散热，疏肝和胃。用于外感病，邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次。
【注意】	风寒表证不宜使用。
【规格】	每粒装0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小柴胡颗粒
【处方】	柴胡150g 黄芩56g 姜半夏56g 党参56g 生姜56g 甘草56g 大枣56g。
【性状】	本品为黄色至棕褐色的颗粒；味甜。或为棕黄色的颗粒；味淡、微辛〔规格(2)、规格(3)〕。
【功能与主治】	解表散热，疏肝和胃。用于外感病，邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。
【用法与用量】	开水冲服。一次1~2袋，一日3次。
【注意】	风寒表证者不宜使用。
【规格】	(1)每袋装10g；(2)每袋装4g(无蔗糖)；(3)每袋装2.5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

流行性感冒型发热恶寒酸痛鼻塞流涕咳嗽头痛咽痛

【药名】	四味土木香散
【处方】	本品系蒙古族验方：土木香 200g 苦参 200g 悬钩子木(去粗皮、心)100g 山柰 50g。
【性状】	本品为黄白色的粉末；气香，味极苦、微辛。
【功能与主治】	清瘟解表。用于瘟病初期，发冷发热，头痛咳嗽，咽喉肿痛，胸胁作痛。
【用法与用量】	水煎服。一次 2.5~3.6g，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 20g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	连花清瘟片
【处方】	连翘 255g 金银花 255g 炙麻黄 85g 炒苦杏仁 85g 石膏 255g 板蓝根 255g 绵马贯众 255g 鱼腥草 255g 广藿香 85g 大黄 51g 红景天 85g 薄荷脑 765g 甘草 85g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显黄棕色至棕褐色；气微香，味微苦。
【功能与主治】	清瘟解毒，宣肺泄热。用于治疗流行性感属热毒袭肺证，症见发热，恶寒，肌肉酸痛，鼻塞流涕，咳嗽，头痛，咽干咽痛，舌偏红，苔黄或黄腻。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每片重 0.35g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	连花清瘟胶囊
【处方】	连翘 255g 金银花 255g 炙麻黄 85g 炒苦杏仁 85g 石膏 255g 板蓝根 255g 绵马贯众 255g 鱼腥草 255g 广藿香 85g 大黄 51g 红景天 85g 薄荷脑 7.5g 甘草 85g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至黄褐色的颗粒和粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	清瘟解毒，宣肺泄热。用于治疗流行性感属热毒袭肺证，症见发热，恶寒，肌肉酸痛，鼻塞流涕，咳嗽，头痛，咽干咽痛，舌偏红，苔黄或黄腻。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。

【注意】	风寒感冒者慎服。
【规格】	每粒装 0.35g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	连花清瘟颗粒
【处方】	连翘 170g 炙麻黄 57g 石膏 170g 绵马贯众 170g 广藿香 57g 红景天 57g 甘草 57g 金银花 170g 炒苦杏仁 57g 板蓝根 170g 鱼腥草 170g 大黄 34g 薄荷脑 5.0g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气微香，味微苦。
【功能与主治】	清瘟解毒，宣肺泄热。用于治疗流行性感冒属热毒袭肺证，症见发热，恶寒，肌肉酸痛，鼻塞流涕，咳嗽，头痛，咽干咽痛，舌偏红，苔黄或黄腻。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	纯阳正气丸
【处方】	广藿香 100g 姜半夏 100g 木香 100g 陈皮 100g 丁香 100g 肉桂 100g 苍术 100g 白术 100g 茯苓 100g 朱砂 10g 硝石 10g 硼砂 6g 雄黄 6g 煅金礞石 4g 麝香 3g 冰片 3g。
【性状】	本品为棕黄色至棕红色的水丸；气芳香，味苦、辛。
【功能与主治】	温中散寒。用于暑天感寒受湿，腹痛吐泻，胸膈胀满，头痛恶寒，肢体酸重。
【用法与用量】	口服。一次 1.5~3g，一日 1~2 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	金莲清热颗粒
【处方】	金莲花，石膏，地黄，炒苦，大青叶，知母，玄参。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甜，微苦。
【功能与主治】	清热解毒，生津利咽，止咳祛痰。用于感冒热毒壅盛证，症见高热、口渴，咽干，咽痛，咳嗽，痰稠；流行性感冒、上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	口服。成人一次 5g，一日 4 次，高烧时每四小时服 1 次；小儿周岁以内一次 2.5g，一日 3 次，高烧时一日 4 次；一至十五岁一次 2.5~5g，一日 4 次，高烧时每四小时 1 次，或遵医嘱。
【注意】	虚寒泄泻者不宜用。
【规格】	每袋装 (1) 5g；(2) 2.5g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	羚羊感冒片
-------------	--------------

【处方】	羚羊角 3.4g 牛蒡子 109g 淡豆豉 68g 金银花 164g 荆芥 82g 连翘 164g 淡竹叶 82g 桔梗 109g 薄荷素油 0.68ml 甘草 68g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显黄棕色至棕褐色；气香，味甜。
【功能与主治】	清热解表。用于流行性感冒，症见发热恶风、头痛头晕、咳嗽、胸闷、咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服。一次 4~6 片，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.32g；(2) 薄膜衣片每片重 0.36g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清热解毒口服液
【处方】	石膏 670g 玄参 107g 连翘 67g 甜地丁 67g 龙胆 67g 知母 54g 金银花 134g 地黄 80g 栀子 67g 黄芩 67g 板蓝根 67g 麦冬 54g。
【性状】	本品为棕红色的液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒。用于热毒壅盛所致的发热面赤、烦躁口渴、咽喉肿痛；流感、上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次 10~20ml，一日 3 次；儿童酌减，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	清热解毒片
【处方】	石膏 670g 玄参 107g 连翘 67g 甜地丁 67g 龙胆 67g 知母 54g 金银花 134g 地黄 80g 栀子 67g 黄芩 67g 板蓝根 67g 麦冬 54g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；气微，味苦。
【功能与主治】	清热解毒。用于热毒壅盛所致的发热面赤、烦躁口渴、咽喉肿痛；流感、上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次，儿童酌减。
【注意】	无。
【规格】	薄膜衣片每片重(1)0.52g；(2)0.37g；(3)0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清瘟解毒丸
【处方】	大青叶 100g 玄参 100g 桔梗 75g 羌活 75g 葛根 100g 黄芩 100g 川芎 50g 甘草 25g 连翘 75g 天花粉 100g 炒牛蒡子 100g 防风 50g 柴胡 50g 白芷 50g 赤芍 50g 淡竹叶 100g。
【性状】	本品为黑褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸，气微香，味甘、苦。
【功能与主治】	清瘟解毒。用于外感时疫，憎寒壮热，头痛无汗，口渴咽干，痒腮，大头瘟。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 12g；小蜜丸一次 18g(90 丸)，大蜜丸一次 2 丸，一日 2 次；小儿酌减。
【注意】	无。

【规格】	(1)水蜜丸每120丸重12g；(2)小蜜丸每100丸20g；(3)大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	维C银翘片
【处方】	山银花180g 荆芥72g 淡竹叶72g 芦根108g 甘草90g 连翘180g 淡豆豉90g 牛蒡子108g 桔梗108g 马来酸氯苯那敏1.05g 对乙酰氨基酚105g 维生素C49.5g 薄荷素油1.08ml。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显灰褐色层与白色层，或显灰褐色，夹杂有少许白点；气微，味微苦。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的流行性感冒，症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。
【用法与用量】	口服。一次2片，一日3次
【注意】	用药期间不宜驾驶机动车辆、管理机器及高空作业等；肝肾功能不全者慎用，或遵医嘱。
【规格】	每片含维生素C4.5mg、对乙酰氨基酚105mg、马来酸氯苯那敏1.05mg。
【贮藏】	遮光，密封。

【药名】	催汤丸
【处方】	本品系藏族验方：藏木香膏30g 藏木香20g 悬钩子茎（去皮、心）90g 宽筋藤（去皮）50g 干姜20g 诃子肉36g 余甘子40g 毛诃子（去核）20g 螃蟹甲60g。
【性状】	本品为灰黄色的浓缩水丸，表面粗糙，纤维碎末明显；气香，味苦、辛、微咸。
【功能与主治】	清热解表，止咳止痛。用于感冒初起，咳嗽头痛，关节酸痛、防治流行性感
【用法与用量】	水煎服，用冷水约400ml浸泡1~2小时后，煎至约300ml，趁热服汤。一次1~2丸，一日3次。
【注意】	肾病患者慎用。
【规格】	每丸重4g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	十二味翼首散
【处方】	本品系藏族验方：翼首草100g 榜嘎75g 节裂角茴香75g 天竺黄75g 红花60g 檀香50g 安息香25g 菝葜大夏50g 铁椴锤叶40g 五灵脂膏50g 牛黄0.5g 麝香0.5g。
【性状】	本品为灰棕色的粉末；气香，味苦，有麻舌感。
【功能与主治】	清热解毒，防疫。用于瘟疫，流行性感
【用法与用量】	口服。一次1g，一日2次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	无。

【贮藏】	密闭，防潮。
-------------	--------

风寒挟湿型风寒感冒发热无汗头重酸痛

【药名】	九味羌活口服液
【处方】	羌活 150g 防风 150g 苍术 150g 细辛 50g 川芎 100g 白芷 100g 黄芩 100g 甘草 100g 地黄 100g。
【性状】	本品为棕褐色的液体；气微香，味苦、辛，微甜。
【功能与主治】	疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。
【用法与用量】	口服。一次 20ml，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	九味羌活丸
【处方】	羌活 150g 防风 150g 苍术 150g 细辛 50g 川芎 100g 白芷 100g 黄芩 100g 甘草 100g 地黄 100g。
【性状】	本品为棕褐色的水丸；气香，味辛、微苦。
【功能与主治】	疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。
【用法与用量】	姜葱汤或温开水送服。一次 6~9g，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	九味羌活颗粒
【处方】	羌活 150g 防风 150g 苍术 150g 细辛 50g 川芎 100g 白芷 100g 黄芩 100g 甘草 100g 地黄 100g。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。
【用法与用量】	姜汤或开水冲服。一次 1 袋，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	柴连口服液
【处方】	麻黄 300g 柴胡 600g 广藿香 200g 肉桂 200g 连翘 600g 桔梗 200g。
【性状】	本品为红棕色液体；气清香，味甜而微苦。
【功能与主治】	解表宣肺，化湿和中，用于感冒风寒挟湿证，症见恶寒发热，头痛鼻塞，咳嗽，咽干，脘闷，恶心。
【用法与用量】	饭后半小时口服。一次 10ml，一日 3 次，或遵医嘱。
【注意】	(1) 高血压、冠心病患者慎用或遵医嘱。(2) 孕妇慎用。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

外感风寒型风寒感冒恶寒发热鼻塞无汗咳嗽

【药名】	川芎茶调丸
【处方】	川芎 120g 白芷 60g 羌活 60g 细辛 30g 防风 45g 荆芥 120g 薄荷 240g 甘草 60g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的水丸；气香，味辛、甘、微苦。
【功能与主治】	疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛，或有恶寒、发热、鼻塞。
【用法与用量】	饭后清茶送服。一次 3~6g，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	川芎茶调丸(浓缩丸)
【处方】	川芎 61.2g 白芷 30.6g 羌活 30.6g 细辛 15.3g 防风 23g 荆芥 61.2g 薄荷 122.4g 甘草 30.6g。
【性状】	本品为黄棕色至深棕色的浓缩丸；气香，味辛、甘、苦。
【功能与主治】	疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛，或有恶寒、发热、鼻塞。
【用法与用量】	饭后清茶送服。一次 8 丸，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	每 8 丸相当于原药材 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	川芎茶调片
【处方】	川芎 240g 白芷 120g 羌活 120g 细辛 60g 防风 90g 荆芥 240g 薄荷 480g 甘草 120g。

【性状】	本品为棕褐色的片；气香，味辛、微苦。
【功能与主治】	疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛，或有恶寒、发热、鼻塞。
【用法与用量】	饭后清茶送服。一次4~6片，一日3次。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	每片重0.48g。
【贮藏】	密封。

【药名】	川芎茶调袋泡茶(川芎茶调袋泡剂)
【处方】	川芎241.5g 白芷120.8g 羌活120.8g 细辛60.4g 防风90.6g 荆芥241.5g 薄荷483g 甘草120.8g。
【性状】	本品为黄褐色的颗粒；气香，味辛、微苦。
【功能与主治】	疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛、或有恶寒、发热、鼻塞。
【用法与用量】	开水泡服。一次2袋，一日2~3次。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	每袋装1.6g。
【贮藏】	密封、防潮。

【药名】	川芎茶调散
【处方】	川芎120g 白芷60g 羌活60g 细辛30g 防风45g 荆芥120g 薄荷240g 甘草60g。
【性状】	本品为黄棕色的粉末；气香，味辛、微苦。
【功能与主治】	疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛，或有恶寒、发热、鼻塞。
【用法与用量】	饭后清茶冲服。一次3~6g，一日2次。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	川芎茶调颗粒
【处方】	川芎153.8g 白芷76.9g 羌活76.9g 细辛38.5g 防风57.7g 荆芥153.8g 薄荷307.7g 甘草76.9g。
【性状】	〔规格(1)〕：本品为棕色的颗粒，气香，味甜、微苦；〔规格(2)〕：本品为棕色至棕褐色的颗粒，气香，微苦。
【功能与主治】	疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛，或有恶寒、发热、鼻塞。
【用法与用量】	饭后用温开水或浓茶冲服。一次1袋，一日2次；儿童酌减。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	(1)每袋装7.8g；(2)每袋装4g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	小青龙合剂
【处方】	麻黄125g 桂枝125g 白芍125g 干姜125g 细辛62g 炙甘草125g 法半夏188g 五味子125g。

【性状】	本品为棕褐色至棕黑色的液体；气微香，味甜、微辛。
【功能与主治】	解表化饮，止咳平喘。用于风寒水饮，恶寒发热，无汗，喘咳痰稀。
【用法与用量】	口服。一次10~20ml，一日3次。用时摇匀。
【注意】	无。
【规格】	(1)每支装10ml；(2)每瓶装100ml；(3)每瓶装120ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	小青龙颗粒
【处方】	麻黄154g 桂枝154g 白芍154g 干姜154g 细辛77g 炙甘草154g 法半夏231g 五味子154g。
【性状】	本品为浅棕色至棕色的颗粒；或为棕色至棕褐色的颗粒(无蔗糖气微香，味甜、微辛)。
【功能与主治】	解表化饮，止咳平喘。用于风寒水饮，恶寒发热，无汗，喘咳痰稀。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装6g(无蔗糖)；(2)每袋装13g。
【贮藏】	密封。

【药名】	正柴胡饮颗粒
【处方】	柴胡100g 陈皮100g 防风80g 甘草40g 赤芍150g 生姜70g。
【性状】	本品为黄棕色至红棕色的颗粒；味甜、苦或味微苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	发散风寒，解热止痛。用于外感风寒所致的发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢痠痛；流感初起、轻度上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次10g或3g(无蔗糖)，一日3次，小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装10g；(2)每袋装3g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	外感风寒颗粒
【处方】	桂枝102g 白芷102g 防风102g 荆芥穗76g 白芍102g 桔梗76g 甘草25g 柴胡102g 羌活76g 葛根127g 苦杏仁(炒)76g 生姜76g。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	解表散寒，退热止咳。用于风寒感冒，恶寒发热，头痛项强，全身酸疼，鼻塞流清涕，咳嗽，苔薄白，脉浮。
【用法与用量】	开水冲服。一次12g，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装12g(相当于原药材12.5g)。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	表实感冒颗粒
【处方】	紫苏叶150g 葛根150g 白芷100g 麻黄100g 防风150g 桔梗100g 桂枝150g

【性状】	甘草 100g 陈皮 100g 生姜 83.3g 炒苦杏仁 100g。 本品为浅棕色至深棕色的颗粒，或为黄棕色至深棕色的颗粒(无蔗糖)；味甜、微苦。
【功能与主治】	发汗解表，祛风散寒。用于感冒风寒表实证，症见恶寒重发热轻、无汗、头项强痛、鼻流清涕、咳嗽、痰白稀。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1~2 袋，一日 3 次；儿童酌减。
【注意】	高血压、心脏病患者慎服。
【规格】	(1) 每袋装 10g；(2) 每袋装 5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	败毒散
【处方】	党参 100g 茯苓 100g 枳壳 100g 甘草 50g 川芎 100g 羌活 100g 独活 100g 柴胡 100g 前胡 100g 桔梗 100g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的粉末；气香，味苦、微甘。
【功能与主治】	发汗解表，散风祛湿。用于外感热病，憎寒壮热，项强头痛，四肢酸痛，噤口痢疾，无汗鼻塞，咳嗽有痰。
【用法与用量】	另加生姜、薄荷少许炖，取汤服。一次 6~9g，一日 1~2 次。
【注意】	忌生冷油腻食物。
【规格】	每袋装 9g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	参苏丸
【处方】	党参 75g 紫苏叶 75g 葛根 75g 前胡 75g 茯苓 75g 半夏(制)75g 陈皮 50g 枳壳(炒)50g 桔梗 50g 甘草 50g 木香 50g。
【性状】	本品为棕褐色的水丸；气微，味微苦。
【功能与主治】	益气解表，疏风散寒，祛痰止咳。用于身体虚弱、感受风寒所致感冒，症见恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、乏力气短。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	银翘散
【处方】	金银花 100g 连翘 100g 桔梗 60g 薄荷 60g 淡豆豉 50g 淡竹叶 40g 牛蒡子 60g 荆芥 40g 芦根 100g 甘草 40g。
【性状】	本品为棕黄色的粉末；气特异，味微甘而凉。
【功能与主治】	辛凉透表，清热解毒。用于外感风寒，发热头痛，口干咳嗽，咽喉疼痛，小便短赤。
【用法与用量】	温开水吞服或开水泡服。一次 1 袋，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	葛根汤片
【处方】	葛根 667g 麻黄 500g 白芍 334g 桂枝 334g 甘草 334g 大枣 1222g 生姜 500g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕色；味甜、微苦。
【功能与主治】	发汗解表，升津舒经。用于风寒感冒，症见：发热恶寒，鼻塞流涕，咳嗽咽痒，咯痰稀白，无汗，头痛身疼，项背强急不舒，苔薄白或薄白润，脉浮或浮紧。
【用法与用量】	口服。一次 6 片，一日 3 次。
【注意】	偶见轻度恶心。服用本品前已服用其他降压药者，在服用本品时，不宜突然减少或停用其他降压药物。可根据血压情况逐渐调整其他药。
【规格】	每片重 0.4g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	葛根汤颗粒
【处方】	葛根 667g 麻黄 500g 白芍 334g 桂枝 334g 甘草 334g 大枣 1222g 生姜 500g。
【性状】	本品为棕色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	发汗解表，升津舒经。用于风寒感冒，症见：发热恶寒，鼻塞流涕，咳嗽咽痒，咯痰稀白，无汗，头痛身疼，项背强急不舒，苔薄白或薄白润，脉浮或浮紧。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	偶见轻度恶心。服用本品前已服用其他降压药者，在服用本品时，不宜突然减少或停用其他降压药物。可根据血压情况逐渐调整其他药。
【规格】	每袋装 6g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	感冒清热口服液
【处方】	荆芥穗 250g 薄荷 75g 柴胡 125g 葛根 125g 苦杏仁 100g 苦地丁 250g 防风 125g 紫苏叶 75g 桔梗 75g 白芷 75g 芦根 200g。
【性状】	本品为棕褐色的液体；味苦、微甜。
【功能与主治】	疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽，咽干。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	感冒清热咀嚼片
【处方】	荆芥穗 750g 薄荷 225g 防风 375g 柴胡 375g 紫苏叶 225g 葛根 375g 桔梗 225g 苦杏仁 300g 白芷 225g 苦地丁 750g 芦根 600g。
【性状】	本品为棕褐色至深褐色的异形片；具特异香气，味酸甜而微苦。
【功能与主治】	疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，

【用法与用量】	咳嗽，咽干。
【注意】	咀嚼溶化后吞服。一次2片，一日2次。
【规格】	无。
【贮藏】	每片重1.5g。
	密封。

【药名】	感冒清热胶囊
【处方】	荆芥穗 500g 薄荷 150g 防风 250g 柴胡 250g 紫苏叶 150g 葛根 250g 桔梗 150g 苦杏仁 200g 白芷 150g 苦地丁 500g 芦根 400g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的粉末；气香，味苦。
【功能与主治】	疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽，咽干。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.45g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	感冒清热颗粒
【处方】	荆芥穗 200g 薄荷 60g 防风 100g 柴胡 100g 紫苏叶 60g 葛根 100g 桔梗 60g 苦杏仁 80g 白芷 60g 苦地丁 200g 芦根 160g。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒，味甜、微苦；或为棕褐色的颗粒，味微苦（无蔗糖或含乳糖）。
【功能与主治】	疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽，咽干。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装(1)12g；(2)6g(无蔗糖)；(3)3g(含乳糖)。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

外感风寒表虚型风寒感冒头痛项强有汗咳嗽痰白

【药名】	表虚感冒颗粒
【处方】	桂枝，葛根，白芍，炒苦杏仁，生姜。
【性状】	本品为浅棕色至棕色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	散风解肌，和营退热。用于感冒风寒表虚证，症见发热恶风、有汗、头痛项强、咳嗽痰白、鼻鸣干呕、苔薄白、脉浮缓。
【用法与用量】	开水冲服。一次1~2袋，一日2~3次。
【注意】	(1)服药后多饮热开水或热粥，覆被保暖，取微汗，不可发大汗，慎防重感。(2)忌食生冷、油腻。
【规格】	每袋装10g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

外感风寒内伤食积型风寒感冒头痛腹胀呕吐泄泻

【药名】	午时茶颗粒
【处方】	苍术，柴胡羌活，防风，白芷，川芎，广藿香，前胡，连翘，陈皮，山楂，枳实，炒麦芽，甘草，桔梗，紫苏叶，厚朴，红茶，六神曲(炒)。
【性状】	本品为棕色的颗粒；气微香，味甜、微苦。
【功能与主治】	祛风解表，化湿和中。用于外感风寒、内伤食积证，症见恶寒发热、头痛身楚、胸脘满闷、恶心呕吐、腹痛腹泻。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日1~2次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	午时茶胶囊
【处方】	苍术，羌活，白芷，广藿香，连翘，山楂，炒麦芽，桔梗，厚朴，柴胡，防风，川芎，前胡，陈皮，枳实，甘草，紫苏叶，红茶，六神曲(炒)。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的粉末；气微香，味淡、微苦。
【功能与主治】	祛风解表，化湿和中。用于外感风寒、内伤食积证，症见恶寒发热、头痛身楚、胸脘满闷、恶心呕吐、腹痛腹泻。
【用法与用量】	口服。一次6粒〔规格(1)〕或一次3粒〔规格(2)〕，一日1~2次。
【注意】	无。

【规格】	(1) 每粒装 0.25g; (2) 每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	四正丸
【处方】	广藿香 90g 紫苏叶 90g 檀香 30g 法半夏 90g 大腹皮 90g 白术(麸炒)90g 茯苓 90g 枳壳(麸炒)90g 六神曲(麸炒)90g 白扁豆(去皮)90g 香薷 90g 白芷 90g 木瓜 90g 厚朴(姜炙)90g 陈皮 90g 桔梗 90g 槟榔 30g 山楂(炒)30g 麦芽(炒)30g 甘草 90g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸; 气香, 味甜、微苦。
【功能与主治】	祛暑解表, 化湿止泻。用于内伤湿滞, 外感风寒, 头晕身重, 恶寒发热, 恶心呕吐, 饮食无味, 腹胀泄泻。
【用法与用量】	姜汤或温开水送服。一次 2 丸, 一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

外感风热型感冒发热咳嗽头痛咽痛上呼吸道感染

【药名】	风热清口服液
【处方】	山银花, 熊胆粉, 青黛, 桔梗, 瓜蒌皮, 甘草。
【性状】	本品为深棕色的液体; 气微腥, 味苦。
【功能与主治】	清热解毒, 宣肺透表, 利咽化痰。用于外感风热所致的感冒, 症见发热、微恶风寒、头痛、咳嗽、口渴、口痛; 急性上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10ml, 一日 3~4 次, 重症加量, 儿童酌减或遵医嘱。

【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	双黄连口服液
【处方】	金银花 375g 黄芩 375g 连翘 750g。
【性状】	本品为棕红色的澄清液体；味甜，微苦〔规格(1)、规格(2)〕；或为深棕色的澄清液体；味苦、微甜〔规格(3)〕。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的感冒，症见发热、咳嗽、咽痛。
【用法与用量】	口服。一次 20ml〔规格(1)、规格(2)〕或 10ml〔规格(3)〕，一日 3 次；小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每支装 (1) 10ml (每 1ml 相当于饮片 1.5g)；(2) 20ml (每 1ml 相当于饮片 1.5g)；(3) 10ml 每 1ml 相当于饮片 3.0g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	双黄连片
【处方】	金银花 1875g 黄芩 1875g 连翘 3750g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕黄色至棕红；气微，味苦涩。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的感冒，症见发热、咳嗽、咽痛。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次；小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每片重 0.53g。
【贮藏】	密封。

【药名】	双黄连栓
【处方】	金银花 2500g 连翘 5000g 黄芩 2500g。
【性状】	本品为棕色或深棕色的栓剂。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的感冒，症见发热、咳嗽、咽痛；上呼吸道感染、肺炎见上述证候者。
【用法与用量】	直肠给药。小儿一次 1 粒，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒重 1.5g。
【贮藏】	密闭，置阴凉干燥处。

【药名】	双黄连胶囊
【处方】	金银花 1875g 黄芩 1875g 连翘 3750g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕色的粉末或颗粒和粉末；气微，味苦。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的感冒，症见发热、咳嗽、咽痛。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次；小儿酌减，或遵医嘱。
【注意】	无。

【规格】	每粒装 0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	双黄连颗粒
【处方】	金银花 1500g 连翘 3000g 黄芩 1500g。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒；气微，味甜、苦或味苦，微甜(无蔗糖)。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的感冒，症见发热、咳嗽、咽痛。
【用法与用量】	口服或开水冲服。一次 10g，一日 3 次；6 个月以下，一次 2~3g；6 个月至一岁，一次 3~4g；一岁至三岁，一次 4~5g；三岁以上儿童酌量或遵医嘱。无蔗糖颗粒服用量减半。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 5g，(1)相当于净饮片 15g；(2)相当于净饮片 30g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	芎菊上清片
【处方】	川芎 40g 菊花 480g 黄芩 240g 栀子 60g 炒蔓荆子 60g 黄连 40g 薄荷 40g 连翘 60g 荆芥穗 60g 羌活 40g 藁本 40g 桔梗 60g 防风 60g 甘草 40g 白芷 160g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显黄棕色至黑棕色；气微香，味微苦。
【功能与主治】	清热解表，散风止痛。用于外感风邪引起的恶风身热、偏正头痛、鼻流清涕、牙疼喉痛。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 2 次。
【注意】	体虚者慎用。
【规格】	(1)糖衣片片心重 0.25g；(2)糖衣片片心重 0.3g。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	芎菊上清丸(水丸)
【处方】	川芎 20g 菊花 240g 黄芩 120g 栀子 30g 炒蔓荆子 30g 黄连 20g 薄荷 20g 连翘 30g 荆芥穗 30g 羌活 20g 藁本 20g 桔梗 30g 防风 30g 甘草 20g 白芷 80g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的水丸；味苦。
【功能与主治】	清热解表，散风止痛。用于外感风邪引起的恶风身热、偏正头痛、鼻流清涕、牙疼喉痛。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2 次。
【注意】	体虚者慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	克感利咽口服液
【处方】	金银花 72g 黄芩 72g 荆芥 72g 炒栀子 72g 连翘 72g 玄参 72g 僵蚕(姜制) 43g 地黄 108g 射干 22g 桔梗 43g 薄荷 43g 蝉蜕 43g 防风 43g 甘草 22g。
【性状】	本品为棕褐色的液体；气微香、味微苦，久置有轻摇易散的沉淀。
【功能与主治】	疏风清热，解毒利咽。用于风热外侵，邪热内扰所致发热、恶风，头痛，

【用法与用量】	咽痛，鼻塞流涕，咳嗽痰黏，口渴，溲黄；感冒见上述证候者。
【注意】	口服。每次 20ml，一日 3 次。
【规格】	无。
【贮藏】	每支装 10ml。
	密封，置阴凉处。

【药名】	抗病毒口服液
【处方】	板蓝根，石膏，芦根，地黄，郁金，知母，石菖蒲，广藿香，连翘。
【性状】	本品为棕红色的液体；味辛、微苦。
【功能与主治】	清热祛湿，凉血解毒。用于风热感冒，温病发热及上呼吸道感染，流感、腮腺炎病毒感染疾患。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 2~3 次(早饭前和午饭、晚饭后各服一次小儿酌减。
【注意】	临床症状较重、病程较长或合并有细菌感染的患者，应加服其他治疗药物。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	抗感颗粒
【处方】	金银花 700g 赤芍 700g 绵马贯众 233g。
【性状】	本品为棕黄色至黄棕色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒。用于外感风热引起的感冒，症见发热、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痛、全身乏力、酸痛。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次；小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	利咽解毒颗粒
【处方】	板蓝根，金银花，连翘，薄荷，牛蒡子(炒)，山楂(焦)，桔梗，大青叶，僵蚕，玄参，黄芩，地黄，天花粉，大黄，浙贝母，麦冬。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦，或味苦(无蔗糖)或味苦，微甜(无蔗糖)。
【功能与主治】	清肺利咽，解毒退热。用于外感风热所致的咽痛、咽干、喉核红肿、两腮肿痛、发热恶寒；急性扁桃体炎、急性咽炎、腮腺炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3~4 次。
【注意】	忌食辛辣及过咸食物。
【规格】	(1) 每袋装 20g(相当于饮片 19g)；(2) 每袋装 6g(无蔗糖，相当于饮片 19g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	注射用双黄连(冻干)
【处方】	连翘，金银花，黄芩。
【性状】	本品为黄棕色的无定形粉末或疏松固体状物；有引湿性。

【功能与主治】	清热解毒，疏风解表。用于外感风热所致的发热、咳嗽、咽痛；上呼吸道感染、轻型肺炎、扁桃体炎见上述证候者。
【用法与用量】	静脉滴注。每次每千克体重 60mg，一日 1 次；或遵医嘱。临用前，先以适量灭菌注射用水充分溶解，再用氯化钠注射液或 5% 葡萄糖注射液 500ml 稀释。
【注意】	本品与氨基糖苷类(庆大霉素、卡那霉素、链霉素)及大环内酯类(红霉素、白霉素)等配伍时易产生浑浊或沉淀，请勿配伍使用。
【规格】	每支装 600mg。
【贮藏】	遮光，密闭，置阴凉处。

【药名】	复方大青叶合剂
【处方】	大青叶 400g 金银花 200g 羌活 100g 拳参 100g 大黄 100g。
【性状】	本品为棕红色的澄清液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	疏风清热，解毒消肿，凉血利胆。用于外感风热或瘟疫所致的发热头痛、咽喉红肿、耳下肿痛、胁痛黄疸；流感、腮腺炎、急性病毒性肝炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 2~3 次。用于急性病毒性肝炎，一次 30ml，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1) 每瓶装 10ml；(2) 每瓶装 100ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	板蓝大青片
【处方】	板蓝根 1500g 大青叶 2250g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显灰棕色至棕褐色；味微苦。
【功能与主治】	清热解毒，凉血消肿。用于流行性乙型脑炎、流感、流行性腮腺炎、传染性肝炎及麻疹等病毒性疾病见热毒内盛证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次。预防流感、乙脑，一日 4 片，连服 5 日。
【注意】	无。
【规格】	每片重 0.45g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方芩兰口服液
【处方】	金银花 500g 黄芩 500g 连翘 1000g 板蓝根 500g。
【性状】	本品为棕黄色至深棕色的澄清液体；味甜。
【功能与主治】	辛凉解表，清热解毒。用于外感风热引起的发热、咳嗽、咽痛。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 3 次；小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	病重者应配合其他治疗措施。
【规格】	(1) 每支装 10ml；(2) 每支装 20ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	复方金黄连颗粒
【处方】	连翘，蒲公英，黄芩，金银花，板蓝根。
【性状】	本品为棕褐色的颗粒；味微苦、微甜。
【功能与主治】	清热疏风，解毒利咽。用于风热感冒，症见发热、恶风、头痛、鼻塞、流浊涕、咳嗽、咽痛。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	(1)空腹服用时偶有胃肠不适。(2)对本品过敏者禁用。(3)外感风寒者不宜使用。(4)脾胃虚寒者慎用。
【规格】	每袋装8g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	穿心莲片
【处方】	穿心莲1000g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显灰褐色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	清热解毒，凉血消肿。用于邪毒内盛，感冒发热，咽喉肿痛，口舌生疮，顿咳劳嗽，泄泻痢疾，热淋涩痛，痈肿疮疡，毒蛇咬伤。
【用法与用量】	口服。一次2~3片(小片)，一日3~4次，或一次1~2片(大片)，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	穿心莲胶囊
【处方】	穿心莲1000g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕绿色至墨绿色的颗粒和粉末；味苦。
【功能与主治】	清热解毒，凉血消肿。用于邪毒内盛，感冒发热，咽喉肿痛，口舌生疮，顿咳劳嗽，泄泻痢疾，热淋涩痛，痈肿疮疡，毒蛇咬伤。
【用法与用量】	口服。一次2~3粒，一日3~4次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每粒装0.19g；(2)每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	夏桑菊颗粒
【处方】	夏枯草500g 野菊花80g 桑叶175g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜。
【功能与主治】	清肝明目，疏风散热，除湿痹，解疮毒。用于风热感冒，目赤头痛，高血压，头晕耳鸣，咽喉肿痛，疔疮肿毒。
【用法与用量】	开水冲服。一次1~2袋，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	柴胡口服液
【处方】	柴胡 1000g。
【性状】	本品为棕红色的液体，味微甜、略苦。
【功能与主治】	解表退热，用于外感发热，症见身热面赤、头痛身楚、口干而渴。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 3 次。小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	柴黄口服液
【处方】	柴胡 500g 黄芩 500g。
【性状】	本品为红棕色的液体；味辛、微苦。
【功能与主治】	清热解表。用于风热感冒，症见发热、周身不适、头痛、目眩、咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 3 次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	柴黄片
【处方】	柴胡 1000g 黄芩 1000g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显黄棕色至棕褐色，味苦。
【功能与主治】	清热解表。用于风热感冒，症见发热、周身不适、头痛、目眩、咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服。一次 3~5 片，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.5g；(2) 糖衣片(片心重 0.5g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	柴银口服液
【处方】	柴胡 100g 金银花 75g 黄芩 60g 葛根 50g 荆芥 50g 青蒿 75g 连翘 75g 桔梗 50g 苦杏仁 50g 薄荷 75g 鱼腥草 75g。
【性状】	本品为红棕色的澄清液体；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，利咽止咳。用于上呼吸道感染外感风热证，症见：发热恶风，头痛、咽痛，汗出，鼻塞流涕，咳嗽，舌边尖红，苔薄黄。
【用法与用量】	口服。一次 20ml，一日 3 次，连服 3 天。
【注意】	脾胃虚寒者宜温服。
【规格】	每瓶装 20ml。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	桑菊感冒丸
【处方】	桑叶 558g 菊花 222g 连翘 336g 薄荷素油 1.2ml 苦杏仁 444g 桔梗 444g 甘

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>草 180g 芦根 444g。</p> <p>本品为棕黑色的浓缩水丸；气微香，味微苦、辛。</p> <p>疏风清热，宣肺止咳。用于风热感冒初起，头痛，咳嗽，口干，咽痛。</p> <p>口服。一次 25~30 丸，一日 2~3 次。</p> <p>无。</p> <p>每 100 粒重 15g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>桑菊感冒片</p> <p>桑叶 465g 菊花 185g 连翘 280g 薄荷素油 1ml 苦杏仁 370g 桔梗 370g 甘草 150g 芦根 370g。</p> <p>本品为浅棕色至棕褐色的片；或为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显浅棕色至棕褐色；气微香，味微苦。</p> <p>疏风清热，宣肺止咳。用于风热感冒初起，头痛，咳嗽，口干，咽痛。</p> <p>口服。一次 4~8 片，一日 2~3 次。</p> <p>无。</p> <p>薄膜衣片每片重 0.62g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>桑菊感冒合剂</p> <p>桑叶 200g 连翘 120g 苦杏仁 160g 甘草 64g 菊花 80g 薄荷 64g 桔梗 160g 芦根 160g。</p> <p>本品为棕褐色至棕黑色的液体；气芳香，味微苦。</p> <p>疏风清热，宣肺止咳。用于风热感冒初起，头痛，咳嗽，口干，咽痛。</p> <p>口服。一次 15~20ml，一日 3 次，用时摇匀。</p> <p>无。</p> <p>(1) 每支装 10ml；(2) 每瓶装 100ml。</p> <p>密封，置阴凉处。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>银翘伤风胶囊</p> <p>山银花 132g 连翘 132g 牛蒡子 79g 桔梗 79g 芦根 79g 薄荷 79g 淡豆豉 66g 甘草 66g 淡竹叶 53g 荆芥 53g 人工牛黄 5g。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为黄褐色至棕褐色的粉末；气芳香，味苦、辛。</p> <p>疏风解表，清热解毒。用于外感风热，温病初起，发热恶寒，高热口渴，头痛目赤，咽喉肿痛。</p> <p>口服。一次 4 粒，一日 3 次。</p> <p>无。</p> <p>每粒装 0.3g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p>	<p>银翘解毒丸(浓缩蜜丸)</p>
--------------------	---------------------------

【处方】	金银花 200g 薄荷 120g 淡豆豉 100g 桔梗 120g 甘草 100g 连翘 200g 荆芥 80g 牛蒡子(炒) 120g 淡竹叶 80g。
【性状】	本品为棕褐色的浓缩蜜丸；气芳香，味微甜而苦、辛。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。
【用法与用量】	用芦根汤或温开水送服。一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	银翘解毒片
【处方】	金银花 200g 薄荷 120g 淡豆豉 100g 桔梗 120g 甘草 100g 连翘 200g 荆芥 80g 牛蒡子(炒) 120g 淡竹叶 80g。
【性状】	本品为浅棕色至棕褐色的片或薄膜衣片，除去包衣后显浅棕色至棕褐色；气芳香，味苦、辛。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 2~3 次。
【注意】	无
【规格】	(1) 素片每片重 0.5g；(2) 薄膜衣片每片重 0.52g。
【贮藏】	密封。

【药名】	银翘解毒软胶囊
【处方】	金银花 400g 连翘 400g 薄荷 240g 荆芥 160g 淡豆豉 200g 牛蒡子(炒) 240g 桔梗 240g 淡竹叶 160g 甘草 200g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为棕褐色油膏状物；气，味苦。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。
【用法与用量】	口服。一次 2 粒，一日 3 次。
【注意】	无
【规格】	每粒装 0.45g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处(不超过 20° C)。

【药名】	银翘解毒胶囊
【处方】	金银花 200g 薄荷 120g 淡豆豉 100g 桔梗 120g 甘草 100g 连翘 200g 荆芥 80g 牛蒡子(炒) 120g 淡竹叶 80g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气芳香，味苦、辛。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 2~3 次。
【注意】	无

【规格】	每粒装 0.4g。
【贮藏】	密封。

【药名】	银翘解毒颗粒
【处方】	金银花 200g 薄荷 120g 淡豆豉 100 桔梗 120 甘草 100g 连翘 200g 荆芥 80g 牛蒡子(炒)120g 淡竹叶 80g。
【性状】	本品为浅棕色的颗粒；味甜、微苦，或味淡、微苦(含乳糖)。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。
【用法与用量】	开水冲服。一次 15g 或 5g(含乳糖)，一日 3 次；重症者加服 1 次。
【注意】	无
【规格】	每袋装(1)15g；(2)2.5g(含乳糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	雅叫哈顿散
【处方】	本品系傣族验方：小百部 100g 藤苦参 100g 苦冬瓜 100g 箭根薯 100g 羊耳菊根 100g 蔓荆子茎及叶 100g。
【性状】	本品为暗灰色的粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	清热解毒，止痛止血。用于感冒发热，喉炎，胸腹胀痛，虚劳心悸，月经不调，产后流血。
【用法与用量】	口服。一次 3~9g，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	感冒止咳颗粒
【处方】	柴胡 100g 山银花 75g 葛根 100g 青蒿 75g 连翘 75g 黄芩 75g 桔梗 50g 苦杏仁 50g 薄荷脑 0.15g。
【性状】	本品为黄色至棕黄色颗粒；味甜、微苦，具清凉感，或味微苦，具清凉感(无蔗糖)。
【功能与主治】	清热解表，止咳化痰。用于外感风热所致的感冒，症见发热恶风、头痛鼻塞、咽喉肿痛、咳嗽、周身不适。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 10g；(2) 每袋装 3g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	感冒止咳糖浆
【处方】	柴胡 100g 山银花 75g 葛根 100g 青蒿 75g 连翘 75g 黄芩 75g 桔梗 50g 苦杏仁 50g 薄荷脑 0.15g。
【性状】	本品为深棕色的澄清液体；味甜、微苦，具清凉感。

【功能与主治】	清热解表，止咳化痰。用于外感风热所致的感冒，症见发热恶风、头痛鼻塞、咽喉肿痛、咳嗽、周身不适。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	感冒舒颗粒
【处方】	大青叶，连翘，荆芥，防风，薄荷，牛蒡子，桔梗，白芷，甘草。
【性状】	本品为浅棕色至棕色的颗粒；味甜而后酸、苦。
【功能与主治】	疏风清热，发表宣肺。用于风热感冒，头痛体困，发热恶寒，鼻塞流涕，咳嗽咽痛。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次；病情较重者，首次可加倍。
【注意】	无。
【规格】	每袋装15g。
【贮藏】	密封。

外感风热痰浊阻肺型感冒发热头痛咽痛咳嗽痰白

【药名】	妙灵丸
【处方】	川贝母 80g 玄参 80g 薄荷 60g 制天南星 60g 葛根 60g 清半夏 60g 橘红 80g 冰片 10g 羚羊角 5g 羌活 60g 木通 60g 赤芍 60g 地黄 80g 桔梗 60g 钩藤 60g 前胡 60g 朱砂 50g 水牛角浓缩粉 10g。
【性状】	本品为褐色的大蜜丸；气香，味苦。

【功能与主治】	清热化痰，散风镇惊。用于外感风热夹痰所致的感冒，症见咳嗽发烧、头痛眩晕，咳嗽、呕吐痰涎、鼻干口燥、咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服。一次1丸，一日2次。
【注意】	本品不宜久用，肝肾功能不全者慎用。
【规格】	每丸重1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	桑姜感冒片
【处方】	桑叶 300g 菊花 120g 紫苏叶 160g 连翘 160g 苦杏仁 160g 干姜 100g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显褐色；味微苦。
【功能与主治】	散风清热，宣肺止咳。用于外感风热、痰浊阻肺所致的感冒，症见发热头痛、咽喉肿痛、咳嗽痰白。
【用法与用量】	口服。一次3~4片(糖衣片)或1~2片(薄膜衣片)，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)糖衣片(片心重0.25g)；(2)薄膜衣片每片重0.5g。
【贮藏】	密封。

外感风热内郁化火型风热感冒发热上呼吸道感染支气管炎

【药名】	热炎宁片
【处方】	蒲公英，虎杖，北败酱，半枝莲。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦。
【功能与主治】	清热解毒。用于外感风热、内郁化火所致的风热感冒、发热、咽喉肿痛、口苦咽干、咳嗽痰黄、尿黄便结；化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性支气管炎、单纯性肺炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3~6片，一日2~4次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.26g；(2)糖衣片(片心重0.25g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	热炎宁合剂
【处方】	蒲公英 372g 虎杖 372g 北败酱 372g 半枝莲 186g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒。用于外感风热、内郁化火所致的风热感冒、发热、咽喉肿痛、口苦咽干、咳嗽痰黄、尿黄便结；化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性支气管炎、单纯性肺炎见上述证候者。

【用法与用量】	口服。一次 10~20ml，一日 2~4 次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 100ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	热炎宁颗粒
【处方】	蒲公英 232.14g 虎杖 232.14g 北败酱 232.14g 半枝莲 116.07g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒。用于外感风热、内郁化火所致的风热感冒、发热、咽喉肿痛、口苦咽干、咳嗽痰黄、尿黄便结；化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性支气管炎、单纯性肺炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服，一次 1~2 袋，一日 2~4 次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 16g；(2) 每袋装 4g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	牛黄清感胶囊
【处方】	黄芩 166.7g 金银花 166.7g 连翘 333.3g 人工牛黄 50g 珍珠母 166.7g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄棕色至黄棕色的粉末；味苦。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于外感风热，内郁化火所致的感冒发热，咳嗽，咽痛。
【用法与用量】	口服。一次 2~4 粒，一日 3 次；儿童酌减或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	消炎退热颗粒
【处方】	大青叶 400g 蒲公英 400g 紫花地丁 150g 甘草 50g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，凉血消肿。用于外感热病、热毒壅盛证，症见发热头痛、口干口渴、咽喉肿痛；上呼吸道感染见上述证候者，亦用于疮疖肿痛。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 4 次。
【注意】	服药期间忌辛辣。
【规格】	每袋装(1)3g(无蔗糖)；(2)10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	清开灵口服液
【处方】	胆酸，珍珠母，猪去氧胆酸，栀子，水牛角，板蓝根，黄芩苷，金银花。
【性状】	本品为棕红色的液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、

<p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性气管炎、高热等病症属上述证候者。口服，一次20~30ml，一日2次；儿童酌减。</p> <p>久病体虚患者如出现腹泻时慎用。</p> <p>每支装10ml。</p> <p>密封。</p>
--	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>清开灵片</p> <p>胆酸，珍珠母，猪去氧胆酸，栀子，水牛角，板蓝根，黄芩苷，金银花。</p> <p>本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦。</p> <p>清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性气管炎、高热等病症属上述证候者。口服，一次2片，一日3次。儿童酌减或遵医嘱。</p> <p>久病体虚患者如出现腹泻时慎用。</p> <p>每片重0.5g(含黄芩苷20mg)。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>清开灵软胶囊</p> <p>胆酸，珍珠母，猪去氧胆酸，栀子，水牛角，板蓝根，黄芩苷，金银花。</p> <p>本品为软胶囊，内容物为棕褐色至棕黑色的膏状物；气特异，味苦。</p> <p>清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性气管炎、高热等病症属上述证候者。口服。一次1~2粒〔规格(1)〕或2~4粒〔规格(2)〕，一日3次；儿童酌减或遵医嘱。</p> <p>久病体虚患者如出现腹泻时慎用。</p> <p>(1)每粒装0.4g(含黄芩苷20mg)；(2)每粒装0.2g(含黄芩苷10mg)。</p> <p>密封，置阴凉干燥处。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>清开灵泡腾片</p> <p>胆酸，珍珠母，猪去氧胆酸，栀子，水牛角，板蓝根，黄芩苷，金银花。</p> <p>本品为浅黄色至棕黄色的片；味甜、微苦。</p> <p>清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性气管炎、高热等病症属上述证候者。热水中泡腾溶解后服用。一次2~4片，一日3次。儿童酌减或遵医嘱。</p> <p>久病体虚患者如出现腹泻时慎用。</p> <p>每片重1g(含黄芩苷10mg)。</p> <p>密封，置阴凉干燥处。</p>
---	--

<p>【药名】</p>	<p>清开灵注射液</p>
--------------------	----------------------

【处方】	胆酸，珍珠母(粉)，猪去氧胆酸，梔子，水牛角(粉)，板蓝根，黄芩苷，金银花。
【性状】	本品为棕黄色或棕红色的澄明液体。
【功能与主治】	清热解毒，化痰通络，醒神开窍。用于热病，神昏，中风偏瘫，神志不清；急性肝炎、上呼吸道感染、肺炎、脑血栓形成、脑出血见上述证候者。
【用法与用量】	肌内注射，一日2~4ml。
【注意】	(1)有表证恶寒发热者、药物过敏史者慎用。(2)如出现过敏反应应及时停药并做脱敏处理。(3)本品如产生沉淀或浑浊时不得使用。如经10%葡萄糖或氯化钠注射液稀释后，出现浑浊亦不得使用。(4)药物配伍：到目前为止，已确认清开灵注射液不能与硫酸庆大霉素、青霉素G钾、肾上腺素、阿拉明、乳糖酸红霉素、多巴胺、山梗菜碱、硫酸美芬丁胺等药物配伍使用。(5)清开灵注射液稀释以后，必须在4小时以内使用。(6)输液速度：注意滴速勿快，儿童以20~40滴/分为宜，成年人以40~60滴/分为宜。(7)除按【用法与用量】中说明使用以外，还可用5%葡萄糖注射液、氯化钠注射液按每10ml药液加入100ml溶液稀释后使用。
【规格】	(1)每支装2ml；(2)每支装10ml。
【贮藏】	密闭。

【药名】	清开灵胶囊
【处方】	胆酸，珍珠母，猪去氧胆酸，梔子，水牛角，板蓝根，黄芩苷，金银花。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕色至棕褐色的粉末；味苦。
【功能与主治】	清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性气管炎、高热等病症属上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2~4粒〔规格(1)〕，一次1~2粒〔规格(2)〕，一日3次。儿童酌减或遵医嘱。
【注意】	久病体虚患者如出现腹泻时慎用。
【规格】	(1)每粒装0.25g(含黄芩苷10mg)；(2)每粒装0.40g(含黄芩苷20mg)。
【贮藏】	密封。

【药名】	清开灵颗粒
【处方】	胆酸13g 猪去氧胆酸15g 水牛角100g 黄芩苷20g 珍珠母200g 梔子100g 板蓝根800g 金银花240g。
【性状】	本品为浅黄色或黄棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性气管炎、高热等病症属上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1~2袋，一日3次。儿童酌减或遵医嘱。
【注意】	久病体虚患者如出现腹泻时慎用。
【规格】	(1)每粒装1.5g(含黄芩苷20mg，无蔗糖)；(2)每粒装3g(含黄芩苷20mg，橙香型)；(3)每粒装10g(含黄芩苷20mg)。
【贮藏】	密封。

【药名】	感冒退热颗粒
【处方】	大青叶 435g 板蓝根 435g 连翘 217g 拳参 217g。
【性状】	本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦或味苦、微甜(无蔗糖)。
【功能与主治】	清热解毒，疏风解表。用于上呼吸道感染、急性扁桃体炎、咽喉炎属外感风热、热毒壅盛证，症见发热、咽喉肿痛。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1~2 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装(1)18g；(2)4.5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	清热灵颗粒
【处方】	黄芩 250g 大青叶 250g 连翘 250g 甘草 50g。
【性状】	本品为棕黄色至黄棕色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒。用于感冒热邪壅肺证，症见发热、咽喉肿痛。
【用法与用量】	开水冲服。周岁以内一 1 次 5g，一至六岁一次 10g，一日 3 次；七岁以上一次 15g，一日 3~4 次。七岁以上一次 5g(无蔗糖)，一日 3~4 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装 5g；(2)每袋装 15g；(3)每袋装 5g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	新雪颗粒
【处方】	磁石 516g 滑石 258g 硝石 516g 栀子 132g 广升麻 258g 珍珠层粉 54g 人工牛黄 54g 石膏 258g 南寒水石 258g 芒硝 516g 竹心 1320g 穿心莲 1320g 沉香 78g 冰片 13.8g。
【性状】	本品为红褐色至棕褐色的颗粒或薄膜衣颗粒；气香，味苦、咸。
【功能与主治】	清热解毒。用于外感热病、热毒壅盛证，症见高热、烦躁；扁桃体炎、上呼吸道感染、气管炎、感冒见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋(瓶)，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋(瓶)装(1)1.5g；(2)1.53g(薄膜衣颗粒)。
【贮藏】	密封。

外感风寒内伤湿滞或夏伤暑湿型胃肠型感冒呕吐泄泻

【药名】	加味藿香正气软胶囊
【处方】	广藿香，紫苏叶，白芷，炒白术，陈皮，半夏(制)，姜厚朴，茯苓，甘草，大腹皮，生姜，大枣，桔梗。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为含少量悬浮固体粉末的棕褐色油状液体；气芳香，

<p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>味苦。</p> <p>解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞证，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。</p> <p>口服。一次3粒，一日2次。</p> <p>无。</p> <p>每粒装0.6g(相当于饮片2.157g)。</p> <p>密封，置阴凉干燥处。</p>
--	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>藿香正气口服液</p> <p>苍术 80g 厚朴(姜制) 80g 茯苓 120g 生半夏 80g 广藿香油 0.8ml 陈皮 80g 白芷 120g 大腹皮 120g 甘草浸膏 10g 紫苏叶油 0.4ml。</p> <p>本品为棕色的澄清液体；味辛、微甜。</p> <p>解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。</p> <p>口服。一次5~10ml，一日2次，用时摇匀。</p> <p>无。</p> <p>每支装10ml。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>藿香正气水</p> <p>苍术 160g 陈皮 160g 厚朴(姜制) 160g 白芷 240g 茯苓 240g 大腹皮 240g 生半夏 160g 甘草浸膏 20g 广藿香油 1.6ml 紫苏叶油 0.8ml。</p> <p>本品为深棕色的澄清液体(贮存略有沉淀)；味辛、苦。</p> <p>解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。</p> <p>口服。一次5~10ml，一日2次，用时摇匀。</p> <p>无。</p> <p>每支装10ml。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p>	<p>藿香正气软胶囊</p> <p>苍术 195g 厚朴(姜制) 195g 茯苓 293g 生半夏 195g 广藿香油 1.95ml 陈皮 195g 白芷 293g 大腹皮 293g 甘草浸膏 24.4g 紫苏叶油 0.98ml。</p> <p>本品为软胶囊，内容物为棕褐色的膏状物；气芳香，味辛、苦。</p> <p>解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。</p> <p>口服。一次2~4粒，一日2次。</p> <p>无。</p> <p>每粒装0.45g。</p>
--	--

【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。
【药名】	藿香正气滴丸
【处方】	苍术 160g 姜厚朴 160g 茯苓 240g 生半夏 160g 广藿香油 1.6ml 陈皮 160g 白芷 240g 大腹皮 240g 甘草浸膏 20g 紫苏叶油 0.8ml。
【性状】	本品为薄膜衣滴丸，除去包衣后显黄棕色至棕色；气香，味辛、微甜、苦。
【功能与主治】	解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 袋，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 2.6g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

小儿感冒胃肠炎呼吸道感染

【药名】	儿感退热宁口服液
【处方】	青蒿，板蓝根，菊花，苦杏仁，桔梗，连翘，薄荷。
【性状】	本品为棕色至深棕色的液体；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	解表清热，化痰止咳，解毒利咽。用于小儿外感风热，内郁化火，发烧头痛，咳嗽，咽喉肿痛。
【用法与用量】	口服。十岁以上一次 10~15ml，五至十岁一次 6~10ml，三至五岁一次 4~6ml，一日 3 次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	小儿百寿丸
【处方】	钩藤 45g 炒僵蚕 45g 胆南星(酒炙) 75g 天竺黄 75g 桔梗 30g 木香 75g 砂仁 45g 陈皮 75g 麸炒苍术 75g，茯苓 30g 炒山楂 150g 六神曲(麸炒) 45g 炒麦芽 45g 薄荷 45g 滑石 150g 甘草 30g 朱砂 10g 牛黄 10g。
【性状】	本品为棕红色的大蜜丸；气香，味甜。

【功能与主治】	清热散风，消食化滞。用于小儿风热感冒、积滞，症见发热头痛、脘腹胀满、停食停乳、不思饮食、呕吐酸腐、咳嗽痰多、惊风抽搐。
【用法与用量】	口服。一次1丸，一日2次；周岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每丸重3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿宝泰康颗粒
【处方】	连翘，地黄，滇柴胡，玄参，桑叶，浙贝母，蒲公英，南板蓝根，滇紫草，桔梗，莱菔子，甘草。
【性状】	本品为棕色至棕红色的颗粒；气微，味甜、微苦。
【功能与主治】	解表清热，止咳化痰。用于小儿风热外感，症见发热、流涕、咳嗽、脉浮。
【用法与用量】	温开水冲服。周岁以内一次2.6g，一至三岁一次4g，三至十二岁一次8g，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装(1)2.6g；(2)4g；(3)8g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿退热合剂(小儿退热口服液)
【处方】	大青叶150g 金银花90g 栀子90g 黄芩90g 地龙60g 柴胡90g 板蓝根90g 连翘90g 牡丹皮90g 淡竹叶60g 重楼45g 白薇60g。
【性状】	本品为红褐色的液体；气芳香，味苦、辛、微甜。
【功能与主治】	疏风解表，解毒利咽。用于小儿外感风热所致的感冒，症见发热恶风、头痛目赤、咽喉肿痛；上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	口服。五岁以下一次10ml，五至十岁一次20~30ml，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)每支装10ml；(2)每瓶装100ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿退热颗粒
【处方】	大青叶，板蓝根，金银花，连翘，栀子，牡丹皮，黄芩，淡竹叶，地龙，重楼，柴胡，白薇。
【性状】	本品为棕黄色至棕色的颗粒；气芳香，味甜、微苦。
【功能与主治】	疏风解表，解毒利咽。用于小儿外感风热所致的感冒，症见发热恶风、头痛目赤、咽喉肿痛；上呼吸道感染见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。五岁以下小儿一次5g，五至十岁一次10~15g，一日3次；或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1)每袋装5g；(2)每袋装15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿柴桂退热口服液
【处方】	柴胡 130g 桂枝 45g 葛根 130g 浮萍 45g 黄芩 60g 白芍 45g 蝉蜕 45g。
【性状】	本品为棕黄色至棕红色的液体；气清香，味甜，微苦。
【功能与主治】	发汗解表，清里退热。用于小儿外感发热。症见：发热，身痛，流涕，口渴，咽红，溲黄，便干。
【用法与用量】	口服。周岁以内，一次 5ml；一至三岁，一次 10ml；四至六岁，一次 15ml；七至十四岁，一次 20ml；一日 4 次，3 天为一个疗程。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿柴桂退热颗粒
【处方】	柴胡 260g 桂枝 90g 葛根 260g 浮萍 90g 黄芩 120g 白芍 90g 蝉蜕 90g。
【性状】	本品为浅棕黄色至棕黄色的颗粒；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	发汗解表，清里退热。用于小儿外感发热。症见发热，身痛，流涕，口渴，咽红，溲黄，便干。
【用法与用量】	开水冲服。周岁以内，一次 0.5 袋；一至三岁，一次 1 袋；四至六岁，一次 1.5 袋；七至十四岁，一次 2 袋；一日 4 次，3 天为一个疗程。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 4g；(2) 每袋装 5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿热速清口服液
【处方】	柴胡，板蓝根，金银花，连翘，黄芩，葛根，水牛角，大黄。
【性状】	本品为红棕色的澄清液体；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，泻火利咽。用于小儿外感风热所致的感冒，症见高热、头痛、咽喉肿痛、鼻塞流涕、咳嗽、大便干结。
【用法与用量】	口服。周岁以内一次 2.5~5ml，一至三岁一次 5~10ml，三至七岁一次 10~15ml，七至十二岁一次 15~20ml，一日 3~4 次。
【注意】	如病情较重或服药 24 小时后疗效不明显者，可酌情增加剂量。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，避光。

【药名】	小儿热速清颗粒
【处方】	柴胡 1250g 黄芩 625g 板蓝根 1250g 葛根 625g 金银花 687.5g 水牛角 312.5g 连翘 750g 大黄 312.5g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜或味微苦。
【功能与主治】	清热解毒，泻火利咽。用于小儿外感风热所致的感冒，症见高热、头痛、咽喉肿痛、鼻塞流涕、咳嗽、大便干结。
【用法与用量】	口服。周岁以内，一次 1.5~3g〔规格(1)〕或 0.5~1g〔规格(2)〕；一至三岁，一次 3~6g〔规格(1)〕或 1~2g〔规格(2)〕；三至七岁，一次

<p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>6~9g〔规格(1)〕或2~3g〔规格(2)〕；七至十二岁，一次9~12g〔规格(1)〕或3~4g〔规格(2)〕；一日3~4次。</p> <p>如病情较重或服药24小时后疗效不明显者，可酌情增加剂量。</p> <p>每袋装(1)6g；(2)2g。</p> <p>密封。</p>
--	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>小儿热速清糖浆</p> <p>柴胡250g 黄芩125g 葛根125g 水牛角62.5g 金银花187.5g 板蓝根250g 连翘150g 大黄62.5g。</p> <p>本品为红棕色的黏稠液体；气香，味甜、微苦。</p> <p>清热解毒，泻火利咽。用于小儿外感风热所致的感冒，症见高热、头痛、咽喉肿痛、鼻塞流涕、咳嗽、大便干结。</p> <p>口服。周岁以内，一次2.5~5ml；一至三岁，一次5~10ml；三至七岁，一次10~15ml；七至十二岁，一次15~20ml；一日3~4次。</p> <p>如病情较重或服药24小时后疗效不明显者，可酌情增加剂量。</p> <p>每支装10ml；每瓶装120ml。</p> <p>密封，置阴凉处。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>小儿豉翘清热颗粒</p> <p>连翘444g 淡豆豉333g 薄荷222g 荆芥222g 炒栀子189g 大黄189g 青蒿333g 赤芍222g 槟榔167g 厚朴333g 黄芩333g 半夏333g 柴胡222g 甘草189g。</p> <p>本品为淡黄色至棕褐色的颗粒；味甘、微苦。</p> <p>疏风解表，清热导滞。用于小儿风热感冒夹滞证，症见发热咳嗽，鼻塞流涕，咽红肿痛，纳呆口渴，脘腹胀满，便秘或大便酸臭，溲黄。</p> <p>开水冲服。六个月至一岁，一次1~2g；一至三岁，一次2~3g；四至六岁，一次3~4g；七至九岁，一次4~5g；十岁以上，一次6g；一日3次。</p> <p>无。</p> <p>(1)每袋装2g；(2)每袋装4g；(3)每袋装2g(无蔗糖)；(4)每袋装4g(无蔗糖)。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p>	<p>小儿感冒口服液</p> <p>广藿香85g 菊花85g 连翘85g 大青叶141g 板蓝根85g 地黄85g 地骨皮85g 白薇85g 薄荷56g 石膏141g。</p> <p>本品为棕红色的液体；气微香，味苦、辛、微甜。</p> <p>清热解表。用于小儿外感风热所致发热重、微恶风寒、头痛、有汗或少汗、咽红肿痛、口渴、舌尖红、苔薄黄而干、脉浮数。</p> <p>口服。周岁以内一次5ml，一至三岁一次5~10ml，四至七岁一次10~15ml，八至十二岁一次20ml，一日2次，摇匀服用。</p> <p>无。</p> <p>每支装10ml。</p>
--	--

【贮藏】	密封。
-------------	-----

【药名】	小儿感冒茶
【处方】	广藿香 750g 连翘 750g 板蓝根 750g 地骨皮 750g 薄荷 500g 菊花 750g 大青叶 1250g 地黄 750g 白薇 750g 石膏 1250g。
【性状】	本品为浅棕色的块状物；味甜、微苦。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于小儿风热感冒，症见发热重、头胀痛、咳嗽痰黏、咽喉肿痛，流感见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一岁以内一次 6g，一至三岁一次 6~12g，四至七岁一次 12~18g，八至十二岁一次 24g，日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每块重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿感冒颗粒
【处方】	广藿香 75g 连翘 75g 板蓝根 75g 菊花 75g 大青叶 125g 地黄 75g 地骨皮 75g 白薇 75g 薄荷 50g 石膏 125g。
【性状】	本品为浅棕色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	疏风解表，清热解毒。用于小儿风热感冒，症见发热重、头胀痛、咳嗽痰黏、咽喉肿痛；流感见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。周岁以内一次 6g，一至三岁一次 6~12g，四至七岁一次 12~18g，八至十二岁一次 24g，日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 12g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿感冒宁糖浆
【处方】	薄荷 80g 苦杏仁 80g 黄芩 80g 前胡 80g 炒栀子 40g 六神曲(焦) 27g 芦根 120g 荆芥穗 67g 牛蒡子 80g 桔梗 67g 白芷 27g 焦山楂 27g 焦麦芽 27g 金银花 120g 连翘 80g。
【性状】	本品为深棕色的液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	疏散风热，清热止咳。用于小儿外感风热所致的感冒，症见发热、汗出不爽、鼻塞流涕、咳嗽咽痛。
【用法与用量】	口服。初生儿至一岁，一次 5ml，二至三岁，一次 5~10ml，四至六岁，一次 10~15ml，七至十二岁，一次 15~20ml，一日 3~4 次，或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 100ml。(2) 每瓶装 120ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿解表颗粒
【处方】	金银花 300g 连翘 250g 炒牛蒡子 250g 蒲公英 300g 黄芩 300g 防风 150g

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>紫苏叶 150g 荆芥穗 100g 葛根 150g 人工牛黄 1g。</p> <p>本品为黄褐色的颗粒；味甜、微苦。</p> <p>宣肺解表，清热解毒。用于小儿外感风热所致的感冒，症见发热恶风、头痛咳嗽、鼻塞流涕、咽喉痛痒。</p> <p>开水冲服。一至二岁一次 4g，一日 2 次；三至五岁一次 4g，一日 3 次；六至十四岁一次 8g，一日 2~3 次。</p> <p>无。</p> <p>每袋装 8g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>小儿解热丸</p> <p>全蝎 80g 防风 70g 天麻 60g 钩藤 50g 猪牙皂 50g 天竺黄 40g 茯苓 40g 琥珀 40g 蜈蚣 5g 朱砂 10g 人工麝香 10g 胆南星 70g 羌活 70g 麻黄 50g 薄荷 50g 煅青礞石 50g 陈皮 40g 甘草 40g 炒僵蚕 20g 珍珠 40g 人工牛黄 10g 冰片 5g。</p> <p>本品为棕色至棕褐色的大蜜丸；气香，味微苦。</p> <p>清热化痰，镇惊，息风。用于小儿感冒发热，痰涎壅盛，高热惊风，项背强直，手足抽搐，神志昏蒙，呕吐咳嗽。</p> <p>口服。一次 1 丸，一日 2 次；周岁以内酌减。</p> <p>无。</p> <p>每丸重 1g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>小儿解感片</p> <p>大青叶 830g 柴胡 415g 黄芩 415g 荆芥 415g 桔梗 250g 甘草 165g。</p> <p>本品为糖衣片，除去糖衣后呈棕褐色；味苦。</p> <p>清热解表，利咽止咳。用于感冒发烧，头痛鼻塞，咳嗽喷嚏，咽喉肿痛。</p> <p>口服。一至三岁一次 1 片，四至六岁一次 2 片，九至十四岁，一次 3 片，一日 3 次，或遵医嘱。</p> <p>无。</p> <p>糖衣片，片心重 0.3g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p>	<p>安儿宁颗粒</p> <p>天竺黄 66.7g 人工牛黄 5.3g 甘草 53.3g 洪连 66.7g 唐古特乌头 66.7g 红花 53.3g 岩白菜 53.3g 高山辣根菜 53.3g 檀香 66.7g。</p> <p>本品为黄色至棕黄色的颗粒；味甜、苦。</p> <p>清热祛风，化痰止咳。用于小儿风热感冒，咳嗽有痰，发热咽痛，上呼吸道感染见上述证候者。</p> <p>开水冲服。周岁以内一次 1.5g，一至五岁一次 3g，五岁以上一次 6g，一日 3 次。</p> <p>无。</p>
---	---

【规格】	每袋装 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	香苏正胃丸
【处方】	广藿香 80g 紫苏叶 160g 香薷 80g 陈皮 40g 姜厚朴 80g 麸炒枳壳 20g 砂仁 20g 炒白扁豆 40g 炒山楂 20g 六神曲(炒) 20g 炒麦芽 20g 茯苓 20g 甘草 11g 滑石 66g 朱砂 3.3g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的大蜜丸；味微甜、略酸苦。
【功能与主治】	解表化湿，和中消食。用于小儿暑湿感冒，症见头痛发热、停食停乳、腹痛胀满、呕吐泄泻、小便不利。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 1~2 次；周岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	消食退热糖浆
【处方】	柴胡，黄芩，知母，青蒿，槟榔，厚朴，水牛角浓缩粉，牡丹皮，荆芥穗，大黄。
【性状】	本品为棕色的澄清液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，消食通便。用于小儿外感时邪、内兼食滞所致的感冒，症见高热不退、脘腹胀满、大便不畅；上呼吸道感染、急性胃肠炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。周岁以内一次 5ml，一至三岁一次 10ml，四至六岁一次 15ml，七至十岁一次 20ml，十岁以上一次 25ml，一日 2~3 次。
【注意】	脾虚腹泻者忌服。
【规格】	每瓶装(1) 60ml；(2) 100ml；(3) 120ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	小儿清热片
【处方】	黄柏 117.6g 灯心草 23.5g 栀子 117.6g 钩藤 47g 雄黄 47g 黄连 70.6g 朱砂 23.5g 龙胆 47g 黄芩 117.6g 大黄 47g 薄荷素油 0.47g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色；气特异，味苦。
【功能与主治】	清热解毒，祛风镇惊。用于小儿风热，烦躁抽搐，发热口疮，小便短赤，大便不利。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 片，一日 1~2 次；周岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

中暑瘟疫痧气

【药名】	十滴水
【处方】	樟脑 25g 干姜 25g 大黄 20g 小茴香 10g 肉桂 10g 辣椒 5g 桉油 12.5ml。
【性状】	本品为棕红色至棕褐色的澄清液体；气芳香，味辛辣。
【功能与主治】	健胃，祛暑。用于因中暑而引起的头晕、恶心、腹痛、胃肠不适。
【用法与用量】	口服。一次 2~5ml；儿童酌减。
【注意】	孕妇忌服。驾驶员和高空作业者慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，遮光。

【药名】	十滴水软胶囊
【处方】	樟脑 62.5g 干姜 62.5g 大黄 50g 小茴香 25g 肉桂 25g 辣椒 12.5g 桉油 31.25ml。
【性状】	本品为棕色的软胶囊，内容物为含有少量悬浮固体浸膏的黄色油状液体；气芳香，味辛辣。
【功能与主治】	健胃，祛暑。用于因中暑而引起的头晕、恶心、腹痛、胃肠不适。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 粒。儿童酌减。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装 0.425g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	七味檫藤子丸
【处方】	檫藤子仁(炒)220g 毛叶巴豆茎及叶 220g 阿魏 3g 胡椒 13g 蔓荆子 66g 蔓荆子叶 154g 黑种草子 220g 墨旱莲 220g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的水丸，有蒜样臭气，味辛、微苦。
【功能与主治】	祛暑，和中，解痉止痛。用于吐泻腹痛，胸闷，胁痛，头痛发热。
【用法与用量】	口服。一次 3~6 g，一日 3 次；外用，研末以麻油调敷患处。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	六一散
-------------	------------

【处方】	滑石粉 600g 甘草 100g。
【性状】	本品为浅黄白色的粉末；具甘草甜味，手捻有润滑感。
【功能与主治】	清暑利湿。用于感受暑湿所致的发热、身倦、口渴、泄泻、小便黄少；外用治痱子。
【用法与用量】	调服或包煎服。一次 6~9g，一日 1~2 次；外用，扑撒患处。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，防潮。

【药名】	六合定中丸
【处方】	广藿香 16g 香薷 16g 檀香 36g 紫苏叶 16g 木香 36g 姜厚朴 48g 枳壳(炒) 48g 桔梗 48g 茯苓 48g 炒白扁豆 16g 六神曲(炒) 192g 炒稻芽 192g 陈皮 48g 甘草 48g 木瓜 48g 炒山楂 48g 炒麦芽 192g。
【性状】	本品为黄褐色的水丸；气微香，味微酸、苦。
【功能与主治】	祛暑除湿，和中消食。用于夏伤暑湿，宿食停滞，寒热头痛，胸闷恶心，吐泻腹痛。
【用法与用量】	口服。一次 3~6g，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	正金油软膏
【处方】	薄荷脑 150g 樟脑 80g 桉油 30g 薄荷素油 120g 樟油 80g 丁香罗勒油 30g。
【性状】	本品为浅黄色的固状油膏；气芳香，具清凉感。
【功能与主治】	驱风兴奋，局部止痛、止痒。用于中暑头晕，伤风鼻塞，蚊叮虫咬。
【用法与用量】	外用。涂于患处。
【注意】	无。
【规格】	每盒装(1)3g。(2)4g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	甘露消毒丸
【处方】	滑石 300g 茵陈 220g 石菖蒲 120g 木通 100g 射干 80g 豆蔻 80g 连翘 80g 黄芩 200g 川贝母 100g 藿香 80g 薄荷 80g。
【性状】	本品为灰黄色的水丸；气微香，味苦、微辛。
【功能与主治】	芳香化湿，清热解毒。用于暑湿蕴结，身热肢痠，胸闷腹胀，尿赤黄疸。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2 次。
【注意】	服药期间忌食辛辣油腻食物。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	庆余辟瘟丹
-------------	--------------

<p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>羚羊角 30g 大黄 30g 玄精石 30g 朱砂 30g 制川乌 30g 姜半夏 30g 雄黄 15g 滑石 30g 姜厚朴 30g 郁金 30g 茜草 30g 黄芩 30g 黄柏 30g 升麻 20g 天麻 20g 拳参 20g 丹参 20g 石菖蒲 20g 蒲黄 20g 麻黄 20g 人工麝香 15g 醋香附 30g 藿香 30g 玄明粉 30g 木香 30g 五倍子 30g 苍术(米泔水润炒) 30g 苏合香 30g 玳瑁 30g 黄连 30g 猪牙皂 30g 肉桂 30g 茯苓 30g 金银花 30g 柴胡 20g 紫苏叶 20g 白芷 20g 川芎 20g 干姜 20g 桔梗 20g 檀香 20g 琥珀 15g 陈皮 15g 安息香 15g 冰片 15g 千金子霜 10g 巴豆霜 10g 桃仁霜 10g 红大戟 10g 槟榔 10g 葶苈子 10g 煅禹余粮 10g 山豆根 10g 鬼箭羽 40g 赤豆 40g 人工牛黄 8g 醋元花 5g 斑蝥(去头、足、翅)0.8g 水牛角浓缩粉 60g 细辛 10g 丁香 10g 当归 10g 甘遂(制)10g 莪术 10g 胡椒 10g 炒白芍 10g 桑白皮 10g 山慈菇 40g 降香 40g 紫菀 8g 铜石龙子 1 条, 蜈蚣(去头、足)2g 大枣 40g 雌黄 15g。</p> <p>本品为棕红色光亮的包衣糊丸, 除去包衣后, 显黄棕色; 气香, 味苦、辛。辟秽气, 止吐泻。用于感受暑邪, 时行痧气, 头晕胸闷, 腹痛吐泻。</p> <p>口服。一次 1.25~2.5g, 一日 1~2 次。</p> <p>孕妇禁服。</p> <p>每 30 粒重 1.25g。</p> <p>密封。</p>
--	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>红色正金软膏</p> <p>薄荷脑 150g 肉桂油 30g 樟油 50g 丁香罗勒油 30g 薄荷素油 100g 樟脑 50g 桉油 60g。</p> <p>本品为红棕色的软膏; 气芳香。</p> <p>驱风、兴奋、局部止痒、止痛。用于中暑、头晕、伤风鼻塞、虫咬、蚊叮。</p> <p>外用, 涂搽于太阳穴或患处。</p> <p>无。</p> <p>(1) 每盒装 3g; (2) 每盒装 4g。</p> <p>密封, 置阴凉处。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>红灵散</p> <p>人工麝香 71.4g 朱砂 238.1g 煅金礞石 95.2g 冰片 71.4g 雄黄 142.8g 硼砂 142.8g 硝石(精制)238.1g。</p> <p>本品为棕色至红棕色的粉末; 气芳香浓郁, 味微苦。</p> <p>祛暑, 开窍, 辟瘟, 解毒。用于中暑昏厥, 头晕胸闷, 恶心呕吐, 腹痛泄泻。</p> <p>口服。一次 0.6g, 一日 1 次。</p> <p>孕妇禁用。</p> <p>每瓶装 0.6g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p>	<p>周氏回生丸</p> <p>五倍子 60g 木香 9g 丁香 9g 千金子霜 30g 山慈菇 45g 人工麝香 9g 冰片 1g</p>
---------------------------------------	---

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>檀香 9g 沉香 9g 甘草 15g 红大戟(醋制)4.5g 六神曲(麸炒)150g 雄黄 9g 朱砂 18g。</p> <p>本品为红色的糊丸；除去包衣后显棕黄色至棕褐色。气香，味微苦。</p> <p>祛暑散寒，解毒辟秽，化湿止痛。用于霍乱吐泻，痧胀腹痛。</p> <p>口服。一次 10 丸，一日 2 次。</p> <p>孕妇禁服；不宜久服。</p> <p>每 10 丸重 1.5g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>益元散</p> <p>滑石 600g 甘草 100g 朱砂 30g。</p> <p>本品为浅粉红色的粉末，手捻有润滑感；味甜。</p> <p>清暑利湿。用于感受暑湿，身热心烦，口渴喜饮，小便短赤。</p> <p>调服或煎服。一次 6g，一日 1~2 次。</p> <p>无。</p> <p>无。</p> <p>密闭，防潮。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>清热银花糖浆</p> <p>山银花 100g 白茅根 100g 大枣 50g 绿茶叶 8g 菊花 100g 通草 20g 甘草 20g。</p> <p>本品为棕色的黏稠液体；味甜、微苦。</p> <p>清热解毒，通利小便。用于外感暑湿所致的头痛如裹、目赤口渴、小便不利。</p> <p>口服。一次 20ml，一日 3 次。</p> <p>无。</p> <p>(1) 每支装 10ml；(2) 每支装 20ml；(3) 每瓶装 60ml；(4) 每瓶装 100ml；(5) 每瓶装 120ml。</p> <p>密封，置阴凉处。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>清暑益气丸</p> <p>人参 36g 炒白术 360g 麦冬 72g 醋五味子 36g 黄芪(蜜炙)150g 苍术(米泔炙)144g 泽泻 60g 当归 48g 黄柏 60g 醋青皮 72g 葛根 348g 陈皮 72g 六神曲(麸炒)84g 升麻 60g 甘草 120g。</p> <p>本品为黄褐色至棕褐色的大蜜丸；气微香，味甜。</p> <p>祛暑利湿，补气生津。用于中暑受热，气津两伤，症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。</p> <p>姜汤或温开水送服。一次 1 丸，一日 2 次。</p> <p>忌食辛辣油腻之品。</p> <p>每丸重 9g。</p> <p>密封。</p>
---	---

【药名】	紫金锭
【处方】	山慈菇 200g 千金子霜 100g 人工麝香 30g 雄黄 20g 红大戟 150g 五倍子 100g 朱砂 40g。
【性状】	本品为暗棕色至褐色的长方形或棍状的块体；气特异，味辛而苦。
【功能与主治】	辟瘟解毒，消肿止痛。用于中暑，脘腹胀痛，恶心呕吐，痢疾泄泻，小儿痰厥；外治疗疮疖肿，疔腮，丹毒，喉风。
【用法与用量】	口服。一次 0.6~1.5g，一日 2 次。外用，醋磨调敷患处。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，遮光。

【药名】	暑症片
【处方】	猪牙皂 80g 细辛 80g 薄荷 69g 广藿香 69g 木香 46g 白芷 23g 防风 46g 陈皮 46g 清半夏 46g 桔梗 46g 甘草 46g 贯众 46g 枯矾 23g 雄黄 57g 朱砂 57g。
【性状】	本品为浅棕黄色的片；气香，味辛。
【功能与主治】	祛寒辟瘟，化浊开窍。用于夏令中恶昏厥，牙关紧闭，腹痛吐泻，四肢发麻。
【用法与用量】	口服。一次 2 片，一日 2~3 次；必要时将片研成细粉，取少许吹入鼻内取嚏。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	暑湿感冒颗粒
【处方】	广藿香 194g 防风 130g 紫苏叶 194g 佩兰 194g 白芷 130g 苦杏仁 130g 大腹皮 130g 香薷 130g 陈皮 130g 生半夏 194g 茯苓 194g。
【性状】	本品为浅棕黄色至棕黄色颗粒；味苦。
【功能与主治】	清暑祛湿，芳香化浊。用于暑湿感冒，症见胸闷呕吐，腹泻便溏，发热，汗出不畅。
【用法与用量】	口服。一次 1 袋，一日 3 次，小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 8g；(2) 每袋装 3g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	痧药
【处方】	丁香 21g 天麻 126g 大黄 210g 冰片 0.5g 制蟾酥 63g 朱砂 126g 苍术 110g 麻黄 126g 甘草 84g 人工麝香 10.5g 雄黄 126g。
【性状】	本品为朱红色光亮的包衣水丸，除去包衣后显深黄色至黄棕色；气香，味甘、苦，有麻舌感。
【功能与主治】	祛暑解毒，辟秽开窍。用于夏令贪凉饮冷，感受暑湿，症见猝然闷乱烦躁、腹痛吐泻、牙关紧闭、四肢逆冷。

【用法与用量】	口服。一次 10~15 丸，一日 1 次；小儿酌减，或遵医嘱。外用，研细吹鼻取嚏。
【注意】	按规定用量服用，不宜多服；孕妇禁用。
【规格】	每 33 丸重 1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	避瘟散
【处方】	檀香 156g 白芷 42g 姜黄 18g 甘松 18g 木香 36g 冰片 138g 薄荷脑 138g 零陵香 18g 香排草 180g 玫瑰花 42g 丁香 42g 人工麝香 1.4g 朱砂 662g。
【性状】	本品为朱红色的粉末；气香，味凉。
【功能与主治】	祛暑避秽，开窍止痛。用于夏季暑邪引起的头目眩晕、头痛鼻塞、恶心、呕吐、晕车晕船。
【用法与用量】	口服。一次 0.6g。外用适量，吸入鼻孔。
【注意】	无。
【规格】	每盒装 0.6g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

跌打损伤诸病

跌扑损伤血瘀出血肿痛闪腰岔气

【药名】	七厘胶囊
【处方】	血竭 273g 乳香(制) 41g 没药(制) 41g 红花 41g 儿茶 65g 冰片 3.27g 人工麝香 3.27g 朱砂 32.7g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为朱红色至紫红色的粉末或易松散的块；气香，味辛、苦，有清凉感。
【功能与主治】	化瘀消肿，止痛止血。用于跌扑损伤，血瘀疼痛，外伤出血。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 粒，一日 1~3 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封，置阴凉干燥处。

【药名】	七厘散
【处方】	血竭 500g 乳香(制) 75g 没药(制) 75g 红花 75g 儿茶 120g 冰片 6g 人工麝香 6g 朱砂 60g。
【性状】	本品为朱红色至紫红色的粉末或易松散的块；气香，味辛、苦，有清凉感。
【功能与主治】	化瘀消肿，止痛止血。用于跌扑损伤，血瘀疼痛，外伤出血。
【用法与用量】	口服。一次 1~1.5g，一日 1~3 次，外用，调敷患处。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每瓶装 (1) 1.5g；(2) 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	九分散
【处方】	马钱子粉 250g 麻黄 250g 乳香(制) 250g 没药(制) 250g。
【性状】	本品为黄褐色至深黄褐色的粉末，遇热或重压易粘结；气微香，味微苦。
【功能与主治】	活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛。
【用法与用量】	口服，一次 2.5g，一日 1 次，饭后服用；外用，创伤青肿未破者以酒调敷患处。
【注意】	本品含毒性药，不可多服；孕妇禁用，小儿及体弱者遵医嘱服用；破伤出血者不可外敷。
【规格】	每袋装 2.5g。
【贮藏】	密闭，防热，防潮。

【药名】	三七伤药片
【处方】	三七 52.5g 制草乌 52.5g 雪上一枝蒿 23g 冰片 1.05g 骨碎补 492.2g 红花 157.5g 接骨木 787.5g 赤芍 87.5g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味微苦。
【功能与主治】	舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，风湿瘀阻，关节痹痛；急慢性扭挫伤、神经痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 片，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	本品药性强烈，应按规定量服用；孕妇忌用；有心血管疾病患者慎用。
【规格】	(1) 薄膜衣每片重 0.3g；(2) 薄膜衣每片重 0.35g；(3) 糖衣片片心重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	三七伤药胶囊
【处方】	三七 52.5g 制草乌 52.5g 雪上一枝蒿 23.0g 冰片 1.05g 骨碎补 492.2g 红花 157.5g 接骨木 787.5g 赤芍 87.5g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至深棕色的粉末；味微苦。
【功能与主治】	舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，风湿瘀阻，关节痹痛；急慢性扭挫伤、神经痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3 粒，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	本品药性强烈，应按规定量服用，孕妇忌用，有心血管疾病患者慎用。
【规格】	(1) 每粒装 0.25g；(2) 每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	三七伤药颗粒
【处方】	三七 157.5g 制草乌 157.5g 雪上一枝蒿 69.0g 冰片 3.15g 骨碎补 1476.6g 红花 472.5g 接骨木 2362.5g 赤芍 262.5g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味微苦。
【功能与主治】	舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，风湿瘀阻，关节痹痛；急慢性扭挫伤、神经痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次 1 袋，一日 3 次；或遵医嘱。
【注意】	本品药性强烈，应按规定量服用；孕妇忌用；有心血管疾病患者慎用。

【规格】	每袋装 1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	大七厘散
【处方】	煅自然铜 96.6g 土鳖虫(炒)96.6g 酒大黄 96.6g 骨碎补 96.6g 当归尾(酒制)96.6g 乳香(制)96.6g 没药(制)96.6g 硼砂(煅)96.6g 血竭 96.6g 三七 87.0g 冰片 43.5g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的粉末或可松散团块；气香，味微苦、略辛凉。
【功能与主治】	化瘀消肿，止痛止血。用于跌打损伤，瘀血疼痛，外伤止血。
【用法与用量】	用黄酒或温开水冲服，一次 0.6~1.5g，一日 2~3 次；外用以白酒调敷患处。
【注意】	孕妇忌服，但可外用。
【规格】	每袋装 1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	五虎散
【处方】	当归 350g 红花 350g 防风 350g 制天南星 350g 白芷 240g。
【性状】	本品为橘黄色至暗黄色的粉末，气微香，味微辛。
【功能与主治】	活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛。
【用法与用量】	温黄酒或温开水送服。一次 6g，一日 2 次；外用，白酒调敷患处。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	止痛紫金丸
【处方】	丁香 50g 当归 50g 血竭 50g 熟大黄 50g 木香 50g 红花 50g 土鳖虫 25g 没药(制)25g 自然铜(煅)25g 儿茶 50g 骨碎补(烫)50g 乳香(制)25g 赤芍 25g 甘草 25g。
【性状】	本品为黑褐色的大蜜丸；气微腥，味苦、涩。
【功能与主治】	舒筋活血，消瘀止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气，瘀血作痛，筋骨疼痛。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	少林风湿跌打膏
【处方】	生川乌 16g 乌药 16g 白芷 16g 土鳖虫 16g 三棱 16g 当归 16g 肉桂 16g 连翘 32g 乳香(炒)6g 三七 6g 薄荷脑 8g 生草乌 16g 白及 16g 白薇 16g 木瓜 16g 莪术 16g 赤芍 16g 大黄 32g 血竭 10g 没药(炒)6g 儿茶 6g 水杨酸甲酯 8g 冰片 8g。
【性状】	本品为微红色的片状橡胶膏，布面具有小圆孔；气芳香。

【功能与主治】	散瘀活血，舒筋止痛，祛风散寒。用于跌打损伤、风湿痹病，症见伤处瘀肿疼痛、腰肢痠麻。
【用法与用量】	贴患处。
【注意】	孕妇慎用或遵医嘱。
【规格】	(1)5cm X 7cm; (2)8cm X 9.5cm。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	伤痛宁片
【处方】	制乳香 6.5g 制没药 6.5g 甘松 6.5g 醋延胡索 13g 细辛 13g 醋香附 65g 山柰 65g 白芷 104g。
【性状】	本品为浅棕黄色至棕黄色的片；或为薄膜衣片，除去包衣后显浅棕黄色至棕黄色；气特异，味辛辣、苦。
【功能与主治】	散瘀止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气，症见皮肤青紫、瘀斑、肿胀、疼痛、活动受限。
【用法与用量】	口服。一次 5 片，一日 2 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	(1)素片每片重 0.36g；(2)薄膜衣片每片重 0.36g。
【贮藏】	密封。

【药名】	红药贴膏
【处方】	三七，土鳖虫，当归，冰片，水杨酸甲酯，颠茄流浸膏，盐酸苯海拉明，白芷，川芎，红花，樟脑，薄荷脑，硫酸软骨素。
【性状】	本品为淡红色片状橡胶膏；气芳香。
【功能与主治】	祛瘀生新，活血止痛。用于跌打损伤，筋骨瘀痛。
【用法与用量】	外用，洗净患处，贴敷，1~2 日更换一次。
【注意】	凡对橡皮膏过敏及皮肤有破伤出血者不宜贴敷。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭，置阴凉干燥处。

【药名】	克伤痛搽剂
【处方】	当归，川芎，红花，丁香，生姜，樟脑，松节油。
【性状】	本品为红棕色的澄清液体；气香。
【功能与主治】	活血化瘀，消肿止痛。用于急性软组织扭挫伤，症见皮肤青紫瘀斑、血肿疼痛。
【用法与用量】	外用适量，涂擦患处并按摩至局部发热，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装(1)30ml；(2)40ml；(3)100ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	沈阳红药胶囊
【处方】	三七，白芷，土鳖虫，延胡索，川芎，当归，红花。

【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄色至棕黄色的粉末；味微甜、微辛、苦。
【功能与主治】	活血止痛，祛瘀生新。用于跌打损伤，筋骨肿痛，亦可用于血瘀络阻的风湿麻木。
【用法与用量】	口服。一次2粒，一日3次。
【注意】	孕妇禁用；经期停服。
【规格】	每粒装0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	治伤胶囊
【处方】	生关白附，防风，羌活，虎掌南星(姜矾制)，白芷。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄色的粉末；味苦，稍有麻舌感。
【功能与主治】	祛风散结，消肿止痛。用于跌打损伤所致之外伤红肿，内伤胁痛。
【用法与用量】	口服。用温黄酒或温开水送服，一次4~6粒，一日1~2次，或遵医嘱。 外用，取内容物用白酒或醋调敷患处。
【注意】	孕妇禁服；本品药性剧烈，必须按规定剂量服用。
【规格】	每粒装0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	云南白药胶囊
【处方】	国家保密配方。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰黄色至浅棕黄色的粉末；具特异香气，味略感清凉，并有麻舌感。保险子为红色的球形或类球形水丸，剖面呈棕色或棕褐色，气微，味微苦。
【功能与主治】	化瘀止血，活血止痛，解毒消肿。用于跌打损伤，瘀血肿痛，吐血、咳血、便血、痔血、崩漏下血，手术出血，疮疡肿毒及软组织挫伤，闭合性骨折，支气管扩张及肺结核咳血，溃疡病出血，以及皮肤感染性疾病。
【用法与用量】	刀、枪、跌打诸伤，无论轻重，出血者用温开水送服；瘀血肿痛与未流血者用酒送服；妇科各症，用酒送服；但月经过多、红崩，用温水送服。毒疮初起，服0.25g，另取药粉，用酒调匀，敷患处，如已化脓，只需内服。其他内出血各症均可内服。口服，一次1~2粒。一日4次(二至五岁按1/4量服用；六至十二岁按1/2剂量服用)。凡遇较重的跌打损伤可先服保险子一粒，轻伤及其他病症不必服。
【注意】	孕妇忌用；服药一日内，忌食蚕豆、鱼类及酸冷食物。
【规格】	每粒装0.25g。
【贮藏】	密封，置干燥处。

【药名】	云南白药
【处方】	国家保密配方。
【性状】	本品为灰黄色至浅棕黄色的粉末；具特异香气；味略感清凉，并有麻舌感。保险子为红色的球形或类球形水丸，剖面呈棕色或棕褐色；气微，味微苦。
【功能与主治】	化瘀止血，活血止痛，解毒消肿。用于跌打损伤，瘀血肿痛，吐血、咳血、便血、痔血、崩漏下血，手术出血，疮疡肿毒及软组织挫伤，闭合性骨折，

<p>【用法与用量】</p>	<p>支气管扩张及肺结核咳血，溃疡病出血，以及皮肤感染性疾病。</p> <p>刀、枪、跌打诸伤，无论轻重，出血者用温开水送服；瘀血肿痛与未流血者用酒送服；妇科各症，用酒送服；但月经过多、红崩，用温水送服。毒疮初起，服 0.25g，另取药粉，用酒调匀，敷患处，如已化脓，只需内服。其他内出血各症均可内服。口服，一次 0.25~0.5g。一日 4 次（二至五岁按 1/4 量服用；六至十二岁按 1/2 剂量服用）。凡遇较重的跌打损伤可先服保险子一粒，轻伤及其他病症不必服。</p>
<p>【注意】</p>	<p>孕妇忌用；服药一日内，忌食蚕豆、鱼类及酸冷食物。</p>
<p>【规格】</p>	<p>每瓶装 4g，保险子 1 粒。</p>
<p>【贮藏】</p>	<p>密封，置干燥处。</p>

<p>【药名】</p>	<p>独一味片</p>
<p>【处方】</p>	<p>独一味 1000g。</p>
<p>【性状】</p>	<p>本品为薄膜衣片或糖衣片，除去包衣后显深棕色；味微苦。</p>
<p>【功能与主治】</p>	<p>活血止痛，化瘀止血。用于多种外科手术后的刀口疼痛、出血，外伤骨折，筋骨扭伤，风湿痹痛以及崩漏、痛经、牙龈肿痛、出血。</p>
<p>【用法与用量】</p>	<p>口服。一次 3 片，一日 3 次。7 日为一疗程；或必要时服。</p>
<p>【注意】</p>	<p>孕妇慎用。</p>
<p>【规格】</p>	<p>(1) 薄膜衣片每片重 0.28g；(2) 糖衣片(片心重 0.26g)。</p>
<p>【贮藏】</p>	<p>密封。</p>

<p>【药名】</p>	<p>独一味胶囊</p>
<p>【处方】</p>	<p>独一味 1000g。</p>
<p>【性状】</p>	<p>本品为硬胶囊，内容物为深棕色的颗粒和粉末；味微苦。</p>
<p>【功能与主治】</p>	<p>活血止痛，化瘀止血。用于多种外科手术后的刀口疼痛、出血，外伤骨折，筋骨扭伤，风湿痹痛以及崩漏、痛经、牙龈肿痛、出血。</p>
<p>【用法与用量】</p>	<p>口服。一次 3 粒，一日 3 次。7 日为一疗程；或必要时服。</p>
<p>【注意】</p>	<p>孕妇慎用。</p>
<p>【规格】</p>	<p>每粒装 0.3g。</p>
<p>【贮藏】</p>	<p>密封。</p>

<p>【药名】</p>	<p>独圣活血片</p>
<p>【处方】</p>	<p>三七，香附(四炙)，当归，醋延胡索，鸡血藤，大黄，甘草。</p>
<p>【性状】</p>	<p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦、辛。</p>
<p>【功能与主治】</p>	<p>活血消肿，理气止痛。用于跌打损伤，瘀血肿胀及气滞血瘀所致的痛经。</p>
<p>【用法与用量】</p>	<p>口服。一次 3 片，一日 3 次。</p>
<p>【注意】</p>	<p>孕妇禁用。</p>
<p>【规格】</p>	<p>(1) 薄膜衣片每片重 0.41g；(2) 糖衣片(片心重 0.4g)。</p>
<p>【贮藏】</p>	<p>密封。</p>

<p>【药名】</p>	<p>活血止痛胶囊</p>
--------------------	----------------------

【处方】	当归 222g 三七 44g 醋乳香 44g 冰片 11g 土鳖虫 111g 煅自然铜 67g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至灰褐色的粉末；气香，味辛、苦、凉。
【功能与主治】	活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛。
【用法与用量】	用温黄酒或温开水送服。一次 3 粒〔规格(1)〕或一次 4 粒〔规格(2)〕，一日 2 次；一次 6 粒〔规格(3)〕，一日 2 次，或一次 4 粒〔规格(3)〕，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	(1) 每粒装 0.5g；(2) 每粒装 0.37g；(3) 每粒装 0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	活血止痛散
【处方】	当归 400g 三七 80g 乳香(制)80g 冰片 20g 土鳖虫 200g 煅自然铜 120g。
【性状】	本品为灰褐色的粉末；气香，味辛、苦、凉。
【功能与主治】	活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛。
【用法与用量】	用温黄酒或温开水送服。一次 1.5g，一日 2 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	祛伤消肿酊
【处方】	连钱草，生草乌，冰片，莪术，红花，血竭，川芎，桂枝，威灵仙，茅膏菜，了哥王，海风藤，野木瓜，两面针，天南星，白芷，栀子，酢浆草，樟脑，薄荷脑。
【性状】	本品为黄棕色液体，气芳香。
【功能与主治】	活血化瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，皮肤青紫瘀斑，肿胀疼痛，关节屈伸不利；急性扭挫伤见上述证候者。
【用法与用量】	外用，用棉花浸取药液涂擦患处。一日 3 次。
【注意】	孕妇及皮肤破损处禁用。使用过程中若出现皮疹等皮肤过敏者应停用。
【规格】	每瓶装 20ml。
【贮藏】	密封，避光，于阴凉干燥处保存。

【药名】	消肿止痛酊
【处方】	木香 71g 荆芥 71g 五加皮 71g 牛膝 71g 徐长卿 71g 莪术 71g 大罗伞 152g 两面针 152g 栀子 152g 沉香 49g 薄荷脑 83g 防风 71g 细辛 71g 桂枝 71g 川芎 71g 白芷 106g 红杜仲 106g 小罗伞 106g 黄藤 144g 三棱 106g 樟脑 83g。
【性状】	本品为黄褐色的澄清液体；气芳香，味辛、苦。
【功能与主治】	舒筋活络，消肿止痛。用于跌打扭伤，风湿骨痛，无名肿毒及腮腺炎肿痛。
【用法与用量】	外用，擦患处；口服，一次 5~10ml，一日 1~2 次；必要时饭前服用。
【注意】	孕妇及皮肤破损处禁用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	跌打活血散
【处方】	红花 120g 血竭 14g 烫骨碎补 60g 乳香(炒) 60g 儿茶 40g 冰片 4g 当归 60g 三七 20g 续断 60g 没药(炒) 60g 大黄 40g 土鳖虫 40g。
【性状】	本品为红棕色至红褐色的粉末；气香，味微苦。
【功能与主治】	舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，瘀血疼痛，闪腰岔气。
【用法与用量】	口服，温开水或黄酒送服，一次 3g，一日 2 次。外用，以黄酒或醋调敷患处。
【注意】	皮肤破伤处不宜敷；孕妇禁用。
【规格】	每袋(瓶)装 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	跌打镇痛膏
【处方】	土鳖虫 48g 生草乌 48g 马钱子 48g 大黄 48g 降香 48g 两面针 48g 黄芩 48g 黄柏 48g 虎杖 15g 冰片 24g 薄荷素油 30g 樟脑 60g 水杨酸甲酯 60g 薄荷脑 30g。
【性状】	本品为棕黑色的片状橡胶膏，久置后膏背面有轻微泛黄，气芳香。
【功能与主治】	活血止痛，散瘀消肿，祛风胜湿。用于急、慢性扭挫伤，慢性腰腿痛，风湿关节痛。
【用法与用量】	外用，贴患处。
【注意】	孕妇及皮肤过敏者慎用。
【规格】	每贴(1)10cm X 7cm；(2)10cm X 400cm。
【贮藏】	密封。

【药名】	筋痛消酊
【处方】	乳香(制)，没药(制)，大黄，红花，煅自然铜，三七，血竭，川芎，郁金，当归，栀子，刘寄奴，紫荆皮，儿茶，白芷，肉桂，防风，木香，香附，厚朴，小茴香，制川乌，制草乌，浙贝母，天南星(制)，木瓜，樟脑，冰片，木鳖子，羌活，陈皮。
【性状】	本品为深红棕色的澄清液体；气香。
【功能与主治】	活血化瘀，消肿止痛。用于急性闭合性软组织损伤。
【用法与用量】	外用。用药棉浸渍药液 10~20ml，湿敷患处 1 小时，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁用；开放性损伤禁用；偶见局部瘙痒、皮疹。
【规格】	(1)每瓶装 30ml；(2)每瓶装 80ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	麝香祛痛气雾剂
【处方】	人工麝香 0.33g 红花 1g 樟脑 30g 独活 1g 冰片 20g 龙血竭 0.33g 薄荷脑 10g 地黄 20g 三七 0.33g。
【性状】	本品为非定量阀门气雾剂，在耐压容器中的药液为橙红色澄清液体；气芳香。
【功能与主治】	活血祛瘀，舒经活络，消肿止痛。用于各种跌打损伤，瘀血肿痛，风湿瘀

【用法与用量】	阻，关节疼痛。 外用。喷涂患处，按摩5~10分钟至患处发热，一日2~3次；软组织扭伤严重或有出血者，将药液喷湿的棉垫敷于患处。
【注意】	孕妇慎用，乙醇过敏者慎用。
【规格】	每瓶内容物重72g，含药液56ml。
【贮藏】	遮光，30℃以下密封贮存。

【药名】	麝香祛痛搽剂
【处方】	人工麝香0.33g 红花1g 樟脑30g 独活1g 冰片20g 龙血竭0.33g 薄荷脑10g 地黄20g 三七0.33g。
【性状】	本品为橙黄色至棕黄色的澄清液体；气芳香。
【功能与主治】	活血祛瘀，舒经活络，消肿止痛。用于各种跌打损伤，瘀血肿痛，风湿痹阻，关节疼痛。
【用法与用量】	外用。喷涂患处，按摩5~10分钟至患处发热，一日2~3次；软组织扭伤严重或有出血者，将药液喷湿的棉垫敷于患处。
【注意】	孕妇慎用，乙醇过敏者慎用。
【规格】	每瓶装56ml。
【贮藏】	遮光，30℃以下密封贮存。

【药名】	麝香跌打风湿膏
【处方】	跌打风湿流浸膏300g 颠茄流浸膏300g 枫香脂225g 冰片120g 薄荷油120g 丁香罗勒油20g 樟脑120g 肉桂油40g 水杨酸甲酯200g 人工麝香0.4g。
【性状】	本品为黄白色至黄褐色的片状橡胶膏；气香。
【功能与主治】	祛风除湿，化瘀止痛。用于风湿痛，跌打损伤，肿痛。
【用法与用量】	外用，贴敷洗净患处。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	6cm X 10cm。
【贮藏】	密闭。

跌扑损伤骨折脱臼筋伤岔气

【药名】	骨折挫伤胶囊
【处方】	猪骨 250g 煨自然铜 25g 大黄 15g 醋乳香 10g 血竭 10g 炒黄瓜子 200g 红花 25g 当归 15g 醋没药 10g 土鳖虫 3g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；味辛辣。
【功能与主治】	舒筋活络，消肿散瘀，接骨止痛。用于跌打损伤，扭腰岔气，筋伤骨折属于瘀血阻络者。
【用法与用量】	用温黄酒或温开水送服。一次 4~6 粒，一日 3 次；小儿酌减。
【注意】	孕妇禁服。
【规格】	每粒装 0.29g。
【贮藏】	密封。

【药名】	伤科接骨片
【处方】	红花，土鳖虫，朱砂，马钱子粉，炙没药，三七，海星，炙鸡骨，冰片，煨自然铜，炙乳香，甜瓜子。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显灰褐色至棕褐色；味苦、腥。
【功能与主治】	活血化瘀，消肿止痛，舒筋壮骨。用于跌打损伤，闪腰岔气，筋伤骨折，瘀血肿痛。
【用法与用量】	口服。成人一次 4 片，十至十四岁儿童一次 3 片，一日 3 次。以温开水或温黄酒送服。
【注意】	(1) 本品不可随意增加剂量，增加时，需遵医嘱。(2) 孕妇忌服。(3) 十岁以下儿童禁服。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.33g；(2) 糖衣片(片心重 0.33g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	正骨水
【处方】	九龙川，海风藤，豆豉姜，香加皮，买麻藤，香樟，降香，碎骨木，虎杖，千斤拔，横经席，鹰不扑，薄荷脑，木香，土鳖虫，大皂角，莪术，过江龙，徐长卿，两面针，羊耳菊，五味藤，朱砂根，穿壁风，草乌，樟脑。
【性状】	品为棕红色的澄清液体；气芳香。

【功能与主治】	活血祛瘀，舒筋活络，消肿止痛。用于跌打扭伤，骨折脱位以及体育运动前后消除疲劳。
【用法与用量】	用药棉蘸药液轻搽患处；重症者用药液湿透药棉敷患处1小时，每日2~3次。
【注意】	忌内服；不能搽入伤口；用药过程中如有瘙痒起疹，暂停使用。
【规格】	每瓶装(1)12ml；(2)30ml；(3)45ml；(4)88ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	外伤如意膏
【处方】	紫草 120g 地榆 120g 栀子 120g 大黄 120g 黄芩 120g 黄柏 120g 冰片 5g。
【性状】	本品为青黄色至棕黄色的软膏。
【功能与主治】	清热解毒，凉血散瘀，消肿止痛，止血生肌。用于跌打损伤，骨折脱臼，筋伤积瘀，皮肉损伤化脓，烫火伤。
【用法与用量】	外用。涂敷患处，一日1次，或制成软膏纱布外敷，一至三日换药1次。
【注意】	无。
【规格】	每支装30g。
【贮藏】	密封。

【药名】	恒古骨伤愈合剂
【处方】	陈皮 10g 三七 30g 人参 20g 洋金花 6g 鳖甲 10g 红花 15g 杜仲 30g 黄芪 40g 钻地风 10g。
【性状】	本品为棕褐色液体；味辛、微苦。
【功能与主治】	活血益气、补肝肾、接骨续筋、消肿止痛、促进骨折愈合。用于新鲜骨折及陈旧骨折、股骨头坏死、骨关节病、腰椎间盘突出症。
【用法与用量】	口服。成人一次25ml，六至十二岁一次12.5ml，每2日服用1次。饭后一小时服用，12天为一个疗程。
【注意】	(1)骨折患者需固定复位后再用药。(2)心、肺、肾功能不全者慎用。(3)精神病史者、青光眼、孕妇忌用。(4)少数患者服药后出现口干、轻微头晕，可自行缓解。
【规格】	每瓶(1)12.5ml；(2)25ml；(3)50ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	养血荣筋丸
【处方】	当归 45g 鸡血藤 75g 何首乌(黑豆酒炙) 150g 赤芍 75g 续断 75g 桑寄生 75g 铁丝威灵仙(酒炙) 45g 伸筋草 75g 透骨草 45g 油松节 45g 盐补骨脂 60g 党参 75g 炒白术 60g 陈皮 45g 木香 45g 赤小豆 75g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的大蜜丸；气香，味甜。
【功能与主治】	养血荣筋，祛风通络。用于陈旧性跌打损伤，症见筋骨疼痛、肢体麻木、肌肉萎缩、关节不利。
【用法与用量】	口服。一次1~2丸，一日2次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每丸重9g。

【贮藏】	密封。
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>中华跌打丸</p> <p>牛白藤 76.8g 地耳草 76.8g 鹤不食草 76.8g 乌药 76.8g 鬼画符 76.8g 羊耳菊 76.8g 过岗龙 76.8g 穿破石 76.8g 鸡血藤 76.8g 岗梅 76.8g 丁茄根 76.8g 独活 76.8g 急性子 76.8g 制川乌 38.4g 香附 153.6g 桂枝 15.36g 假蒟 76.8g 牛尾菜 76.8g 牛膝 76.8g 红杜仲 76.8g 山桔叶 76.8g 刘寄奴 76.8g 山香 76.8g 毛两面针 76.8g 丢了棒 76.8g 木鳖子 76.8g 大半边莲 76.8g 苍术 76.8g 建栀 76.8g 丁香 38.4g 黑老虎根 153.6g 樟脑 3.84g。</p> <p>本品为棕褐色至黑褐色的水蜜丸、小蜜丸或大丸；味甜，微辛辣。</p> <p>消肿止痛，舒筋活络，止血生肌，活血祛瘀。用于挫伤筋骨，新旧瘀痛，创伤出血，风湿瘀痛。</p> <p>口服。水蜜丸一次 3g，小蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。儿童及体虚者减半。</p> <p>孕妇忌服；皮肤破伤出血者不可外敷。</p> <p>(1) 水蜜丸每 66 丸重 3g；(2) 小蜜丸 20 丸重 6g；(3) 小蜜丸每 30 丸重 6g；(4) 大蜜丸每丸重 6g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>跌打丸</p> <p>三七 64g 白芍 48g 桃仁 32g 血竭 48g 烫骨碎补 32g 苏木 48g 乳香(制) 48g 姜黄 24g 防风 32g 枳实(炒) 32g 甘草 48g 煅自然铜 32g 当归 32g 赤芍 64g 红花 48g 北刘寄奴 32g 续断 320g 牡丹皮 32g 没药(制) 48g 醋三棱 48g 甜瓜子 32g 桔梗 32g 木通 32g 土鳖虫 32g。</p> <p>本品为黑褐色至黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微腥，味苦。</p> <p>活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，筋断骨折，瘀血肿痛，闪腰岔气。</p> <p>口服。小蜜丸一次 3g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。</p> <p>孕妇禁用。</p> <p>(1) 小蜜丸每 10 丸重 2g；(2) 大蜜丸每丸重 3g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>舒筋活血定痛散</p> <p>乳香(醋炙) 30g 没药(醋炙) 30g 当归 30g 红花 30g 醋延胡索 30g 血竭 30g 醋香附 30g 煅自然铜 30g 骨碎补 30g。</p> <p>本品为红褐色的粉末；气微香，味微苦。</p> <p>舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气，伤筋动骨，血瘀肿痛。</p> <p>温黄酒或温开水冲服。一次 6g，一日 2 次；外用白酒调敷患处。</p> <p>孕妇禁用；脾胃虚弱者慎用。</p> <p>每袋装 12g。</p> <p>密封。</p>

破伤风

【药名】	玉真散
【处方】	生白附子 706g 生天南星 58.8g 天麻 58.8g 防风 58.8g 白芷 58.8g 羌活 58.8g。
【性状】	本品为淡黄色至淡黄棕色的粉末；气香，味麻辣。
【功能与主治】	熄风，镇痉，解痛。用于金创受风所致的破伤风，症见筋脉拘急、手足抽搐，亦可外治跌扑损伤。
【用法与用量】	口服。一次 1~1.5g，或遵医嘱。外用，取适量敷于患处。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每瓶装 1.5g。
【贮藏】	密封。

运动劳损肌肉酸痛

【药名】	按摩软膏(按摩乳)
【处方】	芸香浸膏 1.0g 乳香 0.51g 乌药 0.51g 郁金 0.51g 薄荷油 107g 丁香油 2.0g 颠茄流浸膏 1.0g 没药 0.51g 川芎 0.51g 水杨酸甲酯 100g 肉桂油 2.0g 樟脑 5g。
【性状】	本品为类白色的乳膏；气芳香。
【功能与主治】	活血化瘀，和络止痛。用于运动劳损，肌肉痠痛，跌打扭伤，无名肿痛。
【用法与用量】	孕妇禁用；切勿内服；皮肤破损者禁用。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每瓶装 70g；(2) 每瓶装 100g。
【贮藏】	密封。

【药名】	活血止痛膏
【处方】	干姜 28.6g 山柰 16.1g 白芷 16.1g 甘松 14.3g 大黄 14.3g 生天南星 9g 生半夏 14.3g 没药 3.6g 乳香 3.6g 冰片 7.2g 薄荷脑 7.2g 樟脑 7.2g 陈皮 16.1g 当归 9g 丁香 9g 胡椒 9g 香加皮 7.2g 细辛 7.2g 荆芥 7.2g 桂枝 7.2g 辛夷 5.4g 川芎 5.4g 独活 5.4g 牡丹皮 3.6g 辣椒 3.6g 苍术 3.6g 颠茄流浸膏 10.7g 水杨酸甲酯 10.7g。

【性状】	本品为淡棕黄色至橙黄色的片状橡胶膏；气芳香。
【功能与主治】	活血止痛，舒筋通络。用于筋骨疼痛，肌肉麻痹，痰核流注，关节酸痛。
【用法与用量】	外用，贴患处。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)5cm X 6.5cm；(2)7cm X 10cm。
【贮藏】	密封。

【药名】	舒康贴膏
【处方】	山楂核精。
【性状】	本品为黄白色至灰黄色的片状橡胶膏；具烟熏气。
【功能与主治】	活血，化瘀，止痛。用于软组织闭合性急性损伤和慢性劳损。
【用法与用量】	贴患处。
【注意】	局部皮肤破损或过敏者禁用。
【规格】	(1)每贴5cm X 7cm；(2)每贴6cm X 10cm；(3)每贴7cm X 10cm；(4)每贴7cm X 10cm。
【贮藏】	密封。

【药名】	腰痛丸
【处方】	杜仲叶(盐炒)100g 狗脊(制)75g 当归 100g 炒白术 75g 泽泻 50g 乳香(制) 25g 盐补骨脂 75g 续断 75g 赤芍 40g 牛膝 75g 肉桂 25g 土鳖虫(酒炒)40g。
【性状】	本品为棕褐色至棕黑色的水蜜丸，气微香，味微苦、甘、辛。
【功能与主治】	补肾活血，强筋止痛。用于肾阳不足、瘀血阻络所致的腰痛及腰肌劳损。
【用法与用量】	用盐水送服。一次9g，一日2次。
【注意】	孕妇禁用；阴虚火旺及实热者慎用。
【规格】	(1)每10粒重0.75g；(2)每10粒重1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	腰痛片
【处方】	杜仲叶(盐炒)108g 续断 81g 炒白术 81g 肉桂 27g 狗脊(制) 81g 泽泻 54g 盐补骨脂 81g 当归 108g 牛膝 81g 乳香(制) 27g 赤芍 43g 土鳖虫(酒炒) 43g。
【性状】	本品为薄膜衣片或糖衣片，除去包衣后显褐色；气微香，味苦。
【功能与主治】	补肾活血，强筋止痛。用于肾阳不足、瘀血阻络所致的腰痛及腰肌劳损。
【用法与用量】	用盐水送服。一次6片，一日3次。
【注意】	孕妇禁用；阴虚火旺及实热者慎用。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.35g；(2)糖衣片(片心重0.35g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	麝香舒活搽剂
【处方】	樟脑 28.6g 冰片 17.1g 薄荷脑 6.4g 红花 0.911g 三七 0.438g 人工麝香 0.009g 血竭 0.435g 地黄 19.77g。

【性状】	本品为橙黄色至棕黄色的澄清液体；气香。
【功能与主治】	活血散瘀，消肿止痛。用于闭合性新旧软组织损伤和肌肉疲劳痠痛及风湿痹痛。
【用法与用量】	外用适量，局部按摩或涂搽患处。
【注意】	孕妇及皮肤破损处禁用。使用过程中若出现皮疹等皮肤过敏者应停用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

中医对于风湿的研究和诊断

痹证是由于风、寒、湿、热等邪气闭阻经络，影响气血运行，导致肢体筋骨、关节、肌肉等处发生疼痛、重着、酸楚、麻木，或关节屈伸不利、僵硬、肿大、变形等症状的一种疾病。轻者病在四肢关节肌肉，重者可内舍于脏器而危及生命，所以此类疾病对人们的运动和行走功能等健康影响极大。

中医文献中有关痹证的论述相当丰富。《内经》不仅提出了痹之病名，而且对其病因病机、证候分类以及转归、预后等均作了较详细的论述。如在《素问·痹论》里面就指出：“风、寒、湿三气杂至，合而为痹。其风气胜者为行痹，寒气胜者为痛痹，湿气胜者为着痹也。”《素问·四时刺逆从论》又云：“厥阴有余病阴痹，不足病热痹”。因感邪季节、患病部位及临床症状的不同，《内经》又有五痹之分。《素问·痹论》曰：“以冬遇此者为骨痹，以春遇此者为筋痹，以夏遇此者为脉痹，以至阴遇此者为肌痹，以秋遇此者为皮痹。”《素问·痹论》还以整体观阐述了痹与五脏的关系：“五脏皆有合，病久而不去者，内舍于其合也。故骨痹不已，复感于邪，内舍于肾。筋痹不已，复感于邪，内舍于肝。脉痹不已，复感于邪，内舍于心。肌痹不已，复感于邪，内舍于脾。皮痹不已，复感于邪，内舍于肺”。并在预后方面指出：“其入脏者死，其留连筋骨者痛久，其留连皮肤者易已。”

历代医家根据疾病的不同症状特点，赋予其不同的病名，在治法方药和辨证上亦渐趋丰富。张仲景《金匮要略》有湿痹、血痹、历节之名，其中历节病的特点是遍历关节疼痛，所创桂枝芍药知母汤、乌头汤等方，至今仍为临床常用。巢元方《诸病源候论》又称为“历节风”；王焘《外台秘要》述其症状痛如虎咬，昼轻夜重，而称“白虎病”；严用和《济生方》则称“白虎历节”；朱丹溪《格致余论》又称“痛风”；王肯堂《证治准绳》对膝关节肿大者称为“鹤膝风”，手指关节肿大者称为“鼓槌风”；李中梓《医宗必读·痹》阐明“治风先治血，血行风自灭”的治则；叶天士对痹久不愈，邪入于络，用活血化瘀法治疗，并重用虫类药剔络搜风，对临床均有较大指导意义。

西医学中风湿性关节炎、类风湿性关节炎、反应性关节炎、肌纤维炎、强直性脊柱炎、痛风、增生性骨关节炎等出现痹证的临床表现时，均可参考辨证论治。

痹证的发生与体质因素、气候条件、生活环境及饮食习惯等有密切关系。正虚卫外不

固是痹证发生的内在基础，感受外邪是痹证发生的外在条件。邪气痹阻经脉为其病机根本，病变多波及肢体筋骨、肌肉、关节，甚则影响脏腑而危及生命。

病因

外因

感受风寒湿邪：久居潮湿之地、严寒冻伤、贪凉露宿、睡卧当风、暴雨浇淋、水中作业或汗出入水等，外邪注于肌腠经络，滞留于关节筋骨，导致气血痹阻从而发为风寒湿痹。由于感受风寒湿邪各有所偏盛，而有行痹、痛痹、着痹之别。若素体阳气偏盛，内有蓄热，复感风寒湿邪，可从阳化热；或风寒湿痹经久不愈，亦可蕴而化热。

感受风湿热邪：久居炎热潮湿之地，外感风湿热邪，袭于肌腠，壅于经络，痹阻气血经脉，滞留于关节筋骨，发为风湿热痹。

内因

劳逸不当：劳欲过度，将息失宜，精气亏损，卫外不固；或激烈活动后体力下降，防御机能降低，汗出肌疏，外邪乘袭。

久病体虚：老年体虚，肝肾不足，肢体筋脉失养；或病后、产后气血不足，腠理空疏，外邪乘虚而入。如《济生方·痹》所云：“皆因体虚，腠理空疏，受风寒湿气而成痹也。”此外，恣食甘肥厚腻或酒热海腥发物，导致脾运失健，湿热痰浊内生；或跌仆外伤，损及肢体筋脉，气血经脉痹阻，亦与痹证发生有关。

病机

风、寒、湿、热、痞、瘀等邪气滞留在肢体筋脉、关节、肌肉，经络闭阻，不通则痛，这是痹证的基本病机。感者平素体虚，阳气不足，卫外不固，腠理空虚，易为风、寒、湿、热之邪乘虚侵袭，痹阻筋脉、肌肉、骨节，而致营卫行涩，从而经络不通，发生疼痛、肿胀、酸楚、麻木，或肢体活动欠利。外邪侵袭机体，可因人的禀赋素质不同而有寒热转化。素体阳气偏盛，内有蓄热者，感受风寒湿邪，易从阳化热，而成为风湿热痹。阳气虚衰者，寒自内生，复感风寒湿邪，从阴化寒，而成为风寒湿痹。

病初以邪实为主，邪在经脉，累及筋骨、肌肉、关节。邪痹经脉，络道阻滞，影响气血津液运行输布，血滞为瘀，津停为痰，所以痰浊瘀血在疾病的发展过程中起着重要作用。痹病日久，耗伤气血，损及肝肾，病理性质虚实相兼；部分患者肝肾气血大伤，而筋骨肌肉疼痛酸楚症状较轻，呈现以正虚为主的虚痹。此外，风寒湿热之邪也可由经络内舍脏腑，出现相应的脏腑病变。因此，如果痹证日久，容易出现下述三种病理变化，一是风寒湿痹

或热痹日久不愈，气血运行不畅日甚，瘀血痰浊阻痹经络，出现皮肤瘀斑、关节周围结节、关节肿大畸形、屈伸不利等症；二是病久使正气耗伤，出现不同程度的气血亏损或肝肾不足证候；三是痹证日久不愈，病邪由经络而累及脏腑，出现脏腑痹的证候。而其中以心痹较为多见，《素问·痹论》曰：“心痹者，脉不通，烦则心下鼓，暴上气而喘。”临床常见心烦、惊悸，动则喘促，甚则下肢水肿，不能平卧等严重症状。

辨证要点

痹证的辨证，一是要辨别邪气的偏盛，二是要辨别虚实。临床痹痛游走不定者为行痹，属风邪盛；痛势较甚，痛有定处，逾寒加重者为痛痹，属寒邪盛；关节酸痛、重着、漫肿者为着痹，属湿邪盛；关节肿胀，肌肤焮红，灼热疼痛为热痹，属热邪盛。关节疼痛日久，肿胀局限，或见皮下结节者为痰；关节肿胀，僵硬，疼痛不移，肌肤紫暗或瘀斑等则为瘀。一般说来，痹证新发，风、寒、湿、热之邪明显者为实；痹证日久，耗伤气血，损及脏腑，肝肾不足为虚；病程缠绵，日久不愈，常为痰瘀互结，肝肾亏虚之虚实夹杂证候。

治疗原则

痹证以风、寒、湿、热、痰、瘀痹阻经络气血为基本病机，其治疗应以祛邪通络为基本原则，根据邪气的偏盛，分别予以祛风、散寒、除湿、清热、化痰、行瘀，兼顾“宣痹通络”。

痹证的治疗，治风宜重视养血活血，即民间所谓“治风先治血，血行风自灭”；治寒宜结合温阳补火，即所谓“阳气并则阴凝散”；治湿宜结合健脾益气，即所谓“脾旺能胜湿，气足无顽麻”。久痹正虚者，应重视扶正，补肝肾、益气血是常用之法。

风邪

春季为风木当令的季节，风为春季的主气，故风邪致病，多见于春季，但同时四时皆有。风邪多从皮毛肌腠侵入人体而产生外风病证。

风邪的性质：风邪以轻扬开泄、善行数变、动摇不定、多兼挟他邪为基本特征。风性轻扬开泄、善行数变、动摇不定，故为阳邪。风邪具有轻扬、上浮、外越和发散、疏通、透泄的特征，故有轻扬开泄之性。又来去迅速，易行而无定处，变幻无常，故表现为风性善行数变。风善动不居，其性动摇不定，故《素问·阴阳应象大论》说：“风胜则动。”风邪在六淫之中，四季皆有，为患较多，故常兼挟他邪，多与其他邪气杂合伤人，故其对人体健康影响颇大。

风邪的致病特点

❖ **易于侵袭阳位：**阳位是指病位在上、在表，风为阳邪，阳邪易袭阳位，故风邪致病常易侵袭人体的头面、咽喉、皮肤、腰背等属于阳的部位。例如风邪循经上扰头面，

则头

项强痛、口眼歪斜；风邪犯肺，则鼻塞流涕、咽痒咳嗽；风邪外袭，肺失通调，水道不利，风水相搏，则面目浮肿；风邪袭表，则见恶风、发热等表证症状。风性开泄，故风邪客于皮肤，使腠理失于固密则出现汗出、恶风等症状。

❖ **病位游移不定：**风性善行，故致病有病位游移，行无定处的特点。如风疹、荨麻疹发无定处，此起彼伏；行痹(风痹)之四肢关节游走性疼痛等症状，均属风邪善行的表现。

❖ **发病急骤，变化无常：**风邪致病具有变化无常和发病急骤，症状时隐时现的特点。例如风疹、荨麻疹之发病较急，时隐时现；小儿风水病短时间会发生头面一身悉肿，均反映了风性数变的特点。

❖ **肢体异常运动：**风性主动，风邪致病具有动摇不定的特点。如因受外伤再感风邪，出现的四肢抽搐、角弓反张、直视上吊等“破伤风”症状等。

❖ **常为外邪致病的先导：**六淫之中，风邪居于首位。由于风邪为患较多，致病极为广泛，因此在外感病邪中是主要的致病因素。风邪常为外邪致病的先导，寒、湿、燥、热等邪气，多依附于风而侵袭人体。例如风寒、风热、风湿、风燥、风火等，故又有“风为百病之长”、“风为百病之始”之称。

寒邪

冬为寒气当令的季节，寒为冬季的主气，故寒邪为病多见于冬季，但也可见于其他季节。此外贪清露宿，饮食过于寒凉、空调致冷等，均为感受外寒的途径。外寒致病根据寒邪侵犯部位的深浅有伤寒、中寒之别。寒邪伤于肌表，郁遏卫阳，称为“伤寒”；寒邪直中于里，伤及脏腑阳气，称为“中寒”。

寒邪的致病特点

❖ **易伤阳气，表现寒象：**寒属阴邪，所以寒邪偏盛即为阴邪偏盛，即“阴盛则阳病”，阴寒偏盛，最易损伤人体阳气。感受寒邪，阳气受损，失于温煦，故全身或局部可出现明显

的寒象。寒邪侵袭肌表，郁遏卫阳，则恶寒；寒邪直中于里，损伤脾阳，则运化升降失常，以致脘腹冷痛、吐泻清稀；若心肾阳虚，寒邪直中少阴，则可见恶寒蜷卧、手足厥冷、下利清谷、精神萎靡、脉微细等。

❖ **阻滞气血，多见疼痛：**气血津液的运行，有赖阳气的温煦推动。寒性凝滞，寒邪侵入人体，阳气受损，经脉气血失于阳气温煦，则凝结阻滞，涩滞不通，不通则痛，故寒邪伤人多见疼痛症状。感受寒邪所致疼痛的特点，多为局部冷痛，得温则减，遇寒加重。例如寒袭肌表，凝滞经络，则头身疼痛；寒客肢体关节，气血凝滞不畅，发为痛痹（寒痹）、肢体关节疼痛剧烈；寒邪直中于里，阻滞气机，则脘腹冷痛或绞痛。

❖ **腠理、经脉、筋脉收缩拘急：**寒性收引，故寒邪侵袭人体，可使气机收敛，腠理闭塞，经脉收缩而挛急。例如寒袭肌表，则毛窍收缩，故无汗；寒舍经脉，则血脉挛缩，可见脉紧；寒客筋脉，则筋脉收引拘急，可使肢体关节屈伸不利，或冷厥不仁。

湿邪

湿为长夏主气。长夏处于夏秋之交，湿气最盛，空气湿度加大，潮湿充斥，故一年之中长夏多湿病。外湿多因气候潮湿，居处伤湿，以水为事，或涉水淋雨，而使人发病，故四季均可见湿邪为患。

湿邪的致病特点

❖ **易于损伤阳气：**湿为阴邪，湿胜即阴胜，即“阴胜则阳病”，故湿邪为害，易伤阳气，而有“湿胜则阳微”之说。脾为阴土，主运化水湿，却又喜燥而恶湿，对湿邪有着特殊的易感性。湿邪侵袭人体，常先困脾，使脾阳不振，运化无权，水湿停聚，发为泄泻、水肿、小便短少等症。由湿邪郁遏使阳气不伸者，当用化气利湿、通利小便的方法，使气机通畅，水道通调，则湿邪可从小便而去，湿去则阳气自通。

❖ **易于阻遏气机：**湿邪侵及人体，由于其黏腻停滞的特性，故湿邪留滞于脏腑经络，最易阻滞气机，导致气机升降失常的病理变化。湿阻于胸膈，气机不畅则胸闷；湿困脾胃，脾胃纳运失职，升降失常，则食少纳呆、脘痞腹胀、便溏不爽、小便短涩。

❖ **易于侵袭阴位：**湿邪有趋下之性，致病具有易于伤及人体下部的特点。例如水湿所致浮肿以下肢水肿较为多见，小便浑浊、泄泻、下痢、妇女带下等，多由湿邪下注所致。

❖ **病程缠绵难愈：**湿性黏滞，胶着难解，故起病缓慢隐袭、病程较长，而且反复发作，缠绵难愈。例如湿温是一种由湿热病邪所引起的外感热病，由于湿邪的特异性，其出现的发热症状，时起时伏，缠绵不愈，具有明显的病程长、难以速愈的特点。其他如湿疹、

着痹等，亦因其为湿邪所侵而常常反复发作，不易痊愈。

❖ **多见头身肢体困重：**湿性重浊，故湿邪致病，其临床症状有沉重的特征，如头身困重，四肢痠楚沉重等。湿邪外袭，遏困清阳，则头重如束布帛；湿邪留滞经络关节，阳气布达不畅，发为“着痹(湿痹)”，可见肢体关节疼痛重着不移、肌肤不仁等。

❖ **排泄物和分泌物秽浊不清、黏滞不爽：**湿性重浊黏滞，故湿邪为患，易于出现排泄物和分泌物秽浊不清、黏腻不爽的症状。例如湿浊在上，则面垢、眵多；湿滞大肠，则大便溏泄黏腻不爽、下痢脓血黏液；湿浊下注，则小便浑浊涩滞不畅、妇女黄白带下过多；湿邪浸淫肌肤，则可见疮疡、湿疹、脓水秽浊等病症。

关节系统诸病

风寒湿邪型关节炎麻木疼痛屈伸不利筋脉拘挛

【药名】	三两半药酒
【处方】	当归 100g 炙黄芪 100g 牛膝 100g 防风 50g。
【性状】	本品为黄棕色的澄清液体；气香，味微甜、微辛。
【功能与主治】	益气活血，祛风通络。用于气血不和、感受风湿所致的痹病，症见四肢疼痛、筋脉拘挛。
【用法与用量】	口服，一次 30~60ml，一日 3 次。
【注意】	高血压患者慎服；孕妇忌服。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	小活络丸
【处方】	胆南星 180g 制川乌 180g 制草乌 180g 地龙 180g 乳香(制)66g 没药(制)66g。
【性状】	本品为黑褐色至黑色的小蜜丸或大蜜丸；气腥，味苦。
【功能与主治】	祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。用于风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛，或冷痛，或刺痛，或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。

【用法与用量】	黄酒或温开水送服。小蜜丸一次 3g(15 丸)；大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	(1)小蜜丸每 100 丸重 20g；(2)大蜜丸每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	马钱子散
【处方】	制马钱子适量(含士的宁 8.0g)地龙(焙黄)93.5g。
【性状】	本品为黄棕色的粉末；气微，味苦。
【功能与主治】	祛风湿，通经络。用于风湿闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、臂痛腰痛、肢体肌肉萎缩。
【用法与用量】	每晚用黄酒或开水送服。一次 0.2g，如无反应，可增至 0.4g，最大服量不超过 0.6g；老幼及体弱者酌减。
【注意】	本品含毒性药，不可多服。服药后约 1 小时可能出现汗出周身、发痒、哆嗦等反应，反应严重者可请医生处理。十三岁以下儿童、孕妇及身体虚弱者，心脏病、严重气管炎、单纯性高血压患者禁服。忌食生冷食物。
【规格】	每袋装 0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	天和追风膏
【处方】	生草乌，麻黄，细辛，羌活，乌药，白芷，高良姜，独活，威灵仙，生川乌，肉桂，红花，桃仁，苏木，赤芍，乳香，没药，当归，蜈蚣，蛇蜕，海风藤，牛膝，续断，香加皮，红大戟，麝香酮，龙血竭，肉桂油，冰片，薄荷脑，辣椒浸膏，丁香罗勒油，樟脑，水杨酸甲酯。
【性状】	本品为黄棕色至淡红棕色的片状或带孔片状橡胶膏；气芳香。
【功能与主治】	温经散寒，祛风除湿，活血止痛。用于风寒湿闭阻、瘀血阻络所致的痹病，症见关节疼痛，局部畏风寒，腰背痛，屈伸不利，四肢麻木。
【用法与用量】	外用。贴患处。
【注意】	孕妇禁用。偶见皮肤过敏反应。皮肤过敏者慎用，皮肤破损处不宜贴用。
【规格】	7cm X 10cm。
【贮藏】	密封。

【药名】	无烟灸条
【处方】	羌活 300g 细辛 300g 白芷 300g 甘松 300g 木香 225g 醋艾炭 12500g。
【性状】	本品为圆柱形，长约 11cm 直径约 1.3cm；表面黑色或表面显棕褐色，有光泽；头部约 1cm 呈黑色，断面黑色；略具香气，点燃后有极少量的烟，且不熄灭。
【功能与主治】	行气血，逐寒湿。用于风寒湿痹，肌肉酸麻，关节四肢疼痛，脘腹冷痛。
【用法与用量】	直射灸法，红晕为度，一次适量，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	每支重 15g。
【贮藏】	密闭，防潮， 避免剧烈振动。

【药名】	云香祛风止痛酊
【处方】	白芷，大皂角，桂枝，木香，莪术，五味藤，豆豉姜，千斤拔，朱砂根，羊耳菊，枫荷桂，虎杖，买麻藤，广西海风藤，香樟，山豆根，薄荷脑，过岗龙，穿壁风，徐长卿，细辛，樟脑。
【性状】	本品为浅黄棕色至棕色的澄清液体；气芳香，味辛辣而清凉。
【功能与主治】	祛风除湿，活血止痛。用于风湿骨痛，伤风感冒，头痛，肚痛，心胃气痛，冻疮。
【用法与用量】	口服。一次0.5~2ml，一日2~3次，小儿酌减；外用取适量，搽患处。
【注意】	孕妇与未满三岁儿童忌内服。
【规格】	(1)每瓶装12ml；(2)每瓶装15ml；(3)每瓶装30ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	木瓜丸
【处方】	木瓜80g 川芎80g 威灵仙80g 牛膝160g 海风藤80g 制川乌40g 当归80g 白芷80g 狗脊(制)40g 鸡血藤40g 人参40g 制草乌40g。
【性状】	本品为包糖衣的浓缩水丸，除去糖衣后显黄褐色至黑褐色；味酸、苦。
【功能与主治】	祛风散寒，除湿通络。用于风寒湿闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、肿胀、屈伸不利、局部畏恶风寒、肢体麻木、腰膝痠软。
【用法与用量】	口服。一次30丸，一日2次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	风湿马钱片
【处方】	马钱子粉125g 乳香(炒)19g 全蝎19g 苍术19g 甘草19g 炒僵蚕19g 没药(炒)19g 牛膝19g 麻黄19g。
【性状】	本品为糖衣片，除去包衣后，显棕褐色；味苦。
【功能与主治】	祛风除湿，活血祛瘀，通络止痛。用于风湿闭阻、瘀血阻络所致的痹病，症见关节疼痛、刺痛或疼痛较甚；风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。常用量：一次3~4片，极量，一次5片，一日1次。睡前温开水送服。连服7日为一疗程，两疗程间需停药2~3日。
【注意】	孕妇忌服；年老体弱者慎服或遵医嘱。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	风湿定片
【处方】	八角枫1500g 白芷50g 徐长卿150g 甘草20g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黑色；气香，味苦、微咸。
【功能与主治】	散风除湿，通络止痛。用于风湿阻络所致的痹病，症见关节疼痛；风湿性关节炎，类风湿性关节炎，肋神经痛，坐骨神经痛见上述证候者。

【用法与用量】	口服。一次4片，一日2次。6天为一疗程。
【注意】	孕妇、儿童、心脏病、过度衰弱者禁用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	风湿骨痛胶囊
【处方】	制川乌，制草乌，红花，甘草，木瓜，乌梅，麻黄。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄褐色的粉末；味微苦、酸。
【功能与主治】	温经散寒，通络止痛。用于寒湿闭阻经络所致的痹病，症见腰脊疼痛、四肢关节冷痛；风湿性关节炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服，一次2~4粒，一日2次。
【注意】	本品含毒性药，不可多服；孕妇忌服。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	正清风痛宁片
【处方】	盐酸青藤碱20g。
【性状】	本品为肠溶薄膜衣片，除去包衣后显白色或类白色；味苦。
【功能与主治】	祛风除湿，活血通络，消肿止痛。用于风寒湿痹病，症见肌肉酸痛，关节肿胀、疼痛、屈伸不利、僵硬、肢体麻木；类风湿关节炎、风湿性关节炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1~4片，一日3次；二个月为一疗程。
【注意】	支气管哮喘、肝肾功能不全者禁用；如出现皮疹或发生白细胞减少等副作用时，应立即停药。
【规格】	每片含盐酸青藤碱20mg。
【贮藏】	遮光，密闭保存。

【药名】	冯了性风湿跌打药酒
【处方】	丁公藤2500g 桂枝75g 麻黄93.8g 羌活7.5g 当归7.5g 川芎7.5g 白芷7.5g 补骨脂7.5g 乳香7.5g 猪牙皂7.5g 陈皮33.1g 苍术7.5g 厚朴7.5g 香附7.5g 木香7.5g 枳壳50g 白术7.5g 山药7.5g 黄精20g 菟丝子7.5g 小茴香7.5g 苦杏仁7.5g 泽泻7.5g 五灵脂7.5g 蚕沙16.2g 牡丹皮7.5g 没药7.5g。
【性状】	本品为棕黄色至红棕色的液体；气香，味微苦、甘。
【功能与主治】	祛风除湿，活血止痛。用于风寒湿痹，手足麻木，腰腿酸痛；跌扑损伤，瘀滞肿痛。
【用法与用量】	口服。一次10~15ml，一日2~3次。外用，擦于患处；若有肿痛黑瘀，用生姜捣碎炒热，加入药酒适量，擦患处。
【注意】	孕妇禁内服，忌擦腹部。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	伤湿止痛膏
【处方】	伤湿止痛流浸膏 50g 水杨酸甲酯 15g 薄荷脑 10g 冰片 10g 樟脑 20g 芸香浸膏 12.5g 颠茄流浸膏 30g。
【性状】	本品为淡黄绿色至淡黄色的片状橡胶膏；气芳香。
【功能与主治】	祛风湿，活血止痛。用于风湿性关节炎，肌肉疼痛，关节肿痛。
【用法与用量】	外用，贴于患处。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	关节止痛膏
【处方】	辣椒流浸膏 200g 颠茄流浸膏 120g 薄荷素油 40g 水杨酸甲酯 80g 樟脑 200g 盐酸苯海拉明 13g。
【性状】	本品为淡棕色的片状橡胶膏；气芳香。
【功能与主治】	活血散瘀，温经镇痛。用于寒湿瘀阻经络所致风湿关节痛及关节扭伤。
【用法与用量】	外用，贴患处。一次 1~2 片，持续 12 小时，一日 2 次。
【注意】	孕妇及皮肤破损处禁用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	坎离砂
【处方】	当归 3.75g 川芎 5g 防风 5g 透骨草 5g。
【性状】	本品为黑色的粗粉；质重。
【功能与主治】	祛风散寒，活血止痛。用于风寒湿痹，四肢麻木，关节疼痛，脘腹冷痛。
【用法与用量】	外用。将布袋抖动至发热后置于患处，一次 1 袋。
【注意】	外用药，勿内服；孕妇腹痛者忌用。
【规格】	每袋装 62.5g。
【贮藏】	密封，防晒。

【药名】	伸筋活络丸
【处方】	制马钱子 72.5g 制川乌 10g 制草乌 10g 木瓜 10g 当归 12.5g 川牛膝 10g 杜仲(炒炭) 7.5g 续断 7.5g 木香 7.5g 全蝎 5g 珍珠透骨草 5g。
【性状】	本品为黑色光亮的包衣水丸，除去包衣后显棕褐色；味苦。
【功能与主治】	舒筋活络，祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿邪、闭阻脉络所致的痹病，症见肢体关节冷痛、屈伸不利、手足麻木、半身不遂。
【用法与用量】	口服。成人男子一次 2~3g，女子一次 1~2g，一日 1 次，晚饭后服用。服药后应卧床休息 6~8 小时。老弱酌减；小儿慎用或遵医嘱。
【注意】	孕妇、儿童、高血压、肝肾不全者禁用；不可过量、久服，忌食生冷及荞麦。
【规格】	每 14 粒重 1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	国公酒
【处方】	当归，羌活，牛膝，防风，独活，牡丹皮，广藿香，槟榔，麦冬，陈皮，五加皮，姜厚朴，红花，制天南星，枸杞子，白芷，白芍，紫草，盐补骨脂，醋青皮，炒白术，川芎，木瓜，栀子，麸炒苍术，麸炒枳壳，乌药，佛手，玉竹，红曲。
【性状】	本品为深红色的澄清液体；气清香，味辛、甜、微苦。
【功能与主治】	散风祛湿，舒筋活络。用于风寒湿邪闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、沉重、屈伸不利、手足麻木、腰腿疼痛；也用于经络不和所致的半身不遂、口眼歪斜、下肢痿软、行走无力。
【用法与用量】	口服。一次10ml，一日2次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，防晒。

【药名】	胡蜂酒
【处方】	本品系景颇族验方：鲜胡蜂100g。
【性状】	本品为棕色的澄清液体；有特异腥香气，味苦、麻、微辛。
【功能与主治】	祛风除湿。用于风湿闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、肢体沉重；急性风湿病、风湿性关节炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次15~25ml，一日2次。
【注意】	服后偶有皮肤瘙痒，次日可自行消失。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	药艾条
【处方】	艾叶20000g 高良姜1250g 降香1750g 白芷1000g 丹参50g 桂枝1250g 广藿香500g 香附500g 陈皮500g 生川乌75g。
【性状】	本品呈圆柱状，长20~21cm，直径1.7~1.8cm；气香，点燃后不熄灭，烟气特异。
【功能与主治】	行气血，逐寒湿。用于风寒湿痹，肌肉痠麻，关节四肢疼痛，脘腹冷痛。
【用法与用量】	直射灸法。一次适量，红晕为度，一日1~2次。或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每支重28g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方夏天无片
【处方】	本品为夏天无、夏天无总碱、制草乌、人工麝香、乳香(制)、蕲蛇、独活、豨莶草、安痛藤、威灵仙、丹参、鸡矢藤、鸡血藤、山楂叶、牛膝等33味经加工制成的片。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；气芳香，味苦、涩、凉。

【功能与主治】	祛风逐湿，舒筋活络，行血止痛。用于风湿瘀血阻滞，经络不通引起的关节肿痛、肢体麻木、屈伸不利、步履艰难；风湿性关节炎、坐骨神经痛、脑血栓形成后遗症及小儿麻痹后遗症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次2片，一日3次，小儿酌减或遵医嘱。
【注意】	孕妇禁服。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.32g；(2)糖衣片(片心重0.3g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	追风透骨丸
【处方】	制川乌100g 白芷100g 制草乌100g 香附(制)100g 甘草100g 白术(炒)50g 没药(制)20g 麻黄100g 川芎100g 乳香(制)50g 秦艽50g 地龙100g 当归50g 茯苓200g 赤小豆100g 羌活100g 天麻50g 赤芍100g 细辛100g 防风50g 天南星(制)100g 桂枝50g 甘松50g。
【性状】	本品为红褐色的水蜜丸，除去包衣后显褐棕色至黑棕色；气微香，味苦。
【功能与主治】	祛风除湿，通经活络，散寒止痛。用于风寒湿痹，肢节疼痛，肢体麻木。
【用法与用量】	口服。一次6g，一日2次。
【注意】	不宜久服，属风热痹者及孕妇忌服。
【规格】	每10丸重1g。
【贮藏】	密封，防潮。

【药名】	祛风舒筋丸
【处方】	防风50g 桂枝50g 麻黄50g 威灵仙50g 制川乌50g 制草乌50g 麸炒苍术50g 茯苓50g 木瓜50g 秦艽50g 烫骨碎补50g 牛膝50g 甘草50g 海风藤50g 青风藤50g 穿山龙50g 老鹤草50g 茄根50g。
【性状】	本品为黑褐色的大蜜丸或小蜜丸；气微，味甜、苦。
【功能与主治】	祛风散寒，除湿活络。用于风寒湿闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、局部畏恶风寒、屈伸不利、四肢麻木、腰腿疼痛。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次12丸，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	小蜜丸每100丸重60g；大蜜丸每丸重7g。
【贮藏】	密封。

【药名】	祖师麻片
【处方】	祖师麻1100g。
【性状】	本品为薄膜衣片或糖衣片，除去包衣后显棕色；味微苦。
【功能与主治】	祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹症，关节炎，类风湿关节炎。也可用于坐骨神经痛、肩周炎寒湿阻络证，症见：关节痛，遇寒痛增，得热痛减，以及腰腿肩部疼痛重着者等。
【用法与用量】	口服。一次3片，一日3次。坐骨神经痛、肩周炎疗程4周。
【注意】	孕妇及风湿热痹者慎用；有胃病者可饭后服用，并配合健胃药使用。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.3g；(2)糖衣片(片心重0.29g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	钻山风糖浆
【处方】	钻山风 1000g 黄鳝藤 63g 四块瓦 25g 威灵仙 63g 千斤拔 125g 丰城鸡血藤 125g 山姜 30g。
【性状】	本品为暗红色的液体；气特异，味甜。
【功能与主治】	祛风除湿，散瘀镇痛，舒筋活络。用于风寒湿痹引起的腰膝冷痛，肢体麻木，伸屈不利等症。
【用法与用量】	口服。一次 20~30ml，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每支装 10ml；(2) 每瓶装 50ml；(3) 每瓶装 160ml；(4) 每瓶装 200ml；(5) 每瓶装 250ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	舒筋丸
【处方】	马钱子粉 115g 麻黄 80g 独活 6g 羌活 6g 桂枝 6g 甘草 6g 千年健 6g 牛膝 6g 乳香(醋制) 6g 木瓜 6g 没药(醋制) 6g 防风 6g 杜仲(盐制) 3g 地枫皮 6g 续断 3g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸；味苦。
【功能与主治】	祛风除湿，舒筋活血。用于风寒湿痹，四肢麻木，筋骨疼痛，行步艰难。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 1 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	麝香镇痛膏
【处方】	人工麝香 0.125g 生川乌 50g 水杨酸甲酯 50g 颠茄流浸膏 96g 辣椒 480g 红茴香根 200g 樟脑 140g。
【性状】	本品为淡棕色的片状橡胶膏；气芳香。
【功能与主治】	散寒，活血，镇痛。用于风湿性关节炎，关节扭伤。
【用法与用量】	贴患处。
【注意】	孕妇及皮肤破损处禁用；使用中如皮肤发痒或变红，应立即停用。
【规格】	7cm X 10cm。
【贮藏】	密闭，避热。

【药名】	活血壮筋丸
【处方】	制川乌 400g 红花 40g 血竭 50g 乳香(去油) 20g 没药(去油) 20g 土鳖虫 40g 地龙 40g 全蝎 40g 川牛膝 80g 桂枝 40g 人参 40g。
【性状】	本品为包糖衣的水丸，除去糖衣后显棕褐色；气腥，味苦。
【功能与主治】	祛风活血，强腰壮筋。用于筋骨疼痛，周身麻木，半身不遂，口歪眼斜。
【用法与用量】	口服。一次 2 丸，一日 2 次，酒或温开水送服；或遵医嘱。
【注意】	(1) 热症者忌服。(2) 孕妇及哺乳期妇女禁服。严重心脏病，高血压，肝、

<p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>肾疾病忌服。(3)本品含乌头碱，应严格在医师指导下按规定量服用。不得任意增加服用量和服用时间。(4)服药后如果出现唇舌发麻、头痛头昏、腹痛腹泻、心烦欲呕、呼吸困难等情况，应立即停药并到医院就医。</p> <p>无。</p> <p>密封。</p>
---------------------------------------	---

风寒阻络型关节冷痛麻木关节炎腰椎病坐骨神经痛

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>代温灸膏</p> <p>辣椒，肉桂，生姜，肉桂油。</p> <p>本品为橘黄色的片状橡胶膏；气芳香。</p> <p>温通经脉，散寒镇痛。用于风寒阻络所致的痹病，症见腰背、四肢关节冷痛；寒伤脾胃所致的脘腹冷痛、虚寒泄泻；慢性风湿性关节炎、慢性胃肠炎见上述证候者。</p> <p>外用。根据病证，按穴位贴一张。</p> <p>无。</p> <p>无。</p> <p>密封，置阴凉处。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>安阳精制膏</p> <p>生川乌 24g 乌药 24g 白芷 24g 木鳖子 24g 木瓜 24g 莪术 24g 赤芍 24g 大黄 48g 血竭 10g 乳香 6g 生草乌 24g 白芷 24g 白及 24g 木通 24g 三棱 24g 当归 24g 肉桂 24g 连翘 48g 阿魏 10g 没药 6g 儿茶 6g 薄荷脑 8g 水杨酸甲酯 8g 冰片 8g。</p> <p>本品为微红色的片状橡胶膏；气芳香。</p> <p>消积化癥，逐瘀止痛，舒筋活血，追风散寒。用于癥瘕积聚，风寒湿痹，胃寒疼痛，手足麻木。</p> <p>贴患处。</p> <p>用于癥瘕积聚时，患者忌食不易消化的食物。</p> <p>8cm X 9.5cm。</p> <p>密闭，置阴凉处。</p>
---	---

<p>【药名】</p>	<p>风寒双离拐片</p>
--------------------	----------------------

【处方】	地枫皮 81g 千年健 81g 防风 81g 红花 40g 制川乌 24g 乳香(炒) 40g 木耳 81g 制草乌 24g 制马钱子 8g 没药(炒) 40g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色或棕褐色；气香，味苦、麻。
【功能与主治】	祛风散寒，活血通络。用于风寒闭阻，瘀血阻络所致的痹病，症见关节疼痛、腰腿疼痛、冷痛或刺痛、局部畏寒恶风、四肢麻木、屈伸不利。
【用法与用量】	黄酒或温开水送服。一次 3~4 片，一日 2 次，或遵医嘱。
【注意】	孕妇禁服。
【规格】	(1) 薄膜衣片，每片重 0.31g；(2) 糖衣片，片心重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	疏风定痛丸
【处方】	马钱子粉 200g 乳香(醋制) 100g 千年健 30g 地枫皮 30g 牛膝 30g 甘草 30g 防风 30g 独活 30g 麻黄 300g 没药(醋制) 100g 自然铜(煅) 30g 桂枝 30g 木瓜 30g 杜仲(盐炙) 30g 羌活 30g。
【性状】	本品为棕黑色或灰黑色的水蜜丸，或为灰黑色的小蜜丸或大蜜丸；气辛香，味苦、酸。
【功能与主治】	祛风散寒，活血止痛。用于风寒湿闭阻、瘀血阻络所致的痹病，症见关节疼痛、冷痛、刺痛或疼痛致甚，屈伸不利、局部恶寒、腰腿疼痛、四肢麻木及跌打损伤所致的局部肿痛。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 4g(20 丸)，小蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	按规定量服用，不宜多服；体弱者慎服，孕妇忌服。
【规格】	(1) 水蜜丸每 100 丸重 20g；(2) 小蜜丸每 100 丸重 20g；(3) 大蜜丸每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	根痛平颗粒
【处方】	白芍 200g 桃仁(焯) 50g 乳香(醋炙) 50g 续断 75g 伸筋草 75g 地黄 50g 葛根 50g 红花 50g 没药(醋炙) 50g 烫狗脊 75g 牛膝 50g 甘草 25g。
【性状】	本品为棕色或棕褐色的颗粒；气香，味甜、微苦，或气香，味微甜、苦(无蔗糖)。
【功能与主治】	活血，通络，止痛。用于风寒阻络所致颈、腰椎病，症见肩颈疼痛、活动受限、上肢麻木。
【用法与用量】	开水冲服，一次 1 袋，一日 2 次。饭后服用。或遵医嘱。
【注意】	本品对胃肠道有轻度刺激作用，宜饭后服用。孕妇忌用。
【规格】	每袋装 (1) 12g；(2) 8g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。

【药名】	消络痛片
【处方】	芫花条 1500g 绿豆 150g。
【性状】	本品为糖衣片，除去包衣后显棕褐色；气微，味苦、麻。
【功能与主治】	散风祛湿。用于风湿阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛；风湿性关节炎

【用法与用量】	见上述证候者。
【注意】	口服。一次2~4片，一日3次。饭后服用。 孕妇禁用；用药后如出现月经过多、胃部发热感或关节疼痛加剧现象，可适当减量或遵医嘱；忌食辛辣等刺激性食物。
【规格】	片心重0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	消络痛胶囊
【处方】	芫花条3000g 绿豆300g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的粉末；气微，味苦、麻。
【功能与主治】	散风祛湿。用于风湿阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛；风湿性关节炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1~2粒，一日3次。饭后服用。
【注意】	孕妇禁用；用药后如出现月经过多、胃部发热感或关节疼痛加剧现象，可适当减量或遵医嘱；忌食辛辣等刺激性食物。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	疏风活络丸
【处方】	制马钱子375g 麻黄625g 虎杖313g 菝葜313g 桂枝313g 秦艽188g 木瓜313g 甘草188g 防风188g 桑寄生188g。
【性状】	本品为棕褐色的大蜜丸，味微甜、苦。
【功能与主治】	祛风散寒，除湿通络。用于风寒湿闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、局部畏恶风寒、四肢麻木、腰背疼痛。
【用法与用量】	口服。一次半丸，一日2次，或于睡前服1丸。
【注意】	(1)高血压患者及孕妇慎用。(2)不得超量服用。
【规格】	每丸重7.8g。
【贮藏】	密封。

【药名】	麝香风湿胶囊
【处方】	制川乌15g 全蝎10g 地龙(酒洗)25g 黑豆(炒)25g 蜂房(酒洗)30g 人工麝香0.5g 乌梢蛇(去头酒浸)200g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为灰黄色至灰褐色的粉末；气腥，味微咸。
【功能与主治】	祛风散寒，除湿活络。用于风寒湿闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、局部畏恶风寒、屈伸不利、手足拘挛。
【用法与用量】	口服。一次4~5粒，一日3次。
【注意】	孕妇儿童禁用；不可过量、久服，忌食生冷。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	腰痛宁胶囊
------	--------------

【处方】	马钱子粉（调制），川牛膝，麻黄，没药（醋制），僵蚕（麸炒），土鳖虫，甘草，乳香（醋制），全蝎，麸炒苍术。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至黄褐色的粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	消肿止痛，疏散寒邪，温经通络。用于寒湿瘀阻经络所致的腰椎间盘突出症、坐骨神经痛、腰肌劳损、腰肌纤维炎、风湿性关节炎，症见腰腿痛、关节痛及肢体活动受限者。
【用法与用量】	黄酒兑少量温开水送服。一次4~6粒，一日1次。睡前半小时服或遵医嘱。
【注意】	孕妇及儿童禁用；心脏病、高血压及脾胃虚寒者慎用；不可过量久服。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

风寒阻络气血瘀滞型痹病腰腿肩颈疼痛筋脉拘挛

【药名】	狗皮膏
【处方】	生川乌 80g 羌活 20g 青风藤 30g 防风 30g 苍术 20g 麻黄 30g 小茴香 20g 当归 20g 木瓜 30g 大黄 30g 续断 40g 白芷 30g 没药 34g 樟脑 34g 肉桂 11g 生草乌 40g 独活 20g 香加皮 30g 铁丝威灵仙 30g 蛇床子 20g 高良姜 9g 官桂 10g 赤芍 30g 苏木 30g 油松节 30g 川芎 30g 乳香 34g 冰片 17g 丁香 17g。
【性状】	本品为摊于兽皮或布上的黑膏药。
【功能与主治】	祛风散寒，活血止痛。用于风寒湿邪、气血瘀滞所致的痹病，症见四肢麻木、腰腿疼痛、筋脉拘挛，或跌打损伤、闪腰岔气、局部肿痛；或寒湿瘀滞所致的腕腹冷痛、行经腹痛、寒湿带下、积聚痞块。
【用法与用量】	外用。用生姜擦净患处皮肤，将膏药加温软化，贴于患处或穴位。
【注意】	孕妇忌贴腰部和腹部。
【规格】	每张净重(1)12g；(2)15g；(3)24g；(4)30g。
【贮藏】	密封。

【药名】	通络祛痛膏
【处方】	当归 100g 川芎 62g 红花 62g 山柰 62g 花椒 72g 胡椒 62g 丁香 30g 肉桂 62g 荜茇 62g 干姜 62g 大黄 62g 樟脑 44g 冰片 30g 薄荷脑 30g。
【性状】	本品为淡黄色至淡棕色的片状橡胶膏；气芳香。
【功能与主治】	活血通络，散寒除湿，消肿止痛。用于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞、寒湿阻络证，症见关节刺痛或钝痛，关节僵硬，屈伸不利，畏寒肢冷。用于颈椎病(神经根型)瘀血停滞、寒湿阻络证，症见颈项疼痛、肩臂疼痛、颈项活动不利、肢体麻木、畏寒肢冷、肢体困重等。
【用法与用量】	外用，贴患处。腰部、膝部骨性关节炎，一次1~2贴，一日1次，15天为一疗程；颈椎病(神经根型)，一次2贴，一日1次，21天为一疗程。
【注意】	(1)偶见贴敷处皮肤瘙痒、潮红、红疹，过敏性皮炎。(2)皮肤破损处忌用。

<p>【规格】 【贮藏】</p>	<p>(3)对橡胶膏剂过敏者慎用。(4)每次贴敷不宜超过12小时，防止贴敷处发生过敏。临床试验中1例出现心慌、心悸、恶心，无法判断和药物的关系。</p> <p>7cm X 10cm。 密封。</p>
------------------------------------	---

<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>通痹片</p> <p>本品系由制马钱子、金钱白花蛇、蜈蚣、全蝎、地龙、天麻、人参、当归、制川乌等药味加工制成的片剂。</p> <p>本品为糖衣片，除去糖衣后，显浅棕色至棕褐色；味腥、微苦。</p> <p>祛风胜湿，活血通络，散寒止痛，调补气血。用于寒湿闭阻、瘀血阻络、气血两虚所致的痹病，症见关节冷痛、屈伸不利；风湿性关节炎、类风湿性关节炎见上述证候者。</p> <p>口服。一次2片，一日3次，饭后服用或遵医嘱。</p> <p>孕妇、儿童禁用。肝肾功能损害与高血压患者慎用；不可过量、久服；忌食生冷油腻食物。</p> <p>片心重0.3g。 密封。</p>
--	---

<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】</p>	<p>通痹胶囊</p> <p>制马钱子 26.56g 金钱白花蛇 4.42g 蜈蚣 4.42g 全蝎 4.42g 地龙 4.42g 僵蚕 4.42g 乌梢蛇 4.42g 天麻 4.42g 人参 1.48g 黄芪 17.72g 当归 26.56g 羌活 4.42g 独活 4.42g 防风 4.42g 麻黄 4.42g 桂枝 4.42g 附子(黑顺片) 4.42g 制川乌 4.42g 薏苡仁 26.56g 苍术(炒) 26.56g 麸炒白术 26.56g 桃仁 8.86g 红花 5.90g 没药(炒) 4.42g 炮山甲 4.42g 醋延胡索 4.42g 牡丹皮 4.42g 北刘寄奴 4.42g 王不留行 4.42g 鸡血藤 8.86g 香附(酒制) 4.42g 木香 4.42g。</p> <p>本品为糖衣片，除去糖衣后，显浅棕色至棕褐色；味腥、微苦。</p> <p>祛风胜湿，活血通络，散寒止痛，调补气血。用于寒湿闭阻、瘀血阻络、气血两虚所致的痹病，症见关节冷痛、屈伸不利；风湿性关节炎、类风湿性关节炎见上述证候者。</p> <p>口服。一次2片，一日3次，饭后服用或遵医嘱。</p> <p>孕妇、儿童禁用。肝肾功能损害与高血压患者慎用；不可过量、久服；忌食生冷油腻食物。</p> <p>片心重0.3g。 密封。</p>
--	---

<p>【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】</p>	<p>舒筋活络酒</p> <p>木瓜 45g 桑寄生 75g 玉竹 240g 续断 30g 川牛膝 90g 当归 45g 川芎 60g 红花 45g 独活 30g 羌活 30g 防风 60g 白术 90g 蚕沙 60g 红曲 180g 甘草 30g。</p> <p>本品为棕红色的澄清液体；气香，味微甜、略苦。</p> <p>祛风除湿，活血通络，养阴生津。用于风湿阻络、血脉瘀阻兼有阴虚所致的痹病，症见关节疼痛、屈伸不利、四肢麻木。</p>
---	---

【用法与用量】	口服。一次 20~30ml，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

肝肾不足风湿瘀阻型关节疼痛麻木拘挛类风湿性关节炎

【药名】	妙济丸
【处方】	黑木耳(醋制)300g 酒白芍 10g 木瓜 16g 续断 32g 苍术 32g 木香 6g 母丁香 6g 茯苓 50g 龟甲(制)50g 当归 32g 川芎 12g 盐杜仲 20g 川牛膝(酒蒸)32g 盐小茴香 8g 丁香 6g 乳香(制)8g 土茯苓 32g。
【性状】	本品为黑褐色的大蜜丸；气特异，味微甜而后苦、辛。
【功能与主治】	补益肝肾，祛湿通络，活血止痛。用于肝肾不足、风湿瘀阻所致的痹病，症见骨节疼痛、腰膝酸软、肢体麻木拘挛。
【用法与用量】	用黄酒送服。一次 1~2 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	尪痹丸
【处方】	地黄，续断，独活，桂枝，防风，皂角刺，白芍，熟地黄，附片(黑顺片)，骨碎补，淫羊藿，威灵仙，羊骨，狗脊(制)，知母，红花，伸筋草。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味微苦。
【功能与主治】	补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络。用于肝肾不足、风湿阻络所致的尪痹，症见肌肉、关节疼痛，局部肿大，僵硬畸形，屈伸不利，腰膝痠软，畏寒乏力；类风湿性关节炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。糖衣片一次 7~8 片，薄膜衣片一次 4 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁用；忌食生冷食物。
【规格】	(1)糖衣片(片心重 0.25g)；(2)薄膜衣片每片重 0.51g。
【贮藏】	密封。

【药名】	尪痹颗粒
【处方】	地黄，续断，独活，桂枝，防风，皂角刺，白芍，熟地黄，附片(黑顺片)，骨碎补，淫羊藿，威灵仙，羊骨，狗脊(制)，知母，红花，伸筋草。
【性状】	本品为棕黄色或棕色的颗粒；味微苦。

【功能与主治】	补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络。用于肝肾不足、风湿阻络所致的尪痹，症见肌肉、关节疼痛，局部肿大，僵硬畸形，屈伸不利，腰膝痠软，畏寒乏力；类风湿性关节炎见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次6g，一日3次。
【注意】	孕妇禁用；忌食生冷食物。
【规格】	(1)每袋装3g；(2)每袋装6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	天麻丸
【处方】	天麻60g 独活50g 牛膝60g 附子(黑顺片)10g 地黄160g 羌活100g 盐杜仲70g 粉萆薢60g 当归100g 玄参60g。
【性状】	本品为黑褐色的水蜜丸或黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味微甜、略苦麻。
【功能与主治】	祛风除湿，通络止痛，补益肝肾。用于风湿痹阻、肝肾不足所致的痹病，症见肢体拘挛、手足麻木、腰腿痠痛。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2~3次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)小蜜丸每100丸重20g；(2)大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	天麻祛风补片
【处方】	地黄160g 羌活80g 附片(黑顺片)(砂炒)60g 天麻(姜汁制)60g 酒川牛膝60g 茯苓60g 当归160g 独活50g 肉桂60g 盐杜仲70g 玄参60g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色至黑褐色；味甜、苦、略麻。
【功能与主治】	温肾养肝，祛风止痛。用于肝肾亏损、风湿入络所致的痹病，症见头晕耳鸣、关节疼痛、腰膝痠软、畏寒肢冷、手足麻木。
【用法与用量】	口服。一次6片，一日3次。
【注意】	孕妇及感冒发热期间禁用；忌食生冷油腻食物。
【规格】	糖衣片片心重0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	独活寄生丸
【处方】	独活54g 桑寄生54g 熟地黄36g 牛膝54g 细辛54g 秦艽54g 茯苓54g 肉桂54g 防风54g 川芎54g 党参54g 甘草36g 酒当归36g 白芍36g 盐杜仲54g。
【性状】	本品为黑褐色的大蜜丸或水蜜丸；味微甘而辛、麻。
【功能与主治】	养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾。用于风寒湿闭阻，肝肾两亏，气血不足所致的痹病，症见腰膝冷痛，屈伸不利。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日2次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1)水蜜丸每袋装6g；(2)大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	独活寄生合剂
【处方】	独活 98g 桑寄生 65g 秦艽 65g 防风 65g 细辛 65g 当归 65g 白芍 65g 川芎 65g 熟地黄 65g 盐杜仲 65g 川牛膝 65g 党参 65g 茯苓 65g 甘草 65g 桂枝 65g。
【性状】	本品为棕黑色的澄清液体；气芳香，味苦。
【功能与主治】	养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾。用于风寒湿闭阻、肝肾两亏、气血不足所致的痹病，症见腰膝冷痛、屈伸不利。
【用法与用量】	口服。一次 15~20ml，一日 3 次；用时摇匀。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每瓶装 (1) 20ml；(2) 100ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	祛风止痛丸
【处方】	老鹤草 334g 槲寄生 167g 续断 167g 威灵仙 83g 独活 83g 制草乌 83g 红花 83g。
【性状】	本品为黑色浓缩丸，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；味苦、湿。
【功能与主治】	祛风寒，补肝肾，壮筋骨。用于风寒湿邪闭阻、肝肾亏虚所致的痹病，症见关节肿胀、腰膝疼痛、四肢麻木。
【用法与用量】	口服。一次 2.2g，一日 2 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每袋装 2.2g (每 10 丸重 1.1g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	祛风止痛片
【处方】	老鹤草 334g 槲寄生 167g 续断 167g 威灵仙 83g 独活 83g 制草乌 83g 红花 83g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味苦、涩。
【功能与主治】	祛风寒，补肝肾，壮筋骨。用于风寒湿邪闭阻、肝肾亏虚所致的痹病，症见关节肿胀、腰膝疼痛、四肢麻木。
【用法与用量】	口服。一次 6 片，一日 2 次。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	祛风止痛胶囊
【处方】	老鹤草 334g 槲寄生 167g 续断 167g 威灵仙 83g 独活 83g 制草乌 83g 红花 83g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；味苦、涩。
【功能与主治】	祛风寒，补肝肾，壮筋骨。用于风寒湿邪闭阻、肝肾亏虚所致的痹病，症见关节肿胀、腰膝疼痛、四肢麻木。
【用法与用量】	口服。一次 6 粒，一日 2 次。
【注意】	孕妇忌服。

【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	寄生追风酒
【处方】	独活，白芍，槲寄生，熟地黄，杜仲(炒)，牛膝，秦艽，桂枝，防风，细辛，党参，甘草，当归，川芎，茯苓。
【性状】	本品为棕色或黄棕色的澄清液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	补肝肾，祛风湿，止痹痛。用于肝肾两亏，风寒湿痹，腰膝冷痛，屈伸不利；风湿性关节炎、腰肌劳损、跌打损伤后期见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 20~30ml，一日 2~3 次。
【注意】	湿热痹阻、关节红肿热痛者不宜。
【规格】	(1) 每瓶装 120ml；(2) 每瓶装 180ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

肝肾不足瘀血阻络型骨质增生骨性关节炎风湿关节炎

【药名】	抗骨增生丸
【处方】	熟地黄 210g 狗脊(盐制) 140g 淫羊藿 140g 炒莱菔子 70g 牛膝 140g 酒肉苁蓉 140g 女贞子(盐制) 70g 鸡血藤 140g 骨碎补 140g。
【性状】	本品为黑色的包衣浓缩水蜜丸，或为浓缩小丸或浓缩大蜜丸；味甜甘、微涩。
【功能与主治】	补腰肾，强筋骨，活血止痛。用于骨性关节炎肝肾不足、瘀血阻络证，症见关节肿胀、麻木、疼痛、活动受限。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 2.2g，小蜜丸次 3g，大蜜丸一次 1 丸，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	抗骨增生胶囊
【处方】	熟地黄 175g 狗脊(盐制) 117g 淫羊藿 117g 炒莱菔子 58g 牛膝 117g 酒肉苁蓉 117g 女贞子(盐制) 58g 鸡血藤 117g 骨碎补 117g。

【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；味甜、微涩，或味微苦涩。
【功能与主治】	补腰肾，强筋骨，活血止痛。用于骨性关节炎肝肾不足、瘀血阻络证，症见关节肿胀、麻木、疼痛、活动受限。
【用法与用量】	口服。一次5粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.35g。
【贮藏】	密封。

【药名】	骨刺丸
【处方】	制川乌 500g 制天南星 500g 白芷 500g 甘草 500g 穿山龙 1000g 红花 1000g 制草乌 500g 秦艽 500g 当归 500g 薏苡仁(炒) 500g 绵萆薢 1000g 徐长卿 1500g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的水蜜丸或大蜜丸；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	祛风止痛。用于骨质增生，风湿性关节炎，风湿痛。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次6g，大蜜丸一次1丸，一日2~3次。
【注意】	孕妇禁用，肾病患者慎用。
【规格】	(1)水蜜丸每100丸重5g；(2)水蜜丸每100丸重20g；(3)大蜜丸每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	骨刺宁胶囊
【处方】	三七，土鳖虫。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄棕色至黄棕色的颗粒；气腥，味苦、微甜。
【功能与主治】	活血化瘀，通络止痛。用于瘀阻脉络所致骨性关节炎，症见关节疼痛、肿胀、麻木、活动受限。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次，饭后服。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	骨刺消痛片
【处方】	制川乌 53.25g 秦艽 53.25g 甘草 53.25g 穿山龙 106.5g 制天南星 53.25g 当归 53.25g 制草乌 53.25g 白芷 53.25g 粉萆薢 106.5g 薏苡仁 106.5g 红花 106.5g 徐长卿 159.75g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显黄褐色；味微麻、辣、咸。
【功能与主治】	祛风止痛。用于风湿痹阻、瘀血阻络所致的痹病，症见关节疼痛、腰腿疼痛、屈伸不利；骨性关节炎、风湿性关节炎、风湿痛见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日2~3次。
【注意】	肾病患者慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	壮骨关节丸
【处方】	狗脊，独活，续断，桑寄生，熟地黄，乳香(醋炙)，淫羊藿，骨碎补，补骨脂，鸡血藤，木香，没药(醋炙)。
【性状】	本品为黑色的浓缩水丸或水丸，气芳香，味微苦。
【功能与主治】	补益肝肾，养血活血，舒筋活络，理气止痛。用于肝肾不足、血瘀气滞、脉络痹阻所致的骨性关节炎、腰肌劳损，症见关节肿胀、疼痛、麻木、活动受限。
【用法与用量】	口服。浓缩丸一次10丸，水丸一次6g，一日2次。早晚饭后服用。
【注意】	(1)本品可能引起肝损伤。(2)肝功能不全、孕妇及哺乳期妇女禁用。(3)在治疗期间应注意肝功能监测，如发现肝功能异常，应立即停药并采取相应的处理。(4)应在医生指导下严格按照适应症使用，避免大剂量、长疗程服用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	骨仙片
【处方】	熟地黄 217g 枸杞子 69g 女贞子 102g 黑豆 135g 菟丝子 135g 骨碎补 102g 仙茅 69g 牛膝 69g 防己 102g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味微苦、酸涩。
【功能与主治】	补益肝肾，强壮筋骨，通络止痛。用于肝肾不足所致的痹病，症见腰膝骨节疼痛、屈伸不利、手足麻木；骨质增生见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4~6片，一日3次。
【注意】	孕妇慎服。感冒发热勿服。
【规格】	(1)糖衣片(片心重0.32g)。(2)薄膜衣片每片重0.33g。(3)薄膜衣片每片重0.41g。
【贮藏】	密封。

【药名】	骨质宁搽剂
【处方】	云母石 1000g 黄连 10g 枯矾 20g。
【性状】	本品为黄色液体，手捻有滑腻感。
【功能与主治】	活血化瘀、消肿止痛。用于瘀血阻络所致骨性关节炎、软组织损伤，症见肿胀、麻木、疼痛及活动功能障碍。
【用法与用量】	外用适量，涂于患处。一日3~5次。
【注意】	如有擦破伤或溃疡不宜使用。
【规格】	(1)每瓶装50ml；(2)每瓶装100ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	骨痛灵酊
【处方】	雪上一枝蒿 80g 干姜 110g 龙血竭 1g 乳香 5g 没药 5g 冰片 1.5g。
【性状】	本品为橙红色的液体，久置有混浊或轻微沉淀；气香。

【功能与主治】	温经散寒，祛风活血，通络止痛。用于腰、颈椎骨质增生，骨性关节炎，肩周炎，风湿性关节炎。
【用法与用量】	外用。一次 10ml，一日 1 次。将药液浸于敷带上贴敷患处 30~60 分钟；20 天为一疗程。
【注意】	孕妇及皮肤破损处禁用；本品只供外用，不可内服；用药后 3 小时内用药部位不得吹风，不接触冷水。
【规格】	每瓶装 (1) 30ml (2) 60ml (3) 70ml (4) 100ml (5) 250ml；每袋装 (1) 5ml (2) 10ml。
【贮藏】	密封，避光。

【药名】	穿龙骨刺片
【处方】	穿山龙 270g 淫羊藿 324g 狗脊 432g 川牛膝 432g 熟地黄 270g 枸杞子 162g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至棕褐色；味微苦。
【功能与主治】	补肾健骨，活血止痛。用于肾虚血瘀所致的骨性关节炎，症见关节疼痛。
【用法与用量】	口服。一次 6~8 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用；服药期间遇有感冒发烧、腹泻者应暂停服用。
【规格】	(1) 素片每片重 0.5g；(2) 薄膜衣片每片重 0.5g。
【贮藏】	密封。

肝肾阴虚气滞血瘀型头痛颈项僵直疼痛麻木颈椎病

【药名】	舒筋通络颗粒
【处方】	骨碎补 450g 川芎 360g 牛膝 450g 天麻 300g 黄芪 450g 威灵仙 450g 地龙 360g 葛根 360g 乳香 180g。
【性状】	本品为棕褐色的颗粒；气微香，味甜而苦、辛。
【功能与主治】	补肝益肾，活血舒筋。用于颈椎病属肝肾阴虚，气滞血瘀证，症见头昏，头痛，胀痛或刺痛，耳聋，耳鸣，颈项僵直，颈、肩、背疼痛，肢体麻木，倦怠乏力，腰膝酸软，口唇色暗，舌质暗红或有瘀斑。

【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次，1个月为一疗程。
【注意】	(1)有胃部疾病者或出血倾向者慎用，或遵医嘱。(2)本品服用后偶见胃部不适，轻度恶心及腹胀，腹泻等症状，停药后自行消失。(3)孕妇禁用。
【规格】	每袋装12g。
【贮藏】	密封。

气血不足风湿瘀阻型关节肿大僵硬萎缩风湿性关节炎

【药名】	痹祺胶囊
【处方】	马钱子粉，地龙，党参，茯苓，白术，川芎，丹参，三七，牛膝，甘草。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄棕色的粉末；味苦。
【功能与主治】	益气养血，祛风除湿，活血止痛。用于气血不足，风湿瘀阻，肌肉关节酸痛，关节肿大、僵硬变形或肌肉萎缩，气短乏力；风湿、类风湿性关节炎，腰肌劳损，软组织损伤属上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日2~3次。
【注意】	孕妇禁服。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

阳虚寒湿型颈椎膝关节增生性关节炎畏寒肢冷

【药名】	附桂骨痛片
【处方】	附子(制)222g 制川乌1111g 肉桂56g 党参167g 当归167g 炒白芍167g 淫羊藿167g 醋乳香1111g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色至褐色；气微香，味微苦。
【功能与主治】	温阳散寒，益气活血，消肿止痛。用于阳虚寒湿所致的颈椎及膝关节增生性关节炎。症见骨关节疼痛、屈伸不利、麻木肿胀、遇热则减、畏寒肢冷。
【用法与用量】	口服。一次6片，一日3次，饭后服。3个月为一疗程；如需继续治疗，必须停药一个月后遵医嘱服用。
【注意】	(1)服药后少数可见胃脘不舒，停药后可自行消除。(2)服药期间注意血压变化。(3)高血压，严重消化道疾病慎用。(4)孕妇及有出血倾向者，阴虚内热者禁用。
【规格】	片心重0.33g。
【贮藏】	密封。

【药名】	附桂骨痛胶囊
【处方】	附子(制)222g 制川乌111g 肉桂56g 党参167g 当归167g 炒白芍167g 淫羊藿167g 醋乳香111g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	温阳散寒，益气活血，消肿止痛。用于阳虚寒湿所致的颈椎及膝关节增生

【用法与用量】	性关节炎。症见骨关节疼痛、屈伸不利、麻木肿胀、遇热则减、畏寒肢冷。口服。一次6粒(或4~6粒)，一日3次，饭后服。3个月为一疗程；如需继续治疗，必须停药一个月后遵医嘱服用。
【注意】	(1)服药后少数可见胃脘不舒，停药后可自行消除。(2)服药期间注意血压变化。(3)高血压，严重消化道疾病慎用。(4)孕妇及有出血倾向者，阴虚内热者禁用。
【规格】	片心重0.33g。
【贮藏】	密封。

【药名】	附桂骨痛颗粒
【处方】	附子(制)266g 制川乌133g 肉桂67g 党参200g 当归200g 炒白芍200g 淫羊藿200g 醋乳香133g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微香，味微苦。
【功能与主治】	温阳散寒，益气活血，消肿止痛。用于阳虚寒湿所致的颈椎及膝关节增生性关节炎。症见骨关节疼痛、屈伸不利、麻木肿胀、遇热则减、畏寒肢冷。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次，饭后服。3个月为一疗程。如需继续治疗，必须停药一个月后遵医嘱服用。
【注意】	(1)服药后少数可见胃脘不舒，停药后可自行消除。(2)服药期间注意血压变化。(3)高血压，严重消化道疾病慎用。(4)孕妇及有出血倾向者，阴虚内热者禁用。
【规格】	每袋装5g。
【贮藏】	密封。

湿热下注阻络型足膝肿痛肢沉关节炎痛风滑膜炎

【药名】	二妙丸
【处方】	苍术(炒)500g 黄柏(炒)500g。
【性状】	本品为黄棕色的水丸；气微香，味苦涩。
【功能与主治】	燥湿清热，用于湿热下注，足膝红肿热痛，下肢丹毒，白带，阴囊湿痒。
【用法与用量】	口服，一次6~9g，一日2次。
【注意】	无。

【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	三妙丸
【处方】	苍术(炒)6G0g 黄柏(炒)400g 牛膝 200g。
【性状】	本品为灰黄色的水丸；味苦、辛。
【功能与主治】	清热燥湿。用于湿热下注所致的痹病，症见足膝红肿热痛、下肢沉重、小便黄少。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2~3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	风痛安胶囊
【处方】	防己 250g 桂枝 125g 石膏 500g 木瓜 250g 忍冬藤 333g 滑石粉 250g 通草 167g 姜黄 167g 薏苡仁 333g 海桐皮 167g 黄柏 250g 连翘 333g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄色至黄棕色的颗粒或粉末多味苦。
【功能与主治】	清热利湿，活血通络。用于湿热阻络所致的痹病，症见关节红肿热痛、肌肉酸楚；风湿性关节炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3~5 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇、体弱年迈及脾胃虚寒者慎用。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	痛风定胶囊
【处方】	秦艽，黄柏，延胡索，赤芍，川牛膝，泽泻，车前子，土茯苓。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄褐色至棕褐色粉末；味苦。
【功能与主治】	清热祛湿，活血通络定痛。用于湿热瘀阻所致的痹病，症见关节红肿热痛，伴有发热、汗出不解、口渴心烦、小便黄、舌红苔黄腻、脉滑数，痛风见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用；服药后不宜立即饮茶。
【规格】	每粒装 0.84g。
【贮藏】	密封。

【药名】	湿热痹片
【处方】	苍术 43.9g 忍冬藤 87.8g 地龙 43.9g 黄柏 43.9g 防风 43.9g 防己 65.8g 粉萆薢 65.8g 连翘 65.8g 薏苡仁 87.8g 威灵仙 52.6g 川牛膝 65.8g 桑枝 87.8g。
【性状】	本品为糖衣片，除去包衣后显黄棕色；味苦。
【功能与主治】	祛风除湿，清热消肿，通络定痛。用于湿热痹阻证，其症状为肌肉或关节

【用法与用量】	红肿热痛，有沉重感，步履艰难，发热，口渴不欲饮，小便短赤。
【注意】	口服。一次6片，一日3次。
【规格】	无。
【贮藏】	片心重0.25g。
	密封。

【药名】	滑膜炎片
【处方】	夏枯草 800g 女贞子 400g 枸骨叶 400g 黄芪 532g 防己 532g 薏苡仁 800g 土茯苓 532g 丝瓜络 400g 泽兰 240g 丹参 400g 当归 268g 川牛膝 268g 豨莶草 400g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕黑色；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热祛湿，活血通络。用于湿热闭阻、瘀血阻络所致的痹病，症见关节肿胀疼痛、痛有定处、屈伸不利，急、慢性滑膜炎及膝关节术后见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3片，一日3次。
【注意】	糖尿病患者忌服。孕妇慎用。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.5g；(2)薄膜衣片每片重0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	滑膜炎胶囊
【处方】	夏枯草 800g 女贞子 400g 枸骨叶 400g 黄芪 532g 防己 532g 薏苡仁 800g 土茯苓 532g 丝瓜络 400g 泽兰 240g 丹参 400g 当归 268g 川牛膝 268g 豨莶草 400g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味微苦。
【功能与主治】	清热祛湿，活血通络。用于湿热闭阻、瘀血阻络所致的痹病，症见关节肿胀疼痛、痛有定处、屈伸不利，急、慢性滑膜炎及膝关节术后见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次。
【注意】	糖尿病患者忌服。孕妇慎用。
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	滑膜炎颗粒
【处方】	夏枯草 200g 女贞子 100g 枸骨叶 100g 黄芪 133g 防己 133g 薏苡仁 200g 土茯苓 133g 丝瓜络 100g 泽兰 60g 丹参 100g 当归 67g 川牛膝 67g 豨莶草 100g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热祛湿，活血通络。用于湿热闭阻、瘀血阻络所致的痹病，症见关节肿胀疼痛、痛有定处、屈伸不利，急、慢性滑膜炎及膝关节术后见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日3次。
【注意】	糖尿病患者忌服。孕妇慎用。

【规格】	每袋装 12g。
【贮藏】	密封。

【药名】	豨桐丸
【处方】	豨荑草 250g 臭梧桐叶 500g。
【性状】	本品为黑色的浓缩水丸；除去包衣后显棕色，味微苦。
【功能与主治】	清热祛湿，散风止痛。用于风湿热痹，症见关节红肿热痛；风湿性关节炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10 丸，一日 3 次。
【注意】	寒湿痹病者慎用；忌食辛辣油腻食物。
【规格】	每 10 丸重 1.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	豨桐胶囊
【处方】	豨荑草 790g 臭梧桐叶 1580g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为深棕色的细小颗粒；气微，味苦。
【功能与主治】	清热祛湿，散风止痛。用于风湿热痹，症见关节红肿热痛；风湿性关节炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 粒，一日 3 次。
【注意】	寒湿痹病者慎用；忌食辛辣油腻食物。
【规格】	(1) 每粒装 0.25g；(2) 每粒装 0.4g。
【贮藏】	密封。

热毒血瘀型骨髓炎骨疽红肿疼痛流脓

【药名】	抗骨髓炎片
【处方】	金银花，蒲公英，紫花地丁，半枝莲，白头翁，白花蛇。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味微苦。
【功能与主治】	清热解毒，散瘀消肿。用于热毒血瘀所致附骨疽，症见发热、口渴，局部红肿、疼痛、流脓；骨髓炎见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次8~10片，一日3次；或遵医嘱，儿童酌减。
【注意】	孕妇慎服。
【规格】	片心重0.4g。
【贮藏】	密封。

神经根型颈椎病肩痛麻木僵硬窜痛

【药名】	壮骨伸筋胶囊
【处方】	淫羊藿，熟地黄，鹿衔草，骨碎补(炙)，肉苁蓉，鸡血藤，红参，狗骨，茯苓，威灵仙，豨莶草，葛根，醋延胡索，山楂，洋金花。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色的颗粒；气微，味微苦。
【功能与主治】	补益肝肾，强筋壮骨，活络止痛。用于肝肾两虚、寒湿阻络所致的神经根型颈椎病，症见肩臂疼痛、麻木、活动障碍。
【用法与用量】	口服，一次6粒，一日3次。4周为一个疗程，或遵医嘱。
【注意】	本品含洋金花，不宜超量服用；高血压、心脏病慎用；青光眼和孕妇禁服。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	颈舒颗粒
【处方】	三七 333g 当归 333g 川芎 333g 红花 333g 天麻 333g 肉桂 222g 人工牛黄 92.5g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微香、味苦。
【功能与主治】	活血化瘀，温经通窍止痛。用于神经根型颈椎病瘀血阻络证，症见颈肩部僵硬、疼痛、患侧上肢窜痛。
【用法与用量】	温开水冲服。一次1袋，一日3次，1个月为一疗程。
【注意】	孕妇禁用。忌生冷、油腻食物。过敏体质者慎用。
【规格】	每袋装6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	颈痛颗粒
【处方】	三七 250g 延胡索 500g 白芍 750g 葛根 750g 川芎 750g 羌活 1000g 威灵仙 1000g。
【性状】	本品为黄棕色的颗粒；气香，味辛、微苦。
【功能与主治】	活血化瘀、行气止痛。用于神经根型颈椎病属血瘀气滞、脉络闭阻证。症见颈、肩及上肢疼痛，发僵或窜麻、窜痛。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次，饭后服用。2 周为一疗程。
【注意】	(1) 孕妇忌服。(2) 消化道溃疡及肝肾功能减退者慎用。(3) 长期服用应向医师咨询，定期监测肝肾功能。(4) 忌与茶同饮。(5) 过敏体质患者在用药期间可能有皮疹、瘙痒出现，停药后会逐渐消失，一般不需要做特殊处理。
【规格】	每袋装 4g。
【贮藏】	密封。

血瘀阻络型颈椎脊椎肩周病骨性关节炎骨折后遗症

【药名】	伸筋丹胶囊
【处方】	地龙，制马钱子，红花，乳香(醋炒)，防己，没药(醋炒)，香加皮，烫骨碎补。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气微香，味苦。
【功能与主治】	舒筋通络，活血祛瘀，消肿止痛。用于血瘀络阻引起的骨折后遗症、颈椎病、肥大性脊椎炎、慢性关节炎、坐骨神经痛、肩周炎。
【用法与用量】	口服。一次 5 粒，一日 3 次，饭后服用或遵医嘱。
【注意】	不宜过量、久服；孕妇和哺乳期妇女禁用；心脏病患者慎用。
【规格】	每粒装 0.15g。
【贮藏】	密封。

【药名】	骨友灵搽剂
【处方】	红花 18g 制川乌 18g 制何首乌 13g 续断 18g 威灵仙 18g 醋延胡索 31g 防风 18g 鸡血藤 18g 蝉蜕 13g。
【性状】	本品为棕色的溶液；气特异，并有醋的气味。
【功能与主治】	活血化瘀，消肿止痛。用于瘀血阻络所致的骨性关节炎、软组织损伤，症见关节肿胀、疼痛、活动受限。
【用法与用量】	外用，涂于患处，热敷 20~30 分钟，一次 2~5ml，一日 2~3 次，14 天为一疗程，间隔一周，一般用药 2 疗程或遵医嘱。
【注意】	孕妇禁用；使用过程中皮肤出现发痒、发热及潮红时，应停用。
【规格】	每瓶装(1) 10ml；(2) 20ml；(3) 40ml；(4) 50ml；(5) 60ml；(6) 100ml。
【贮藏】	密闭，置阴凉处。

【药名】	瘀血痹颗粒
【处方】	乳香(制)，没药(制)，红花，威灵仙，川牛膝，香附(制)，姜黄，当归，丹参，川芎，炙黄芪。
【性状】	本品为棕黄色至棕色的颗粒；气香，味甜。
【功能与主治】	活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻络所致的痹病，症见肌肉关节剧痛、痛处拒按、固定不移、可有硬节或瘀斑。
【用法与用量】	开水冲服。一次1袋，一日3次。
【注意】	孕妇禁用；脾胃虚弱者慎用。
【规格】	每袋装10g。
【贮藏】	密封。

血瘀气滞脉络闭阻型腰痛腰椎间盘突出

【药名】	腰痹通胶囊
【处方】	三七，川芎，延胡索，白芍，牛膝，狗脊，熟大黄，独活。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒，气香，味辛、微苦。
【功能与主治】	活血化瘀，祛风除湿，行气止痛。用于血瘀气滞、脉络闭阻所致腰痛，症见腰腿疼痛、痛有定处、痛处拒按、轻者俯仰不便、重者剧痛不能转侧；腰椎间盘突出症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次3粒，一日3次，宜饭后服用。30天为一疗程。
【注意】	孕妇忌服，消化性溃疡性患者慎服或遵医嘱。
【规格】	每粒装0.42g。
【贮藏】	密封。

风湿瘀阻型颈椎病头晕颈项僵硬肩背酸痛

【药名】	颈复康颗粒
【处方】	羌活，川芎，葛根，秦艽，威灵仙，苍术，丹参，白芍，地龙(酒炙)，红花，乳香(制)，黄芪，党参，地黄，石决明，煅花蕊石，关黄柏，炒王不留行，燀桃仁，没药(制)，土鳖虫(酒炙)。
【性状】	本品为黄褐色至棕褐色的颗粒；味微苦。
【功能与主治】	活血通络，散风止痛。用于风湿瘀阻所致的颈椎病，症见头晕、颈项僵硬、肩背酸痛、手臂麻木。
【用法与用量】	开水冲服。一次1~2袋，一日2次。饭后服用。
【注意】	孕妇忌服。消化道溃疡、肾性高血压患者慎服或遵医嘱。如有感冒、发烧、鼻咽痛等患者，应暂停服用。
【规格】	每袋装5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	豨莶丸
【处方】	豨莶草 1000g。
【性状】	本品为黑色的大蜜丸；气微，味甜、微苦。
【功能与主治】	清热祛湿，散风止痛。用于风湿热阻络所致的痹病，症见肢体麻木、腰膝痠软、筋骨无力、关节疼痛。亦用于半身不遂，风疹湿疮。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

类风湿性关节炎红斑狼疮

【药名】	昆明山海棠片
【处方】	昆明山海棠 2500g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色；味微苦、涩。
【功能与主治】	祛风除湿，舒筋活络，清热解毒。用于类风湿性关节炎，红斑狼疮。
【用法与用量】	口服。一次 2 片，一日 3 次。
【注意】	肾功能不全者慎用。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.29g；(2) 糖衣片(片心重 0.28g)。
【贮藏】	密封。

肾虚气血不足型中老年骨质疏松腰脊酸痛胫膝酸软

【药名】	骨疏康胶囊
【处方】	淫羊藿 1251g 熟地黄 1656g 骨碎补 828g 黄芪 1251g 丹参 828g 木耳 663g 黄瓜子 663g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色或棕褐色的颗粒及粉末；味苦。
【功能与主治】	补肾益气，活血壮骨。用于肾虚气血不足所致的中老年骨质疏松症，症见腰脊酸痛、胫膝痠软、神疲乏力。
【用法与用量】	口服。一次 4 粒，一日 2 次，饭后服用。
【注意】	偶有轻度胃肠反应，一般不影响继续服药。
【规格】	每粒装 0.32g。
【贮藏】	密封。

【药名】	骨疏康颗粒
【处方】	淫羊藿 500.4g 熟地黄 662.4g 骨碎补 331.2g 黄芪 500.4g 丹参 331.2g 木耳 265.2g 黄瓜子 265.2g。
【性状】	本品为深棕色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。
【功能与主治】	补肾益气，活血壮骨。用于肾虚气血不足所致的中老年骨质疏松症，症见腰脊酸痛、胫膝痠软、神疲乏力。
【用法与用量】	口服。一次1袋，一日2次，饭后开水冲服。
【注意】	偶有轻度胃肠反应，一般不影响继续服药。
【规格】	每袋装10g。
【贮藏】	密封。

中医对于皮肤病的研究和诊断

中医认为，皮肤病的病因病机虽然复杂，但归纳起来不外乎内因、外因二类。外因主要是风、湿、热、虫、毒；内因主要是七情内伤、饮食劳倦和肝肾亏损。其病机主要因气血不和、脏腑失调、邪毒结聚而致生风、生湿、化燥、致虚、致瘀、化热、伤阴等。性传播疾病主要由性接触染毒致病，属特殊病种。

风：很多皮肤病都与风邪有着密切关系。风邪可以单独直接致病，也可以与他邪气配合而致病。当人体腠理不密、卫气不固时，风邪乘虚入侵，受阻于皮肤，邪毒结聚，内不得疏通，外不得表解，使营卫不和，气血运行失常，肌肤失于濡养，则可致生皮肤病。风邪所致皮肤病，其病变多具有发生迅速，骤起骤消，游走不定，泛发全身或多发头面，皮肤干燥、脱屑、瘙痒等特点。常见皮损有风团、丘疹、疔目、脱屑等。若皮损色白，遇寒易发，苔薄白，脉浮紧者为风寒；皮损色红，遇热易发，苔薄黄，脉浮数者，为风热。

湿：皮肤病以外湿居多，但有时外湿与内湿相合致病。湿邪侵入肌肤，停留肌表，郁结不散，与气血相搏，多发生疱疹、瘙痒、渗液、糜烂等。湿邪所致的皮肤病，其皮肤损害为水疱，或为多形性，或皮肤糜烂，常患病于下部，或浸淫四窜，滋水淋漓，病程缠绵，难以速愈。若与内湿相合，则常伴有胸闷，纳差，肢体沉重，苔白腻，脉濡缓等症状；若湿邪与寒邪相合，则伴有四肢乏力，一身肌肉疼痛，四肢受凉则肢端发冷、苍白或紫暗，苔薄白，脉迟缓等症状。

热：热为阳邪，热为火之渐，热微则痒；火为热之甚，热盛则痛。外感热邪，或脏腑实热，蕴郁肌肤，不得外泄，熏蒸肌表，均可发生皮肤病。火、热同属阳邪，只是轻重的区别，火热之邪性喜炎上，发病暴速，蔓延也快，故热邪致病多发于人体上部，化火则易灼伤营血；热盛则灼烁肌肤而红热灼痛，常伴身热、口渴、便秘、尿赤、苔黄、脉数等症状。

虫：由虫致生的皮肤病多种多样，虫不同则皮损也不相同。一为皮肤中寄生虫直接致病，如疥虫引起的疥疮，真菌则可引起手癣、足癣、体癣、甲癣等病；一为由昆虫的毒素侵入或过敏引起的皮肤病，如蚊虫、臭虫、蠓虫、蚊子叮咬所致的损伤和虫咬皮炎。此外，尚可由肠道寄生虫过敏及禽类寄生虫毒、桑毛虫毒、松毛虫毒等引起皮肤病等，在临床中均较常见。中医文献中对部分皮肤病认为是虫蚀所致，由于古代条件所限，将真菌所致皮肤病也归为虫蚀为患；或以虫来形容皮肤病的瘙痒，如“痒如虫行”，而皮损中实非有虫，应予以区别。由虫引起的皮肤病，其症状是皮肤瘙痒甚剧，有的表现为糜烂，有的能互相传染，有的可伴局部虫斑，腕腹疼痛、大便中可查到虫卵等。

毒：由毒邪引起的皮肤病可分为食毒、药物毒、虫毒、漆毒等，其病机不外乎中毒或禀赋不耐对某物质过敏而成。由毒邪引发的皮肤病，发病前有食“毒”物史或曾内服某种

药物，或接触某种物质，或有毒虫叮咬史，需经过一定的潜伏期后方发病。其症状是皮损表现为灼红、肿胀、丘疹、水疱、风团、糜烂等多种形态，或痒或痛，轻症则局限一处，重症则泛发全身。停止上述毒邪来源后，其病来势急而去也快。有病情严重者，皮肤暴肿，大疱，破流滋水，皮肤层层剥脱，甚则危及生命，不可忽视。

血瘀：为皮肤病重要的病因病机，凡外感六淫、内伤七情，均可导致气机不畅，气为血帅，血随气行，气滞则血凝，血凝久则成瘀。血瘀证候多见于慢性皮肤病，而且多有这些特点：皮损色黯、紫红、青紫，或出现肌肤甲错、色素沉着、瘀斑、肥厚、结节、肿块、瘢痕，舌紫或有瘀点，脉弦涩等。

血虚风燥：亦为皮肤病的重要病机。多种慢性皮肤病因长期皮肤瘙痒，寝食不安，脾虚食减，脾胃失其健运，阴血失其化源，以致血虚生风化燥；或风湿郁久，郁而化热化火，伤其阴血，阴血亏虚，导致血虚风燥；或本虚病久导致血虚风燥。由于血虚则不能濡养肌肤，肤失濡润，血虚生风化燥，风邪逗留肌肤，可引起皮肤干燥、脱屑、瘙痒、粗糙等情况。血虚风燥临床症状表现为病期较长，皮损干燥、肥厚、粗糙、脱屑、瘙痒，伴有头晕目眩、面色苍白、苔薄、脉濡等。血虚风燥常见于牛皮癣、白疕、慢性湿疮、风瘙痒、鱼鳞病等慢性病久之皮肤病。

肝肾不足：脏腑失调也是皮肤病重要的病因病机，其中以肝肾不足为多见。而肝藏血，开窍于目，在体为筋，其华在爪，其色属青；肾藏精，为先天之本，为生殖发育之源，开窍于耳，其荣在发，其色黑。肝血虚，爪甲失养，则指甲肥厚干燥变脆；肝虚血燥，筋气失荣，则生疣目；肝经火郁血滞，可致血痣。肾精不充，发失其养，则毛发干枯易脱；肾虚，本色上泛，则面生黧黑斑。因肝肾不足而所致的皮肤病，其特点是：大多呈现慢性过程，其皮损有干燥、肥厚粗糙、脱屑或伴毛发枯槁，脱发，色素沉着，指甲受损，或伴生疣目、血痣等；且其皮肤病的发生、发展常同患者的生长、发育、妊娠、月经等有关。并伴有全身症状，如兼见头晕目眩，耳鸣，面部烘热，腰膝酸软，失眠多梦，遗精，舌红少津，苔少或光剥，脉弦细等，为肝肾阴虚；如兼见面色淡白，畏寒怕冷，四肢不温，腰膝酸软，头昏耳鸣，阳痿，舌苔白，舌体胖，边有齿痕，脉沉细等，为肾阳不足。

治法

依据皮肤病发生的病因病机、皮损特点、患者体质、病情轻重，采用辨证论治、内外合治的原则进行治疗，以期达到早日康复的目的。但皮肤病是人体全身性疾病在皮肤上的表现，许多全身性疾病可反映在皮肤上；而皮肤上的局部刺激也可引起全身性病变。因此，中医治疗皮肤病主张“治外必本诸内”，局部与整体并重。治疗方法分内治、外治两大类，在临床应用时，必须根据患者的体质情况以及不同的致病因素和皮损形态，然后拟定内治和外治的法则。

内治

祛风法

疏风清热：用于风热证。方选银翘散、桑菊饮、消风散。常用药物如荆芥、防风、蝉衣、牛蒡子、银花、连翘、桑叶、菊花、黄芩、生地、栀子等。

疏风散寒：用于风寒证。方选麻黄汤、麻黄桂枝各半汤等。常用药物如麻黄、桂枝、羌活、防风等。

祛风胜湿：用于风湿证。方选独活寄生汤。常用药物如细辛、防风、独活、桑寄生、秦艽、茯苓等。

驱风潜镇：用于风邪久羁证、顽癣类皮肤病。常用药物如乌梢蛇、蝉衣、僵蚕、全蝎等，用于血虚肝旺证或疮类皮肤病；或由皮肤病所引起的神经痛，方选天麻钩藤饮。常用药物如牡蛎、磁石、珍珠母、石决明、钩藤、白芍等。

清热法

清热解毒：用于实热证。方选五味消毒饮、黄连解毒汤。常用药物如银花、蒲公英、连翘、黄连、黄芩、栀子、黄柏、板蓝根等。

清热凉血：用于血热证。方选犀角地黄汤、化斑解毒汤。常用药物如山栀子、黄连、赤芍、丹皮、槐花、鲜生地、紫草等。

祛湿法

清热利湿：用于湿热证和暑湿证。方选茵陈蒿汤、龙胆泻肝汤、萆薢渗湿汤。常用药物如茵陈、车前草、山栀子、萆薢、生薏苡仁、滑石等。

健脾化湿：用于脾湿证。方选除湿胃苓汤等。常用药物如苍术、厚朴、陈皮、生薏苡仁、藿香、佩兰等。

滋阴除湿：用于渗利伤阴证。方选滋阴除湿汤。常用药物如生地、当归、玄参、茯苓、泽泻、黄柏等。

润燥法

养血润燥：用于血虚风燥证。方选四物汤、当归饮子等。常用药物如熟地、当归、川芎、白苏、女贞子、何首乌、小胡麻等。

凉血润燥：用于血热风燥证。方选凉血消风散等。常用药物如生地、丹皮、当归、丹参、槐花、白茅根、紫草、生石膏等。

活血法

理气活血：用于气滞血瘀证。方选桃红四物汤、通络活血方等。常用药物如归尾、赤芍、桃仁、红花、香附、青皮等。

活血化瘀：用于瘀血凝结证。方选通窍活血汤、血府逐瘀汤等。常用药物如川芎、桃仁、红花、牛膝、水蛭等。

温通法

温阳通络：用于寒湿阻络证。方选当归四逆汤、独活寄生汤等。常用药物如麻黄、桂枝、羌活、独活、制川乌、红花、细辛、牛膝等。

通络除痹：用于寒凝皮痹证。方选阳和汤、独活寄生汤等。常用药物如麻黄、肉桂、干姜、白芥子、独活、鹿角胶等。

软坚法

消痰软坚：用于痰核证。方选海藻玉壶汤。常用药物如半夏、贝母、陈皮、青皮、海藻、昆布等。

活血软坚：用于瘀阻结块证。方选活血散瘀汤加减。常用药物如当归、川芎、赤芍、桃仁、三棱、莪术等。

补肾法

滋阴降火：用于阴虚内热证或肝肾阴虚证。方选知柏地黄汤、大补阴丸。常用药物如生地、玄参、麦冬、山萸肉、龟板、女贞子、旱莲草、知母、黄柏等。

温补肾阳：用于脾肾阳虚证。方选肾气丸、右归丸。常用药物如肉桂、附子、枸杞子、菟丝子、巴戟天、仙茅、淫羊藿等。

外治

皮肤病的病变部位多在皮肤或黏膜，采用各种外治法可以减轻患者的自觉症状，并使皮损迅速消退；而且有些皮肤病单用外治即可迅速达到治疗目的。因此，外治法在皮肤病治疗中十分常见。在使用外治法时，同一皮肤病若皮损情况不同，外治方药也可能不尽相同，这也是中医里面常常提到同病异治；不同性质的皮肤病，若皮损表现相同，处理则可以相仿，此即异病同治。掌握了外治的一些基本原则，临床中即可灵活运用。皮肤病外治可分药物外治和非药物外治。

外用药物的剂型

溶液：具有清洁、止痒、消肿、收敛、清热解毒的作用。适用于急性皮肤病，渗出较多或脓性分泌物多的皮损，或伴轻度痂皮性损害。是将单味药或复方加水煎熬至一定浓度，

滤药渣所得的溶液。可用于浸渍(湿敷)和熏洗。常用药物如苦参、黄柏、马齿苋、生地榆、野菊花、蒲公英、甘草等煎出液；或10%黄柏溶液、生理盐水等。溶液剂用于湿敷是治疗皮肤病常用的方法，适用于急性红肿渗出糜烂的皮损，或浅表溃疡。使用时将5~6层消毒纱布置于药液中浸透，稍挤拧至不滴水为度，敷于患处，一般每1~2小时换1次即可；如渗液不多，可4~5小时换1次。

粉剂(又名散剂)：具有保护、吸收、蒸发、干燥、止痒的作用。适用于无渗液性的急性或亚急性的皮炎类皮肤病。是将单味药或复方研成极细粉末的制剂。常用药物如青黛散、六一散、九一丹、滑石粉、止痒扑粉等。用法为每天3~5次扑患处。

洗剂(又名混悬剂、悬垂剂)：有清凉止痒、保护、干燥、消斑解毒之功。适应证同粉剂。是水和粉剂混合在一起的制剂。久置后一些不溶于水的药粉沉淀于水底，使用时需振荡摇匀。常用药物如三黄洗剂、炉甘石洗剂、颠倒散洗剂、痤疮洗剂等。如止痒可加1%薄荷脑、樟脑、冰片等；杀菌可加10%九一丹或5%~10%硫磺。凡小儿面部皮损广泛及冬天最好不用薄荷脑、樟脑等。

酊剂：具有收敛散风、杀菊、止痒的作用。适用于脚湿气、鹅掌风、体癣、牛皮癣(神经性皮炎)等。是将药物浸泡于75%乙醇或白酒中，密封7~30天后滤过即成的酒浸剂(也有用醋浸泡的醋剂)。常用药物如复方土槿皮酊、1号癣药水等。用法为用棉棒蘸药液，直接外涂皮损区，每天1~3次。凡急性炎症性皮肤病破皮糜烂者以及头面、会阴部皮肤薄嫩处禁用，用后易引起皮肤烧灼及剧痛。

油剂：具有润泽保护、解毒收敛、止痒生肌的作用。适用于亚急性皮肤病中有糜烂、渗出、鳞屑、脓疱、溃疡的皮损。包括将药物放在植物油中煎炸的油剂和用植物油或药油与药粉调和成糊状的油调剂。常用药物如蛋黄油、紫草油、青黛散油、三石散油等。常用的植物油为麻油、菜籽油、花生油、茶油等。以麻油最佳，有清凉润肤之功。用法为每天外搽2~3次。

软膏：具有保护、润滑、杀菊、止痒、去痂的作用。适用于一切慢性皮肤病具有结痂、皲裂、苔藓样变等皮损。是将药物研成细末，用凡士林、羊毛脂、猪脂或蜂蜜、蜂蜡等作为基质调成的均匀、细腻半固体状的剂型。常用药物如青黛膏、风油膏、5%硫黄软膏等。用法为每天外搽2~3次，或涂于纱布上敷贴于患部再加包扎，去痂时宜涂得厚些。用于皲裂、苔藓样变皮损时，如加用热烘疗法效果更好。凡滋水较多、糜烂较重的皮损，不宜外涂或敷贴软膏。

针刺

针刺治疗皮肤病有很好的应用前景，范围较广泛，容易推广，但是需要专业人士来操作，**非专业人士切勿擅自尝试**。体针与耳针有止痒、止痛、镇静、安眠、消炎、促进毛发

生长、调节血管舒缩、内分泌紊乱等作用。常用穴位如体针：上肢取穴曲池、列缺、合谷；下肢取血海、阴陵泉、三阴交；躯干取穴肺俞、心俞、膈俞、脾俞。耳针：取穴肺、皮质下、神门、肾上腺、交感等穴，或取病变相应的部位。其手法为：体针可提插重刺激，留针 15~20 分钟，每日 1 次；耳针可捻转后留针 20 分钟，每日 1 次。适用于湿疮、瘾疹、牛皮癣等。梅花针轻叩击 15~20 分钟，2 日 1 次，适用于油风、局限性神经性皮炎（牛皮癣）。

皮肤科诸病

热毒瘀结型溃疡脓疮红肿湿疮疔疮黄水疮

【药名】	九一散
【处方】	石青(煨)900g, 红粉 100g。
【性状】	本品为浅橙色或浅粉红色的细腻粉末。
【功能与主治】	提脓拔毒, 去腐生肌。用于热毒壅盛所致的溃疡, 症见疮面鲜活、脓腐将尽。
【用法与用量】	外用。取本品适量均匀地撒于患处, 对深部疮口及瘰管, 可用含本品的纸捻条插入, 疮口表面均用油膏或敷料盖贴。每日换药一次或遵医嘱。
【注意】	本品专供外用, 不可入口, 凡肌薄无肉处不能化脓, 或仅有稠水者忌用。
【规格】	每瓶装 1.5g。
【贮藏】	密封, 避光, 防潮。

【药名】	九圣散
【处方】	苍术 150g 黄柏 200g 紫苏叶 200g 苦杏仁 400g 薄荷 200g 乳香 120g 没药 120g 轻粉 50g 红粉 50g。
【性状】	本品为棕黄色至浅棕色的粉末; 气清香。
【功能与主治】	解毒消肿, 燥湿止痒。用于湿毒瘀阻肌肤所致的湿疮、疔疮、黄水疮, 症见皮肤湿烂、溃疡、渗出脓水。
【用法与用量】	外用, 用花椒油或食用植物油调敷或撒布患处。
【注意】	不可内服。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭, 防潮。

【药名】	伤疔膏
【处方】	黄芩 300g 生天南星 100g 冰片 120g 水杨酸甲酯 30g 连翘 200g 白芷 100g 薄荷脑 60g。
【性状】	本品为浅棕黄色的片状橡胶膏; 气芳香。
【功能与主治】	清热解毒, 消肿止痛。用于热毒蕴结肌肤所致的疮疡, 症见红、肿、热、痛、未溃破。亦用于乳腺炎、静脉炎及其他皮肤创伤。
【用法与用量】	外用, 贴于患处。每日更换一次。
【注意】	肿疡阴证者禁用; 忌食辛辣食物; 皮肤如有过敏现象可停用。
【规格】	(1)5cm X 6.5cm; (2)5cm X 7cm; (3)7cm X 10cm。
【贮藏】	密封。

【药名】	如意金黄散
【处方】	姜黄 160g 黄柏 160g 厚朴 64g 大黄 160g 苍术 64g 陈皮 64g 甘草 64g 生天

【性状】	南星 64g 白花 160g 天花粉 320g。
【功能与主治】	本品为黄色至金黄色的粉末；气微香，味苦、微甘。清热解毒，消肿止痛。用于热毒瘀滞肌肤所致疮疡肿痛、丹毒流注，症见肌肤红、肿、热、痛，亦可用于跌打损伤。
【用法与用量】	外用。红肿，烦热，疼痛，用清茶调敷；漫肿无头，用醋或葱酒调敷，亦可用植物油或蜂蜜调敷。一日数次。
【注意】	外用药，不可内服。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	拔毒膏
【处方】	金银花 70g 大黄 70g 地黄 70g 黄柏 70g 赤芍 70g 川芎 35g 白蔹 35g 蓖麻子 35g 苍术 35g 樟脑 28g 没药 18g 乳香 18g 血竭 18g 连翘 70g 桔梗 70g 栀子 70g 黄芩 70g 当归 35g 白芷 35g 木鳖子 35g 玄参 35g 蜈蚣 5g 穿山甲 35g 儿茶 18g 红粉 18g 轻粉 18g。
【性状】	本品为摊于布上或纸上的黑膏药。
【功能与主治】	清热解毒，活血消肿。用于热毒瘀滞肌肤所致的疮疡，症见肌肤红、肿、热、痛，或已成脓。
【用法与用量】	加热软化，贴于患处。隔日换药一次，溃脓时每日换药一次。
【注意】	溃疡创面不宜外用。
【规格】	每张净重 0.5g。
【贮藏】	密闭，置阴凉处。

【药名】	复方珍珠散
【处方】	煅石决明 750g 龙骨(煅) 150g 煅白石脂 90g 煅石膏 60g 珍珠 7.5g 人工麝香 7.5g 冰片 30g。
【性状】	本品为白色至淡灰色的粉末；气微香。
【功能与主治】	收湿敛疮，生肌长肉。用于热毒蕴结所致的溃疡，症见疮面鲜活、脓腐将尽。
【用法与用量】	外用。取药粉适量，敷患处。
【注意】	肿疡阴证者禁用；孕妇禁用；忌食辛辣食物。
【规格】	每瓶装 1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方黄柏液涂剂(复方黄柏液)
【处方】	连翘 80g 黄柏 40g 金银花 40g 蒲公英 40g 蜈蚣 2.4g。
【性状】	本品为红棕色液体。
【功能与主治】	清热解毒，消肿祛腐。用于疮疡溃后，伤口感染，属阳证者。
【用法与用量】	外用。浸泡纱布条外敷于感染伤口内，或破溃的脓肿内。若溃疡较深，可用直径 0.5~1.0cm 的无菌胶管，插入溃疡深部，以注射器抽取本品进行冲洗。用量一般 10~20ml，每日一次。或遵医嘱。
【注意】	(1)使用本品前应注意按常规换药法清洁或清创病灶；(2)开瓶后，不易久

【规格】 【贮藏】	存；(3)孕妇慎用。 (1)每瓶装 20ml；(2)每瓶装 100ml；(3)每瓶装 120ml；(4)每瓶装 150ml。 密封。
【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】	紫雪草 紫草 500g 防风 150g 白芷 150g 没药 150g 当归 150g 地黄 150g 乳香 150g。 本品为紫红色的软膏；具特殊的香气。 化腐生肌，解毒止痛。用于热毒蕴结所致的溃疡，症见疮面疼痛、疮色鲜活、脓腐将尽。 外用，摊于纱布上贴患处，每隔 1~2 日换药一次。 无。 无。 密闭，遮光。
【药名】 【处方】 【性状】 【功能与主治】 【用法与用量】 【注意】 【规格】 【贮藏】	牛黄化毒片 制天南星 81g 金银花 162g 甘草 54g 没药 27g 连翘 162g 白芷 81g 乳香 27g 人工牛黄 5.4g。 本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕黄色至黄棕色；味苦、辛。 解毒消肿，散结止痛。用于疮疡、乳痈红肿疼痛。 口服。糖衣片一次 8 片，薄膜衣片一次片，一日 3 次；小儿酌减。 无。 (1)糖衣片，片心重 0.3g；(2)薄膜衣片，每片重 0.62g。 密封。

气滞血瘀热毒壅滞型红斑狼疮

【药名】	狼疮丸
【处方】	金银花 53.6g 蒲公英 53.6g 地黄 53.6g 甘草 13.4g 赤芍 26.8g 丹参 13.4g 炒桃仁 26.8g 蝉蜕 53.6g 连翘 53.6g 黄连 13.4g 大黄(酒炒) 20.1g 蜈蚣(去头尾足) 2.42g 当归 13.4g 玄参 53.6g 红花 20.1g 浙贝母 26.8g。
【性状】	本品为黑色的包衣水蜜丸，除去包衣显棕褐色至黑褐色；或为黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；气微，味辛、涩、微苦。
【功能与主治】	清热解毒，凉血活血。用于热毒壅滞、气滞血瘀所致的系统性红斑狼疮。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 5.4g，小蜜丸一次 10g，大蜜丸一次 2 丸，一日 2 次；系统性红斑狼疮急性期：一次服用量加 1 倍，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	水蜜丸每 100 丸重 30g；大蜜丸每丸重 5g。
【贮藏】	密封。

湿毒蕴结型湿疹皮疹瘙痒粉刺痤疮荨麻疹足癣银屑病

【药名】	乌蛇止痒丸
【处方】	乌梢蛇(白酒炙)，蛇床子，苍术(泡)，牡丹皮，苦参，当归，防风，关黄柏，红参须，蛇胆汁，人工牛黄。
【性状】	本品为黑色的包衣浓缩水丸，除去包衣后显棕褐色；气香，味苦、辛。
【功能与主治】	养血祛风，燥湿止痒。用于风湿热邪蕴于肌肤所致的瘾疹、风瘙痒，症见皮肤风团色红、时隐时现、瘙痒难忍，或皮肤瘙痒不止、皮肤干燥、无原发皮疹；慢性荨麻疹、皮肤瘙痒症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 2.5g，一日 3 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每 10 丸重 1.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	老鸛草软膏
【处方】	老鸛草 1000g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色或褐紫色的软膏。
【功能与主治】	除湿解毒，收敛生肌。用于湿毒蕴结所致的湿疹、痈、疔、疮、疖及小面积积水、火烫伤。
【用法与用量】	外用，涂敷患处，一日1次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密闭。

【药名】	冰黄肤乐软膏
【处方】	大黄，硫黄，甘草，薄荷脑，姜黄，黄芩，冰片。
【性状】	本品为灰黄色的乳剂型软膏，具有冰片的特殊气。
【功能与主治】	清热燥湿，活血祛风，止痒消炎。用于湿热蕴结或血热风燥引起的皮肤瘙痒；神经性皮炎、湿疹、足癣及银屑病瘙痒性皮肤病见上述证候者。
【用法与用量】	外用，涂搽患处。一日3次。
【注意】	无
【规格】	每支装 15g。
【贮藏】	遮光，密闭，置阴凉处。

【药名】	姜黄消痤搽剂
【处方】	姜黄 50g 重楼 50g 杠板归 50g 土荆芥 25g 一枝黄花 25g 绞股蓝 25g 珊瑚姜 50g。
【性状】	本品为黄色的澄清溶液；具特异香气。
【功能与主治】	苗医：旭嘎怡沓痂，维象样丢象：粉刺，油面风。中医：清热祛湿，散风止痒，活血消痤。用于湿热郁肤所致的粉刺（痤疮），油面风（脂溢性皮炎）。
【用法与用量】	外用。用棉签蘸取本品涂患处，一日2~3次。
【注意】	(1) 治疗期间少食动物脂肪及酒、酸、辣等刺激性食物。 (2) 本品对有破损的痤疮患者有短暂轻微的刺痛感。 (3) 乙醇过敏者慎用。
【规格】	每瓶装(1)10ml；(2)30ml；(3)50ml；(4)65ml。
【贮藏】	避光，密闭。

【药名】	消痤丸
【处方】	升麻9.47g 柴胡30.31g 麦冬34.10g 野菊花22.73g 黄芩28.42g 玄参9.79g 石膏56.84g 石斛39.79g 龙胆39.79g 大青叶39.79g 金银花28.42g 竹茹18.95g 蒲公英28.42g 淡竹叶22.73g 夏枯草22.73g 紫草22.73g。
【性状】	本品为黑色的浓缩丸，丸芯显黑褐色；气微香，味苦。
【功能与主治】	清热利湿，解毒散结。用于湿热毒邪聚结肌肤所致的粉刺，症见颜面皮肤光亮油腻、黑头粉刺、脓疱、结节，伴有口苦、口黏、大便干；痤疮见上述证候者。

【用法与用量】	口服。一次 30 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇及脾胃虚寒者慎用；忌食辛辣、油腻之品。
【规格】	每 10 丸重 2g。
【贮藏】	密封。

血热瘀阻型粉刺痤疮丘疹红斑湿疹

【药名】	复方珍珠暗疮片
【处方】	山银花 28g 黄芩 106g 猪胆粉 0.65g 玄参 56g 山羊角 3g 赤芍 50g 川木通 112g 北沙参 50g 蒲公英 28g 黄柏 28g 地黄 84g 水牛角浓缩粉 10g 当归尾 28g 酒大黄 56g 珍珠层粉 3g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；气香，味微苦。
【功能与主治】	清热解毒，凉血消斑。用于血热蕴阻肌肤所致的粉刺、湿疹，症见颜面部红斑、粉刺疙瘩、脓疱，或皮肤红斑丘疹、瘙痒；痤疮、红斑丘疹性湿疹见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇及脾胃虚寒者慎服；忌食辛辣、油腻及海鲜之品。
【规格】	(1) 薄膜衣片每片重 0.33g；(2) 糖衣片(片心重 0.3g)。
【贮藏】	密封。

血虚风燥型瘙痒皮肤干燥脱屑

【药名】	湿毒清胶囊
【处方】	地黄，当归，丹参，蝉蜕，苦参，白鲜皮，甘草，黄芩，土茯苓。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅黄棕色至棕褐色的粉末；味微苦。
【功能与主治】	养血润肤，祛风止痒。用于血虚风燥所致之风瘙痒，症见皮肤干燥、脱屑、瘙痒，伴有抓痕、血痂、色素沉着；皮肤瘙痒症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇及过敏体质者慎服；忌食辛辣、海鲜之品。
【规格】	每粒装 0.5g。
【贮藏】	密封。

血虚风盛肾精不足型秃头脱发油腻毛发干燥斑秃产后脱发

【药名】	养血生发胶囊
【处方】	熟地黄，当归，羌活，木瓜，川芎，白芍，菟丝子，天麻，制何首乌。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为深棕色的颗粒和粉末；味辛、微苦。
【功能与主治】	养血祛风，益肾填精。用于血虚风盛、肾精不足所致的脱发，症见毛发松动或呈稀疏状脱落、毛发干燥或油腻、头皮瘙痒；斑秃、全秃、脂溢性脱发与病后、产后脱发见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.5g。
【贮藏】	密封。

风热瘀阻型黄褐斑粉刺红鼻酒齄

【药名】	化斑祛斑胶囊
【处方】	柴胡，黄芩，红花，薄荷，当归，赤芍。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒和粉末；味辛、微苦。
【功能与主治】	疏风清热，活血化瘀。用于黄褐斑、酒齄、粉刺属风热瘀阻证者。
【用法与用量】	口服。一次5粒，一日2次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.32g。
【贮藏】	密封。

真菌型脚癣手癣体癣股癣皮肤癣症

【药名】	癣宁搽剂
【处方】	土荆皮，关黄柏，白鲜皮，徐长卿，苦参，石榴皮，洋金花，南天仙子，地肤子，樟脑。
【性状】	本品为棕红色的澄清液体；具特异香气。
【功能与主治】	清热除湿，杀虫止痒。有较强的抗真菌作用。用于脚癣、手癣、体癣、股癣皮肤癣症。
【用法与用量】	外用，涂擦或喷于患处。一日2~3次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

风湿虫毒型鹅掌风脚湿气丘疹水疱脱屑瘙痒

【药名】	癣湿药水
【处方】	土荆皮 250g 大风子仁 125g 防风 50g 凤仙透骨草 125g 吴茱萸 50g 蝉蜕 75g 蛇床子 125g 百部 125g 当归 100g 侧柏叶 100g 花椒 125g 斑蝥 3g。
【性状】	本品为深黄绿色的澄清液体；具醋酸的特臭。
【功能与主治】	祛风除湿，杀虫止痒。用于风湿虫毒所致的鹅掌风、脚湿气，症见皮肤丘疹、水疱、脱屑，伴有不同程度瘙痒。
【用法与用量】	外用。擦于洗净的患处，一日3~4次；治疗灰指甲应先除去空松部分，使药易渗入。
【注意】	切忌人口，严防触及眼、鼻、口腔等黏膜处。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

经络阻隔气血不畅型秃头脱发油风斑秃

【药名】	生发搽剂
【处方】	闹羊花 60g 补骨脂 60g 生姜 30g。
【性状】	本品为棕色澄清液体；气香。
【功能与主治】	温经通脉。用于经络阻隔、气血不畅所致的油风，症见头部毛发成片脱落、头皮光亮、无痛痒；斑秃见上述证候者。
【用法与用量】	外用。涂擦患处，一日2~3次。
【注意】	局部皮肤破损处禁用；切忌口服及入眼；发生过敏反应时停用；不可大剂量或长期使用。
【规格】	每瓶装 20ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	滋补生发片
【处方】	当归 60g 地黄 45g 川芎 30g 桑椹 45g 黄芪 60g 黑芝麻 90g 桑叶 30g 制何首乌 90g 菟丝子 45g 枸杞子 45g 侧柏叶 45g 熟地黄 75g 女贞子 60g 墨旱莲 60g 鸡血藤 45g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至黑褐色；气微，味苦。
【功能与主治】	滋补肝肾，益气养荣，活络生发。用于脱发症。
【用法与用量】	口服。一次 6~8 片，一日 3 次，小儿酌减。
【注意】	孕妇及合并其他疾病者遵医嘱。
【规格】	(1)糖衣片片心重 0.30g；(2)糖衣片片心重 0.38g；(3)薄膜衣片每片重 0.31g；(4)薄膜衣片每片重 0.38g。
【贮藏】	密封。

肝肾不足血虚风盛型油风斑秃全秃普秃

【药名】	斑秃丸
【处方】	地黄 74g 熟地黄 74g 制何首乌 74g 当归 49g 丹参 49g 炒白芍 49g 五味子 49g 羌活 25g 木瓜 25g。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸或黑褐色的大蜜丸，味甜而后涩。
【功能与主治】	补益肝肾，养血生发。用于肝肾不足、血虚风盛所致的油风，症见毛发成片脱落、或至全部脱落，多伴有头晕失眠、目眩耳鸣、腰膝痠软；斑秃、全秃、普秃见上述证候者。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 5g；大蜜丸一次 1 丸，一日 3 次。
【注意】	本品不适用假发斑秃(患处头皮萎缩，不见毛囊口)及脂溢性皮炎；忌食辛辣食品。
【规格】	(1)水蜜丸每 10 丸重 1g；(2)大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

肝肾不足气血瘀阻型白癜风

【药名】	白蚀丸
【处方】	紫草 71g 降香 71g 丹参 71g 制何首乌 595g 牡丹皮 71g 苍术(泡) 24g 蒺藜 1010g 灵芝 595g 盐补骨脂 357g 红花 71g 海螵蛸 48g 黄药子 71g 甘草 48g 龙胆 24g。
【性状】	本品为黑色的包衣浓缩水丸，除去包衣后显棕褐色；味苦。
【功能与主治】	补益肝肾，活血祛瘀，养血驱风。用于肝肾不足、血虚风盛所致的白癜风，症见白斑色乳白、多有对称、边界清楚，病程较久，伴有头晕目眩、腰膝痠痛。
【用法与用量】	口服，一次 2.5g，十岁以下小儿服量减半，一日 3 次。
【注意】	孕妇及肾功能不全者禁用；服药过程患处宜常日晒。
【规格】	每袋装 2.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	白癜风胶囊
【处方】	补骨脂 33.33g 黄芪 33.33g 红花 33.33g 川芎 33.33g 当归 33.33g 香附 33.33g 桃仁 33.33g 丹参 33.33g 乌梢蛇 33.33g 紫草 33.33g 白鲜皮 33.33g 山药 33.33g 干姜 33.33g 龙胆 33.33g 蒺藜 433.33g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末；味辛、微苦。
【功能与主治】	活血行滞，祛风解毒。用于经络阻隔、气血不畅所致的白癜风，症见白斑散在分布、色泽苍白、边界较明显。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 粒，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每粒装 0.45g。
【贮藏】	密封。

银屑病(牛皮癣)玫瑰糠疹白疖

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>郁金银屑片</p> <p>秦艽 30g 当归 30g 石菖蒲 30g 关黄柏 30g 香附(酒炙) 30g 郁金(醋炙) 30g 醋莪术 30g 雄黄 30g 马钱子粉 30g 皂角刺 30g 桃仁 30g 红花 30g 乳香(醋炙) 30g 硃砂 12g 玄明粉 18g 大黄 18g 土鳖虫 36g 青黛 24g 木鳖子 24g。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显黄棕色至棕褐色；气微香，味微苦、涩。</p> <p>疏通气血，软坚消积，清热解毒，燥湿杀虫。用于银屑病(牛皮癣)。</p> <p>口服。一次 3~6 片，一日 2~3 次。</p> <p>在专科医生指导下应用。</p> <p>(1) 薄膜衣片每片重 0.28g；(2) 糖衣片(片心重 0.24g)。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>复方青黛丸</p> <p>青黛 40g 蒲公英 53.3g 白芷 66.7g 白鲜皮 66.7g 绵马贯众 40g 马齿苋 133.3g 焦山楂 40g 乌梅 133.3g 紫草 53.3g 丹参 66.7g 建曲 40g 土茯苓 133.3g 绵萆薢 66.7g 南五味子(酒蒸) 66.7g。</p> <p>本品为深蓝色的包衣水丸，除去包衣后显灰褐色；气微，味微苦、酸。</p> <p>清热凉血，解毒消斑。用于血热所致的白疮、血风疮，症见皮疹色鲜红、筛状出血明显、鳞屑多、瘙痒明显，或皮疹为圆形、椭圆形红斑，上附糠秕状鳞屑，有母斑；银屑病进行期、玫瑰糠疹见上述证候者。</p> <p>口服。一次 6g，一日 3 次。</p> <p>孕妇慎用。</p> <p>每袋装 6g。</p> <p>密封。</p>
<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>消银屑片</p> <p>地黄，牡丹皮，赤芍，当归，苦参，金银花，玄参，牛蒡子，蝉蜕，白鲜皮，防风，大青叶，红花。</p> <p>本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦。</p> <p>清热凉血，养血润肤，祛风止痒。用于血热风燥型白疖和血虚风燥型白疖，症见皮疹为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银白色鳞屑、或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑、较干燥、基底淡红色、瘙痒较甚。</p> <p>口服。一次 5~7 片，一日 3 次。一个月为一疗程。</p> <p>无。</p> <p>(1) 薄膜衣片每片重 0.32g；(2) 糖衣片(片心重 0.3g)。</p> <p>密封。</p>

【药名】	消银胶囊
【处方】	地黄 91g 赤芍 46g 苦参 46g 玄参 46g 蝉蜕 23g 防风 23g 红花 23g 牡丹皮 46g 当归 46g 金银花 46g 牛蒡子 46g 白鲜皮 46g 大青叶 46g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕褐色的颗粒及粉末；味苦。
【功能与主治】	清热凉血，养血润肤，祛风止痒。用于血热风燥型白疔和血虚风燥型白疔，症见皮疹为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银白色鳞屑、或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑、较干燥、基底淡红色、瘙痒较甚。
【用法与用量】	口服。一次 5~7 粒，一日 3 次。一个月为一疗程。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	银屑灵膏
【处方】	苦参 40g 甘草 40g 白鲜皮 54g 防风 40g 土茯苓 81g 蝉蜕 54g 黄柏 27g 地黄 54g 山银花 54g 赤芍 27g 连翘 40g 当归 40g。
【性状】	本品为黑褐色稠厚的半流体；味甜、微苦。
【功能与主治】	清热燥湿，活血解毒。用于湿热蕴肤，郁滞不通所致的白疔，症见皮损呈红斑湿润、偶有浅表小脓疱，多发于四肢屈侧部位；银屑病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 33g，一日 2 次。或遵医嘱。
【注意】	孕妇禁用；忌食刺激性食物。
【规格】	(1) 每袋装 33g；(2) 每瓶装 100g；(3) 每瓶装 300g。
【贮藏】	密封。

水火烫伤疮疡肿痛溃烂

【药名】	京万红软膏
【处方】	地榆，地黄，当归，桃仁，黄连，木鳖子，罌粟壳，血余炭，棕榈，半边莲，土鳖虫，白藜，黄柏，紫草，金银花，红花，大黄，苦参，五倍子，槐米，木瓜，苍术，白芷，赤芍，黄芩，胡黄连，川芎，栀子，乌梅，冰片，血竭，乳香，没药。
【性状】	本品为深棕红色的软膏；具特殊油腻气。
【功能与主治】	活血解毒，消肿止痛，去腐生肌。用于轻度水、火烫伤、疮疡肿痛、创面溃烂。
【用法与用量】	用生理盐水清理创面，涂敷本品或将本品涂于消毒纱布上，敷盖创面，用消毒纱布包扎，一日1次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	1)每支装10g；(2)每支装20g；(3)每瓶装30g；(4)每瓶装50g。
【贮藏】	密封，遮光，置阴凉干燥处。

【药名】	烧伤灵酊
【处方】	虎杖，黄柏，冰片。
【性状】	本品为红棕色或深棕色的澄清液体。
【功能与主治】	清热燥湿，解毒消肿，收敛止痛。用于各种原因引起的I、II度烧伤。
【用法与用量】	外用。喷洒于洁净的创面，不需包扎。一日3~4次
【注意】	无。
【规格】	每瓶装(1)50ml；(2)100ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	烫伤油
【处方】	马尾连93g 紫草62.4g 黄芩93g 冰片5g 地榆62.4g 大黄62.4g。
【性状】	本品为棕红色的油状液体。
【功能与主治】	清热解毒，凉血祛腐止痛。用于I、II度烧烫伤和酸碱灼伤。
【用法与用量】	外用。创面经消毒清洗后，用棉球将药涂于患处，盖于伤面，必要时可用纱布浸药盖于创面。
【注意】	孕妇慎用；忌食辛辣食物。
【规格】	每瓶装30g。
【贮藏】	密封。

【药名】	紫花烧伤软膏
【处方】	紫草，地黄，熟地黄，冰片，黄连，花椒，甘草，当归。
【性状】	本品为紫红色至紫棕色的软膏；气微香。
【功能与主治】	清热凉血，化瘀解毒，止痛生肌。用于I、II度以下烧伤、烫伤。
【用法与用量】	外用，清创后，将药膏均匀涂敷于创面，一日1~2次。采用湿润暴露疗法，必要时特殊部位可用包扎疗法或遵医嘱。

【注意】	忌食辛辣食物。
【规格】	(1)每支装 20g；(2)每支装 40g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	獾油搽剂
【处方】	獾油 970g 冰片 30g。
【性状】	本品为淡黄色半透明黏稠液体；气辛凉。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛。用于烧伤，烫伤，皮肤肿痛。
【用法与用量】	外用。涂抹患处。
【注意】	忌食辛辣厚味食物。
【规格】	(1)每瓶装 15g；(2)每瓶装 30g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

小儿发育成长诸病

【药名】	龙牡壮骨颗粒
【处方】	党参，山麦冬，黄芪，醋龟甲，炒白术，山药，醋南五味子，龙骨，煅牡蛎，茯苓，大枣，甘草，乳酸钙，炒鸡内金，维生素D ₂ ，葡萄糖酸钙。
【性状】	本品为淡黄色至黄棕色的颗粒；气香，味甜。
【功能与主治】	强筋壮骨，和胃健脾。用于治疗 and 预防小儿佝偻病、软骨病；对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓也有治疗作用。
【用法与用量】	开水冲服。二岁以下一次 5g 或 3g(无蔗糖)，二至七岁一次 7.5g 或 4.5g(无蔗糖)，七岁以上一次 10g 或 6g(无蔗糖)，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每袋装 5g；(2) 每袋装 3g(无蔗糖)。
【贮藏】	密封。
【药名】	乐儿康糖浆
【处方】	党参 77.3g 黄芪 77.3g 山药 77.3g 麦冬 77.3g 大枣 25.8g 炒麦芽 25.8g 桑枝 206.2g 太子参 77.3g 茯苓 51.5g 薏苡仁 77.3g 制何首乌 77.3g 焦山楂 25.8g 陈皮 77.3g。
【性状】	本品为棕黄色至棕褐色的黏稠液体；味甜、微苦。
【功能与主治】	益气健脾，和中开胃。用于脾胃气虚所致的食欲不振、面黄、身瘦；厌食症、营养不良症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一至二岁一次 5ml，二岁以上一次 10ml，一日 2~3 次。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 100ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。
【药名】	肥儿丸
【处方】	煨肉豆蔻 50g 木香 20g 六神曲(炒) 100g 炒麦芽 50g 胡黄连 100g 槟榔 50g 使君子仁 100g。
【性状】	本品为黑棕色至黑褐色的大蜜丸；味微甜、苦。
【功能与主治】	健胃消积，驱虫。用于小儿消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻。
【用法与用量】	口服。一次 1~2 丸，一日 1~2 次；三岁以内小儿酌减。
【注意】	无。
【规格】	每丸重 3g。
【贮藏】	密封。
【药名】	蚝贝钙咀嚼片(蚝贝钙片)
【处方】	牡蛎 1000g。

【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显类白色；具橙香，味微甜。
【功能与主治】	补肾壮骨。用于儿童钙质缺乏及老年骨质疏松症的辅助治疗。
【用法与用量】	嚼服。一次1片，一日3次童酌减或遵医嘱。
【注意】	无。
【规格】	每片重1.60g〔每片含钙(Ca)量300mg〕。
【贮藏】	密封，防潮。

中医对于眼睛诸病的研究和诊断

眼与脏腑的密切关系，《灵枢·大惑论》早有深刻论述，谓：“五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精。精之窠为眼，骨之精为瞳子，筋之精为黑眼，血之精为络，其窠气之精为白眼，肌肉之精为约束，裹撷筋骨血气之精而与脉并为系，上属于脑，后出于项中。”说明眼的发育及功能是五脏六腑之精气不断上行输注的结果。精气是人体生命活动的主要物质基础，眼睛得到脏腑精气的涵养，才能神光充沛，视觉正常。如果脏腑功能失调，精气不能充足流畅地上行灌注于目，就会影响眼的功能，甚至发生眼病。《太平圣惠方·眼论》说：“明孔道通五脏，脏气若乱，目患即生，诸脏既安，何辄有损。”明确地指出了眼与脏腑之间的密切关系。

目为肝窍，目为心之使，而五脏六腑之精气皆上注于目，所以观察目的变化可知脏腑病变。目的各部分与五脏相对应，即瞳仁属肾，称水轮；黑睛属肝，称风轮；白睛属肺，称气轮；目眦的血络属心，称血轮；眼睑属脾，称肉轮。根据五轮变化可推测所对应之脏的病变，望目时应注意其神、色、形、态之常变。

目色：目眦色赤为心火；白睛赤为肺火；白睛显红络为阴虚火旺；全目赤肿为肝经风热；眼胞红肿湿烂为脾火；白睛变黄为黄疸，目眦淡白则是血亏之征。

目形：目窠微肿如新卧起之状，是水肿病初起；目窠内陷，为亡阴脱液之征或五脏精气衰竭之象，病重难治。喘而眼睛突起为肺胀；眼突颈肿属瘰疬病。

目态：主要观察目之动静变化。两目上视，白多黑少，不能转动者，为“戴眼”，见于惊风、痉厥及癫痫等；双目凝视前方不能转动，称“瞳目直视”，多属阴血亏损或痰迷心窍；如果黑睛斜向一侧，称“横目斜视”，为肝风内动的表现之一，亦可见于先天性斜视；瞳仁散大，称“瞳仁扩大”，多属肾精耗竭，为濒死危象，亦可见于中毒病人；瞳仁缩小，则属肝胆火炽，或中毒所致。

目痛：最为常见，多属实证，肝阳上亢、肝火上炎、风热侵袭等都可引起眼目疼痛。

目眩：指眼前发黑、发花，甚则视物旋转，可由肝阳上亢或痰湿上蒙清窍引起，也可因气血阴精亏虚，目失濡养使然。

目昏：为视物昏暗模糊；雀盲，为光暗时视物不清；歧视，为视一物为几物，三者病因病机基本相同，均由肝肾虚损，精血不足而致。

眼睛的治疗

眼乃五官之一，居于人体上部及体表，其结构、功能及病理有其自身特点，而又与脏

腑、经络、气血等整体有着不可分割的关系，故眼病的治疗，必须内外兼治。内治对于调整脏腑、阴阳、气血失调以治本，固然重要。而外治对外障眼病和某些内障眼病有着不可替代的重要作用。

内治法

内治法是通过内服药物，以祛除病邪，调整脏腑经络和气血阴阳的失调，调动自身抗病修复能力，从而达到治疗眼病和提高视力的目的。内治法以整体观为指导，以辨证为依据，在中医眼科治疗学中占有重要地位，是中医眼科治疗的主要给药途径，认为是治本之法，受到历代眼科医家的重视，积累了大量的内服方药。由于目病的病因、病位、病性等不同，故内治法是多种多样的。其配伍既灵活又需遵循一定的法度。在具体组方遣药时，既要立足全身辨证，又要结合局部症状和辨病，其内涵是十分丰富的。内服药治，既是内障眼病的主要治疗措施，也是外障眼病治本之法。

❖ 祛风清热法

本法是以辛散轻扬与寒凉清热药物为主组成。以祛除风热之邪为主要作用，治疗眼病的风热证候。是外障眼病的最常用治法之一。把疏散风热作为治目之要法，谓其组方主要是苦寒剂中加辛温发散。

祛风清热法主要适用于具有红肿热痛及眵泪涩痒等症状的炎症性眼病。而且多发病较急，症见胞睑红肿，湿烂痒痛，目痛畏光，眵泪交加，白睛红肿，黑睛翳障，瞳神缩小，目珠偏斜，眉骨疼痛。或伴恶风发热，头痛流涕、苔薄白不润或薄黄，脉弦或浮数等风热表证。如眼睑、结膜、角膜、巩膜、前葡萄膜、眼眶等的炎症性疾病初期，或眼外伤、过敏性眼病等，常以本法为主，风邪易犯上窍及体表，火性炎上且目病多火热，外障眼病以风热为最多见，故祛风清热法应用很广。常用方剂有银翘散、驱风散热饮子、羌活胜风汤、金液汤、新制柴连汤、抑阳酒连散、还阴救苦汤、防风通圣散、菊花决明散、散热消毒饮等。

❖ 祛风散寒法

本法是以辛温发散疏风祛邪药物为主组成方剂，以祛风散寒除邪为主要作用的治疗方法，用以治疗眼病的风寒证候。尤其是目痛为主症的眼病较为常用。强调风寒与目病的关系，对当时所盛行的“目不因火则不病”的理论，颇具独到见解，对祛风散寒法在眼科的应用具有参考价值。

本法适用于眼痛较甚，畏光多泪，或伴目痒梗涩等症的外障眼病。多发病较急，眼病早期，邪未化热，症见眼痛头痛，泪多眵少，泪无热感，畏光怕风，目痒目涩，目珠偏斜，黑睛翳障，眉骨疼痛等。可伴身痛恶寒，项背不舒，苔薄白，脉浮紧或弦而不数等。多见于病毒性炎症眼病、过敏性眼病、眶上神经痛、麻痹性斜视等。如结膜、角膜、巩膜、前葡萄膜等的炎症性眼病。一般多用于外障眼病初期，若用于久病者，多为陈寒痼疾或是阳虚体质或是过早过多用寒凉所致。常用方剂如荆防败毒散、明目细辛汤、柴胡复生汤、驱风一字散、川芎茶调散、羌活退翳散、四味大发散、八味大发散等。

❖ 清热解毒法

本法是以清热解毒为主要作用的药物为主组成，适用于眼病的热毒证候的治疗方法，且日益受到眼科医家的重视。多用于炎症性眼病属热毒实证者，尤其是化脓性炎症、角膜炎症及眼外伤并感染者。症见眼睛疼痛或灼热拒按，胞肿如桃，疮疡疔肿，白睛混赤肿胀，眵泪交加，眼珠红肿突起，黑睛翳腐，黄液上冲等。或伴发热口渴，舌红苔黄，脉数等。如眼睑、结膜、泪器、眼眶、角膜的急性炎症性疾病以及眼外伤感染等，属热证者，多以本法为主。常用方剂如黄连解毒汤、五味消毒饮、普济消毒饮、银花复明汤、银花解毒汤、通腑降黄汤等。

❖ 清热降火法

本法是以寒凉清热降火药物为主组成，以清除火热之邪为主要作用的治疗方法。用于眼病的实火热证。目不因火则不病，火性炎上，眼病因火热者居多，本法在眼科比较常用。

清热降火法主要适用于外感六淫化热生火，或脏腑功能失调，内生火邪，或五志化火等实火热证眼病。症见病势急重，胞睑红赤焮热肿胀，头目痛甚，眼痛拒按，畏火羞明，泪热眵稠，视力骤降，白睛混赤或抱轮红赤，黑睛翳厚或溃陷，黄液上冲，瞳神缝小或散大，目珠高突，转动受限。常伴有口渴欲饮，便结溲黄，舌红苔黄，脉数实等实热之象。多用于重症角膜炎、重症结膜炎、巩膜炎、葡萄膜炎、眼内炎、全眼球脓炎、急性视神经炎、眼眶急性炎症、急性闭角型青光眼、眼外伤感染等。常用方剂如龙胆泻肝汤、黄连解毒汤、四顺清凉饮子、竹叶泻经汤、清脾散、退红良方、退赤散、黄连天花粉丸、龙胆芦荟丸、泻肝汤、泻肺饮等。

❖ 泻下降火法

本法是用通导大便和清热泻火药物为主的配伍组方，以排除燥屎及有害物质，荡涤实热火毒与瘀血，减轻上部反应，止痛退赤为主要作用的治疗方法，用以治疗火毒炽盛，里实秘结，瘀滞内停的眼病，多为感染性炎症性眼病的严重阶段。症见头目剧痛，痛而拒按，胞肿难睁，畏热羞明，泪热眵多，白睛混赤肿胀，黑睛溃烂翳腐，黄液上冲，瞳神紧小或散大，珠突胀痛，突发失明，眼部疮病肿痛等。常伴有口渴喜饮，大便秘结，腹胀腹痛，舌红苔黄，脉数实等里实热结证。常用方剂如芍药清肝散、泻肝散、泻脑汤、通脾泻胃汤、眼珠灌脓方、防风通圣散、凉膈连翘散、内疏黄连汤等。眼科运用泻下降火法，与内科的攻下法有别，极少单用通里攻下之。

❖ 滋阴降火法

本法由甘寒滋阴与寒凉降火药物为主组成方剂，用以滋阴液降虚火，治疗眼病的阴虚火旺证、是炎症性眼病中后期的常用治法。眼乃上窍，功能独特，内有滋目之真血真精，还有神膏神水，富含阴液；且风邪火邪皆为阳邪，易袭上窍，易伤阴耗液，目病阴虚火旺者多。《景岳全书·卷二十九》云：“凡病目者，非火有余则阴不足耳。”故本法比较常用。症见眼目干涩，视物昏花，萤星满日，眼前黑花飞舞或似云雾飘荡，或眵干泪少，眼

睛痒涩，白睛淡红或暗红而有结节，赤脉稀疏或抱轮微赤，黑睛翳面洁净，瞳神干缺，或眼内出血、渗出、充血等，或年老体弱之人，或病久阴亏，或病程长而反复难愈。伴有五心烦热，颧赤唇红，盗汗遗精，失眠多梦，腰膝痠软，口燥咽干，舌红少津，脉细数等阴虚内热之象。多用于结膜、角膜、巩膜、虹膜睫状体等的炎症性疾病的中后期，眼底病中的炎症性疾病及出血者。常用方剂如滋阴降火汤、知柏地黄汤、养阴清肺汤、清肾抑阳丸、滋阴地黄丸、连柏益阴丸等。

❖ 祛湿法

本法是用祛湿化浊利水药物为主组方，以祛除湿邪为主要作用的治疗方法。用于内外障眼病的湿浊上泛者。眼睛为多水多液的器官，有其高度透明的屈光间质，易致水肿和混浊，故常需利水渗湿，且不少祛湿药有明目作用，可能是通过加速水液的排除，恢复其屈光间质的透明性，而达到明目的目的。又眼病中有许多是病程缠绵而易复发者，等等原因决定了祛湿法在眼科很常用。临床上多用于渗出性炎症性内眼病及病程冗长的外眼炎性疾病，以及过敏性炎症。症见胞睑浮肿，痒痛湿烂，眵泪胶粘，白睛污黄，黑睛雾浊，或翳如虫蚀、翳如腐渣，神水混浊、瞳神缩小或边缘如锯齿，视物模糊，视物变形，眼前黑影，网膜渗出、水肿等。病程缠绵，或久处湿地，或暑夏之季。一般起病较缓，挟风火者，起病亦急。多见于眼睑、结膜、角膜、葡萄膜、视网膜等的炎症性疾病及玻璃体的混浊等。病变性质以变质、渗出、水肿、混浊为主，可伴有体倦身重，胸胁疼痛，腹胀纳呆，泛恶便溏，苔滑厚腻，脉濡等湿盛的症状。常用方剂有三仁汤、五苓散、甘露消毒丹、除湿汤、猪苓散等。

❖ 化痰法

本法是用祛痰化饮药物为主组方，以消除痰饮为主要作用的治疗方法。用于眼病的痰饮上泛者。症见视物模糊，眼睛痠胀，偏头痛，眉骨痛，眼前黑影，视物变形，目珠偏斜，胞轮振跳，瞳神散大，眼部肿块结节，眼底渗出质多，或有机化、结节、变质，网膜不洁，血管瘀阻。如青光眼，视网膜脉络膜病变，玻璃体混浊，麻痹性斜视，眼上神经痛等。多伴有体肥身胖，精神抑郁，头晕目眩，多梦纳呆，咳吐痰涎，苔滑腻，脉溜等。风痰阻络或风火痰扰者，起病多急；痰湿上蒙，痰气郁结，痰凝血瘀者，起病较缓，病程也长。怪病多由痰作祟，疑难慢性眼病，多从痰从瘀论治，病程也长。常用化痰剂有二陈汤、温胆汤、化坚二陈丸、涤痰汤、正容汤、导痰汤等。

❖ 止血法

本法是用止血药物为主配伍组方，以制止眼部出血的治疗方法。用于眼内出血的早期。一切以出血为主症的眼病，在出血没有停止之前，血色鲜红，视力仍不断下降，有继续出血趋向者，均可酌情应用止血法。常见者如结膜下出血、前房积血、玻璃体积血、脉络膜视网膜出血等。常用方剂如十灰散、宁血汤、生蒲黄汤、祛瘀汤、归脾汤等。《审视瑶函》所论目赤四症，其中有三症论出血，用方有分珠散、宣明丸、坠血明目饮、退赤散、落红散等。

❖ 活血化瘀法

本法是用活血行气、化瘀通脉药物为主组方，用以通利血脉、促进血行、消散瘀滞的治疗方法。适用于眼部血瘀证。眼病治血，受到历代眼科医家重视，古人强调治眼病，调血顺气为先，行血为治目之纲，恶血必归肝，而肝开窍于目，眼病血瘀证多见，活血法是中医眼科治疗学的重要组成部分。故《审视瑶函·开导之后宜补论》曰：“夫目之有血，为养目之源，充和则有发生长养之功，而目不病，少有亏滞，目病生矣。”《银海精微》及《银海指南》等眼科古籍均非常重视活血药的应用。常用方剂有桃红四物汤、血府逐瘀汤、通窍活血汤、行血散、归芍红花散、破血红花散、破血汤、祛瘀汤、清上瘀血汤、大黄当归散、川芎行经散、补阳还五汤等，

❖ 疏肝理气法

本法是用解肝郁、畅气机、调脏腑的药物为主组方。用以调理气机，消散郁滞，养肝和血；平衡脏腑，恢复和增加抗病修复能力，从而达到治疗眼病的目的。适宜于肝气郁结而致气机不畅，目窍不利的眼病，无论是因郁而病，或因病而郁，均应疏肝解郁。症见眼目胀痛，视物昏朦，或突然失明，视物变形，视物变色等。多兼有精神抑郁，或情绪紧张，或情志急躁，或忧愁善感，或胸胁胀闷，乳房胀痛，不思饮食，月经不调等。如视神经、视网膜及其血管疾病，慢性葡萄膜炎，青光眼，视力疲劳，非器质性眼病的目胀痛等。尤其是眼底病恢复期及久病不愈者。

本法常用方剂如柴胡疏肝散、逍遥散及其众多加减方，舒肝解郁益阴汤等，因久病多兼瘀，气郁亦常致血瘀，故解郁疏肝常配伍活血化瘀药；内障多虚，久病多虚，解郁法常与补益法同用，如舒肝解郁益阴汤；目病多火，气郁易致化火，故解郁法常需配伍清火，临床上丹栀逍遥散比逍遥散更为常用，甚至再加知母、黄柏；网膜水肿、渗出者，又常配伍利水祛湿化痰之品；兼有出血者，还应配伍凉血止血药物。

❖ 平肝潜阳法

本法是用平肝熄风和滋阴潜阳药物为主组成，以平衡阴阳，用于治疗肝阳上亢所致眼病。症见头目胀痛，头晕耳鸣，烦躁失眠，面红烘热，视物昏花或视力骤丧，或视物难持久，白睛赤脉粗大，瞳神散大，眼压增高，目珠偏斜，眉骨胀痛，视盘充血肿胀，网膜动脉细而反光强，静脉怒张或血管阻塞，网膜上有出血、渗出、水肿或显缺血状态等。多见于视神经及视网膜的炎症，视网膜血管病，青光眼，视力疲劳，斜视等。常用方剂如镇肝熄风汤、天麻钩藤饮、平肝熄风汤、养肝熄风汤、平肝潜阳汤等，

❖ 益气养血法

本法是用具有补气养血作用的方药，治疗眼病气血亏虚证的方法。主要适用于眼睫乏力，常欲垂闭，上胞下垂，胞虚如球，视物昏花或不耐久视，黑睛翳障，翳面洁净，溃陷难敛，眼底组织退行性变或萎缩，眼内出血量少而反复发病者。如视力疲劳，上睑下垂，角膜溃疡，老年性白内障，视神经萎缩，视网膜脉络膜病变，视网膜脱离，视网膜色素变

性，开角型青光眼，纳血性视乳头病变，黄斑变性及黄斑部出血等。多为慢性病或急性病恢复期，常伴有神倦乏力，少气懒言，动则汗出，面色少华，心慌心悸，爪甲淡白，舌淡脉虚等气血亏虚的全身症状。目得血而能视，气脱者目不明，神光有赖真气真血真精的滋养，方能明视万物，气血对于眼目至关重要，补益气血是中医眼科重要治法，可增强机体抗病修复能力，消除或减轻某些眼病发生发展的内在原因，达到治愈眼病和减少复发的目的；促进视网膜视神经机能的恢复而具有明目作用。常用方剂有八珍汤、人参养荣汤、补中益气汤、归脾汤、助阳活血汤、参苓白术散、黄芪人参汤、当归补血汤等。

❖ 补益肝肾法

本法是用补养肝肾的药物为主组成，治疗眼病的肝肾亏虚证，是眼科常用治法。尤其是治疗内障眼病恢复期的主要治疗方法，受到历代眼科医家的重视。肝受血而能视，肝开窍于目，肾主藏精，瞳神属肾，肾水神光，最灵最贵，故正常的精明视物，离不开肾精肝血的濡养，而补益肝肾是内障眼病明目的重要方法。肝肾亏虚者，症见目少神光，视物昏花，眼前黑影，视物变形，神光自现，萤星满目，冷泪常流，眼内干涩，黑睛翳障后期，瞳神淡白，瞳神散大或干缺，眼底退变、萎缩。如角膜溃疡恢复期或反复难愈而红痛不显、眵泪泪少，功能性溢泪，白内障，青光眼，视神经、视网膜、脉络膜炎症后期等。多伴头昏耳鸣，腰膝痠软，梦遗滑精，失眠健忘、舌淡少苔，脉细弱等肝肾不足之全身症状。常用方剂如杞菊地黄丸、石斛夜光丸、四物五子丸、三仁五子丸、加减驻景丸、补水宁神汤等。

❖ 软坚散结法

本法是用软坚散结的药物与化痰、祛瘀的药物为主，配伍组方，以消散痰瘀结滞，治疗眼部机化、结节、肿块等病症的方法。

软坚散结法主要适用于各种内外障眼病，具有气血凝滞、痰瘀互结而成为有形之物者。如胞睑痰核肿块，白睛结节隆起或赤白膜障，眼内陈旧积血或机化条膜形成，或血管阻塞，或陈旧渗出多者。常用药物如昆布、海藻、海浮石、牡蛎、僵蚕、贝母、鸡内金等。临床组方选药时，应根据不同病变区别用药，病在血分者，配伍行气活血化瘀药；痰凝所致者，当选用化痰消滞药；阴虚而津液不足者，则当配伍养阴增液之品，以利结块软化而助消散，尤其是眼内机化和渗出者，更应注意养阴。应用软坚散结法者，多为慢性眼病和顽症，病程多冗长，尤其是内障眼病，往往有虚的一面，且久病多郁，故应注意配伍解郁和补虚，而补虚以补益肝肾和补益气血为主，常常是在补益之剂中加软坚散结药。

❖ 退翳明目法

本法是用具有消障退翳作用的方药，以促进黑睛翳障的消散，减少疤痕的形成，恢复黑睛晶莹之性，达到增加视力的目的。是中医眼科特有的内治方法。适宜黑睛新翳欲转老翳的恢复期。至于黑睛新翳的初、中期，邪气尚盛，此时治疗当以祛邪为要，祛邪即能退翳，酌情选加退翳药即可，并非退翳明目法为主，非本法适应症。而黑睛翳障老定经年日久者，内服药治实难有效。故《证治准绳·七窍门》认为“滑涩沉深及患久者，虽极治亦

难尽去。”并指出：“珠上必有白障，如鱼鳞、外圆翳等状，终身不能脱。”《目经大成》亦认为此种情形“不必言及医药。”退翳明目法需用之适时，最宜于角膜炎恢复期邪气已衰者。此时期风热毒邪渐除，新障不再发展，翳面开始修复，适时应用本法，因势利导、旨在帮助和促进角膜混浊的吸收，减少疤痕的形我，尽可能恢复其透明性，增加视力才有可能。临床经验证明，这种修复是一个相当长的过程，需坚持服药，日久方能收到翳退目明的效果。

角膜炎恢复期，常历经疗治，往往虚实夹杂，使用本法退翳，需依其不同病情，恰当配伍。首先考虑的是病至后期，阳邪伤阴耗液，加之角膜本身营养供应差，当以养阴益血，如当归、生地、麦冬、石斛、枸杞等；如还可有风热湿邪未尽，可酌情选用防风、羌活、黄连、车前子、木通，用羌防者，尚有升发退翳之用意；活血之使用亦属必要，如红花、苏木、桃仁、丹皮等，有利于加强角膜的营养和加强代谢而减少疤痕的形成；翳陷难敛者，则可用黄芷、党参之类益气敛疮；退翳明目药可选用白蒺藜、乌贼骨、蛇蜕、蝉蜕、木贼草等；胃纳不佳者，神曲、山楂、麦芽、青皮之类可选用。虽说退翳明目法仅宜于角膜炎恢复期，而退翳明目药则不但用于黑暗翳障，更常用于屈光间质的混浊乃至影响视力的所有内障眼病，适当加用，旨在明目。

外治法

眼科外治法是指采用药物的或非药物的治疗措施，以外部进行施治的方法，是与内治法相对而言。其方式方法多种多样，其适应范围和内容十分广泛，有用药物制成各种剂型施于眼局部者，如眼药水、眼药粉、眼药膏、药物煎水熏洗、药物捣烂外敷等；还有用器械对眼部施治者，如钩割、针法、刷洗、熨烙等，均属眼的局部治疗，是眼科外治法的主要内容。此外，还有非对眼睛局部的治疗措施，如摩顶法、发疱法、搐鼻法、药枕法、按摩法、针灸法、穴位注射等。

眼科诸病

风邪热毒型目赤肿痛流泪视物不清结膜炎角结膜炎

【药名】	马应龙八宝眼膏
【处方】	煅炉甘石 32.7g 琥珀 0.15g 人工麝香 0.38g 人工牛黄 0.38g 珍珠 0.38g 冰片 14.8g 硼砂 1.2g 硃砂 0.05g。
【性状】	本品为浅黄色至浅黄棕色的软膏；气香，有清凉感。
【功能与主治】	清热退赤，止痒去翳。用于风火上扰所致的眼睛红肿痛痒、流泪、眼睑红烂；沙眼见上述证候者。
【用法与用量】	点入眼睑内。一日 2~3 次。
【注意】	孕妇慎用；忌食辛辣油腻食物。
【规格】	每支装 2g。
【贮藏】	遮光，密封，置凉暗处。

【药名】	双黄连滴眼剂
【处方】	连翘 500g 金银花 250g 黄芩 250g。
【性状】	本品为棕黄色的粉末，有引湿性，味苦、涩。滴眼溶剂为无色澄明的液体。
【功能与主治】	驱风清热，解毒退翳。用于风邪热毒型单纯疱疹病毒性树枝状角膜炎。
【用法与用量】	滴入眼睑内(临用前将 1 支药粉与 1 支溶剂配制成溶液，使充分溶解后使用)。一次 1~2 滴，一日 4 次。四周为一疗程。
【注意】	(1)对本品过敏者忌用；(2)在使用过程中如药液发生混浊，应停止使用；配制好的滴眼液，应在一个月内用完，不宜久存后使用；(3)药粉与溶剂混匀后，残留于玻璃瓶内的药液量在计量范围之外，请勿刻意取净；(4)取塞、扣接、混合过程中应避免瓶口污染。
【规格】	每支装 60mg；滴眼溶剂每支装 5ml。
【贮藏】	密闭，置阴凉干燥处。

【药名】	明目上清片
【处方】	桔梗 70g 熟大黄 70g 天花粉 44g 麦冬 44g 栀子 44g 蝉蜕 44g 陈皮 70g 车前子 44g 黄芩 70g 黄连 70g 薄荷脑 0.22g 荆芥油 0.11ml 石膏 44g 玄参 70g 蒺藜 44g 甘草 44g 菊花 70g 当归 44g 赤芍 44g 枳壳 70g 连翘 44g。
【性状】	本品为棕色至棕褐色的片；或为薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	清热散风，明目止痛。用于外感风热所致的暴发火眼、红肿作痛、头晕目

【用法与用量】	眩、眼边刺痒、大便燥结、小便赤黄。
【注意】	口服。一次4片，一日2次。
【规格】	孕妇慎用；忌食辛辣油腻食物。
【贮藏】	(1)素片每片重0.60g；(2)薄膜衣片每片重0.63g。 密封。

【药名】	拨云退翳丸
【处方】	密蒙花 80g 菊花 20g 蛇蜕 12g 荆芥穗 40g 薄荷 20g 川芎 60g 地骨皮 40g 楮实子 20g 甘草 12g 蒺藜(盐炙) 60g 木贼 80g 蝉蜕 20g 蔓荆子 80g 当归 60g 黄连 20g 花椒 28g 天花粉 24g。
【性状】	本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；气芳香，味苦。
【功能与主治】	散风清热，退翳明目。用于风热上扰所致的目翳外障、视物不清、隐痛流泪。
【用法与用量】	口服。一次1丸，一日2次。
【注意】	忌食辛辣食物。
【规格】	每丸重9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	鱼腥草滴眼液
【处方】	鲜鱼腥草 2000g。
【性状】	本品为近无色或微黄色的澄明液体。
【功能与主治】	清热，解毒，利湿。用于风热疫毒上攻所致的暴风客热、天行赤眼、天行赤眼暴翳，症见两眼刺痛、目痒、流泪；急性卡他性结膜炎、流行性角结膜炎见上述证候者。
【用法与用量】	滴入眼睑内，一次1滴，一日6次。治疗急性卡他性结膜炎，7天为一疗程；治疗流行性角结膜炎，10天为一疗程。
【注意】	对鱼腥草过敏者禁用。
【规格】	每瓶装8ml。
【贮藏】	密闭，遮光，置阴凉处。

肝胆火盛型火眼红肿痛痒羞明多泪多眵结膜炎角结膜炎

【药名】	开光复明丸
【处方】	栀子(制)60g 黄芩 60g 黄连 120g 黄柏 60g 大黄 60g 龙胆 30g 炒蒺藜 60g 菊花 60g 防风 30g 石决明 60g 玄参 30g 红花 30g 当归 36g 赤芍 36g 地黄 36g 泽泻 30g 羚羊角粉 3g 冰片 15g。
【性状】	本品为黑褐色的大蜜丸；味甘而苦。
【功能与主治】	清热散风，退翳明目。用于肝胆热盛引起的暴发火眼、红肿痛痒、眼睑赤烂、云翳气蒙、羞明多眵。
【用法与用量】	口服。一次1~2丸，一日2次。
【注意】	孕妇禁服。
【规格】	每丸重6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方熊胆滴眼液
【处方】	熊胆粉，天然冰片。
【性状】	本品为淡黄色的混悬液；气清香，味苦。
【功能与主治】	清热降火，退翳明目。用于肝火上炎、热毒伤络所致的白睛红赤、眵多、羞明流泪；急性细菌性结膜炎、流行性角结膜炎见上述证候者。
【用法与用量】	滴眼。一次1~2滴，一日6次，或遵医嘱。
【注意】	忌食辛辣油腻食物。
【规格】	(1)每瓶装5ml；(2)每瓶装8ml；(3)每瓶装12ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	龙泽熊胆胶囊
【处方】	龙胆 101g 盐泽泻 61g 地黄 76g 当归 61g 栀子 61g 菊花 61g 盐车前子 61g 决明子 61g 柴胡 61g 防风 61g 黄芩 61g 木贼 61g 黄连 61g 薄荷脑 6.33g 大黄 101g 冰片 8g 熊胆粉 1.27g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕色至棕褐色的粉末；气清凉，味苦、辛。
【功能与主治】	清热散风，止痛退翳。用于风热或肝经湿热引起的目赤肿痛、羞明多泪。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日2次；小儿酌减。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装0.25g。
【贮藏】	密封。

【药名】	黄连羊肝丸
【处方】	黄连 20g 黄芩 40g 龙胆 20g 醋青皮 40g 密蒙花 40g 炒决明子 40g 夜明砂 40g 胡黄连 40g 黄柏 20g 柴胡 40g 木贼 40g 菟蔚子 40g 石决明(煅)40g 鲜羊肝 160g。
【性状】	本品为黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味苦。
【功能与主治】	泻火明目。用于肝火旺盛，目赤肿痛，视物昏暗，羞明流泪，胥肉攀睛。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 9g(18 丸)，大蜜丸一次 1 丸，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)小蜜丸每 100 丸重 20g；(2)大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

肝阴不足肝气偏盛型眼痛视疲劳近视轻度青光眼

【药名】	四味珍珠层冰硼滴眼液
【处方】	珍珠层粉，天然冰片，硼砂，硼酸。
【性状】	本品为近无色至微黄色的澄明液体；气香。
【功能与主治】	清热解痉，去翳明目。用于肝阴不足、肝气偏盛所致的不能久视、轻度眼胀、眼痛、青少年远视力下降；青少年假性近视、视力疲劳、轻度青光眼见上述证候者。
【用法与用量】	滴于眼睑内。一次 1~2 滴，一日 3~5 次；必要时可酌情增加。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装(1)8ml。(2)15ml。
【贮藏】	密封，置凉暗处。

肝肾阴虚型畏光视物模糊迎风流泪青光眼白内障

【药名】	复明片
【处方】	羚羊角 1g 木贼 25g 车前子 25g 决明子 40g 酒萸肉 25g 枸杞子 40g 女贞子 25g 黄连 10g 木通 25g 山药 25g 茯苓 25g 地黄 25g 蒺藜 40g 菊花 50g 夏枯草 25g 人参 15g 石斛 40g 菟丝子 25g 石决明 50g 谷精草 25g 熟地黄 25g 泽泻 10g 牡丹皮 25g 槟榔 25g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；气微香，味微

<p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>苦。</p> <p>滋补肝肾，养阴生津，清肝明目。用于肝肾阴虚所致的羞明畏光、视物模糊；青光眼，初、中期白内障见上述证候者。</p> <p>口服。一次5片，一日3次。</p> <p>孕妇慎用；忌食辛辣刺激食物。</p> <p>(1)薄膜衣片每片重0.31g；(2)糖衣片(片心重0.3g)。</p> <p>密封，防潮。</p>
--	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>明目地黄丸</p> <p>熟地黄 160g 牡丹皮 60g 茯苓 60g 枸杞子 60g 当归 60g 蒺藜 60g 酒萸肉 80g 山药 80g 泽泻 60g 菊花 60g 白芍 60g 煅石决明 80g。</p> <p>本品为黑褐色至黑色的水蜜丸、黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味先甜而后苦、涩。</p> <p>滋肾，养肝，明目。用于肝肾阴虚，目涩畏光，视物模糊，迎风流泪。</p> <p>口服。水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。</p> <p>无。</p> <p>大蜜丸每丸重9g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>明目地黄丸(浓缩丸)</p> <p>熟地黄 160g 牡丹皮 60g 茯苓 60g 枸杞子 60g 当归 60g 蒺藜 60g 酒萸肉 80g 山药 80g 泽泻 60g 菊花 60g 白芍 60g 煅石决明 80g。</p> <p>本品为深棕色的浓缩水丸；气微香，味先甜而后苦、涩。</p> <p>滋肾，养肝，明目。用于肝肾阴虚，目涩畏光，视物模糊，迎风流泪。</p> <p>口服。一次8~10丸，一日3次。</p> <p>无。</p> <p>每8丸相当于原生药3g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>金花明目丸</p> <p>熟地黄，枸杞子，白芍，黄芪，川芎，炒决明子，密蒙花，金荞麦，盐菟丝子，五味子，黄精，党参，菊花，车前子(炒)，炒鸡内金。</p> <p>本品为棕褐色的浓缩水丸；气微香，味苦、微酸。</p> <p>补肝，益肾，明目。用于老年性白内障早、中期属肝肾不足、阴血亏虚证，症见视物模糊、头晕、耳鸣、腰膝酸软。</p> <p>口服。一次4g，一日3次，饭后服用。一个月为一疗程，连续服用三个疗程。</p> <p>无。</p> <p>(1)每瓶装4g；(2)每袋装4g。</p> <p>密封。</p>
---	--

【药名】	杞菊地黄丸
【处方】	枸杞子 40g 菊花 40g 熟地黄 160g 酒萸肉 80g 牡丹皮 60g 山药 80g 茯苓 60g 泽泻 60g。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜、微酸。
【功能与主治】	滋肾养肝。用于肝肾阴亏，眩晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪，视物昏花。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	杞菊地黄丸(浓缩丸)
【处方】	枸杞子 40g 熟地黄 160g 牡丹皮 60g 茯苓 60g 菊花 40g 酒萸肉 80g 山药 80g 泽泻 60g。
【性状】	本品为棕色至棕黑色的浓缩丸；味甜而酸。
【功能与主治】	滋肾养肝。用于肝肾阴亏，玄晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪，视物昏花。
【用法与用量】	口服。一次 8 丸，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每 8 丸相当于原药材 3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	杞菊地黄片
【处方】	枸杞子 40g 菊花 40g 熟地黄 160g 酒萸肉 80g 牡丹皮 60g 山药 80g 茯苓 60g 泽泻 60g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味酸，微苦。
【功能与主治】	滋肾养肝。用于肝肾阴亏，玄晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪，视物昏花。
【用法与用量】	口服。一次 3~4 片，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	片心重 0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	杞菊地黄胶囊
【处方】	枸杞子 36.7g 菊花 36.7g 熟地黄 146.8g 酒萸肉 73.4g 牡丹皮 55g 山药 73.4g 茯苓 55g 盐泽泻 55g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅褐色至黑褐色的粉末，味甜、微酸。
【功能与主治】	滋肾养肝。用于肝肾阴亏，玄晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪，视物昏花。
【用法与用量】	口服。一次 5~6 粒，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装 0.3g。
【贮藏】	密封。

肝肾两亏虚火上炎型翳障瞳孔散大视力减退昏花迎风流泪

【药名】	石斛夜光丸
【处方】	石斛 30g 人参 120g 山药 45g 茯苓 120g 甘草 30g 肉苁蓉 30g 枸杞子 45g 菟丝子 45g 地黄 60g 熟地黄 60g 五味子 30g 天冬 120g 麦冬 60g 苦杏仁 45g 防风 30g 川芎 30g 麸炒枳壳 30g 黄连 30g 牛膝 45g 菊花 45g 盐蒺藜 30g 青箱子 30g 决明子 45g 水牛角浓缩粉 60g 山羊角 300g。
【性状】	本品为棕色的水蜜丸、棕黑色的小蜜丸或大蜜丸；味甜而苦。
【功能与主治】	滋阴补肾，清肝明目。用于肝肾两亏，阴虚火旺，内障目暗，视物昏花。
【用法与用量】	口服 6 水蜜丸一次 7.3g，小蜜丸一次 11g，大蜜丸一次 2 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	大蜜丸每丸重 5.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	琥珀还睛丸
【处方】	琥珀 30g 青箱子 45g 黄柏 45g 石斛 40g 麦冬 45g 党参(去芦)45g 茯苓 45g 山药 45g 当归 45g 熟地黄 45g 沙苑子 60g 酒肉苁蓉 45g 羚羊角粉 15g 菊花 45g 黄连 15g 知母 45g 地黄 90g 天冬 45g 麸炒枳壳 45g 炙甘草 20g 炒苦杏仁 45g 川芎 45g 枸杞子 45g 菟丝子 45g 杜仲(炭)45g 水牛角浓缩粉 18g。
【性状】	本品为黄褐色至黑褐色的大蜜丸；味甘、微苦。
【功能与主治】	补益肝肾，清热明目。用于肝肾两亏、虚火上炎所致的内外翳障、瞳孔散大、视力减退、夜盲昏花、目涩羞明、迎风流泪。
【用法与用量】	口服，一次 2 丸，一日 2 次。
【注意】	忌食辛辣油腻食物。
【规格】	每丸重 6g。
【贮藏】	密封。

肝肾不足型干涩复视酸软视力下降老年性白内障

【药名】	障眼明片
【处方】	石菖蒲，决明子，肉苁蓉，葛根，青箱子，党参，蔓荆子，枸杞子，车前子，白芍，山茱萸，甘草，菟丝子，升麻，蕤仁（去内果皮），菊花，密蒙花，川芎，酒黄精，熟地黄，关黄柏，黄芪。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味甘，微酸。
【功能与主治】	补益肝肾，退翳明目。用于肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝痠软、或轻度视力下降；早、中期老年性白内障见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次4片〔规格（1）（3）〕或一次2片〔规格（2）〕，一日3次。
【注意】	忌食辛辣食物。
【规格】	（1）薄膜衣片每片重0.21g；（2）薄膜衣片每片重0.42g；（3）糖衣片（片心重0.21g）。
【贮藏】	密封。

气滞血瘀型老年白内障角膜翳

【药名】	障翳散
【处方】	丹参 111g 菟蔚子 111g 决明子 222g 没药 111g 昆布 111g 木通 111g 牛胆干膏 12g 珍珠 40g 天然冰片 80g 硼砂 20g 盐酸小檗碱 20g 山药 100g 荸荠粉 160g 红花 111g 青箱子 111g 蝉蜕 222g 黄芪 111g 海藻 111g 炉甘石(水飞)

<p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>111g 羊胆干膏 18g 琥珀 30g 人工麝香 40g 海螵蛸 200g 维生素 B₂ 40g 无水硫酸钙 40g。</p> <p>本品为黄色的粉末；气芳香。与滴眼用溶液混合后为浅棕黄色混悬液。行滞祛瘀，退障消翳。用于老年性白内障及角膜翳属气滞血瘀证。</p> <p>外用。临用时，将本品倒入滴眼用溶液瓶中，摇匀后滴入眼睑内，一次 2~3 滴，一日 3~4 次，或遵医嘱。</p> <p>孕妇禁用。</p> <p>每瓶装 0.3g。</p> <p>密封。</p>
---	--

脾肾不足型眼目昏花视物不清

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>补益蒺藜丸</p> <p>炙黄芪 150g 炒白术 150g 山药 100g 茯苓 50g 白扁豆 50g 麸炒芡实 50g 当归 100g 沙苑子 500g 菟丝子 100g 陈皮 50g。</p> <p>本品为棕色至棕褐色的大蜜丸；气微香，味甘。</p> <p>健脾补肾，益气明目。用于脾肾不足，眼目昏花，视物不清，腰痠气短。</p> <p>口服。一次 2 丸，一日 2 次。</p> <p>忌食辛辣食物。</p> <p>每丸重 6g。</p> <p>密封。</p>
---	--

气滞血瘀型视物不清视网膜中央静脉阻塞

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>丹红化瘀口服液</p> <p>丹参，当归，川芎，桃仁，红花，柴胡，枳壳。</p> <p>本品为深棕色的液体；气微，味微苦。</p> <p>活血化瘀，行气通络。用于气滞血瘀引起的视物不清、突然不见症；视网膜中央静脉阻塞症的吸收期见上述证候者。</p> <p>口服。一次 10~20ml，一日 3 次，用时摇匀。</p> <p>孕妇慎用；忌食辛辣油腻食物。</p> <p>每支装 10ml。</p> <p>密封。</p>
---	---

血瘀筋脉阻滞型视力下降不能久视假性近视

【药名】	夏天无滴眼液
【处方】	夏天无提取物，天然冰片。
【性状】	本品为淡黄色或黄棕色的澄明液体。
【功能与主治】	活血明目舒筋。用于血瘀筋脉阻滞所致的青少年远视力下降、不能久视；青少年假性近视症见上述证候者。
【用法与用量】	滴于眼睑内。一次1~2滴，一日3~5次。
【注意】	青光眼患者禁用；不宜滴眼药量过多、次数过频。
【规格】	每支装(1)5ml；(2)8ml；(3)10ml。
【贮藏】	遮光，密封。

神经系统诸病

神经性疼痛三叉神经痛坐骨神经痛白脉病面神经麻痹

【药名】	二十五味珊瑚丸
【处方】	本品系藏族验方：珊瑚75g 珍珠15g 青金石20g 珍珠母50g 诃子100g 木香60g 红花80g 丁香35g 沉香70g 朱砂30g 龙骨40g 炉甘石25g 脑石25g 磁石25g 禹粮土25g 芝麻40g 葫芦30g 紫菀花45g 獐牙菜80g 藏菖蒲50g 榜那45g 打箭菊75g 甘草75g 西红花25g 人工麝香2g。
【性状】	本品为红棕色的水丸；气微香，味甘、苦、涩。
【功能与主治】	开窍，通络，止痛。用于“白脉病”，神志不清，身体麻木，头昏目眩，脑部疼痛，血压不调，头痛，癫痫及各种神经性疼痛。
【用法与用量】	开水泡服。一次1g，一日1次。
【注意】	无
【规格】	(1)每4丸重1g；(2)每丸重1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	汉桃叶片
【处方】	汉桃叶3000g
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕黑色；味苦。
【功能与主治】	祛风止痛，舒筋活络。用于三叉神经痛，坐骨神经痛，风湿关节痛。
【用法与用量】	口服。一次3~5片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重0.33g；(2)糖衣片(片心重0.32g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	疏痛安涂膜剂
【处方】	透骨草143g 伸筋草143g 红花48g 薄荷脑6.7g。
【性状】	本品为棕红色黏稠状的液体。

【功能与主治】	舒筋活血，消肿止痛。用于风中经络、脉络瘀滞所致的头面疼痛、口眼歪斜，或跌打损伤所致的局部肿痛；头面部神经痛、面神经麻痹、急慢性软组织损伤见上述证候者。
【用法与用量】	涂患处或有关穴位。一日2~3次。
【注意】	孕妇慎用；皮肤破损处不宜使用；偶有过敏性皮疹，停药后即可恢复。
【规格】	每瓶装20ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

神经衰弱型头痛头晕健忘失眠耳鸣心烦乏力

【药名】	健脑安神片
【处方】	酒黄精47g 枸杞子16g 鹿角胶2g 红参2g 茯苓8g 龟甲4g 南五味子31g 熟地黄8g 淫羊藿39g 鹿茸0.8g 鹿角霜5g 大枣(去核)16g 麦冬8g 炒酸枣仁8g 制远志16g 苍耳子31g。
【性状】	本品为糖衣片，除去糖衣后显黄棕色；气香，味甜、微苦。
【功能与主治】	滋补强壮，镇静安神。用于神经衰弱，头痛，头晕，健忘失眠，耳鸣。
【用法与用量】	口服，一次5片，一日2次。
【注意】	高血压患者忌服。
【规格】	片心重0.20g。
【贮藏】	密封。

【药名】	人参首乌胶囊
【处方】	红参400g 制何首乌600g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的粉末；味微苦。
【功能与主治】	益气养血。用于气血两虚所致的须发早白、健忘失眠、食欲不振、体疲乏力；神经衰弱见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次1~2粒，一日3次。饭前服用。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

【药名】	安神补脑液
【处方】	鹿茸，淫羊藿，甘草，维生素B1，制何首乌，干姜，大枣。
【性状】	本品为黄色至棕黄色的液体；气芳香，味甜、辛。
【功能与主治】	生精补髓，益气养血，强脑安神。用于肾精不足、气血两亏所致的头晕、乏力、健忘、失眠；神经衰弱症见上述证候者。

【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 每支装 10ml (含维生素 B1 25mg)；(2) 每瓶装 100ml (含维生素 50mg)。
【贮藏】	密封。

【药名】	泻肝安神丸
【处方】	龙胆 9g 黄芩 9g 栀子(姜炙) 9g 珍珠母 60g 牡蛎 15g 龙骨 15g 柏子仁 9g 炒酸枣仁 15g 制远志 9g 当归 9g 地黄 9g 麦冬 9g 蒺藜(去刺盐炙) 9g 茯苓 9g 盐车前子 9g 盐泽泻 9g 甘草 3g。
【性状】	本品为黄棕色至棕褐色的水丸；味微苦。
【功能与主治】	清肝泻火，重镇安神。用于肝火亢盛，心神不宁所致的失眠多梦，心烦；神经衰弱症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每 100 丸重 6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	五味子颗粒
【处方】	五味子 300g。
【性状】	本品为棕黄色至棕红色的颗粒；味酸、甜。
【功能与主治】	益气生津，补肾宁心。用于心肾不足所致的失眠、多梦、头晕；神经衰弱症见上述证候者。
【用法与用量】	开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	每袋装 10g。
【贮藏】	密封。

【药名】	五味子糖浆
【处方】	五味子 100g。
【性状】	本品为黄棕色至红棕色的黏稠液体；味甜、微酸。
【功能与主治】	益气生津，补肾宁心。用于心肾不足所致的失眠、多梦、头晕；神经衰弱症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 5~10ml，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	1) 每瓶装 10ml；(2) 每瓶装 100ml。
【贮藏】	密闭，置阴凉干燥处。

【药名】	乌灵胶囊
【处方】	乌灵菌粉 330g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为浅棕色至棕色的粉末；气特异，味甘、淡。
【功能与主治】	补肾健脑，养心安神。用于心肾不交所致的失眠、健忘、心悸心烦、神疲

<p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣、少气懒言、脉细或沉无力；神经衰弱见上述证候者。</p> <p>口服。一次3粒，一日3次。</p> <p>无。</p> <p>每粒装0.33g。</p> <p>密封。</p>
--	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>枣仁安神胶囊</p> <p>炒酸枣仁 1425g 丹参 285g 醋五味子 285g。</p> <p>本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒和粉末；气香，味酸、微苦。</p> <p>养血安神。用于心血不足所致的失眠、健忘、心烦、头晕；神经衰弱症见上述证候者。</p> <p>口服。一次5粒，一日1次，临睡前服用。</p> <p>孕妇慎用。</p> <p>每粒装0.45g。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>枣仁安神颗粒</p> <p>炒酸枣仁 1425g 丹参 285g 醋五味子 285g。</p> <p>本品为浅棕黄色的颗粒；气香，味酸、微苦。</p> <p>养血安神。用于心血不足所致的失眠、健忘、心烦、头晕；神经衰弱症见上述证候者。</p> <p>开水冲服。一次1袋，一日1次，临睡前服用。</p> <p>孕妇慎用。</p> <p>每袋装5g。</p> <p>密封。</p>
---	---

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p> <p>【性状】</p> <p>【功能与主治】</p> <p>【用法与用量】</p> <p>【注意】</p> <p>【规格】</p> <p>【贮藏】</p>	<p>夜宁糖浆</p> <p>合欢皮 105g 首乌藤 105g 女贞子 105g 浮小麦 30g 灵芝 50g 大枣 75g 甘草 30g。</p> <p>本品为棕褐色的黏稠液体；气微，味甜、微苦。</p> <p>养血安神。用于心血不足所致的失眠、多梦、头晕、乏力；神经衰弱见上述证候者。</p> <p>口服。一次40ml，一日2次。</p> <p>无。</p> <p>(1) 每瓶装20ml；(2) 每瓶装200ml；(3) 每瓶装250ml。</p> <p>密封。</p>
---	--

<p>【药名】</p> <p>【处方】</p>	<p>益心宁神片</p> <p>人参茎叶总皂苷 10g 藤合欢 1000g 五味子 500g 灵芝 500g。</p>
---------------------------------------	--

【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；味苦。
【功能与主治】	补气生津，养心安神。用于心气不足、心阴亏虚所致的失眠多梦、心悸、记忆力减退；神经衰弱见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次5片(小片)，或一次3片(大片)，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣小片每片重0.31g；(2)薄膜衣大片每片重0.52g。
【贮藏】	密封。

【药名】	复方扶芳藤合剂
【处方】	扶芳藤，黄芪，红参。
【性状】	本品为红棕色的澄清液体；气芳香，味甜、微苦。
【功能与主治】	益气补血，健脾养心。用于气血不足，心脾两虚，症见气短胸闷、少气懒言、神疲乏力、自汗、心悸健忘、失眠多梦、面色不华、纳谷不馨、脘腹胀满、大便溏软、舌淡胖或有齿痕、脉细弱；神经衰弱、白细胞减少症见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次15ml，一日2次。
【注意】	周岁以内婴儿禁服；外感发热患者忌服。
【规格】	(1)每支装15ml；(2)每瓶装120ml。
【贮藏】	密封。

中医对于听力系统的研究和诊断

耳与脏腑的关系

耳位于头部两侧，属“清窍”之一，司听觉，主平衡。《灵枢·口问》说：“耳者宗脉之所聚。”由于全身各大脉络聚会于耳、使耳与全身各部及脏腑发生密切联系。与耳有较为密切关系的脏腑有肾、心、肝、胆、肺、脾等。

耳与肾

所属关系：肾主耳，耳为肾之窍，为肾之官。《素问·阴阳应象大论》说：“肾主耳……在窍为耳。”《灵枢·五阅五使》说：“耳者，肾之官也。”指出了耳与肾之间的所属关系。

生理关系：肾藏精，肾之精气上通于耳，肾精充沛，耳窍得以濡养，则听力聪敏，耳主平衡功能正常。又如《灵枢·脉度》说：“肾气通于耳，肾和则耳能闻五音矣。”《素问·灵兰秘典论》说：“肾者，作强之官，伎巧出焉。”

病理关系：肾精亏损、耳窍失于濡养，则可致耳鸣耳聋。如《灵枢·决气》曰：“精脱者耳聋……液脱者……耳数鸣。”肾主藏精而生髓，髓充于骨而汇于脑，如若肾精不足，髓海空虚，不能上荣于耳，则可致耳鸣、眩晕，如《灵枢·海论》说：“髓海不足，则脑转耳鸣。”临床上，肾功能失调的病理变化，可产生耳鸣、耳聋、眩晕、耳内长期流脓、耳内胀塞等病证。

诊断关系：耳的病证，多与肾脏的病理变化有关，肾脏的病变多反映于耳。历代医家常通过察耳来判断肾脏的某些病变，如《济生方·耳门》说：“夫耳者，肾之所候。”《灵枢·师传》说：“肾者主为外，使之远听，视耳好恶，以知其性。”指出以耳的听觉功能的好坏，来判断肾脏的盛衰。又如《证治准绳·杂病·第八册》说：“耳聋面颊黑者，为

精脱肾虚。”

治疗关系：一些耳病，可以从肾论治，如滋肾填精、滋肾降火、温肾利水等。

耳与心

所属关系：心寄窍于耳，耳为心之客窍。《素问·金匱真言论》说：“南方赤色，入通于心，开窍于耳。”《证治准绳·杂病·第八册》更明确指出：“心在官为舌，以舌非孔窍，因寄窍于耳，则是肾为耳窍之主，心为耳窍之客。”

生理关系：心主神明，耳司听觉，受心之主宰。又心主血脉，耳为宗脉之所聚、心血上奉，耳得心血濡养而功能健旺。手少阴心之脉络于耳中，肾之精气上通于耳，心肾相交，心火肾水相互调和，则听觉聪敏。

病理关系：心的生理功能失调，可致耳窍病变。心虚血耗及心肾不交均可致耳鸣、耳聋、眩晕；邪热上犯耳窍，内陷心包，则致黄耳伤寒。

治疗关系：一些耳病可以从心论治或心肾论治。如《严氏济生方·耳门》指出：“七情所感治乎心。医疗之法、宁心顺气，欲其气顺心宁，则耳为之聪矣。”又如《临证指南医案·卷八》说：“体虚失聪，治在心肾。”临床上针对耳病常有滋补心血、滋肾宁心、清心开窍、宁心安神等治法。

耳与肝胆

所属关系：足少阳胆经之脉循耳后，其支者从耳后入耳中，出走耳前。肝胆互为表里，胆经循耳，肝之络脉亦络于耳。按五行学说，肝为肾之子，肝肾精血同源，肾主耳，故肝与耳的关系亦密切。如《辨证录·卷之三》说：“肝为肾之子，肾气既通于耳，则肝之气未尝不可相通者。”

生理关系：肝胆之气上通于耳，耳的正常生理功能有赖于肝胆之气通达及肝血的奉养。

病理关系：肝胆火热上犯耳窍，常致耳胀、耳肿、耳痛、耳流脓、耳鸣耳聋、耳眩晕等病证，如《类证治裁·卷六》说：“有肝胆火升，常闻蝉鸣者。”若肝血虚，耳失所养，或肝阴不足，肝阳上扰清窍、亦可产生耳鸣耳聋、耳眩晕等病证。《素问·脏气法时论》说：“肝病者……虚则目眈眈无所见，耳无所闻。”

治疗关系：一些耳病可从肝或肝胆论治。从肝论治方面，临床上有清肝泻火、疏肝解郁、平肝熄风、滋补肝肾等治法。从胆论治方面，临床上有和解少阳、行气通窍、清利肝胆湿热等治法、如《类证治裁·卷之六》说：“气逆闭窍治在胆。”

耳与肺

所属关系：耳与肺由经络而发生联系。手足三阴经通过经别合于阳经而与耳相通，手

太阴肺经别出的络脉亦循行于耳。《温热经纬·余师愚疫病篇》按语：“肺经之结穴在耳中，名曰龙葱，专主乎听。”根据五脏生克关系，肺为肾之母，而肾主耳。

生理关系：肺主气，肺气贯于耳。《证治汇补·卷之四》说道：“肾窍于耳，而能听声者，肺也。因肺主气，一身之气贯于耳故也。”又肺与肾，金水相生，又如《杂病源流犀烛·卷二十三》说：“然肾窍于耳，所以聪听，实因水生于金，盖肺主气，一身之气贯于耳，故能为听。”

病理关系：《素问·气交变大论》说：“金肺受邪……嗑燥，耳聋。”临床上常见风邪犯肺，肺气不得宣肃而致耳胀痛、耳堵塞感、耳鸣耳聋、旋耳疮等病。肺气虚弱，不能贯耳，亦可致耳病，如《素问·脏气法时论》说道：“肺病者……虚则少气、不能报息，耳聋嗑干。”

治疗关系：某些耳病可以从肺论治，临床上针对耳病常有疏风宣肺、补益肺气等治法。

耳与脾

所属关系：足太阴脾经之络脉入于耳中。

生理关系：脾为后天之本，主输布水谷精微，运化水湿，升举清阳，为气血生化之源。耳为清窍，得清气濡养方能维持正常功能。

病理关系：脾气虚弱，气血生化之源不足，不能上奉于耳，则耳的功能失常而致病，如《素问·玉机真脏论》曰：“脾为孤脏……其不及则令人九窍不通。”脾虚清阳不升，水湿失运，湿浊停滞、聚而成痰，痰湿或痰火蒙蔽耳窍亦可致耳病，如耳胀、脓耳、耳眩晕等。

治疗关系：一些耳病可以从脾论治，如《保婴撮要·卷四》说：“耳证……脾经郁结而致者，加味归脉汤。”临床上针对耳病常有补脾益气、健脾利湿、益气升阳等治法。

中医望闻问切来诊疗疾病时常常会望耳，就是通过观察耳部变化，以测知疾病的常用方法。耳为肾窍，心寄窍于耳。耳又为“宗筋之所聚”，手足少阴、手足太阳及足阳明经入于耳或环绕其周围，故耳与人的身体整体具有密切的联系。因此，望耳可诊察全身或某些脏腑的病变。望耳应注意观察耳的色泽、形态及耳道分泌物等。

耳部色泽：耳部色泽微黄红润为常色。色淡白，主寒证或气虚；色胱白则多见于血虚、血脱；色青白，主慢脾风；色黑者，主肾病，耳轮焦黑干枯，属肾精大亏。耳背有红络，耳根发凉者，为麻疹先兆。

耳部形态：耳薄小者形亏肾虚，耳肿胀者为邪盛；耳轮甲错者多属久病血瘀。

耳道分泌物：耳内流脓，称“脓耳”，多因肝胆湿热蕴结所致。

听力系统诸病

【药名】	耳聋丸
【处方】	龙胆 500g 黄芩 500g 地黄 500g 泽泻 500g 木通 500g 桅子 500g 当归 500g 九节菖蒲 500g 甘草 500g 羚羊角 25g。
【性状】	本品为黑褐色的小蜜丸或大蜜丸，味苦。
【功能与主治】	清肝泻火，利湿通窍。用于肝胆湿热所致的头晕头痛、耳聋耳鸣、耳内流脓。
【用法与用量】	口服。小蜜丸一次 7g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	忌食辛辣食物。
【规格】	1) 小蜜丸每 45 丸重 7g；(2) 大蜜丸每丸重 7g。
【贮藏】	密封。

【药名】	耳聋左慈丸
【处方】	磁石(煅) 20g 熟地黄 160g 山茱萸(制) 80g 牡丹皮 60g 山药 80g 茯苓 60g 泽泻 60g 竹叶柴胡 20g。
【性状】	本品为棕黑色的水蜜丸，或为黑褐色的大蜜丸；味甜、微酸。
【功能与主治】	滋肾平肝。用于肝肾阴虚，耳鸣耳聋，头晕目眩。
【用法与用量】	口服。水蜜丸一次 6g；大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	(1) 水蜜丸每 10 丸重 1g；(2) 水蜜丸每 15 丸重 3g；(3) 大蜜丸每丸重 9g。
【贮藏】	密封。

备注：由于耳与五脏关系密切，更多与听力系统相关的治疗药物请参考“身体亏虚诸病”或者“头部诸病”的章节

中医对于瘰疬结节结核肿块的研究和诊断

中医认为，每一种外科疾病，都有其各自的具体病机，但归纳其共有的规律，对临床中具有普遍的指导意义，通常就是邪正盛衰，阴阳失调、气血凝滞、脏腑失调、经络阻隔以及外科常见的特有的病机不通则痛、肉腐成脓、邪毒壅结、火毒攻心等。

邪正盛衰：邪正斗争是一切疾病过程中，自始至终存在着的基本矛盾，是病机的总纲。邪正斗争过程中表现出邪正盛衰，既决定着疾病的发展，同时影响病证的虚实变化。当疾病发生之前，正气盛则邪不可干，正气虚则邪易侵入。发病后，正气盛邪气衰，到病退而向愈；邪气盛正气衰，则病进而恶化。正气是邪正交争中消长进退的主要因素，决定着疾病的发展变化。

阴阳失调：即阴阳消长失去平衡协调的简称。机体在疾病发生发展过程，由于各种致病因素的影响，导致机体的阴阳消长失去相对的平衡，从而形成阴阳偏胜、偏衰，或阴不制阳、阳不制阴的病理状态。同时阴阳失调又是脏腑、经络、气血、营卫等相互关系失调，以及表里出入、上下升降等气机失常的概括。各种致病因素只有作用于人体，引起阴阳失调、才能形成各种外科疾病。所以阴阳失调又是外科疾病发生、发展的内在根据。

气血凝滞：气是充养全身、推动和维持人体各种组织机能正常活动的动力，包含先天之元气与水谷化生的精气。其中卫气有温煦脏腑、肌腠，启闭汗孔的功能，具有捍卫肌表，抗御外邪的作用；营气为运行于脉管之中的精气，与血共行脉中以化生血液，营养全身；血则为构成和维持人体生命活动的基本物质，其有很高的营养和滋润作用，血由气推动而循行全身，脏腑、肌腠、筋骨等均需充足的血液滋养。气血循行全身，周流不息，如环无端，是温煦肢体、濡养脏腑的源泉。气失血之濡养，则无所依附而郁结；血无气之统率，

则离经散溢而瘀聚。所以气滞可以引起血瘀，血瘀亦多兼致气滞。不论先有气滞、先有血凝，终形成气血凝滞，气血俱伤。总之，气血凝滞是外科极重要的病机之一。气血凝滞的形成既与感邪之轻重有关，又与气血之盛衰相关。气血凝滞的形成，其表现又有气滞于血、血滞于气之别，及时疏通气血则消外症于无形。若气血衰弱，则或日久化脓，或成毒日深，使病情进一步加重。可以说一切外科病证，气血凝滞是其共有的病理阶段，如何把握和处理气血凝滞阶段，直接关系到疾病的转归和发展。

经络阻塞：经络分布全身，内属脏腑，外连体表，沟通上下内外，是气血运行周流于脏腑以至皮肉筋骨的径路，起着濡养和维护人体各项功能的平衡协调作用。其中径而直者为经，支而横者为络。外感六淫等邪毒，局部经络阻塞、气血凝滞产生各种外症；内伤七情、饮食内伤等导致脏腑失调，邪自内成，由经络传导，发于体表窍道亦可形成各种外症，正如《外科秘录》所云：“五脏六腑各有经络，脏腑之气血不行，则脏腑之经络即闭塞不通，而外之皮肉即生疮疡。”可以说，所有的外科病证，均有经络阻塞、气血凝滞。无论邪自外入，或由内传于外，均是因经络相传。外科发病的部位不同即与感邪有关，同时与经络之虚实有密切的联系。“邪之所凑，其气必虚”，毒邪客居之处，便是最虚之地。

脏腑失调：《素问·至真要大论》云：“诸痛痒疮，皆属于心。”心主血脉而藏神，与小肠相表里，开窍于舌。心为五脏之大主，心动则五脏六腑皆摇。心火内炽，迫血妄行，脉流搏疾，血脉失调，逆于肉里则为痈；脉血交错纵横则成血瘤；心火上炎，舌失去滋养，则成舌疮；气不常行而郁结则舌肿色紫，或成舌菌。心火下移，小肠湿热则成为淋浊之证。心血不足，阴血虚弱，无以充养滋润，肌肤失养则成瘙痒之症；外邪内侵，血脉受阻，凝滞不通，则疼痛难忍。亦有外邪火毒，迫入营血、内攻心脏，则神昏病危。

肺主宣肃，外主皮毛，上通喉鼻。外邪未解，郁而不发，蕴结成湿，化热生疮，蚀肺成痈。火毒外袭，肺气内虚，邪结内喉，则成痈肿喉风。与气血相搏，结成鼻痔。肺气不足，卫外不固，营卫不和，邪气外袭，蕴结于皮毛之间，而成癣疥癬疹。

脾主运化，外主肌肉四肢，开窍于口，其华在唇，脾健则气血化生充足；脾虚则气血不足，抗邪无力，百病生焉。运化不足，痰湿内生，随气而行，结于皮里膜外，则成流注、流痰；留于颈项两胁，则有瘰疬癭瘤；阻于乳房则有乳癖；凝于外阴则成硬结；脾受邪热，津液不行、医失调养而成口疮。

肝主疏泄，外主筋而开于目。情志内伤，肝气郁结，日久化火，迫于阴血，发于胸胁则有缠腰火丹、腋痛等症；肝气不足，营血内亏，诸脉失养，风寒湿毒外袭，则成附骨痛、痹证等症；肝火内炽，毒火相搏窜于颈项则成瘰疬癭瘤；肝经火热兼夹湿邪，下注前阴而成囊痈；肝郁日久，津液不行，血亦凝滞，气血瘀滞与痰浊相搏，结于经络之间，而成石病、肿瘤等。

肾主藏精，为先天之本，原气之根。肾失封藏，精失固摄，流溢于精道，化成痰湿则生精浊；肾气衰败，邪毒外染结于前阴，则成肾之痼疽；肾气内虚，气化无力，湿热内生，日久而成为淋浊；肾主骨，肾骨空，痰浊结聚，风寒搏结，阻于骨节之间，而成流痰、龟背等。大凡外科疾病，日久则必累及于肾，肾气虚损，预后多凶；肾气尚足，病为向愈。

六腑失调导致的外科疾病，多与传导失职，气机不利，升降失常有密切的关系。胃气不降，痰湿内生，挟热上犯而成咽疮；阻于乳络而成乳痈；流于四肢而发流注疔肿；湿热下迫，阻于肛门而生痔疾；膀胱不利，气化不行，湿热阻滞而成淋瘕；饮食不节，湿热内生，郁发于皮肉而成疥癣疮疹。总之六腑失调，总与所属气机不利、传导失职有关，所致外科疾患、多有疼痛剧烈、二便失常。

疮疡是各种致病因素侵袭人体后引起的体表化脓性疾病，包括急性和慢性两大类。对疮疡的辨证施治是中医外科的特色。

疮疡发生以后，正邪交争决定着疮疡的发展和转归。疮疡初期，若正能胜邪，使邪热不能鸱张，逐渐肿势局限，疮疡消散；若正不胜邪，热毒壅滞不散，热胜肉腐成脓，导致脓肿形成，即为疮疡中期(成脓期)。此时如治疗得当，切开引流，毒随脓泄，形成溃疡，腐脱新生，最后疮口愈合；或正气尚足，脓肿破溃，脓毒外泄，同样使溃疡腐脱新生而愈，即为疮疡后期(溃疡期)。

在疮疡的初、中期，若邪毒炽盛，又未能得到及时处理，可使邪毒走散，内攻脏腑，形成走黄；若人体气血虚弱，不能托毒外达，可致疮形平塌、肿势不能局限、难溃、难腐等；如病情进一步发展，正不胜邪，内犯脏腑，形成内陷。疮疡后期，毒从外解，病邪衰退，理应渐趋痊愈，若由于气血大伤，脾胃生化功能不能恢复，加之肾气亦衰，可致生化之源，阴阳两竭，同样可使毒邪内陷，危及生命。

疮疡的治疗常须内治和外治相结合。轻浅的疮疡，有时单用外治也能获得痊愈。而严重病证，如走黄、内陷等，不仅需要内治、外治结合，还要配合西医西药治疗。总之，必须根据患者的体质、致病因素、病情轻重等辨证施治。疮疡内治法的总则为消、托、补。即初期尚未成脓时，用消法使之消散，并针对病因、病情运用清热解毒、和营行瘀、行气、解表、温通、通里、理湿等治法，其中清热解毒为疮疡最常用的治法；中期脓成不溃或脓出不畅，用托法以托毒外出，又分透托法和补托法；后期体质虚弱者，用补法以恢复正气，使疮疡早日愈合。

疮疡外治法可根据疮疡的初期、中期、后期分别辨证施治。初期宜箍毒消肿，阳证可选用金黄散(膏)、玉露散(膏)、太乙膏、千捶膏，可加掺红灵丹、阳毒内消散，或用清热解毒消肿的新鲜草药捣烂外敷；阴证可选用回阳玉龙散(膏)、阳和解凝膏，加掺黑退消、桂麝散、丁桂散；半阴半阳证选用冲和散(膏)。中期脓热时宜切开排脓，注意切开时机、切口位置、切口方向等的选择。如颜面疔疮忌早期切开，而蛇头疔应及早切开；如手指疔

宜从侧方切开以免影响屈伸功能等。后期宜提脓祛腐、生肌收口，阳证用八二丹、九一丹提脓祛腐，阴证用七三丹、五五丹提脓祛腐；疮口脓水较多时，不论阳证、阴证均可应用中药溶液湿敷；疮口太小或成漏时，用白降丹、千金散药线腐蚀；疮面赘肉突出时用平胥丹；腐脱脓尽用生肌散、八宝丹，并根据情况配合使用垫棉法或扩创法。

在疮疡的治疗中，还要注意精神调整、饮食宜忌、日常起居、护理换药等。

下面是中医治疗中常用的基本术语：

疡：又称外疡，是指一切外科疾病的总称。疡科即外科。

疮疡：广义上是指一切体表外科疾患的总称；狭义是指发于体表的化脓性疾病。

肿疡：指体表外科疾病尚未溃破的肿块。

溃疡：指一切外科疾病溃破的疮面。

赘肉：疮疡溃破后，出现过度生长高突于疮面或暴翻于疮口之外的腐肉，称为赘肉。需要说明的是，中医眼科所讲的赘肉攀睛(即翼状赘肉)与外科所指的赘肉不尽相同。

痈：痈者，壅也。指气血被邪毒壅聚而发生的化脓性疾病。一般分为外痈和内痈两大类。外痈是指生于体表皮肉之间的化脓性疾患；内痈是指生于脏腑的化脓性疾患。

疽：疽者，阻也。指气血被毒邪阻滞而发于皮肉筋骨的疾病。常见的有有头疽和无头疽两类。有头疽是发生在肌肤间的急性化脓性疾病，相当于西医的痈。无头疽是指多发于骨骼或关节间等深部组织的化脓性疾病，相当于西医的骨髓炎、骨结核、化脓性关节炎等。

根盘：指肿疡基底部周围之坚硬区，边缘清楚。根盘收束者多为阳证，平塌者多为阴证。

根脚：指肿疡之基底根部。一般多用于有如钉钉之状粟粒状脓头疔的基底根部的描述。根脚收束多为阳证，根脚软陷为成脓，根脚散漫或塌陷者，多提示可能发生走黄。

应指：指患处已化脓(或有其他液体)，用手按压时有波动感。

护场：“护”有保护之意，“场”为斗争场所。所谓护场，是指在疮疡的正邪交争中，正气能够约束邪气，使之不至于深陷或扩散所形成的局部作肿范围。有护场说明身体正气充足，疾病易愈；无护场说明正气不足，预后较差。

袋脓：溃后疮口缩小，或切口不当，致使空腔较大，犹如口袋之形，脓液不易排出而营积袋底，即为袋脓。

痔：痔有峙窍之意，凡肛门、耳道、鼻孔等人之九窍中，有小肉突起者，古代均称为痔。

如生于鼻腔内者称鼻痔(鼻息肉)；生于耳道内者称耳痔(耳道息肉)等。由于痔的发病以肛门部最多见，故归属于肛门疾病类。

漏：指溃口处脓水淋漓不止，尤如滴漏。它包括两种不同性质的病理改变，一是瘻管，指体表与有腔脏器之间的病理性管道，伴有脓水淋漓，具有内口和外口；或溃口与溃口相通的病理性管道。二是窦道，指深部组织通向体表的病理性盲管，伴脓水淋漓，一般只具有外口而无内口，不与体内有腔脏器相通。

痰：是指发于皮里膜外、筋肉骨节之间，或软或硬，或按之有囊性感的包块，属有形之征，多为阴证。临证中以痰取名的疾病，归纳起来大致有两类：一类是疮疡性病变如流痰、子痰等；一类是囊肿性病变如痰包、痰核等。还有一些疾病虽不以痰命名，但其病因与痰有关，如气瘰、肉瘰等。

结核：即结聚成核、结如果核之意。是泛指一切皮里膜外浅表部位的病理性肿块。非指西医之结核病。如形容瘰疬肿大之淋巴结为“结核累累，有如串珠”，描述乳房内肿块性疾病之“乳中结核，形如梅李”等。

岩：病变部肿块坚硬如石，而且高低不平，固定不移，形似岩石，破溃后疮面中间凹陷较深，状如岩穴，故称之为岩。岩与癌相同。

毒：凡是导致机体阴阳平衡失调，对机体产生不利影响的因素统称为毒。中医外科以毒取名的疾病很多，包括范围较广，通常是指有传染性的疾病，如时毒；或火毒症症状明显、发病迅速的一类疾病，如丹毒；或某些疾病尚难以定出确切病名者，如无名肿毒等。

五善：“善”就是好的征象，在病程中出现善的症状，表示预后较好。“五善”包括心善、肝善、脾善、肺善、肾善。心善为精神爽快，言语清亮，舌润不渴，寢寐安宁；肝善为身体轻便，不怒不惊，指甲红润，二便通利；脾善为唇色滋润，饮食知味，脓黄而稠，大便和润；肺善为声音响亮，不咳不喘，呼吸均匀，皮肤润泽；肾善为身无潮热，口和齿润，小便清长，夜卧安静。

七恶：“恶”就是坏的征象，在病程中出现恶的症状，表示预后较差。“七恶”包括心恶、肝恶、脾恶、肺恶、肾恶、脏腑败坏、气血衰竭〔脱证〕。心恶为神志昏惚，心烦舌燥，疮色紫黑，言语呢喃；肝恶为身体强直，目难正视，疮流血水，惊悸时作；脾恶为形容消瘦，疮陷脓臭，不思饮食，纳药呕吐；肺恶为皮肤枯槁，痰多音暗，呼吸喘急，鼻翼煽动；肾恶为时渴引饮，面容惨黑，咽喉干燥，阴囊内缩；脏腑败坏为身体浮肿，呕吐呃逆，肠鸣泄泻，口糜满布；气血衰竭为疮陷色暗，时流污水，汗出肢冷，嗜卧语低。

顺证：“顺”就是正常的征象，但并不是指生理功能的正常情况，外科疾病在其发展过程

中，按着顺序出现应有的症状者，称为“顺证”。如阳证疮疡表现为初起疮顶高突，红肿疼痛，根脚不散；脓成顶高根收，皮薄光亮，易脓易腐；溃后脓稠色鲜，腐肉易脱，肿痛减；收口期疮面红活，新肉易生，疮口易敛。

逆证：“逆”就是反常的征象，外科疾病在其发展过程中，不以顺序而出现不良的症状者，称为“逆证”。如阳证疮疡表现为初起疮顶平塌，根脚散漫，不痛不热；脓成疮顶软陷，肿硬紫暗，不脓不腐；溃后皮烂肉坚无脓，时流血水，肿痛不减；收口期脓稀淋漓，新肉不生，色败臭秽，疮口难敛。

善证与恶证多指全身表现；顺证与逆证多指局部表现。临证中善证与恶证、顺证与逆证之间是可以相互转化的，所以要密切观察病情变化，及时调整治疗和护理措施，尽可能转恶为善，转逆为顺。

瘰疬结节结核肿块诸病

瘰疬瘰瘤乳岩乳癖癌肿关节红肿

【药名】	小金丸
【处方】	麝香或人工麝香 30g 木鳖子(去壳去油) 150g 制草乌 150g 枫香脂 150g 醋乳香 75g 醋没药 75g 五灵脂(醋炒) 150g 酒当归 75g 地龙 150g 香墨 12g。
【性状】	本品为黑褐色的糊丸；气香，味微苦。
【功能与主治】	散结消肿，化瘀止痛。用于痰气凝滞所致的瘰疬、瘰瘤、乳岩、乳癖，症见肌肤或肌肤下肿块一处或数处，推之能动，或骨及骨关节肿大，皮色不变，肿硬作痛。
【用法与用量】	打碎后口服。一次 1.2~3g，一日 2 次，小儿酌减。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	(1) 每 100 丸重 3g；(2) 每 100 丸重 6g；(3) 每 10 丸重 6g；(4) 每瓶(袋)装 0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小金片
【处方】	人工麝香 15g 木鳖子(去壳去油) 75g 制草乌 75g 枫香脂 75g 醋乳香 37.5g 醋没药 37.5g 五灵脂(醋炒) 75g 酒当归 37.5g 地龙 75g 香墨 6g。
【性状】	本品为灰棕色至灰黑色的片；气香，味微苦。
【功能与主治】	散结消肿，化瘀止痛。用于阴疽初起，皮色不变，肿硬作痛，多发性脓肿，瘰瘤，瘰疬，乳岩，乳癖。
【用法与用量】	口服。一次 2~3 片，一日 2 次，小儿酌减。
【注意】	孕妇禁用。

【规格】	每片重 0.36g。
【贮藏】	密封。

【药名】	小金胶囊
【处方】	人工麝香 10g 制草乌 50g 醋乳香 25g 五灵脂(醋炙) 50g 地龙 50g 木鳖子(去壳去油) 50g 枫香脂 50g 醋没药 25g 酒当归 25g 香墨 4g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为黑褐色的颗粒或黄褐色至棕褐色的粉末；气香，味微苦。
【功能与主治】	散结消肿，化瘀止痛。用于阴疽初起，皮色不变，肿硬作痛，多发性脓肿，瘰疬，瘰疬，乳岩，乳癖。
【用法与用量】	口服。一次 3~7 粒〔规格(1)〕，一次 4~10 粒〔规格(2)〕，一日 2 次；小儿酌减。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	1) 每粒装 0.35g；(2) 每粒装 0.30g。
【贮藏】	密封。

【药名】	内消瘰疬片
【处方】	夏枯草 281g 浙贝母 35g 海藻 35g 天花粉 35g 熟大黄 35g 煅蛤壳 35g 枳壳 35g 薄荷脑 0.18g 当归 35g 甘草 35g 白薇 35g 连翘 35g 玄明粉 35g 大青盐 35g 桔梗 35g 地黄 35g 玄参 176g。
【性状】	本品为棕褐色的片；味咸、苦。
【功能与主治】	化痰，软坚，散结。用于痰湿凝滞所致的瘰疬，症见皮下结块、不热不痛。
【用法与用量】	口服。一次 4~8 片，一日 1~2 次。
【注意】	无。
【规格】	每片重 0.6g。
【贮藏】	密封。

【药名】	四妙丸
【处方】	苍术 125g 牛膝 125g 盐黄柏 250g 薏苡仁 250g。
【性状】	本品为浅黄色至黄褐色的水丸，气微；味苦、涩。
【功能与主治】	清热利湿。用于湿热下注所致的痹病，症见足膝红肿、筋骨疼痛。
【用法与用量】	口服。一次 6g，一日 2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	每 15 粒重 1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	西黄丸
【处方】	牛黄或体外培育牛黄 15g 麝香或人工麝香 15g 醋乳香 550g 醋没药 550g。
【性状】	本品为棕褐色至黑褐色的糊丸；气芳香，味微苦。
【功能与主治】	清热解毒，消肿散结。用于热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘰疬，流注、癌肿。
【用法与用量】	口服。一次 3g，一日 2 次。

【注意】	孕妇禁服。
【规格】	每20丸重1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	当归拈痛丸
【处方】	当归40g 粉葛40g 党参40g 苍术(炒)40g 升麻40g 苦参40g 泽泻60g 炒白术60g 知母60g 防风60g 羌活100g 黄芩100g 猪苓100g 茵陈100g 甘草100g。
【性状】	本品为灰褐色的水丸；味苦。
【功能与主治】	清热利湿，祛风止痛。用于湿热闭阻所致的痹病，症见关节红肿热痛或足胫红肿热痛；亦可用于疮疡。
【用法与用量】	口服。一次9g，一日2次。
【注意】	孕妇及风寒湿闭阻痹病者慎用；忌食辛辣油腻食物。
【规格】	每18丸重1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	阳和解凝膏
【处方】	鲜牛蒡草480g(或干品120g) 鲜凤仙透骨草40g(或干品10g) 生川乌20g 大黄20g 生草乌20g 地龙20g 赤芍20g 白薇20g 川芎10g 防风10g 五灵脂10g 香橼10g 肉桂20g 没药20g 人工麝香10g 桂枝20g 当归20g 生附子20g 僵蚕20g 白芷20g 白及20g 续断10g 荆芥10g 木香10g 陈皮10g 乳香20g 苏合香40g。
【性状】	本品为摊于纸上的黑膏药。
【功能与主治】	温阳化湿，消肿散结。用于脾肾阳虚、痰瘀互结所致的阴疽、瘰疬未溃、寒湿痹痛。
【用法与用量】	外用，加温软化，贴于患处。
【注意】	无。
【规格】	每张净重(1)1.54g；(2)3g；(3)6g；(4)9g。
【贮藏】	密封。

【药名】	阿魏化痞膏
【处方】	香附20g 厚朴20g 莪术20g 生草乌20g 大蒜20g 白芷20g 木鳖子20g 胡黄连20g 蓖麻子20g 没药3g 血竭3g 肉桂15g 阿魏20g 三棱20g 当归20g 生川乌20g 使君子20g 穿山甲20g 蛭螂20g 大黄20g 乳香3g 芦荟3g 雄黄15g 樟脑15g 阿魏20g。
【性状】	本品为摊于布上的黑膏药。
【功能与主治】	化痞消积。用于气滞血凝，癥瘕痞块，脘腹疼痛，胸胁胀满
【用法与用量】	外用，加温软化，贴于膈上或患处。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每张净重(1)6g；(2)12g。
【贮藏】	密闭，置阴凉干燥处。

火热内蕴型甲状腺肿大淋巴结乳腺增生

【药名】	夏枯草口服液
【处方】	夏枯草。
【性状】	本品为棕褐色的液体，味甜，微涩。
【功能与主治】	清火，散结，消肿。用于火热内蕴所致的头痛、眩晕、瘰疬、瘰疬、乳痛肿痛；甲状腺肿大、淋巴结核、乳腺增生病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 10ml，一日 2 次，
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	夏枯草膏
【处方】	夏枯草 2500g。
【性状】	本品为黑褐色稠厚的半流体，味甜、微涩。
【功能与主治】	清火，散结，消肿。用于火热内蕴所致的头痛、眩晕、瘰疬、瘰疬、乳痛肿痛；甲状腺肿大、淋巴结核、乳腺增生病见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 9g，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

【药名】	消瘦丸
【处方】	昆布 300g 蛤壳 50g 桔梗 100g 陈皮 100g 海藻 200g 浙贝母 50g 夏枯草 50g 槟榔 100g。
【性状】	本品为褐色的大蜜丸；味咸、涩。
【功能与主治】	散结消瘦。用于痰火郁结所致的瘰疬初起；单纯型地方性甲状腺肿见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 1 丸，一日 3 次，饭前服用；小儿酌减。
【注意】	无。

【规格】	每丸重 3g。
【贮藏】	密封。

中毒解毒诸病

各种毒症

【药名】	仁青芒觉
【处方】	本品系藏族验方：由毛诃子、蒲桃、西红花、牛黄、麝香、朱砂、马钱子等药味加工制成的丸剂。
【性状】	本品为黑褐色的水丸；气香，味苦、甘、涩。
【功能与主治】	清热解毒，益肝养胃，明目醒神，愈疮，滋补强身。用于自然毒、食物毒、配制毒等各种中毒症；“培根木布”，消化道溃疡，急慢性胃肠炎，萎缩性胃炎，腹水，麻风病等。
【用法与用量】	研碎开水送服。一次 1 丸，一日 1 次。
【注意】	服药期禁用酸腐、生冷食物；防止受凉。
【规格】	每丸重 1~1.5g。
【贮藏】	密封。

【药名】	仁青常觉
【处方】	本品系藏族验方：由珍珠、朱砂、檀香、降香、沉香、诃子、牛黄、人工麝香、西红花等药味加工制成的丸剂。
【性状】	本品为黑色的水丸；气微香，味甘、苦、涩。
【功能与主治】	清热解毒，调和滋补。用于“龙、赤巴、培根”各病，陈旧性胃肠炎、溃疡，‘木布’病，萎缩性胃炎，各种中毒症；梅毒，麻风，陈旧热病，炭疽，疖痛，干黄水，化脓等。
【用法与用量】	口服。重病一日 1g；一般隔三天至七天或十天服 1g；开水或酒泡，黎明空腹服用。
【注意】	无。
【规格】	1) 每 4 丸重 1g；(2) 每丸重 1g。
【贮藏】	密封。

【药名】	甘草豆汁汤
-------------	--------------

【处方】	甘草 1~3g 黑豆 250g。
【性状】	黑豆汁混合甘草粉。
【功能与主治】	解一千二百多种毒（号称天下解毒第一汤，善解各种疑难杂症，怪病）。
【用法与用量】	甘草 1~3g（每天最大量 3g），黑豆 250g 打成汁煮熟，混合后饮用。
【注意】	作者个人经验，使用前请咨询执业药师。
【规格】	无。

蛇虫毒症

【药名】	季德胜蛇药片
【处方】	本品为由重楼、干蟾皮、蜈蚣、地锦草等药味经适宜加工制成的片。
【性状】	本品为棕褐色的片；或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味辛、苦。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛。用于毒蛇、毒虫咬伤。
【用法与用量】	口服。第一次 20 片，以后每隔 6 小时续服 10 片，危急重症者将剂量增加 10~20 片并适当缩短服药间隔时间。不能口服药者，可行鼻饲法给药。外用。被毒虫咬伤后，以本品和水外搽，即可消肿止痛。
【注意】	孕妇忌用。脾胃虚寒者慎用。肝肾功能不全者慎用。本品不可过服久服。若用药后出现皮肤过敏反应需及时停用。忌食辛辣、油腻食物。
【规格】	每片重 0.4g。
【贮藏】	密封。

中医对于癌症的研究和诊断

瘤是瘀血、痰滞、浊气停留于机体组织间而产生的结块。其临床特点是：局限性肿块，多生于体表，发展缓慢，一般没有自觉症状。瘤的名称很多，《灵枢》中有筋瘤、肠瘤、脊瘤、肉瘤等。内脏肿瘤后世文献多归属于癥瘕范畴。生于体表的肿瘤《医宗金鉴·外科心法要诀》分为6种，即：气瘤、血瘤、筋瘤、肉瘤、骨瘤、脂瘤。相当于西医的部分体表良性肿瘤。

岩是发生于体表的恶性肿瘤的统称，为外科疾病中最凶险者。因其质地坚硬，表面凹凸不平，形如岩石而得名。古代的“癌”、“岩”、“岳”、“巖”等字义相同且通用。其临床特点是：多发于中老年人，局部肿块坚硬，高低不平，皮色不变，推之不移，溃烂后如翻花石榴，色紫恶臭，疼痛剧烈，难于治愈，预后不良，故有绝症之称。

病因病机

瘤、岩是全身性疾病的局部表现，其发病原因较复杂，但归纳起来不外内因、外因两个方面。外因为六淫之邪，内因为正气不足和七情所伤。由于致病因素的作用，导致机体阴阳失调，脏腑功能障碍，经络阻塞，气血运行失常，气滞血瘀、痰凝毒聚等相互交结而导致瘤、岩的发生。常见病因病机如下所述：

六淫之邪：六淫之邪或污浊之气乘虚内侵，从而导致气血凝结，阻滞经络，影响内脏的正常功能，邪浊与郁气、积血相合为病，留积不散，久之结为瘤、岩。

情志郁结：七情所伤，情志抑郁不畅，内脏的气机失于正常运行，气滞日久，必致血瘀，气滞血瘀长期蕴结不散，可逐渐形成瘤、岩。

脏腑失调：如果脏腑功能失调，正气虚弱，邪气留滞而致气滞血瘀，痰凝毒聚，互相搏结

而致瘤、岩。

饮食不节：恣食辛辣厚味，脾胃受损，水湿不化，津液不布，湿蕴日久而成湿毒；或兼受邪火熬灼，凝结成痰，痰浊积聚而为瘤、岩。

上述病因病机中，瘤主要是邪气偏盛，岩主要是正气不足，即机体抗病力降低。加之邪毒侵袭，日积月累，导致瘤岩的形成，正如明·李中梓《医宗必读》所言：“积之成者，正气不足，而后邪气踞之。”总之，瘤岩病因病机的特点是：本虚而标实，正气亏虚为本，气滞、血瘀、痰凝、湿热或阴毒结聚为标。

西医学认为瘤、癌是由多种原因引起人体细胞的增生而形成的异常新生物。这种增生组织的细胞具有异常的结构和功能，其生长能力旺盛，与整个身体的代谢不协调，对人体的危害很大。由正常细胞增生而转变为癌细胞的过程叫作“癌变”，这个转变过程的本质、原理及经过，叫作“癌变原理”，即癌的发病机理。目前尚未能找出恶性肿瘤的单一病因，但多数学者认为，除了各种致癌因素以外，癌症的发病与病人的易感性和遗传因素密切相关。

辨证

一般体表的瘤、岩在早、中期或未溃之前多以实证为主，晚期或瘤、岩溃后则以虚证为主。根据临床辨证规律一般分如下证型：

气郁痰凝证：局部肿块硬韧，尚可活动，患部皮色不变，无痛；伴有胸闷，胁胀，纳差，精神抑郁等症状；舌质淡红，苔薄白或微黄腻，脉细弦。

寒痰凝聚证：局部肿块质硬，表面光滑有弹性，肿块活动度较差，患部皮肤色白，无痛，肤温不高；伴周身倦怠，胸闷不舒，畏寒怕冷；舌质淡，苔白或白腻，脉沉而滑。

气血瘀滞证：肿块坚硬，表面高低不平，推之不动，自觉疼痛或刺痛及胀痛，局部青筋显露；伴胁胀不适，易烦躁；舌质暗红或有瘀斑，苔薄黄，脉弦或涩。

毒热蕴结证：肿块增大，压痛，患处皮肤色红，肤温较高，或肿块溃烂，状如翻花，时流血水，痛如火燎，分泌物有恶臭味；伴发热，心烦，口渴，尿黄，大便干结；舌质红，少苔或苔黄，脉弦滑或滑数。

正虚邪实证：多见于岩的晚期。肿块增大、增多，有邻近或远处转移，或岩肿溃烂，渗流血水，疮面灰暗，高低不平，易出血，久不收口；伴全身消瘦，发热，面色㿔白，身

体倦怠，不思饮食等；舌质淡红，苔薄而微黄或少苔、无苔，脉细数。

内治法

气郁痰凝证：治疗方法宜理气解郁，化痰散结。方用开郁散、通气散坚丸加减。常用药物有：陈皮、青皮、香附、枳壳、枳实、柴胡、橘核、郁金、厚朴、川贝母、浙贝母、法夏、僵蚕、白芥子、胆南星、夏枯草等。

寒痰凝聚证：治疗方法宜温经散寒，化痰散结。方用阳和汤、万灵丹加减。常用药物有：鹿角胶、熟地、麻黄、白芥子、细辛、肉桂、台乌药、全蝎、浙贝母、法夏、乳香、没药、橘核、香附等。

气血瘀滞证：治疗宜活血化瘀，软坚散结。方用活血散瘀汤或散肿溃坚汤加减。常用药物有：丹参、川芎、桃仁、红花、赤芍、水红花子、五灵脂、三棱、莪术、水蛭、虻虫、土鳖虫、乳香、没药、苏木、鬼箭羽等。

毒热蕴结证：治疗宜清热解毒，软坚散结。方用五味消毒饮合当归芦荟丸加减。常用药物有：十大功劳叶、黄柏、半枝莲、白花蛇舌草、肿节风、黄连、黄芩、夏枯草、鳖甲、七叶一枝花、龙葵、半边莲、川贝母、胆南星、银花、蒲公英、紫花地丁等。

正虚邪实证：治疗宜用益气养血，解毒散结之法。方用保元汤或生脉饮合散肿溃坚汤加减。常用药物有：太子参、西洋参、人参、生黄芪、当归、炒白术、茯苓、沙参、麦冬、制首乌、黄精、菟丝子、仙灵脾、白花蛇舌草、肿节风、半枝莲、蒲公英、半边莲等。

外治法

可辨证选用阳和解凝膏、冲和膏、金黄膏、阳毒内消散、阴毒内消散、桂麝散、红灵丹等外敷。紫金锭、小金丸、新癬片等可分别研末，以茶水调涂肿块部位。对于溃疡面，可选用红升丹、白降丹或三品一条枪药线等，使癌瘤组织分离、脱落，外敷藤黄膏。腐肉已尽可用生肌白玉膏或生肌玉红膏。

手术治疗：根据病情选择手术，以切除肿块为目的。

激光与冷冻疗法：可使癌性溃疡的癌组织坏死脱落。

放疗与化疗：选用放射治疗，对癌细胞敏感者，可直接杀灭癌细胞，疗效较好，并可适当应用抗肿瘤药物。

备注：由于癌症是一个非常复杂的致命的疾患，所以在治疗过程必须要对症下药，通用的药很少，所以本书收录的中成药也非常有限。

癌症肿瘤诸病

各种癌症肿瘤

【药名】	平消片
【处方】	郁金 54g 五灵脂 45g 硝石 54g 麸炒枳壳 90g 仙鹤草 54g 白矾 54g 干漆(制) 8g 马钱子粉 36g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显深灰色至黑灰色；气微香，味苦、涩。
【功能与主治】	活血化瘀，散结消肿，解毒止痛。对毒瘀内结所致的肿瘤患者具有缓解症状，缩小瘤体，提高机体免疫力，延长患者生存时间的作用。
【用法与用量】	口服。一次 4~8 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁用；不宜久服。
【规格】	片心重 0.23g。
【贮藏】	密封。

【药名】	平消胶囊
【处方】	郁金 54g 仙鹤草 54g 五灵脂 45g 白矾 54g 硝石 54g 干漆(制) 18g 麸炒枳壳 90g 马钱子粉 36g。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为深灰色至黑灰色的颗粒；气微香，味苦、涩。
【功能与主治】	活血化瘀，散结消肿，解毒止痛。对毒瘀内结所致的肿瘤患者具有缓解症状，缩小瘤体，提高机体免疫力，延长患者生存时间的作用。
【用法与用量】	口服。一次 4~8 粒，一日 3 次。
【注意】	孕妇禁用；不宜久服。
【规格】	每粒装 0.23g。
【贮藏】	密封。

【药名】	肿节风片
------	-------------

【处方】	肿节风浸膏 250g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕色至棕褐色；气香，味苦、微涩。
【功能与主治】	清热解毒，消肿散结。用于肺炎、阑尾炎、蜂窝组织炎属热毒壅盛证候者，并可用于癌症辅助治疗。
【用法与用量】	口服。一次 1 片〔规格(1)〕或一次 3 片〔规格(2)〕，一日 3 次。
【注意】	无。
【规格】	(1)薄膜衣片每片重 0.75g；(2)糖衣片(片心重 0.25g)。
【贮藏】	密封。

【药名】	养阴生血合剂
【处方】	地黄，黄芪，当归，玄参，麦冬，石斛，川芎。
【性状】	本品为深棕褐色的液体；气香，味微甜、微苦。
【功能与主治】	养阴清热，益气生血。用于阴虚内热、气血不足所致的口干咽燥、食欲减退、倦怠无力；有助于减轻肿瘤病人白细胞下降，改善免疫功能，用于肿瘤患者放疗时见上述证候者。
【用法与用量】	口服。一次 50ml，一日 1 次。放射治疗前 3 天开始服用，放疗期间，在每次放射治疗前 1 小时服用，至放疗结束。
【注意】	无。
【规格】	每瓶装 50ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	微达康口服液
【处方】	刺五加 150g 黄芪 150g 陈皮 90g 熟地黄 180g 女贞子 150g 附子(制) 45g 淫羊藿 150g。
【性状】	本品为深棕色的澄清液体；味甜，微苦。
【功能与主治】	扶正固本，补肾安神。用于肾虚所致体虚乏力、失眠多梦，食欲不振；肿瘤放疗、化疗引起的白细胞、血小板减少，免疫功能降低下见上述证候者。
【用法与用量】	口服。用于肿瘤放疗、化疗及射线损伤：一次 40ml，一日 3 次；一周后，一次 20ml，一日 3 次。用于微波损伤：一次 20ml，一日 2 次。
【注意】	无。
【规格】	每支装 10ml。
【贮藏】	密闭，置阴凉处。

胃癌食管癌

【药名】	胃复春片
【处方】	红参 131g 香茶菜 2500g 麸炒枳壳 250g。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦、涩。
【功能与主治】	健脾益气，活血解毒。用于胃癌癌前期病变及胃癌手术后辅助治疗、慢性浅表性胃炎属脾胃虚弱证者。
【用法与用量】	口服。一次4片，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每片重0.36g。
【贮藏】	密封。

【药名】	金蒲胶囊
【处方】	人工牛黄，金银花，蜈蚣，炮山甲，蟾酥，蒲公英，半枝莲，山慈菇，莪术，白花蛇舌草，苦参，龙葵，珍珠，大黄，黄药子，乳香(制)，没药(制)，醋延胡索，红花，姜半夏，党参，黄芪，刺五加，砂仁。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕色的粉末；气微，味苦、辛、麻。
【功能与主治】	清热解毒，消肿止痛，益气化痰。用于晚期胃癌、食管癌患者痰湿瘀阻及气滞血瘀证。
【用法与用量】	饭后用温开水送服。一次3粒，一日3次，或遵医嘱。42日为一疗程。
【注意】	孕妇忌服。用药早期偶有恶心，可自行缓解。超量服用时，少数患者可见恶心、纳差。
【规格】	每粒装0.3g。
【贮藏】	密封。

肝癌

【药名】	养正消积胶囊
【处方】	黄芪，女贞子，人参，莪术，灵芝，绞股蓝，炒白术，半枝莲，白花蛇舌草，茯苓，土鳖虫，鸡内金，蛇莓，白英，茵陈(绵茵陈)，徐长卿。
【性状】	本品为硬胶囊，内容物为棕色粉末；气香，味苦、涩。
【功能与主治】	健脾益肾、化瘀解毒。适用于不宜手术的脾肾两虚、瘀毒内阻型原发性肝癌辅助治疗，与肝内动脉介入灌注加栓塞化疗合用，有助于提高介入化疗疗效、减轻对白细胞、肝功能、血红蛋白的毒性作用，改善患者生存质量、改善脘腹胀满、纳呆食少、神疲乏力、腰膝酸软、溲赤便溏、疼痛。
【用法与用量】	口服。一次4粒，一日3次。
【注意】	无。
【规格】	每粒装0.39g。
【贮藏】	密封。

肺癌

【药名】	益肺清化膏
【处方】	黄芪 250g 党参 125g 北沙参 100g 麦冬 75g 仙鹤草 125g 拳参 100g 败酱草 83g 白花蛇舌草 167g 川贝母 75g 紫菀 75g 桔梗 75g 苦杏仁 100g 甘草 50g。
【性状】	本品为深棕色稠厚的半流体；味苦、微甜。
【功能与主治】	益气养阴，清热解毒，化痰止咳。用于气阴两虚所致的气短、乏力、咳嗽、咯血、胸痛；晚期肺癌见上述证候者的辅助治疗。
【用法与用量】	口服。一次 20g，一日 3 次。2 个月为疗程，或遵医嘱。
【注意】	偶见恶心、腹泻。
【规格】	(1) 每瓶装 60g；(2) 每瓶装 120g；(3) 每袋装 20g。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	康莱特软胶囊
【处方】	注射用薏苡仁油 450g。
【性状】	本品为软胶囊，内容物为淡黄色或黄色的油状液体；气微、味淡。
【功能与主治】	益气养阴，消癥散结。适用于手术前及不宜手术的脾虚痰湿型、气阴两虚型原发性非小细胞肺癌。
【用法与用量】	口服。一次 6 粒，一日 4 次。宜联合放、化疗使用。
【注意】	孕妇忌服。
【规格】	每粒装 0.45g。
【贮藏】	遮光、密封，置阴凉干燥处。

【药名】	紫龙金片
【处方】	黄芪，当归，白英，龙葵，丹参，半枝莲，蛇莓，郁金。
【性状】	本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕色至深棕色；气微香，味微苦。
【功能与主治】	益气养血，清热解毒，理气化痰。用于气血两虚证原发性肺癌化疗者，症见神疲乏力、少气懒言、头昏眼花、食欲不振、气短自汗、咳嗽、疼痛。
【用法与用量】	口服。一次 4 片，一日 3 次，与化疗同时使用。每 4 周为 1 周期，2 个周期为 1 疗程。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	每片重 0.65g。
【贮藏】	密封。

鼻咽癌

【药名】	鼻咽灵片
【处方】	山豆根 203g 茯苓 102g 天花粉 102g 茅莓根 203g 麦冬 102g 半枝莲 203g 玄参 203g 石上柏 407g 党参 162g 白花蛇舌草 203g。
【性状】	本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦、微涩。
【功能与主治】	解毒消肿，益气养阴。用于火毒蕴结、耗气伤津所致的口干、咽痛、咽喉干燥灼热、声嘶、头痛、鼻塞、流脓涕或涕中带血；急慢性咽炎、口腔炎、鼻咽炎见上述证候者。亦用于鼻咽癌放疗、化疗辅助治疗。
【用法与用量】	口服。一次 5 片，一日 3 次。
【注意】	孕妇及儿童慎用；忌食辛辣等刺激性食物及油炸食物。
【规格】	(1) 糖衣片（片心重 0.38g）；(2) 薄膜衣片每片重 0.39g。
【贮藏】	密封。

【药名】	鼻咽消毒颗粒(鼻咽消毒剂)
【处方】	野菊花 390g 苍耳子 390g 重楼 390g 茅莓根 390g 两面针 195g 夏枯草 195g 龙胆 117g 党参 117g。
【性状】	本品为浅棕黄色至棕褐色的颗粒；味先甜后苦。
【功能与主治】	清热解毒，化痰散结。用于痰热毒瘀蕴结所致的鼻咽部慢性炎症，鼻咽癌放射治疗后分泌物增多。
【用法与用量】	口服。一次 20g，一日 2 次，30 天为一疗程。
【注意】	孕妇及儿童慎用；忌食辛辣食物。
【规格】	(1) 每袋装 10g；(2) 每瓶装 120g。
【贮藏】	密封。

其他疼痛类诸病

【药名】	消炎止痛膏
【处方】	前流浸膏 200g 冰片 100g 麝香草酚 68g 水杨酸甲酯 60g 樟脑 80g 薄荷脑 280g 盐酸苯海拉明 16g 桉油 40g。
【性状】	本品为淡黄色的片状橡胶膏；气芳香。
【功能与主治】	消炎，活血，镇痛。用于神经性疼痛，关节痛，头痛等。
【用法与用量】	外用，贴于患处。一次 1~2 片，一日 1~2 次。
【注意】	孕妇慎用。
【规格】	(1) 4.0cm X 6.5cm；(2) 7.0cm X 10.0cm。
【贮藏】	密封，置阴凉处。

【药名】	消痛贴膏
【处方】	本品系藏族验方：由独一味、姜黄等药味加工而成。
【性状】	本品为附在胶布上的药芯袋，内容物为黄色至黄褐色的粉末；具特殊香气。润湿剂为黄色至橙黄色的液体；气芳香。
【功能与主治】	活血化瘀，消肿止痛。用于急慢性扭挫伤、跌打瘀痛、骨质增生、风湿及类风湿疼痛、落枕、肩周炎、腰肌劳损和陈旧性伤痛。
【用法与用量】	外用。将小袋内润湿剂均匀涂于药芯袋表面，润湿后直接敷于患处或穴位。每贴敷 24 小时。
【注意】	无。
【规格】	药芯袋每贴装(1) 1.2g；(2) 1g。润湿剂每袋装(1) 2.5ml，(2) 2.0ml。
【贮藏】	密封。

【药名】	九气拈痛丸
【处方】	醋香附 138g 木香 34.5g 高良姜 34.5g 陈皮 69g 郁金 69g 醋莪术 276g 醋延胡索 138g 槟榔 69g 甘草 34.5g 五灵脂(醋炒) 138g。
【性状】	本品为黄褐色至棕褐色的水丸；气香，味苦、辣。
【功能与主治】	理气，活血，止痛，用于气滞血瘀导致的胸胁胀满疼痛、痛经。
【用法与用量】	口服。一次 6~9g，一日 2 次。
【注意】	孕妇禁用。
【规格】	无。
【贮藏】	密封。

附录一：中医舌诊

望舌

望舌是通过观察舌象变化，以测知体内病变的方法，简称舌诊。舌诊是中医特色诊法之一，在诊断学中占有十分重要的地位。

舌诊的原理要有二：一是舌与脏腑密切相关。人体脏腑通过经络与舌连通，其中心、脾胃、肾与舌的关系最为密切。心开窍于舌，手少阴心经之别系于舌，心主血脉，舌体分布有丰富的脉络，故心的功能正常与否，必然反映于舌；足太阴脾经连舌本、散舌下，舌又为脾胃之外候，舌苔乃胃气上蒸而成，故舌象又可反映脾胃的运化功能状况；肾为先天之本而藏精，足少阴肾经挟舌本，精气盈亏亦会导致舌象变化。一是舌与精气血津液关系密切。气血的生成、运行与脾胃、心等脏腑密切相关，故气血盛衰变化与运行情况多能反映于舌；舌下“金津”、“玉液”乃是肾液、胃津上潮的孔穴，因此舌体润燥又可反映体内津液多少。故观察舌象可以推测脏腑盛衰、气血盈亏、邪正消长及病情顺逆，对判断正气盛衰、区别病邪性质、分辨病位深浅及推断病情及预后具有重要意义。

舌象包括舌质和舌苔。舌质又称舌体，指全舌的肌肉脉络组织。舌体的上面称舌背(或舌面)，下面称舌底。舌体前 1/5 为舌尖部，候心肺；中 2/5 为舌中部，候脾胃；后 2/5 为舌根部，候肾。舌之两边则候肝胆。舌苔是指舌面上的苔状物，禀胃气而生成。

舌诊要求：一是光线充足，在自然光线或白炽灯下，病人取坐位或卧位，面向光亮；二要伸舌自然，使舌面平坦舒展，便于观察，避免用力致舌肌紧张，影响舌色和舌形；三是察舌苔时应注意除外“染苔”，如某些饮食或饮料可使苔色失真；四是察舌顺序一般先舌质后舌苔，由舌尖至舌根。

正常舌象为淡红舌薄白苔，表现为：舌质柔软，活动自如，舌色淡红，荣润有神；舌苔薄白均匀，干湿适中。望舌主要包括望舌质和舌苔两方面。

望舌质

望舌质是通过观察舌体的神、色、形、态改变，以测知脏腑病变的方法。舌质与脏腑经络、气血阴阳关系密切，故望舌质能辨脏腑的虚实、气血盈亏、阴阳盛衰，据此可判断疾病的预后。望舌时应注意观察舌体有神无神、舌色变化、舌形的改变及舌体的动静姿态。

望舌神

即观察舌质的荣枯以辨有神、无神。察舌神以辨生机。舌质红活荣润，为有神，是脏

腑气血充盛，生机旺盛之象，虽病亦居善候；舌体干枯晦暗无华，为无神，是脏腑气血阴阳衰败，邪气壅盛之象，生机受损，病势危重，预后不良。望舌神是判断疾病预后的关键。

望舌色

即通过观察舌质颜色的变化，以了解疾病的有关情况。

淡红舌：是正常舌象。即舌色淡红明润，为脏腑功能正常，气血和调，胃气充盛的表现，见于常人。或疾病初起，病较轻浅，尚未伤及脏腑气血。

淡白舌：舌色较正常浅淡，由气血不荣所致，主虚证、寒证或气血两虚证。淡白而润，兼舌体胖嫩，多为阳虚证；舌色淡白而舌体瘦薄者，属气血两虚证。

红绛舌：舌色深于正常，鲜红者，称红舌；深红者，称绛舌。红绛舌的形成机理是体内邪热亢盛，气血涌动，舌络充盈；或热入营血，耗伤营阴，血液浓稠，热壅血滞到舌呈绛红；或阴虚水涸，虚火上灼舌络致舌红。红绛舌主热证，但有虚实之分。如若舌色鲜红，苔黄燥者，属气分实热；舌质深绛，为热入营血；舌质嫩红或绛，少苔或无苔，主阴虚火旺；舌尖红者，为心火亢盛；舌边红者，是肝胆火盛；舌中部红者，为中焦热盛。

青紫舌：舌色淡紫无红者，为青舌；舌色深绛而暗，为紫舌。可全舌青紫，亦可见局部青紫斑点。青紫舌主血行瘀滞，其原因有：热毒炽盛，深入营血，灼伤营阴，气血不畅；或阴寒内盛，血脉凝滞；或者跌仆外伤，气血瘀滞等。青紫舌主热、寒或瘀等。舌绛而深，干枯少津，主热毒炽盛；淡紫或青紫而润，是阴寒内盛；舌色紫暗或青紫，或者局部有紫斑、瘀点，是瘀血之征。舌尖有瘀点、瘀斑，为心血瘀阻；舌边青紫，是肝郁血瘀；舌中紫暗，为瘀阻胃络。

望舌形

即通过观察舌体的形态变化，以测知疾病的方法。舌形主要指舌体的大小与形质，正常舌体大小适中，望舌形主要观察其胖瘦、老嫩、厚薄以及有无裂纹、芒刺、齿痕和舌下脉络等。

老嫩舌：辨老嫩舌主要观察舌体的纹理。舌体纹理粗糙，形色坚敛者，为苍老舌，不论苔色如何，多主实证。是阳热炽盛，伤津耗液，舌体失润所致。若舌质纹理细腻，形色浮胖娇嫩者，为娇嫩舌，多属虚证或虚中夹实。是水湿内停，浸淫舌体所致。

胖大舌：舌体大于正常，伸舌满口，且舌肌呈弛缓状，称胖大舌。主水肿、痰饮为病。多因脾肾阳虚，水湿停聚，或湿聚成痰饮，阻滞舌络所致。舌淡白胖嫩，苔白而水滑，多属脾肾阳虚；若红而胖大，伴黄腻苔、是脾胃湿热，或痰热为病。

肿胀舌：舌体肿大，盈口满嘴，舌肌呈胀急状，甚者不能闭口，难以缩回，称肿胀舌；主实证、热证。常因心脾热盛，或温热挟酒毒上壅，或中毒，以致气血壅阻舌络而成。若舌鲜红而肿胀，为心脾热盛；青紫肿胀，是酒毒攻心之象。

瘦薄舌：舌体较正常瘦小而薄者，称瘦薄舌。主阴血亏虚之证。因阴血耗伤，或脾虚精亏，舌失濡润充养，舌肌萎缩，以致舌体瘦薄。若舌色浅淡而瘦薄，属心脾血虚；舌色

红绛瘦薄，乃热盛伤阴或阴虚火旺之象。

裂纹舌：舌面有明显的数目不等、形状各异、深浅不一的裂沟，称裂纹舌。其裂沟中一般无舌苔覆盖，多主精血亏虚之证。因精血亏虚，或阴津耗伤，舌体失养，舌面萎缩，龟裂所致。久病舌色浅淡而裂者，为血虚不润；暴病见舌色红绛而裂，由热盛伤津，阴津耗伤所致；淡白胖嫩，边有齿痕而有裂纹者，是脾虚湿渍。辨裂纹舌应注意在正常人群中约0.5%的人有先天性裂纹，称先天性舌裂，其特征是裂纹中有舌苔覆盖，且无不快感。

点刺舌：点，指舌面上有大小不一的星点。色红者，称“红星舌”，是温毒入血或热毒乘心之征；白点多为脾胃气虚挟热毒上攻，为将糜烂之兆；黑点为血中热盛。刺，即芒刺，舌面红色颗粒高起如刺，摸之棘手，称“芒刺舌”。主邪热炽感，芒刺越多，邪热越甚。常因脏腑热盛，热入营血，营热郁结充斥舌络所致。若舌尖有芒刺，为心火亢盛；舌边有芒刺，属肝胆火盛；舌中有芒刺，主胃肠积热。

齿痕舌：舌体边缘有牙齿挤压的痕迹，称齿痕舌。主脾虚湿盛。齿痕舌常与胖大舌并见，其形成多因脾阳虚，水湿内停，致舌体肿大，与齿缘相互挤压而成。正常人舌边也可见轻微齿痕，且长期不易消失，但舌体并不胖大，不属病态，应与上述病理性齿痕舌相鉴别。

舌下络脉：将舌尖翘起，舌系带两侧金津、玉液穴处，隐隐可见青紫色脉络，即为舌下络脉。正常人的络脉不扩张，也无分支或瘀点。若舌下络脉青紫迂曲，主血瘀气滞；若舌下出现许多青紫或紫黑色小疱，多属肝郁血瘀；舌下络脉青紫粗胀，则属痰热内阻，或为寒凝血瘀。

望舌态

即通过观察舌体的动静姿态，以诊察疾病的方法。应注意舌体运动情况，舌体活动灵活，伸缩自如，为正常舌态。病理舌态常见舌体强硬、震颤、歪斜等表现。

强硬舌：舌体失其柔和，伴缩不利，或不能转动者，为强硬舌，亦称“舌强”。多见于热入心包或中风病证。其成因主要有三：外感邪热亢盛，灼伤阳津，扰及神明，舌脉失养；痰浊、痰热内结，闭窍阻络，舌失其主；肝风挟痰，上阻舌络。若舌红而强硬，兼神志不清者，多属热扰心神；舌色红干而强硬，则多为热盛伤津；若舌强语謇、口舌歪斜者，常见于中风病。

震颤舌：舌体颤动，或舌体细微颤动，称震颤舌。动则为风，病涉于肝。多因血液亏虚，筋脉失养，舌脉挛急；或邪热亢盛，燔灼肝经，筋脉拘急；或肝郁化火生风等，均可致舌体颤动。若舌质淡白而颤动者，属血虚生风；舌红或绛而颤动，为热盛生风。

歪斜舌：伸舌时舌体偏向一侧，称歪斜舌。见于中风或中风先兆，或外伤等。其形成多因肝风内动，挟痰瘀阻于舌的一侧经脉，受阻一侧则舌肌弛缓，收缩无力，而健侧舌肌力如常，故伸舌时向健侧歪斜。

痿软舌：舌体软弱，一侧或全舌痿软，伸缩无力，言语困难，称痿软舌。多由阴血亏虚，舌肌失养而萎缩。舌淡白而渐痿者，属气血两亏；舌红绛而渐痿者，属肝肾阴亏已极；

新病舌干红而暴痿者，是热灼津伤。

短缩舌：舌体紧缩不能伸长，甚则伸舌难于抵齿，称为短缩舌，是由舌上筋脉挛急所致。若舌淡紫湿润而短缩，多属寒凝筋脉；舌胖苔腻而短缩，多为痰湿内阻；舌红绛而短缩，属热病伤津。先天性短缩舌，是舌下系带过短，牵拉而使舌不能伸长所致。

望舌苔

望舌苔是通过观察舌苔颜色、质地进行观察，以了解疾病变化情况的方法。舌苔是指附着于舌面上的一层苔垢。正常舌苔是由脾胃之气、津液上蒸而成，表现为薄白苔，不滑不燥，是胃气充盛之象。病理舌苔则是胃气挟邪气上蒸而成，故舌苔与胃气的强弱、病邪的寒热等属性有关。观察舌苔变化对判断病因、推测病位、确定病性及预测预后吉凶都有重要意义。望舌苔应着重观察舌苔的颜色及舌苔的质地。

望苔色是指通过观察舌苔不同颜色变化，以诊察疾病的方法。一般有白苔、黄苔、灰黑苔三类及其兼色变化。

白苔：白苔最为常见，主病也最为复杂。其形成原因，一是由胃气上熏，凝聚于舌而成，为正常之苔；二是因外寒入侵或阳虚内寒，阻遏阳气，寒凝于舌所致，多主表证、寒证。白苔有厚薄之分，因舌质、苔质之别，具有不同的临床意义，也可见于里证、热证、虚证、实证等。

- ❖ **薄白苔：**苔薄色白，细腻均匀，干湿适中，舌色淡红，为正常舌苔。亦可见于表证，若兼有恶寒发热、脉浮，是表证初起之象，为病邪在表而尚未入里的表现。如舌苔薄白、舌质淡白、神倦肢冷者，多为阳虚内寒证；苔薄白而于舌尖红者，为燥热伤津，或心肺火盛；苔薄色白、舌面湿润水滑，可见痰湿上犯，或痰饮水湿上溢。
- ❖ **厚白苔：**苔白而厚，多主里证、实证。若苔白厚而腻，为脾阳不振，水饮停聚，或痰湿内生；苔白厚如积粉，扪之不燥者，是外感浊邪疫气，热毒内盛所致，常见于瘟疫或内痈；苔白厚如腐渣，多为内有食积痰浊，胃腑积热之故。

黄苔：黄苔的形成，是因病邪入里化热，脏腑内热，胃气挟邪热上泛熏灼，导致苔色变黄。黄苔一般主里证、热证，也可见于表证、虚证和寒证。黄苔有深浅、厚薄、润燥等不同，主病各异。

- ❖ **淡黄苔：**苔色淡黄，或黄白相兼，多由薄白苔转变而来，见于外感病，是外邪由表入里化热，但尚未完全入里，表里同病的表现。苔薄黄而润，则是表邪初入里，里热不甚，津液未伤。
- ❖ **黄厚腻苔：**苔色黄而厚腻湿润，多见于湿温病，或湿热内结，或饮食积滞，或为痰热内盛。
- ❖ **黄干苔：**苔色黄干而少津，多属邪热伤津。若呈黄厚干苔，为里热实证；若色黄干枯不润为老黄，甚至为焦黄色，为热积于内，胃液干枯。若舌苔黄滑而润，但

舌质淡胖而嫩者，则为阳气虚衰，水湿不化所致。

灰黑苔：苔色是浅黑色为灰苔，深灰色即为黑苔。灰苔与黑苔主病同类而有轻重程度的差别，常并称为灰黑苔。

- ❖ **灰苔：**可见于里热证，亦主里寒证。苔灰而润，主痰湿内停或寒湿中阻；苔灰而干燥，常兼见舌质红，是热炽伤津或阴虚火旺；若为由白而黄转灰者，为外感后传经邪热所致。
- ❖ **黑苔：**多由灰苔或焦黄苔转化而来，主里证、热证，又主寒证，多见于病情较重者。苔黑而滑润、舌质色淡者，主虚寒，多为阳虚阴寒内盛；苔黑厚腻而黏、舌红者，是痰湿挟热伏于中焦；苔黑而干燥、舌质红者，主热证，多属邪热伤津。若舌中焦黑，四周无苔，为津液受伤，虚火所致；苔黑燥而生芒刺，是热极津涸之实热证；若苔黑生刺，望之虽燥，但渴不多饮、边有白苔、舌质淡白而嫩者，为真寒假热证。

望苔质

苔质即舌苔的质地。望苔质是指通过观察舌苔质地的厚薄、润燥、腻腐、剥脱等变化，用以诊察疾病的方法。

薄厚苔：舌苔薄厚的分辩，以“见底”、“不见底”为标准。凡透过舌苔能隐隐见到舌体者为薄苔，又叫见底苔；不能见到舌体者为厚苔，又叫不见底苔。薄苔是由胃气、胃津熏蒸于舌而成；厚苔则常因胃气挟食浊、痰湿等邪气熏蒸，滞积于舌所致。故薄苔察胃气，厚苔辨邪气。观察舌苔的厚薄，有助于了解病位的深浅、感邪的轻重以及病情的进退。

薄苔主病初起在表，邪浅病轻。苔薄色白主表寒证，苔薄色黄主表热证。苔厚主病邪在里，病情较重。苔厚而黄腻主湿热或痰热，或食积化热。舌苔由薄变厚，多为邪盛病进，或伏邪显露；舌苔由厚变薄，则提示正胜邪退，或邪气消散外达。

润燥苔：舌苔的润燥主要根据舌面津液多少来区分。舌苔润泽有津，干湿适中者为润苔；若苔面湿润而滑，甚则流涎欲滴为滑苔；苔面干燥少津，望之枯涸者为燥苔；舌苔干而粗糙，扪之涩手者为糙苔；舌苔干而有裂纹者是裂苔。润苔是胃津、肾液上承于舌之征，但热入营血，蒸动营阴津液上潮于舌，亦可见舌面湿润。滑苔多为寒湿内蕴，或阳虚水饮不化，聚于舌面所致。燥、糙苔，为热盛津伤，阴液亏耗所致；或湿邪内郁，阻遏阳气，气不化津上承而成。裂苔因火热伤津，苔失津润而致。察舌苔之润燥，可以了解津液的盈亏及其输布的正常与否。舌苔润泽，表明津液未伤。若舌红绛而苔润，为热入营血；舌淡而苔滑，为水湿内停。舌红苔燥，多属热盛伤津；舌淡苔燥，乃痰饮水湿郁遏阳气。舌苔由润变燥，表明津液渐伤；由燥转润，则提示热退津复。

腐腻苔：舌面覆盖一层苔垢，苔质疏松，颗粒较大、松软，形如豆渣堆积舌面，刮之易去，称为腐苔；若苔质致密，颗粒细腻，如油腻覆盖舌面，刮之难去，为腻苔。腐苔主食积、痰浊，多因阳热有余，蒸腾胃中腐浊邪气上泛，聚集于舌而成。腻苔多见于湿浊、

痰饮等浊邪阻滞，胃气不降的病证，因湿浊内阻，阳气被遏，湿浊停积舌面而成。

剥落苔：舌苔在病程中全部或部分剥脱者称剥落苔，简称剥苔。剥落苔的形成是因胃气匮乏不得上蒸于舌，或胃阴枯涸不能上潮于口所致。根据苔剥落的部位和大小而形成不同类型。舌前部苔剥落者，称前剥苔；舌中部苔剥落者，称中剥苔；舌苔多处剥落，舌面仅存少量斑驳片舌苔，称花剥苔；若舌苔骤然退去，舌面光洁如镜者，即为光剥舌，又称镜面舌，是胃阴枯竭，胃气大伤，毫无生机的危重征象。

观察舌苔剥脱变化，既可测知胃气、胃阴的存亡，也可反映邪正的盛衰，判断疾病的预后。如舌苔从有到剥苔，是胃的气阴不足，正气渐衰的表现；但舌苔剥落之后，复生薄白苔者，乃邪去正胜，胃气渐复之佳兆；痰热湿浊内阻出现剥苔，则是邪气渐退，而胃阴耗伤之象。

辨舌苔之剥落应注意与先天性剥苔加以区别，先天性剥苔部位常在人字沟前呈菱形，是先天发育不良所致。

真假苔：辨舌苔真假，以有根、无根为标准。舌苔坚敛着实，紧贴舌面，刮之不脱者，为有根苔，称真苔。真苔多为实证，是胃气尚存，夹食积浊气上蒸所致。若苔不着实，似涂浮舌上，刮之即去，为无根苔，称假苔。假苔多见于虚证，为胃气大伤，不能上蒸，难以续生新苔，而原有之苔逐渐脱离舌体之故，所以刮之即脱。

察舌苔真假，可辨邪正盛衰，病情轻重顺逆。病在初、中期出现假苔，表明邪浊聚积，病尚轻浅；若见真苔且厚，为胃气壅实，病较深重；久病出现假苔，是胃气匮乏之逆证；若见真苔，则是真气来复的顺证。

舌质和舌苔的综合诊察

舌苔和舌质的变化所反映的生理和病理意义各有侧重，故临床诊舌必须舌苔与舌质合参。舌苔的色、质变化与所感邪气及病证的性质有关；舌质的色、形主要反映脏腑气血津液情况。因此在诊察疾病时，不仅应详察舌苔、舌质的基本变化与主病，还须注意不同舌苔与舌质之间的相互关系，将两者结合起来审察病情。

通常舌质与舌苔的变化是一致的，所反映的病机也是相关的，如内有实热，则见舌质红、舌苔黄；虚寒证则多见舌质淡白、舌苔白。但在某些疾病中可出现两者变化不一的情况。主要有以下两种：

其一，舌质和舌苔单方面异常。无论病之久暂，都意味病情单纯。可提示病邪性质、病程长短、病位深浅及邪正盛衰等情况。

其二，舌质和舌苔均有改变，但变化不一致。对此应从三个方面考察：一要着重从舌质分析病机，如舌质淡胖两嫩，苔黄滑润者，则舌质反映其阳虚，苔滑润体现水湿不化，其黄色则不能从热而辨；二要着重从舌苔辨其病机，如淡红舌黄黑苔而干燥，此时舌苔反映了里热炽盛，且有伤津之象；三是提示存在两种以上的病理变化，病情较为复杂，辨证应考虑二者的意义，不要轻易从舍。如舌红苔白滑，主里热挟痰；舌红瘦苔黑，为热盛伤津等。

参 考 书 目

古籍中医：

《黄帝内经·素问》	《黄帝内经·灵枢》	《难经》
《伤寒论》	《千金方》	《伤寒杂病论》
《本草纲目》	《神农本草经》	《金匱要略》
《四圣心源》	《证类本草》	《汤头歌诀》
《濒湖脉学》	《温病条辨》	《医学入门》
《类证治裁》		

现代中医：

《中国药典》	《中华本草》	《中草药大典》
《中医基础》	《中医药理学》	《中医方剂学》
《中医临床学》	《中医内科学》	《中医外科学》
《中医诊断学》	《中医骨科学》	《中医耳鼻喉科学》
《中医眼科学》	《中医舌诊》	《思考中医》
《衷中参西录》		

西医：

《内科学》
《外科学》
《诊断学》

后 记

作者作为一名中医爱好者，在最近几年才开始接触中医药，但是在最开始学习了解中医药的时候，仿佛是被别人打开了一个神奇的通道，突然间发现了一个伟大而神秘的宝库，一个中华民族几千年来积累了无数伟大的中医医生的智慧与创造而长期积累下来的医学宝库，深深的被它的神秘和天才思想所吸引和折服。中医博大精深，资料浩如烟海，学习中医药注定是一个漫长而艰苦的行程，但是同时又会充满乐趣和力量的过程，也有一份民族的自豪感洋溢在心中。我会在这条崎岖的道路上走下去，为伟大的中医药事业的发展和崛起奉献自己的一份力量。

环伺中医药在这个社会上的发展环境，由于现代社会是一个物欲横流的社会。中医药由于不能够迅速带来巨大的经济利益，被西医压缩在了一个小小的有限的空间里面艰难的生存。但是，是金子在哪里都会发光，治疗疾病的理论思想和西医相比较，中医其实要比西医先进多了，而最终人民会做出正确的选择。包括全球华人和不少熟悉中国文化的外籍人士，在生活水平不断提高的今天，他们也越来越注重于自己的身体健康水平。同时，由于中医药治未病的先进思想，他们也越来越多的关注中医药，身体力行的使用中医药来获得健康的身躯，这就是中医药越来越强大的动力来源。

在完成作者的第一部第二部医药著作后，也在策划第三步医药保健书籍，将以药食两用药物为主来快速分类检索，方便读者。计划在 2021 年或者 2022 年推出。

一片仁心昭万古，千方妙药救众生

中医中药必将再次崛起！

作者：张莽 2020-12-26 于深圳